






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4871/A/1








Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4871/A/1



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4871/A/1





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4871/A/1

12/


4871(2)

A. XIX. 0

Vormick  
May 03




~~420~~ ~~5~~ ~~10~~ 9980  
283 37





PAVLI  
AEGINETAE  
MEDICI OPERA,

A IOANNE GVINTERIO  
Andernaco Medico exercitatissimo  
summiq[ue] iudicij conuersa, &  
illustrata commentarijs.




*Adiectæ sunt Annotationes Iacobi Goupyli  
Medici Parisiensis, in aliquot singulo-  
rum Librorum Capita.*




VENETIIS,  
Apud Hieronymum Scotum.

---


M D LXVII.







AD HONORATISS.  
VIRVM IO. BELLAIVM  
CARDINALEM ET EPISCOPVM  
PARISIENSEM,



IO. GVINTERII ANDERNACI  
*Medici in Paulum Aeginetam præfatio.*



**Q**UAM olim Pauli Aeginetæ interpretationem latinam tibi dicaui, uir honorate, & omni dignitate princeps, eam rursus maiore nunc cura, & fide ad uetusta exemplaria, ipsiusq; artis rationem exactam, recognitamq; ac breuibus quibusdam commentarijs, illustratam offero: non dubitans, quin illam eo sis animo excepturus, quo olim ueluti rudimenta, & prima operum nostrorum exercitia solebas. Hoc autem nomine potissimum offero: ut gregijs tuis in me beneficijs, literata quedam remuneratione, ac debita beneuolentiæ memoria gratiam reponeam. Tu siquidem iuuentutis nostræ studijs ad optimas quasq; artes celebrandas, recolendasq; fauere nunquam destitisti: per te labores nostri, qualescunq; in Græcis medicinæ autoribus suscepti, clarissimo Francorum Regi Francisco innotuerunt. Vnde mihi non uulgaria præmia,  
\* 2 & data



& data sunt, & proposita, siue ad opes, siue ad gratiam.  
Ergo quicquid à me unquam exactius eruditiusq; proue-  
nerit, id omne iure tibi optimo debere me libenter agno-  
scam. Cui enim potius aliquis otij sui fructum acceptum  
referre poterit, quàm Mecænati suo, & patrono, e q; eru-  
ditione, prudentia, & pietate excellentissimo? sub cuius  
etiam nominis celebritate & patrocinio tutior à male-  
uolis, & uiligatoribus esse possit. Nam hodie ita com-  
paratum est, ut statim ubi quis ingenij sui fœturas ma-  
gno partas sudore in publicum ediderit, nonnulli malefe-  
riati homines, acutius atque acrius uitia quàm recta ui-  
deant: auctori potius, quàm codicum deprauationi ascri-  
bentes, quanquam nullius hætenus fuerit philosophiæ,  
aut medicinæ interpret, quem non sæpius aberrasse de-  
monstrare possem. Nullus autem labor in disciplinis ue-  
teribus instaurandis, magis quidem negotij, & mole-  
stie plenius, minus autē auctori gloriosius suscipi queat,  
quam qui in auctoribus conuertendis insumitur. Id quod  
ego annis iam sat multis experior, dum communibus ho-  
minum studijs & publicæ utilitati prodesse cogito. Cum  
enim olim Lutetiæ medicinam publicè docerem, non pau-  
cos obiter Græcorum libros scholæ nostræ quasi latinita-  
te donavi, ac in hoc præsertim excudendos permisi: pri-  
mum ut amicis aliquot gratificarer, deinde ut haberē ex  
ueteribus medicis, quos studiosis prælegerem. Eos tamen  
libros ex tempore sic potius quàm cura translatos, inte-  
rim per interualla reuifere, ac recognoscere decreuerā,  
maius aliquando otium, & meliorum codicū exemplaria  
nactus, sine quibus nihil posse quemlibet ingeniosum pu-  
to. Inter ceteros Paulum quoq; Aeginetam, excellentē  
medicinæ scriptorem, annis mille desideratum, primus in  
tegrum




tegrum latinū facere sum aggressus, ea sanè causa & ra-  
tione, ut post ampla illa Galeni theoremata compendio-  
sum aliquē authorem scholæ nostræ haberent, ex quo me  
dendi rationē, quam practicē uocant, fideliter condisce-  
rent. Paulus siquidem omnes recentiores à Galeno citra  
controuersiā compendio, ordine, artificio, perspicuitate,  
& doctrina superat. Adde quod multa erudite tractet,  
alijs aut intacta, aut etiā incognita. Quid de parte chi-  
rurgica dicam? quam ita feliciter & dilucidè persequi-  
tur, ut Auicēna ille Arabicæ familiæ princeps non pau-  
ca in suum librum mutuare sit dignatus. Porro quod ad  
partes meas attinet, in hisce septem Pauli libris pluri-  
mum laboris mihi subeundū fuit, tum exemplariū uitio,  
quamuis tria contigerint diuersa, tum quòd in Chirurgi-  
ca uel instrumentorū nomine difficillima, nulli fere Lati-  
ni autores habeantur, quos tutò queas imitari. Quippe  
is semper mihi in uertendis Græcorū monumentis fuit  
animus, ut præter fidem, purè omnia Latine & planè  
quoad eius fieri potuit, exprimerem. Quamquam hodie  
multos agrestes hircososq; philosophos, si dijs placet, ui-  
dere liceat, quos impolita, & rudia magis delectant. Ex  
horū numero nonnulli grauiore disciplina exponere ag-  
gressi, uocabulis sordidis, & à politiore humanitate alie-  
nis fædarunt, contaminaruntq;. Vnde fit, ut qui paulò  
humanius educati, institutiq; sint, non reformident illas  
adeò sed fugiant, oderint, & despiciant: cum magis refer-  
ret egregias mentes, præclaraq; ingenia, sermonis uenu-  
state, & elegantia, ad seueriores illas, ut ita dicā, matro-  
nas allicere. Quod an nos in hoc opere præstitimus, alio-  
rum esto iudicium, certe sedulò conati sumus. Vale uir  
clarissime apud Mediomatrices.

\*


3

PAULI





INDEX EORVM  
QVAE HOC OPERE  
CONTINETVR.



BAPTISMVS	Abscessus rumpentia	290
instrumen	Abscessum generatio	291
tum 435	Notæ	ibid. & 304
Abdominis	Abscessum neruicorum medi-	
interioris	camenta	290
membra-	Absinthium	479
nę uulne-	Acacalis, Acacia, Acalyphe,	
ra quomodo manu curen-	Acantha, Aegyptia uel arabi-	
tur	ca, Acanthaleuce, Acan-	
Abdominis suendi ratio	thium	470
Abies	Acantobolon	382
Abrasa quomodo curēda	Acanthus	470
Abraza ab inflāmatione quid	Aceratos emplastrū Gal. 619	
tueatur	Acerabulū 510 & 662 & 663	
Abratum	Acoti fax	549
Abscessibus corporis exterior-	Acetum	527
ribus conuenientia medica	Acetum scillites 575. quibus	
menta	utile	575
In abscessibus qualia corpora	Achores quid 113. unde orian-	
inueniri soleant	tur ibid. quomodo curen-	
Abscessui quomō manu scal-	tur ibid. & 114	
pelloq; sit medendum	Achras	479
Abcessum in pus trāgisse quo	Acidorum uires	265
modo deprehendendū	Acinos herba	40
Abcessus medicamētorū	Acini mali punici	536
Abcessus quid	Aconitum	470
	Aconiti	



# INDEX.

Aconiti poti notæ 355	Reme	menta	320
dia	356	acutus morbus exacte nō exa	
Acopa unde dicantur 231 &		cte	713
637 & 6. 7		acutus morbus	ibidem
Acopa calefacientia quibus cō		acutus ex decedentia	714
stent, eorum usus, Acopa e-		adarce tantū acrimoniæ & ca-	
mollientia quibus conue-		lois habet ut extrinsecus	
niant, Acopa quam spissitu		cū aliis imposita urat.	468
dinem habere debeant 637		adeps animalium . 47 & 43.	
Acopon à uarietate pœcilon		suillus ibidē caprillus ibidē	
dictum	638	anserinus ibidem. gallorum	
Acopon azanitæ, Acopon bar		gallarum ibid. leoninus	
baricum dia euphorbiu, ad		ibidem bubulus ibidem. ur	
coxendicum dolores, & alia		sinus, uulpinus ibidem uipe	
pleraque	640	rinus	ibidem
acopon Basilii,	ibidem	adeps marinum calidior & sic-	
acopon bromion	638	cior quàm sceminarū ibid.	
acopō cui nomē est pyxis 636		adeps uetustate calidior reddi-	
acopon dysodes ex Gal 638.		tur	544
aliud	ibidem	adglutinamenta	602
acopon ex abiete Gal.	640	adanthum	471 & 832
acopon ex atramēto librario,		adolescencia ætas	671
cutis ruborem peculiariter		adolescens mulier	ibid.
inducens, idq; potissimum		ædæon	408
in iis quibus altera capitis		ægilops	771
pars dolet, ex commētariis		ægilops	468
Alexandri	641	ægilops morbus quid. 149 &	
acopon ex nigra populo. 640		376 curatio	ibidem
& 673		ægirinum oleum	645
acopon lysiponium	639	ægiros	463
acoron	470	ægyptia artaba	63
acorus nostra	322	ægyptia, pessus	662
acrides	479	ægyptia spina sanguinem &	
acrium uires	468	alias fluxiones retinet	470
acrochordon	2 3	ægyptia stomatica	599
acroteria sinos	426	ægyptia terra	483
acrou acraganthus	87	æma	469
acte	470	æquinoctium uernum quid in	
aculeos extrahentia medica-		hominibus efficiat	55
		* 4 æquinoctio	



# I N D E X:

Aequinoctio uerno quid faciendum	ibidem	Aethale	467
Aequinoctium uernū dies habet quadraginta sex usque ad uergiliarum ortum ibi.		Aethiopica olea	489
Aequinoctiū autumnale quid in homine efficiat	56	Aethiopsis	468
Aequinoctio autumnali quid faciendum, & Ab æquinoctio autumnali dies sunt quadraginta sex ad occasum uergiliarum	ibidem	Aetius Cappadox	272
Aera lolium	469	aetonycho. 468 agallocū	467
Aeræ aquæ quib. cōferunt	24	Agapeti compositio ad podagram. 584	Agaricum 457
Acrem morborū causam esse quomodo cognoscatur.	87	agarici nigri damnum corpori afferentis remedia	362
Aereolus	661	agarici uires. 558	Dandi modus & pondus. ibidem.
Aer intemperatus contrariæ temperiei confert	22	le deligendū, ageraton	467
Aeris flos mixtus collyrijs palpebrarum & asperitates & ficus exterit. 552	quomodo coqui debeat	649	ageratus
Aer optimus. 22	Semper prodest, & Aer temperatus corporibus utilis	ibid.	agglutinamenta
Aer uiciosus ibidem. semper nocet ibidem : quomodo emendandus	87		602 & 601
Aerugo 458	quomodo coquenda	653	agglutinamēta oculorum quibus defluxionib. infestatur
Aes combustū ad cicatricem ulceribus obducendam in sicccioribus corporibus præstantissimum est. 552	quomodo coquendum	662	agnus
Aestate quæ uictus ratio conueniat	25		465
Aetatum omniū uictus ratio	6		agninus sanguis
			469
			agrestis
			467
			Agrioscordon
			540
			aima 469
			aizoon 456
			alabastrites
			517
			alana terra
			486
			alæ quomodo adurantur
			393
			alauda. 510
			albus cygnus
			664
			albugines oculorum quomodo curentur
			154
			album diarodon
			609
			alexa. 471
			alcibiadion
			496
			alcibiadios anchusa
			467
			alcyonium
			475
			alexandri cyphoides
			582
			alexandri purgatio ex Rhodomelite confecta
			562
			alexandri acopon ex atramento librario
			637
			alica
			43
			alimenta quæ laudatiss.
			40
			alimentum facultates ibidem
			alimon



# INDEX.

alimon	471	aluus quomodo emolliēda	54
allium	42 & 540	alui deiectiones quid præsa-	
alme	471	giant 74. uide deiectio.	
aloe	ibidem	aluo astrictæ quomodo me-	
aloe quibus danda	556	dum	213
aloen exhibēdi tempus & mo-		aluus quomodo subducenda	
du	ibidem	sanis	20
aloe quomodo coquenda	654	alui fluxionibus maxime bi-	
aloe sola inter medicamenta		lios medetur lac coctū in	
purgantia stomacho con-		quod demissi sunt igniti ma-	
ducit	557	rini calculi 49 & intestino-	
alopex	472	rum torminibus	49
alopecia unde dicta	107	alui astrictæ citæ & cruentæ	
alopeciæ remedia	108	in febribus causæ & cura-	
alopecia & ophiasis quomodo		tio	103
differant	107	alypon	472
alos achne	472	alypi feminis uires, quantitas	
alos anthos	ibidem	& dandi modus	559
alphitidon	431	alysion	472
alporum generatio	281	alysii uires & utendi mo-	
ratio	ibidem	dus	559
alphi albi unde ducant origi-		amantium notæ 135. cura-	
nem	ibidem	tio	ibidem
alphi nigri unde generantur		amaracinum oleum	643
ibidem		amaracus	472
als	470	amarantus	472 & 490
alsine	473 & 523	amarorum uires	465
altercum	549	amaurosis oculorum	158
alterci assumpti notæ	354	ammanitæ fungi	43
media	ibidem	amazonum pastillus	589
althæa	471	ambrosia ad febres arcendas	
alumen 543. quomodo co-		apta	638
quendum	646	ambrosia	472
aluminatæ aquæ ad quid con-		ambustorum medicamenta	
ducant	24		284
aluus quomodo subducen-		ambustis quomodo pili renā-	
da	12	scantur	285
aluus pueris quomodo cien-		ami	472
da	405	amiantum	ibidem
		amithæonis	



# INDEX

amithonis empl.	619	andrachme	474
ammos	473	andronius pastillus	590
ammoniacum quomodo co-		androsæmon, androsarces	474
quendum	615	anemomæ	ibidem
ammoniacum thymiana, am-		anethine malagma	636
moniacū suffimen, ammo-		anethinum oleum	643
niaci gutta	473	anethum	474
ammoniaci suffiminis, pon-		anethinum olea incoctū, dolo-	
rus. modus utendi, atque		re lenit & somniferū est	92
uirres	560	aneurisma quid	336. Eius cau-
anomum	474	sæ: 87. Notæ ibid. curatio,	
amores	131	angina eiusq; species, & cura-	
ampelos melæna, & ampelos		tio	173
leuce	473	anguis senecta	485
ampelos agria	473	anicetos empl.	619
ampelos hemeros	ibid.	ani inflātionis curatio	33
ampeloprasum	473	ani erysipelata quomodo cure-	
ampelitis terra	485	tur	ibidem
amphisbenæ morsus curatio		ani dolorem mitigantia	234
344		ani excrecentia quomodo cu-	
amigdalinum oleum	643	randæ	ibidem & 235
amygdalinum metopion ibid.		ani ulcera pascendo serpentina	
amygdala, dulcia, amara	43 &	quomodo sananda	232
475		ani rimas curantia ibid. &	234
amylum	43	ani cōdylomata quomodo cu-	
amylon, & amurca	373	randa	234
ambrosiismus in quibus &		ani cōdylomata, tubercula &	
quomodo fiat.	272	rimæ quomodo manu cu-	
anagallis, & anagyrus	475	rentur	424
anarrhinon	475	ani fistularum curatio manu	
ancylosis quid & quomodo cu-		administrata	420
randa	326	ani non perforati curatio	423
anaphorici	178	ani ulcera humida quomodo	
anas	46	curanda	232
anatis sanguis	469	ani ulcera citra inflātionē	
anchilops eiusq; curatio	149	oborta quomō curāda ibid.	
anchusæ quatuor	467	ani procidentis curatio	235
ancyle, & ancylosis	226	ani ulcera sicca recentia quo-	
ancylion, ancyloglosson	380	modo curanda	232
		animi	



# INDEX.

animi relaxatio ad probā cor- poris educationem pluri- mum affert momenti 6	apechema. 423	aphace 479
animæ defectus causæ & re- media 104. & deinceps	aphrodes papauer 521	
animalia pedestria 47	aphronitrum 479	
animalia fera siccus,quā do- mestica, alimentū exhibēt, minusq; excrementiciū 48	aphroselenes lapis 517	
animalia uolatilia 46	aphroditarium 595	
animalium partes 47	aphrodisiasticon clidon pastil- lus. 586	aphros. 479
animalium pedestrium car- nes, & anisum 475	aphias curantia 6. & 171	
anodynon medicamentum ad abrasā, flagris cæsa, & articu- lorum contusiones 286	apiastrum. 521	apios 476
anodynō colliriū liquidū 146	apium 538	apiū grandæ 498
anonis 475	apium palustre 49	
anoresia 192	apium ictus notæ. 329	Reme- dia, & apium montanū 527
anser 46	apium sylvestre 541	
anserinū adeps 542	apii dimidii quod ad radicem est utendi modus 559	
anseris sanguis 469	apiū quas uires possideat 41	
anserū oua 46,	apochyma 476	
anthemis 555	apochymatis coctio 655	
antheron 597,	apochynon 476	
anthyllis 475	apollinaris herba 551	
antiadas curantia 172	apomeli 601	
antidotum quid 571	apomeli, ex commētariis phi- lagrii 601	
antidotum dia hæmaton ex sanguinibus 471 & 469	apoplexia quid 125	
antidotorum differentia 571	apoplexia cui ætati & tēpera- mēto potissimū accidat 136	
antidotum Mitridatis, dialtin- cu 575	apoplexiæ signa, & apoplexiæ causā apoplexia curatio 136	
antidotum philonis 577	apofyrmata quomodo curan- da 285	
antidotum, Sotera 578	apotherapia 8. & 10. & 11	
antidotum Satyriacum 587	apothrausis 432	
antidotum theodoretum 217	appetentia canina quomodo curanda 99	
antidotū theriace quomodo paretur 570. Eius usus 572	apri iccur 495	
anthirrhinon 475	aqua 549	nitrosa, bitumino- sa, ibid pluuiialis, ibidem ma- rina 497
antiochi hiera 567		aqua
antilium 636		
antitasis 438	aparina 476	



# I N D E X.

aqua hydropicis quomodo emittatur. 396.	aqua inter cutem. Vide, hydrops, & aquæ aluminatæ ad quid conducant 24.	nitrosæ, & falsæ ibid.	sulfuratæ ibid.	bituminatæ ibid.	ferreæ, & aqua in qua ferrū extinctū est 538
aqua frigida qñ assumenda 23	aquam educentia 560.	quibus conueniant	ibid.	aquæ rosatæ quam hydrostatum dicūt, compositio 601	aquosorum uis 465
aquosum ramicē curātia 228	aqua frigida quando cum fiducia propinanda in febribus 83	aquam elicentiā quibus exhibenda 562	aquæ bituminæ quibus conferant 24	aquarum naturalium differentia, & aquæ sulfuratæ quibus conferant, & aqua uitiosa quomodo emēdanda 23	aquæ falsæ & nitrosæ quibus conferant 24
aquæ ferreæ quibus conferant	ibidem	aquæ uitiosæ notæ 22	aquæ frigida potu coercendi phrenitici 127	aquam educentia 220	aquam uitiosam sumpturus quæ præmittere debeat 23
aquosorum uires 464	aqua marina 496	aquarum naturalium uis 24	aqua frigida in febribus putridis quando tutò exhibeatur, & aqua quæ optima 22	cuius notæ 78	aquæ areæ quibus cōferāt 24
aquæ frigida subito cumulatim potæ remedia 362	aqua uitiosa 22.	quomodo corrigenda 23	aquarum sponte prouenientū differentia 24.	uires ibi.	arabica spina 469
arabicus lapis 517	arachne, & araneus 476	araneæ ictus notæ 340.	remedia, & arbutus 508	aceuthos 476	archigenis hiera 566
archigenis medicamentum ad uiperarum morsus 344	archigenis medicamentum ad erosionem mamillarum cū malignitate 290	archigenis medicamentū ad carcinode & cacoethe ulceram 300	arction. 466	arena 473	algemon. 152
argemone 476	argæi montis Cappadociæ lapides 517	argentum uiuum 549	argenti spuma 516.	quomodo coquenda 652	argenti uiui assumpti notæ & remedia 361
argenti recrementum 490	arida medicamenta eorumq; uariæ differentia. 591	aridū ad xerophthalmiā &c. 609	aridum		



# INDEX.

aridum collyrium Gal. quod	612	diagnoscendi causa	64
oculos tueretur	612	arteriæ post aures in quibus	
aridum dia crocu	612	passionibus incidendæ	365
aridorum mensuræ	663	arteriæ quomodo diuidantur	
arietum testiculi	47	ibidem	
ariobarzanion emplastrū	614	arteriæ asperæ tumor q. bron-	
arifarum	475	cho cele dicitur	387. eius
aristolochia	ibidem	differtētia duplex ibidem cura-	
aristolochiæ clematidis pon-		tio	388
us, modus exhibendi & ui-		arteriam humidiorē quæ red-	
res	558	dant	72
aristophanium empl.	620	arteria aspera quomodo inci-	
armenia	45	di debeat	383
armenia empl.	623	ἀσπεράκιον	175
armenia terra	485	arteriotomia	265
armeniacus lapis	517	arthritis quid 258 signa	ibid.
armeniacum	477	arthritidis causæ	257
armenia mala	45	arthritis à podagra quid diffe-	
arnabo	477	rat	258
arnoglossum	477	arthritidis ex sanguineo hu-	
aron	477	more curatio	261
arquatus	225	arthriticis non sanguineis so-	
arsenicum	477	lum, sed pituitosis etiam &	
artaba ægyptia	663	melancholicis in morbi ini-	
artemisiæ	477	tic sanguis mitti debet ibi.	
arteriace ad abscissum uocis		arthritid s ex bile curatio	259
sonum & eius claritatem fa-		articularius morbus uide ar-	
ciens	178	thritis.	
arteriace, hypoglossis appel-		articulorum dolor uehemens	
lata, ad abscissionem uo-		quomodo leniendus	ibid.
cis, raucitatem, & ægrè reii-		articuli unde laxantur articu-	
cientes	ibidem	lorū relaxatorū curatio	317
arteriæ quid	63	articulorum doloribus cura	
arteriarum usus	ibidem	quis intentio frigore in mor-	
arteriarum origo	ibidem	morbus inter ossa curatio	
arteriæ omnes eodem pulsū		rum impactus	263
di modo inter se & cum cor		articulorum uel quomodo	
de conueniunt	ibid.	curandi	263
arteriæ quæ tangendæ pulsus		articulorum topior quid cura	



# I N D E X.

scere impediāt	263	aster pastillus	585
articularum intortorū & con-		astragalus	479
tusorum remedia	302	astmatici 179. eorū curō ibid.	
articularum contractio seu li-		astringentium uires	465
gatio quæ ancylosis dicitur		astringentiū ante & post cibū	
quomodo curanda	326	sumptorum facultas	45
articularum cōtusionum me-		atactos compositio ad poda-	
dicamenta	286	gram	584
articularum morbis quomo-		attegna	46
do & quæ medicamenta		athanasia Oribasii	577
adhibenda	262	athema emplastrum	620
articularū ulcerū curatio	320	athera	469
artos 478 artus sanguine in-		atheroma quid 306. curatio	
festati quomō curētur	264	ibid. & 386	
asarum. 478 asbole 478		atracton. 428 atractylis 479	
ascalabores, & ascarides lum-		atractylis uires	41
brici 331. ubi generentur		atra bilis duplici modo gene-	
ibid. causæ & curatio	332	ratur	560
ascyrrhon	473	atram bilem uacuantia medi-	
ascyrrhoides	475	camenta simplicia	560
asclepias	478	atram bilem purgantia medi-	
asclepion chironium	530	camenta quibus & quando	
asclepion panaces	ibid.	exhibenda	560
asclepios smegma aridū	594	atramentum indicum	520
aselli. 459 asæ petrae flos	517	atramentum scriptorium	510
asini 527 asininum lac	482	atramenrum sutorium 552. c.	
asininū iecur. 495 aspaltus	479	20. 4. quomodo coquen-	
aspalatus. 478 asparagus	49	dum	654
asparagorum differentia & ui-		atriplex	479
res 479 asphodelus	42	atrophia oculorum	156
aspera arteria quomodo inci-		attenuantium alimentorum	
di debeat	383	uires	40
aspidis morsus notæ	346	auditum grauē corrigentia	14
curatio	347	auditum grauem curātia	161
aspidis tria genera	346	auditus grauis quomodo cu-	
aspidis exuuium	485	randus	163
asplenon, astaphis, aster attri-		auditorii meatus non perfora-	
cus	478	ti causa & curatio	377
aster magni	610	auellana 45 auena	43
		auenæ	



# INDEX

auenæ decoctio. 43 aues 46

aures animalium 47

auricula muris 472

auriū sordes extrahentia 161

aurium dolor quas causas ha-  
beat & quomodo curari de-  
beat 159: & deinde per to-  
tum caput.

auribus incidentia quomodo  
extrahantur. 163

auribus incidentia quomodo  
modo extrahantur. 378

aurium sonitus quomodo cu-  
randus 163

auriū uermes quomodo cu-  
randi, aurium cruorem fun-  
dentium remedia, aurium  
ulcera diuturna quæ sa-  
nent 162

aurium tinnitus quomodo e-  
mendandus 163

auriū humiditates desiccantia 5

auris contusæ curatio 422

aurium pus curantia 161

aurium caro excrescens quo-  
modo arcenda 162

aurium ulceribus cum inflam-  
matione quid faciendū ibi.

aurium curia quomodo sar-  
cienda 379

aurium contusio quomodo cu-  
randa 163

auripigmenti assumpti notæ  
361. remedia ibid.

auripigmentum 479. quomo-  
do coquendum 649

autumno quæ uictus ratio con-  
ueniat 25

auulforum remedia 203

## B

Bacca prunorum sylue-  
strium 507

Baccharis 480

Baion malagma 634

Balaninon oleum 645

Balanus myrepica 480

Balaustium, Balenæ 50

Ballote. 480 Balnea alumi-  
nosa quibus conferant 24

Balnea area quib. cōferat ibi.

Balnea bituminata quibus cō-  
ferant ibid.

Balnea ferrea quibus confe-  
rant ibidem

Balnea salsa & nitrosa quibus  
conferant 24

Balnea sulfurata quibus con-  
ferant ibidem

Balnei aquæ dulcis calidi uti-  
litates ibidem

Balneorum naturalium diffe-  
rentiæ ibidem

Balneorum sordes 485

Balsamum 480

Barbara, emplastrum 620

Barbaricum acopon, dia eu-  
phorbiu 639

Barbe alopecii efficax reme-  
dium. 151

Basilisci morsus notæ 347

Basilicum tetrapharmacū 614

Basilii acopon 639

Bassi hygra adhypopios 153

Batina mora 599

Batrachi Bdellium 480

Bdellii pondus, & modus uten-  
di 560

Bdelliū quomō coquendū 651

Bechicon



# INDEX.

Bechicon	178	curetur	458
Bechicon ex styrace ad rullim		Brachii contracti curatio	443
377		Brassicę marine facultates	41
Bechum 481	Belulcum 428	Brassica marina	476
Belass. 524	Beta 545	Brassicę facultates	41
Beta uires. 41	Betonica 481	Brathy. 486	Brion 482
Bilis atra duplici modo generatur	272	Britānica Bromiō acopō	634
Bilis uomitioni quomodo occurrendum	102	Bromus 482, Bronchion	182
Bilem atram uacuantia medicamenta simplicia	560	Bronchus	175
Bilem atram purgantia medicamenta quibus & quando exhibenda	ibid. & 60	Bronchocele	387
Bilem flauam educētia, quando & quibus exhibēda	560	Bryonia	483
Bilem flauam purgantia medicamenta simplicia 556. & sequentibus		Bryō thalassion, Buboniū	482
Biliosis alui fluxionibus medetur lac coctum in quod calculi marini igniti decocti sunt 49 & intestinorum torminibus	ibidem	Bubo quid 96. Curatio ibid.	
Bithynus pastillus	591	βουβονικήλη	227
Bitumen	48	Bubulum lac	483
Bituminatę aquę quibus conferant	24	Bubula caro	47
Bitumē quomō coquēdū	650	Bubulum stercus	262
Blatta quę in pistrinis inuentur	539	Bubulum stercus	508
Blepharoxiston	150	Bubulus talus	528
Blitum. 481	Bliti uires 41	Bubulus adeps	542
Boleti. 43	βομβύλια 124	Bucellatus purgans	561
Botanicum emplastrum	611	Buccina	50 & 505
Botryon. 152	Botrys 583	Buglossum. 482	Bulbus 481
Bouis femora cremata	529	Bulbus agrestis	357
Brachitlis luxatio quomodo		Bulbi	42
		Bulmos quomodo curet	99
		Bunium, Buphthalmion	482
		Buprestis assumptę notę	352
		Curatio, Buprestis	482
		Butyrum	482
		C	
		Cacalia	500
		Cachexia quid 218. eius curatio, Cactus arbor	541
		Cacoethe ulcera	315
		Cactus. 302 Cadmia 500. quomodo coquenda	653
		Cæcitude nocturna quid & quomodo curetur	156
		Cæli	



# I N D E X.

Cæsi flagris quomodo curan- di 285, & 86	Calidioris temperaturæ no- tæ, Calidi & humidi tempe- ramenti notæ
Calamagrostis 500	Caliginem oculorum prohi- bentia 14
Calamus, & Calaminta 500	Callus quid 419
Calcanei ex longo decubitu attritus quomodo curandi 268	Callos excindenda 318
Calcaneorum & plani pedū fissuræ quomodo curandæ ibi.	Caluariæ fractæ curatio 43
Calciamentorum ueterū co- ria 488	Caluitium unde fiat 107
Calx, & Calcis assumptæ no- tæ 361. remedia 549	Caluiti curatio 107 & 109
Calculorum in renibus no- tæ 207	Camarios 432
Calculi ne creentur 208	Cameli cerebrum 489
Calculorum materia 207	Campe 500 Cancamum 599
Calculi cussi eiectioni 175	Cancanus ibidem
Calculorum causæ 107	Cancer in quib. corporis par- tibus oriri soleat 299 Cau- sæ ibidem. Signa 300. Cura- tio 299
Calculi in uesica notæ 404	Cancer in foeminarum mam- mis cur potissimum acci- dat 299
Calculorum in renibus cura- tio 207	Cancer latens 394
Calculi uesicæ quomodo ex- cindendi 404	Cancer unde appelletur 300
Calculus quibus excinditur, qui facile curationem reci- pian 207	Cancer cur planè non consa- nescat, & Cancer quid 272.
Calculos quatuor aut quinque; asperos tribulorum modo, ad magnitudinem siliquarū trium, aut quatuor expuit quidam 182	Incurabilis, & Cancer quo- modo præcauendus 309
Calculus per anum in tenes- mo excretus 198	Cancer quibus partibus cor- poris accidat 394
Calculi in sanguinis reiectio- ne excreti 175	Cancer quid 394. unde dica- tur, ibidem. Eius curatio ma- xime adhibita ibid.
Calida intemperies quomo- do corrigatur 36	Cancro 50. & 501
Calidi & sicci temperamenti notæ 29	Canus non rabiosi morsus re- media 339
	Canis qui momordit rabio- sus sit an non, qua ratione cognoscas. 37 Canis rabidi morsum symptomata 326
	* * Caninus



# I N D E X.

Caninus appetitus quomo-	bona, quæ mala	30
do curandus	99	
Canis rabidi iecur	495	
Canis rabidi signa	336	
canum stercus	508	
canes rabiūt plernq; in æstu		
uehementiore	336	
canis rabiosi moruum reme-		
dia. 338	cannabis	509
canopus 561	canopon	500
cātharidis allūmptę signa 352		
curatio, cantharides	500	
capillus qua ratione aureus		
reddatur	111	
capitis dolor ex insolatu con-		
tractus quibus notis digno-		
scatur	115	
capitis dolor ex insolatu con-		
tractus quō curetur, capitis		
dolorem ex frigida intempe-		
rie notantia, & curantia, ca-		
pitis dolorem ex bilioso hu-		
more curantia	116	
caput cōfortij lege indolefcēs		
quomodo curetur, capitis do-		
lor ex uino quō cureter	117	
capitis dolor ex ictu quomo-		
do curetur, capitis plydracia		
quomodo curetur	112	
capitis dolorem ex calida in-		
temperie curantia	115	
capitis dolor unde oriatur		
ibidem		
capitis ulcuscula densa, rubra-		
que quomodo curanda	113	
capita 504	Menarū ibid.	Sma
ridis ibid.	Muris ibid	Milui
ibidem.	Lacertæ	ibidem
capitis quantitas & figura quę		
	bona, quæ mala	30
	capitis morbos quæ signa præ	
	cedant	13
	capitis ulcera manantia unde	
	fiant 113. quomodo curen-	
	tur	ibidem, & 114
	capitis exanthemata quomo-	
	do curentur	114
	capitis morborum signis ne-	
	glectis quæ ægritudines se-	
	quantur	54
	capitis morborum signa ubi	
	apparuerint quid faciendum	
	ibidem	
	capitis faui unde nascantur &	
	quomodo curentur	113
	capitis formatio	30
	capitis pediculi quomodo abi	
	gendi	114
	capito piscis	49
	capnistos pastillus	178
	capnion, & capnos	500
	capparis	41 & 501
	caprarum sanguis	470
	caprarum syluestrium sanguis	
	ibidem	
	caprillus finus	262
	caprillum stercus	508
	caprillus adeps	542
	caprilla caro	47
	caprillum lac	482
	caprillum cornu	503
	caprillum iecur	495
	caput adurendi modus	263
	caput quomodo aduratur in	
	lippientibus ægre spiranti-	
	bus, & elephanticeis	363
	caput per os & nares quibus	
	medicamentis euacuaudū 21	
	carbunculus	



# I N D E X.

carbuuculus quid. 298	causæ	caseus oxygalastinus	545
ibid. Notæ ibid. curatio ibid.		caseosum lactis	483
carbunculus	287	callamum	502
carbunculus oculorum	155	castia, & castanea	46
carcinoma oculorum	ibidem	castorium	502
cardamine	539	catagmaticæ Oribasii 625. ex	
cardamomum	501	cōmentariis Heraclei	ibid.
cardamum	501	catalepsis	125
cardiogmos. 127	carduus 541	cataphora quid	72
cari radix. 42	caricæ 44	cataphoræ curatio	93
cari species. 23	caris 501	cataphora quid 53. causæ ibi.	
caries lignorum	537	curatio	ibidem
carnes optimæ quæ	47	cataplasma quod oras uulne-	
carnes uolatilium quomodo		ris latas in rabidi canis mor-	
differant	46	su seruat	328
carnem generantia medica-		cataplasma ad sacrum ignem,	
menta	309	herpetas, & abscessus, paroti-	
carnis contusæ curatio	302	das, & ambusta	295
caro bubula	47	cataplasmata	590
caro ceruina	ibidem	catapotia ex aloe 562. modus	
caro hircina	ibidem	utendi atque pondus ibidem	
caro humana	ibidem	catapotia ex lapide armenico	
caro leporina	ibidem	arthriticis	565
caro ouilla	ibidem	catapotia ad tussim ueterem	
caro suilla	ibidem	accommodata	177
caro thymi salis	543	catapotia ex xylomacere, dy-	
caros	123	sentericis utilia	585
caros à lethargo quid diffe-		catapotia ad destillationem in	
rat	123	fauces & tussim	177
carpesium	502	catapotia Dosithei ad iecur in	
carpesiæ liquoris poti notæ		scripta	583
356. remedia	ibidem	catheter	213
carya	500	catheterismus	402
caryinum oleum	646	catochos	121 & 125
caryophyllon	500	catochi causæ ibid. Signa ibi-	
caseus	49 & 548	dem. curatio	126
caseus laudatior	49	catochi uel catochomeni un-	
caseus acris	ibidem	de dicti. 125	caucalis 503
caseus pessimus	ibidem	cauda equina	493
		✱✱ 2	causos



# I N D E X.

Causos febris	81	Ceratoides membrana	150
Cautica 157	Cecis 504	Ceratum thaidis quo facies	
Cedrea, Cedrus arbor	503	rubescat	198
Cedrus frutex, Ccle, Videra-		Ceratum dia turpænes ad po-	
mex, Cenchros, Cenchri		dagram dolorem leniens mi-	
morsus notæ	346	rabiliter	628
Curatio, Centaurium	503	Cerosis quid 415 quomodo	
Centaurii minoris uires 558.		sit emendanda	ibid.
Pondus ibid Exhibendi mo-		Cerebrum 490. Leporis ibid.	
du, & Centunculus	486	Galli ibid. Cameli ibid. Mu-	
Cepa 42.512	Cepæa 504	stelæ ibid Hirundinum ibi.	
Cephalæam curas apophleg-		Ouillum	ibidem
matissinus	120	Cerebri membranæ inflam-	
Cephalæ	504	mationis notæ, causæ & cu-	
Cephalææ curatio	118	ratio	436
Cephalæam curans epithe-		Cerebri uulnerati notæ	431
ma	ibidem	Cerebri membranæ conuul-	
Cephalæam curans unguen-		neratæ signa	ibidem
tum	119	Cerebri membranæ nigrescens	
Cephalæa	117	quomodo curetur	436
Cephalæam curantia medica-		Cerebri erysipelatis signa &	
menta uaria	119	curatio	123
Cephalalgia unde oriatur	115	Cerebri temperatum notæ 30	
Cephalicus puluis, capiti con-		Cerebrum animalium	47
ueniens	592	Cerebri inflammationis signa	
Cera	504	& curatio	123
Ceræ cum oleo qui modus		Cerion quid 421. eius cura-	
esse debeat in conficiendis		tio	ibidem
unguentis	656	Cerucis tumorū curatio	388
Cera quomodo coquenda	663	Cerui, cornu	503
Ceras 503	Ceramium 660	Cerui masculi pudendum	468
Ceramium Italicum	ibidem	Ceruina caro	47
Cerasia	45	Cerussæ assumptæ signa	361.
Cerasia 504. dulcia, austera		remedia, & Cerussa 555. quo	
ibid. acida	ibid.	modo coquenda	649
Cerasi arboris gummi	ibid.	Ceryces, & Cheræfolium	505
Cerastis morsus notæ	346	Chalbanæ	554
Curatio. 347	Ceratium 661	Chalaziō & eius curatio	150
Ceratonia arbor	504	Chalcanthon, Chalcitis	554
		Chalcitis	



# I N D E X.

Chalcitis quomodo coqui de beat	648	constantini sapo	593
Chalcidica lacerta	529	choriō. 4 8 chrysanthos	490
Chaleos. 554 Chalcus	661	cyryse emplastrum	625
Chalcuanthos	554	chryfocolla	556
Chalazium quid 373. curatio ibidem		chryfocome	556
Chamæ. 50 Chamæacte	471	hryfitus	556
chamædrops	555	chryfos. peflus emolliens	651
chamædrys, chamæleon	554	chus	651
chamæiææ pondus & modus adminiftrandi 558. uires ibi.		cibis in uentre corruptis quid faciendum	15
chamælaea	556	cibi fastidium prohibentia	1
chamæleuce	554	cibi fastidium eiusque cauffæ figna & curatio	191. & 192
chamæleontis nigri affumpti notæ 54 curatio	ibidem	cibi qui laudatiffimu	40
chamæleontis fanguis	469	cibi uarii affumi non debêt	40
chamæmelum	555	cibi fastidium in febribus quo modo curandum	98
chamæmelinon oleum	639	cicadæ	546
chamæpityos pondus & uten di modus	561	cicatrix ulceri quomodo indu cenda	313
camæpitys	555	cicatrices oculorum quomo- do curentur	154
chamæraphanon	561	cicatrices nigræ quomodo tol lendæ	516
chamæfyce, chelidones	555	cicatrices quomodo tingan- tur	154
chelidonia aspidis genus	346	cicer. 44	cicer 491
chelidonium. 55; chema	657	cichorium 506	cici 505
chemofis quid, & quomodo curetur	148	cicinum oleum	645
cherfæa aspidis genus	346	ciconiarum ftercus	509
chezananze	565	cicuta	513
chia terra	485	cicutæ potæ notæ 355. reime dia	ibid.
chiacum collyrion	601	cimex	485
chirurgicæ partes duæ	363	cinara quomodo præparan- da	41
chænix. 657. & 659 cholæ	555	cinerula. 342	cinis 545
cholera quid 195. eius curatio ibidem		cinnabaris, cinnamomū	505
chondrilla	556	cinaræ uires	41
chondrus	556	* * 3	cinocrambe
chondri coctio	43		



# I N D E X:

cinocrambe	476	cocci gnidii uires, pondus, &	
circæa	505	sumendi modus	598
circuncisorum curatio	403	coccus baphicos	507
cirsocele. 409	cissaros 506	coccymelæa	ibidem
cissleris	505	cochlea. 510	cochleæ 50
cissos, & cisthos	506	cochleæ terrestres, cælia	507
cissimum emplastrum	613	coeliacus affectus	197
cittæ causa	1	colchicon unde dicatur	357
citta grauidarum symptoma		colis glans contacta quomo-	
unde nomen acceperit	2	do aperiatur	401
citream malum	46	colicis dolor in Italia uictus	
citrei mali tres partes ibidem		ratione temeraria curatus à	
citrium	506	quodam medico	205
citrium malagma	633	colla. 507	colon quid 202
claudiacum dia smyrnon	607	colobomata	379
clauus quid 269. curatio ibid.		colocyntha, colocynthis	507
clauus quid & unde dicatur		colocinthidis effectus.	557
427. curatio	ibidem	pondus ibidem. exhibēdi mo-	
clauiculæ luxatæ curatio	455	duſ ibi. quib. exhibenda ibid.	
clauiculæ cōfractæ curō	441	colicorum remedium	217
clematis, clematis altera	506	colis glans nuda quomodo cō-	
cleonis collyrium	609	tegenda	401
cleopatrz mors	348	colicus morbus quid 202. caus-	
clidion aphrodisiasticon, pastil-		sæ ibidem signa ibidem, cura-	
lus	586	tio 203 & deinceps	
clidion oribasii ad dysenteri-		colico & renum dolori quid	
cos, & coeliacos	ibidem	commune, quid propriū 207	
clinopodium	506	colliquamenta corporis quō	
clystere uesicæ	403	curanda 92. & sequentibus	
clysteribus qui uti debeāt 20.		color urinæ aquosus rufus &	
& qualibus	ibidem	biliosus mediocriter palli-	
cneoron quas uires obtineat		duſ quid significet	7
560		color malus corporis quomo-	
cnicus	507	do emendandus	13
cnici seminis pondus & sumen		colpos quid 316. curatio	ibid.
di modus	598	columbarum sanguis	469
coagulum 535. leporinum ibi-		columbarum pullus	46
dem equinū ibid. Phoece ibi.		columbarum syluestrium ster-	
coccus cnidios	507	cus	509
		columella	



I N D E X:

columella 381. curatio ibidem	dat	128
columellæ inflammatio quomodo curanda	172	
collyrium anodynon	146	
collyrium malabathrinū	611	
colymbades. 45 collyria	603	
collyrium ex succo fœniculi	608	
collyriū ex opobalsamo	ibid.	
collyrium ex aloe	609	
collyrium ex succo fœnugræci, collyrium cleonis	609	
collyriū crassius ex uino	611	
collyrium ex duobus lapidibus ad asperitudinem	611	
collyrium aridum Gal. quod oculos tuetur	ibidem	
collyrium chiacum	614	
collyrium ex oleæ turionum succo tenerum	606	
collyrium ex decoctis	605	
collyrium ex cornu Gale.	608	
collirium monohemeron	604	
collyrium dia hydryas. repellens	602	
collyrium liquidum ex caualide	609	
collyrium dia crocu	ibidem	
collyrium Ilambonis	607	
collyrium è thure	608	
coma. 121 coma uigilans	121	
comatis uigilantis causæ	125	
signa ibid. curatio ibi. &	126	
comaros	508	
comitialis morbi notæ	128	
comitialis morbi causæ	ibid.	
comitialis morbi curatio	129.	
& deinceps, & comitialis morbus cui ferè ætati acci-		
comitialis morbus trifariam gignitur, & comitiales quomodo coarguendi	129	
comuni. 514 commi	508	
compositio Procli, podagræ & coxendicum doloribus accommodata	586	
compositio dia hermodactilu ad podagram	564	
compositio dia citriu, quod est ex malo medico, stomacho utilis	563	
compositio dia coronopodiu	565	
compositio rhodostacti	602	
compositio Agapeti ad podagram. 586 compositio atactos ad podagram	ibidem	
compositio pæonia	583	
conchulæ Indicæ	527	
conchyliæ	507	
concoctionis signa nunquam sinistrè apparent	61	
conditum calculos confringens	584	
cōdylomata locorū muliebriū 415. quō excidenda	ibidem	
condylomatū ani curatio manu administrata	423	
confecto Rhoetis	609	
confectio masuchæ	649	
congius	657. & 658. 659	
cōuulsiones unde oriantur	140	
cōuulsionibus puerorum, menditia. 5 conuulsiones ex inanitione originem ducant an ex repletionem quomodo cognoscendum	141	
conuulsionum	4	



# I N D E X.

convulsionum curatio	ibid.	do emendādus, corporis col	
conyza, & copros	508	liquamentorū remedia	92
copton ad duritiem stomachi		cortex piceæ	533
& iocinoris malagma	632	corydallus	510
coracon emplastrum	619	corydos, coryza	175
coria calceamentorum ue-		cos olearia	517
rum. 487 corallium	509	costarum rupturæ & contusio	
corium, coris herba, cordis		nis, notæ & curatio	441
affect' quomoda curādi	183	coctus	550
cor animalium	47	cotis noxiæ detrimentū	517
coriandrum	510	cotyla. 661 cotyleden	510
cordis palpitatio	189	coxarum dolor ab articulari	
coris animal, coriandri assum		morbo quid differat	255
pti notæ 355. curatio	509	coxarum doloris causæ	ibid.
corianum	509	Notæ ibid. curatio	ibid.
cordis temperaturæ notæ	33	coxarum fracturæ, differentia	
cornu. 504 caprillum, Hirci-		notæ, & curatio	442
num ibid. cerui ibid Tauri-		coxæ luxatæ curatio	464
num, & cornea membrana		coxendices quō adurātur	419
oculi	152	crania. 50 crambe	511
coronopos	510	crapulam quid discutiāt	51
corpus hominis in quatuor		cratægonos	511
partes diducitur	53	cremasteres	406
corpus ut bene oleat quomo-		creta sutoria	520
do efficiendum, corporis li-		cretica terra	485
uores prohibentia	31	crethmon	511
corpus crassum quomodo ex-		crinaton suffimen	649
tenuandum	27	crimnon, & crinon	511
corporis habitus quomodo		crines. 49 crisi instans quo	
recalfaciendus	13	modo agnoscenda	61
corpus tenue quomodo im-		crisis futura quomodo præno-	
pleatur	28	scenda, & crisis optima pera-	
corporum intemperatorum		cta quomodo agnoscēda	63
notæ	29	crisis qualis futura sit, quomo-	
corporis temperatissimi no-		do dignoscendum	61. & se-
tæ	23	quentibus.	
corpus pletoricum	62	chrite quid eiusq; curō	350
corpus quō erugandum	13	critonis smegma	597
corporis malus color quomo-		crocinum dia rhodon	610
		crocinum	



# I N D E X.

Crocium oleum	648	curei malagma	621
crocides pessus	651	cutis astrictio 10. Eius causæ	
crocides pastillus	589	ibid. Notæ ibid. curatio	11
crocodili terrestris sâguis	469	cuti senili teneræque conue-	
crocodilorum terrestriû ster-		uientia medicamenta	289
cus	509	cyamos, & cyanos	512
crocodili morsus remedia	340	ciathus. 6 cyclaminus	512
crocodilus terrestris	541	cyclamini radices pondus &	
crocodilon, & crocus	512	modus utendi	662
crocomagmatis cōfectura	618	cyclisti	435
crocomagma quō pareť	588	cydonaton contusum frag-	
cromnion 512. crotones	561	mentis saluis	435
crudis humoribus abundantes		cygnarium, cygnus albus	605
quam curandi rationem de-		cygnus rubens, cyminum	512
derent	89	cynanche, cynosbatus	513
cruenti sputi causæ signa	181	cyphi 645. Eius materia ibid.	
cruentû sputû quō cureť	182	usus ibidem	
crus quō reponi debeat	448	cyphi magnum quod uocant	
crusta generantia medica-		solare ex rebus triginta sex	
menta	322	confectum	648
crystalloides humor oculi	157	cyphi, quod rebus uigintiocto	
cubiti fractura quō curada	447	cōstat, lunare appellatû	649
cubiti luxatio quot modis		cyparissus, & cyperus	513
fiat & quomodo cureť	456	cyphoides Alexandri	582
cucumer. 44 cucumis	539	cyphoides medicamentum ad	
cucumis syluestris	ibid.	iecorosos & pectoris uitia	
cucumeris syluestris radices		582	
torricu pondus	560	cypros. 513 cytinus	537
cucurbitulas admouendi mo-		cyprinum oleum ex commen-	
dos. 391. & deinceps		tariis Posidonii	643
cucurbita syluestris	507	cyprinum aliud, cytisus	513
cucurbita. 44 cucurbita	507	D	
cucurbitularum usus	391	Damascena	46
cucurbitula leuis quid effi-		Damascena	507
ciat	391	Damascena, Damasoniû	487
cucurbitula cum scarificatio-		Daphne, & Daphne herba ibi.	
ne ad quid præstet	392	Daphnoides. 506 Darti	406
cuminum. 513 cupressus	512	Daucus 487 Dauci radix	42
cura quid	135	Decretoria signa in morborû	
		principio	



# I N D E X.

principio praua sunt 61. Sed	Destillationis curat. Destilla
ubi morbus inclinauerit, bo	tionis acris tenuisque cura
na sunt ibidem	tio. 177 Deuterion. 420
Decamyron malagma 629	Dia aloes medicamentum 595
Deiectio quæ optima 74	Dia anacardion 582
Deiectio cruda ibidem	Dia alicacabu pastillus 592
Deiectio merè ruffa ibidem	Diabrosis 181
Deiectio uiridis ibidem	Dia bacanu medicamentum he
Deiectio nigra ibidem	pati accommodatum 582
Deiectio liuida ibidem	Diabates quid 112. eius signa
Deiectio oleosa, pinguisque	ibid. curatio ibidem
ibidem	Dia calaminthes 581
Deiectio uiscosa ibidem	Diacodion, ex papaueris capi
Deiectio nimis foetida ibid.	tibus & melle 577
Deiectio omnium deterrima	Dia coralliu pastillus 588
& pestifera 75	Diacodion compositum 178
Deiectiones qd præfagiāt 56	Dia citriu medicamentū, tardè
Delphini 50	concoquentibus efficax 581
Dētes quomodo eximant 380	Diacodion, ex papaueris capi
Dentes exesi quomodo exi	tibus & sapa 177
mendi ibidem	Dia chartu pastillus 591
Dentes superflui quomodo	Dia citriu co npositio stoma
tollendi ibidem	cho utilis 563
Dens confractus quomodo cu	Dia chartu 596
randus ibidem	Dia coronopediu compō 555
Dentes ab interitu uindican	Diacodyon 121
tia 14	Dia ægylops, acopon 636
Dentium dolora sedētia 169	Dia æron emplast. 620
Dentes quo tempore oriātur	Dia cadmias empla. 615
pueris 4	Dia dictamnu empl. 617
Dentes attritos curantia 170	Dia erigerontos emplast. 624
Dentiū candorē facientia ibi.	Dia euphorbiu, acopon 631
Dentiū stuporē tollentia ibid.	Dia coralliu medicamentum,
Dentium inflammationē cu	podagricis idoneum 586
rantia, & Dentes mobiles sta	Dia electru pastillus 590
bilientia. 169 Dētifriciū 170	Diarrhæa 196
Dentiētib. pueris superātia 5	Dia hematon antidotum 575
Dentium smegma 170	Dia hermodactilu compō ad
Derma. 487 Destillatio 175	podagrā 564 dia libanu 595
	Dia



# I N D E X.

Dia œnelæu pastillus	592	dia pirano emplastrum	615
Dia ostreon	595	dia hydrias collyrium	503
Dia oxynyrsines	596	dia zomaton collyrium	605
Dia phellon pastillus	191	dia crocu aridon	612
Dia physalidon	590	dia rhodon Nili	610
Dia rhodon pastillus	188	dia pternes emplastrum	626
Dia stole pulsus. 63. dia scincu.		dia turpænes ceratum	627
575 Dia spermatō pastillus.		dia halon emplast.	626
588 Diasphecles, hoc est ex		dia sampsicu malagma	635
face uini cōbusta, Manetho-		diachromon emplastrum	629
nis. 59. Dia cinnabareos em		dictamnium	587
pla. 628 Dia iteon empl	622	dies decretorii	59
Dia meliloton malagma	629	dies speculatorij	60
Dia spermaton malagma	635	digerentia medicamenta	122
Dia strutiū empl	612	digiti in manu ubi adnascan-	
don, quæ septuaginta duas		tur, digitorum adnatorū dif-	
uncias pendunt	609	ferentia,, digiti adnati quo-	
dia talias collyrium	608	modo præcidendi	393
dia talias, ruffum, dia smyrnō,		digitorum luxatio quomodo	
claudiacum, diamoron sim-		curetur	450
plex, diamoron cōpositū	599	digitorū pterygia putrida quo	
diamoron ex moris batinis,		modo curanda. 270 digitorū	
quæ rubi fructibus sunt	599	pedis luxatorū curatio	463
dia caryō simplex, dia caryon		digitos puerorū, dentibus uul-	
cōpositū, dia gyreos emp	611	neratos quod sanet	5
diagleucous, dia besafa	600	digitorū cōtusionis & confra-	
dia rhodon album	609	ctionis curatio	447
dia smyrnon ad & rhyadas &		dioclis	
ægylopas. 606 dia gigurton,		epistola Antigono regi scri-	
malagma. 635 dia chilon em		pta ad ualeitudinē tuendā	53
pla. 615 dia sphodelu empla		dionysias. 489 diospolites	581
strum. 615 dia ceratos colly-		diphryges quomodo coqui de	
rium Galenns	605	beat	648
dia elcysinatos. 616 dia meli-		diphryges, dipsacos	485
tos empl.	614	dipsas unde dictus. 345 dipsa-	
dia aloes collyrium	609	dis morsus notæ ibi. curō ibi.	
dia libanu collyrium	608	διαιχίας qd 367. Eius caus-	
dia scoridū emplastrum	615	sæ ibi. curatio ibi. dolichō	44
dia rhodon Crocinum	610	doloris species & causæ	91
		remedia	ibidem
			doloris



# I N D E X.

Doloris capitis in febris cu ratio	94	Ebulus. 471	Ebur 490
Dorias 493	Dorycinon 488	Eccope. 433	Echini 50
Dorycnii poti notæ 358. re- media, Dosithei cataporia ad iecur inscripta	583	Echinis herba, Echinus 493	Echinon, Ecchimona quid 302. curatio, Echidna 493
Dothiene emplastrum	615	Eclegma ex marrubio compo situm	576
Drachma	662	Eclegma ad tussim	177
Dracunculus	488	Eclegma ex marrubio sim- plex	576
Dracunculi 332. ubi generen tur ibid. curatio	ibidem	Ecpiesmus oculi	158
Dracunculi curatio	425	Ecpiesma	433
Draconis marini ictus cura	347	Estropion, eiusq; curatio	149
Dracuntium	488	Estropium 371. Eius causæ ibidem curatio, Educentia spicula, aculeos, arundines, spinas & consimilia	320
Dropax Gallus Oribasii	639	E'is onyca	433
Dropacis duplex præparatio 636. usus druppæ oliuæ	45	Elate, Elatine.	490
Drys	488	Elaterii noxæ quomodo re- mouendæ	362
Dryni morsuum signa 344. re- media	345	Elaterii effectus 558. quale de ligendum. ibid. Exhibendi modus & pondus	ibidem
Drynus pessimus serpens	344	Elaphoboscus, Elaterium	490
Dryopteris	488	Elæa, Elæon	489
Dulcis radícula	486	Elæa, æthiopica	ibidem
Dulcium uires	465	Elæomeli	ibidem
Duracina	45	Elephantia quid	272
Dysenteria quid 199 species ibid. causæ ibid. signa ibi. Cu- ratio ibid. & sequentibus		Elephantia incurabilis quare ibidem	
Dysenteria cruenta ibid. Ieco- raria, Dysentericis utilia ca- taporia ex xylomacere	583	Elephantia duplex ibid. Quæ minus malignior, Elephan- tiæ minus malignæ cura- tio	ibidem
Dysodes acopon ex Gal.	635	Elephantia laborantium spi- randi difficultas quomodo curanda	276
aliud	ibid.	Elephantia causæ	272
Dysodes malagma	635	Elephantia	
E			
E Benus	488		
Ebrietatē præcauentia	51		
Ebrietatis curatio	15		



# I N D E X.

Elephantia uictus ratio con-	ueniens	274	Empla. ex achate, discutiens
Elleborine	491	emolliensq; Empl. ex plum	bagine ad calidas affectio-
Eleoselinon	490	nes, Empl. coracon ex oxy-	melite, ad naturalium & no-
Elelisphacus, Electrum	496	mas accommodatum, Empla-	strum Icesios ad strumas, ab-
Elos, 153	Elymus	491	scessus, lienē, articulos, & co-
Empetron	491	xendicum dolores	620
Emphysema quid	148	Empla. Neronis, ad ictus om-	nemq; particularum carnosarum
Emphysematis cura	ibidem	rum dolorem	622
Empiema 184 causæ 185 si-	gna ibid. curatio	ibidem	Empl. ex cerusa uel oui
Emplastrum smilion ad ab-	scessus	612	Emplastrum parygron Oriba-
Emplastrum diascorodon ad	rumpendum, Emplastrum	dia apyranu ad discutiend-	um, Emplastrum dia stru-
thiu, strumas discutiens, ibid.	Emplastrum pelarion ex sco-	ria argenti	616
Emplastrum è fermento ab-	scessus rumpens	615	Emplastrum dothiene
Emplastrum dothiene	ibid.	Emplastrum ex succo lini se-	minis discutiens detergens-
que	614	Emplastrum ex melle	ibidem
Empl. barbara quod cruentis	protinus; uulneribus iniici-	tur, & fracturarum callos fir-	mant
Empl. ex salicibus, glutinans	cruenta excreantibus, & pu-	rulentis efficax, thoraci im-	positum
Empl. Galeni aceros, gluti-	nat, concoquit. ulcera ad sup-	purationem perducit	619
Empl. ex oxelæo	619	Empla. ex achate, discutiens	emolliensq; Empl. ex plum
		bagine ad calidas affectio-	nes, Empl. coracon ex oxy-
		melite, ad naturalium & no-	mas accommodatum, Empla-
		strum Icesios ad strumas, ab-	scessus, lienē, articulos, & co-
		xendicum dolores	620
		Empla. Neronis, ad ictus om-	nemq; particularum carnosarum
		rum dolorem	622
		Empl. ex cerusa uel oui	615
		Emplastrum parygron Oriba-	sii, & Emplastrum ariobarza-
		nion, Emplastrum ex dra-	cunculo
		617	Emplastrum ex dracunculo ibi-
		Emplastrum Aristophanium	emolliens
		619	Emplastrum ex althæa, poda-
		gricis aliisq; duriciis accom-	modatum
		616	Emplastrum cissonum ad ner-
		uorum uulnera, punctus, &	maximè diuturna
		ibidem	Emplastrum botanicum
		614	Emplastrum ex polline farina-
		ceo	611
		Emplastrorum materia, præ-	paratio & differentia
		612	Emplastrum pyrine, ad duri-
		tias scirrhus	616
		Emplastrum tetrapharmacū	614
		Emplastrum dia chylon	614
		Empl. dia asphodelu	ibidem
		Empl. oxera multiplicis usus	619

Emplast.



# I N D E X.

- Empl. ex ochra, inflammatio-  
nem arceat tum sponte, tum  
in iudicio tortis idoneū 721
- Empl. ex cedria, glutinat di-  
scutit, abstergitq; ibid. Aliud  
emolliens, Empl. ex pumi-  
ce ad cicatricē ducendū 625
- emplastrum paula, strumis &  
bubonibus efficax ibidem
- emplastrum palmulatum 617
- emplastrū ex metallicis 622
- emplastrum armenia fractu-  
ris accommodata ibidem
- emplastrum ex anchusa, am-  
bustis efficax 618
- empl. ex pampholige ibidem
- emplastrum leæna, noxia edu-  
cit in superficiem, humores-  
que euacuat 621
- emplastrū Macedonicum ibi.
- emplastrum chryse, cruentis  
uulneribus accommodatū 628
- emplastrum anicetos glutinat  
discutit, squamas separat, &  
ad articulos recenti cicatri-  
ce contractos nalet 622
- empl. Serapionis Melæne ibi.
- emplastrum ex lolio 629
- emplastrum isis, cruentis ac-  
commodata, ad glutinandū,  
carnē inducendū, & purgan-  
dum 619
- empl. ex urina mu-  
li, podagricis utile 627
- emplastrum ex lapidis asii flo-  
re, philagrii ad scyrrhos ibi-  
dem ex eodē Galeni ibidem
- emplastrum ex salis flore, ar-  
ticulariis in declinatione ac-  
commodatur 627
- emplastrum quod nutriendæ  
ulcerum carni est ibidem
- emplastrum Italicum ad pur-  
gandum sordida, inducen-  
dumque carnem 628
- emplastrū entaticon ibidem
- emplastrum ex cinnabari ad  
trophos aliosq; omnigenos  
tumores induratos, dicitur  
pamphlethes 623
- emplastrū uiride simplex. 622
- aliud uiride, ad humida uiria  
& carnis excrescētiās ibidem
- emplastrum peganera ad pleu-  
riticos ibidem
- emplastrum athena, ad ulcera  
sordida, impacta, neruorum  
uulnera 620
- emplastrū dia dictamnus, gluti-  
nans ad canū morsus, & om-  
nigena ulcera ibidem
- emplastrū è nitro ad abscessus  
scyrrhos, ad tumores 626
- emplastrū conglutinans ad ul-  
cera quæ serpendo depascūt,  
& sanguinis sputum 623
- emp. ex cinere aspidū, discutit  
strumas & podagras ibidem
- emplastrū leæna, siccatur discu-  
titque, emplastrum ex nitro  
ad carbunculos 624
- emplastrū ex anemone ibid.
- empl. uiride Macherionis, ad  
coxendicum cruciatus, arti-  
culos infraçtos, & abscessus  
ibidem
- emplastrū ingrediētia medica-  
mēta quō coqui debeāt 652
- emplastrum philocatiche, do-  
lorem



# I N D E X:

lorem leniens, ad sedem uti- lis	615	epicaunia ulcus oculi	152
emplastrū Amithaonis, ad ar- culos recenti cicatrice con- tractos, condulososq; ad ex- trahendum etiā efficax	619	epilepsia trifariā gignitur	128
emplastrum ex perna tophos soluit	626	epilepsie curō. 129 & sequēt.	
emplastrū ex lixiuio, coxendi cum doloribus, articulariis & tumoribus œdema refe- rentibus utile	625	epihialtes unde cōstituat	134
empl. ex auellanis, ad articu- lorum tophos probatū	628	epilepsie causæ, & epilepsie cui ferè ætati accidat	128
emp. Sphærien ad ardores	641	epilepsie notæ	ibidem
emplastrum Nicolai ad recen- tia uulnera, & sinus glutinan- dos aptum.	621	epileptici quō coarguēdi	129
emplastrum ex liquore sycamino	629	epimedium	493
emplastrum dichromon	ibid.	emiētides quid 283. signa, cu- ratio ibidem & 284	
emplastrum dia cadmias, cica- tricem inducens	618	epimelis. 491 epiphora ocu- lorum quomodo curet	147
empl. Mnaſæi discutiens	612	epiploenteroceles	411
emplastrum melanclorū	616	epipactis. 491 epiplocele	411
emplastrū ex seuetione	617	epistola Dioclis Antigono re- gis scripta ad ualeitudinem tuendam	53
emplastrum pſitacium	ibidem	epithymi uires, pondus, & utendi modus	561
emproſthotonos	142	epithymbri uires	ibidem
encanthis qd eiusq; cura	161	epithymum	491
enchephalos	488	epomphalum medicamentū quod umbilico illinitur ad al- uum subducendam	568
engisoma	432	epithematū dſia & usus	626
entaticon empl.	628	epuli 380 Eius curatio, epu- lis quid & quō curetur	170
enteroceles	410	equarum sanguis	471
enthenſtici	132	eraiſtrati panchrestos hy- gra 612 erethrias terra	485
ephelidem curantia	167	eria, & erice	492
ephemeron, ephemeris assum- pti notæ 457. remedia	493	erigerum. 495 erinaceus	493
epihialtes unde dicatur	134	erimon	492
epihialtes quō cognoscat	ibid.	erruum. 528	eruca 492
epihialtes quō curādus	ibidem	erucæ picearum	533
		erucæ facultates	41
		erucæ pinorum assumptæ ſi- gna 353. Curatio ibidem	erucæ



# I N D E X.

Erucæ olerum	501	F	
Eryngium	495	Faba. 512	Fabæ 44
Erysipelas inflammatoriū	99	Faba Aegyptia	ibidem
Erysipelas quid	287	Facies ut rubescat quomodo	
Erysipelata capitis periculosa,		efficiendum	168
Eorum curatio	96	Faciem à rugis asserentia	167
Erysipelas quid ibid. Curatio		Faciei pilos tollentia	168
ibidem.		Faciei nigritias tollentia	ibid.
Erysipelatis cerebri signa & cu		Faciei uaros tollentia	ibidem
ratio. 123 Erytrodanon	492	Faciei aspretudinem tollen	
erythroides, tunica	406	tia, Faciei uitia quomodo	
erithrum. 639 eupatoriū	492	curentur	167
euphorbium	499	Facultates alimentorum	40
euphorbiū pondus, uires, & mo		Fames grandis, in febribus	
dus utendi	562	quomodo curetur	99
eunuchi quomodo fiant	414	Farinaceus pollen	486
eunuchismus, euodes, à grato		Fastidium cibi	192
odore dictum, malagma	630	Fastidium cibi in febribus quo	
euzomon	492	modo curandum	98
exanthemata puero oborta		Fastidium cibi prohibentia	1
quomodo curanda	4	Fatuitatis causa	126
exanthemata ficsa capitis &		Faustini pastillus	589
menti quō curanda	114	Fauus quid 21. curatio	ibid.
exanthematum capitis præsid.		Fauus quid 307. quomodo cu	
113		retur	ibidem
exarthroma	451	Fauis capitis unde nascantur,	
exercitationum genera	7	& quomodo curentur	113
exercitatio ualida seu uio		Febrium continuarnm origo	
lenta	7	notæ & curatio. 83 Fex	549
exercitatio celeris	8	Febriū putridarū agnitio	77
exercitatio quid	ibidem	Febriū tertianarū agnitio	78
exercitationis commoda	7	Febris tertiana	79
exercitationis tempus ido		Febris tertiana exacta	ibid.
neum, urinarum color indi		Febris tertiana extensa	ibid.
cat	ibidem	Febriū putridarū curatio	78
exercitatio uocis qualis esse		Febris tertianæ uictus	79
debeat & quæ eius sint com		Febris tertianæ curatio	ibid.
moda	9	Febris tertianæ nothæ cura	
exemphalon	397	tio	80
		Febrium	



# I N D E X.

Febrium quartanarum agnitiono	ibidem	perquirere debeat	57
Febrium quartanarum differentia	ibidem	Fel. 555. Suillum 556. Ouillu	
Febrium quartanarum curatio, & Febrium quotidiana- rum agnitio	81	ibidem, Caprillum, Vrsoru,	
Febrium quotidianarum curatio, Febris quartana quo fe- re anni tempore incipiat	80	Boum, Taurinu ibide Hyæ- næ, Callionymi piscis ibid.	
Febris hepialis signa, causæ & curatio	82	Scorpionis ibidem maxime	
Febris hepialis unde dicatur	ibidem	Hirundinis, Capræ syluestris	
Febrium ardentiu agnitio	84	ibidem Gallorum, Perdicum	
Febriu ardentiu curatio ibid.		Accipitrum, Aquilarum ibid.	
Febrium quibus ex affectu ery- sipelaceo origo est notæ ibi- dem eorundē curatio ibidem		Fel uolucrum acrius & siccan- do uehementius, quàm qua- drupedum	ibidem
Febriu hecticaru agnitio	85	Felis morsus notæ 342 cura- tio	ibidem
Febrium hecticarum duæ spe- cies, Febrium hecticarum cu- ratio	ibidem	Femora bouis cremata	529
Febrium diariarum causæ	76	Femorū intertrigines curan- tia. s. Femoris fracturæ quo modo curentur	447
Febris diaria qua ratione di- gnoscat	ibidem	Foeniculum grande	497
Febris diariæ qui oportuni ibi.		Fermentum	494
Febris diariæ curandi ratio ibid.		Ferrex aquæ quibus confe- rant	24
Febris diaria laborantium ui- ctus, Febrium putridarum notæ	77	Ferrum. 539	Ferula 525
Febrium putridaru curat.	78	Ficus. 44	Ficus 546
Febris semitertianæ notæ, eius- que generatio duplex	86	Ficus arbor	546
Febris semitertianæ curatio	ibidem	Ficus humilis	555
Febres continentes	83	Ficus capitis morbus quomo- do curandus	114
Febris continens quid ibidem		Ficosa capitis & menti exan- themata quomodo curan- da, & Felicula	488
Febres curaturus quod & quæ		Felicula. 533	Filix 535
		Fistula quid	420
		Fistula quid 318. curatio ibid.	
		Fistulæ insanabiles	422
		Fistulæ egrè consanescences	ibidem
		Fistularum ani curatio quæ manu peragitur	ibidem
		***	Fistularum



# I N D E X.

Fistularum differentia	420	frictionum genera	8
Fistulæ quomodo manu curandæ	ibidem	frictionum nouæ coniugationes. 9	Frictio dura 8
Fistularum ani latentium notæ	421	frictio mollis, Frictio medicis, Frictio multa & dura.	
Fistularum ani manifestarum notæ	421	frictio modica & mollis	ibid.
Flagris cæsi quomodo curandi	285 & 286	frictio apotherapeutica	ibid.
Flatus uentriculi unde generentur	195. quomodo curentur	frictio præparatoria	7
Flauum medicamentum	596	frigida lauatio quibus conueniat. 23	Frigida intemperies
Fluxionibus alui biliosis maxime medetur lac coctum in quod calculi marini igniti demissi sunt	49 & intestinorum torminibus	quomodo corrigatur	37
Fœniculū. 519 Fœnugræcū	44	frigus cui nocuit, quid facere debeat	18
Fœnugræcum	547	frigidi & sicci temperamenti notæ. 30	Frigidi & humidī temperamenti notæ
Fœtum educentia	238	temperamenti notæ	29
folium	553	frigidi temperamēti notæ	29
fracturis idoneū medicamentum Oribasii 624. Ex commentarijs Heraclei	ibidem	frons quomodo incidatur & quibus	366
Fractura ossis quid	433	fructus temporarii	44
fractura in capite quid	ibidem	fructus arborum	ibidem
fracturarum differentia	ibid.	frumentaceorum uires	43
fracturarum capitis differentia, Fracturæ capitis species quomodo dāprehēdēda	433	fucus. 553	Fuligo 516
fracturæ capitis curatio	434	fuligo 469	Fumaria 501
fracturæ cum nuulnere curat.	449	Fungorum assumptorum remedia	359
fracturæ callo nō firmatæ quomodo curandæ	452	furunculus quid 297. curatio, ibidem	
fracturæ immodico callo obductæ quō curentur	450	fuga purgans & stomacho grata	564
Fraxinus	520		
		G	
		G Agates 512	Gala 483
		G Galactites	516
		Galbanum quomodo coquendum	654
		Galenī collyriū ex cornu	608
		Galenium malagma	633
		Galenī picra	581
		Galerita. 510	Gallion 484
			Galliopsis



# I N D E X.

- Galliopsis, & Galla.** 504 **Galli**  
**cerebrum.** 489 **Gallina** 46  
**Gallarum stercus** 509  
**Gallarum uentris interior**  
**membrana** 507  
**Gallus dropax, Oribasii** 639  
**Gallarum chortalum san-**  
**guis** 471  
**Gallopsis.** 487 **Gammæxi** 50  
**ganglion quid** 388. **Eius no-**  
**tæ, ibidem, Curatio ibidem**  
**Gangliū qd** 187. **curatio ibi.**  
**gāgræna qd** 291. **curatio** 292  
**gangrænarum remedia** 292  
**garum.** 487 **Ge, Genista** 542  
**genitali exulcerato conue-**  
**niens medicamentum** 267  
**gentiana** 484  
**genu articulus luxatus quo-**  
**modo reponatur** 464  
**geranium.** 484 **Geras** 485  
**ges enetera, gigarta ibidem**  
**gingidion.** 41 **gingidium** 485  
**gingiuas corrosas curatia** 171  
**gladiolus.** 526 **glandes** 46  
**glans unguentaria** 480  
**glans penis contacta quomo-**  
**do aperiri possit** 401  
**glandes ad quid conueniāt** 20  
**glandes unde conficiātur ibid.**  
**glans colis nuda quomodo cō-**  
**regenda** 401  
**glandulæ animalium** 47  
**glastum.** 499 **glans** 486  
**glaucium** ibidem  
**glaucoma quid eius remedia**  
**157**  
**glechon, & glocos** 487  
**gluten piscium** 500

- glutinum** 507  
**glutinum bubulnm** 509  
**glycea quomodo curent** 166  
**glycyrrhiza, gnaphalium** 487  
**gone pessus.** 648 **gōgylis** 487  
**gordilion, gamma oboli** 662  
**gramen** 481  
**gramen arundinaceum** 501  
**grandines tussiedo eiekti** 175  
**grannm gnidium** 507  
**granum tinctorium ibidem**  
**crassum corpus quomodo ex-**  
**tenuandum.** 27 **grauedo** 175  
**grauedinis curatio ibidem**  
**grauedinis puerorū curatio** 4  
**gravidarum Symptomata, eo-**  
**rumque remedia** 1  
**grossi.** 525 **grues** 46  
**gummi** 508  
**gummi cerosi arboris** 504  
**gurgulio.** 381 **gutturis aspredi-**  
**nem curantia** 177 **gutturi**  
**spinæ quō eximantur** 382  
**gypsum.** 488 **gypli poti uotæ**  
**& remedia** 360  
**gyrgathon.** 133 **gyris** 488

## H

- H** **Abitus corporis quomo-**  
**do recalfaciendus** 13  
**Hæmatites.** 516 **hemorrhoi-**  
**des cecæ curatu difficiles exi-**  
**stunt** 234. **quō aperiēdæ ibi.**  
**hæmorrhoidum fluxus super-**  
**fluus quō sistendus, hæmor-**  
**rhoides qd, & cur sic dicātur,**  
**hæmorrhoides muliebriū lo-**  
**corum quō excidendæ** 414  
**hæmorrhoides ani quomodo**  
**manu curandæ** 429

\*\*\* 2

Halatia



# I N D E X.

Halatia, quasi dicas ex sale cō	Herpyllum	492	
fecta, purgatio	Hidos. 494	Hieracitis 517	
Halmi uires	41	Hiera Antiochi	567
Harmation	617	Hiera Archigenis	568
Haltula regia	479	Hiera Galeni	565
Hedera	566	Hiera Iusti, Hiera Rufi	568
Hedera terrestris	551	Hippocampus	497
Hedycroi confectio	571	Hippolapathum	ibidem
Hediosinus, Hedyfarum	494	Hippomarathon	ibidem
Helcysma, Helleborus	492	Hippopotami	447
Helechryson, Helenium, He-		Hippopotamus	480
liocæs medicamentum	595	Hippofelinon	ibidem
Helxine	491	Hippofelinon	542
Hemerocalles	495	Hippofelini uires	41
Hemicrania	117	Hippuris	480
Hemicranix curatio	118	Hircina caro	47
Hemina	661	Hircinum iecur	495
Hemionitis	495	Hircinu cornu	504
Hemiplagia quid	135	Hirundines	555
Hepar	495. Vide Iecur	Hirundinum cerebrum	489
Hepar quomodo uratur	395	Hirundinaria herba	555
Hepatis tēperaturæ notæ	34	Hirudinum deuoratarū digno	
Hepialus febris	82	tio 354 curatio	ibidem
Hepiali curatio	ibidem	Hyssopi liquidi medicamenti	
Hepesma. 493	Heraclion 517	præparatio	625
Heraclius lapis	ibidem	Hædi sanguis	470
Herba lactaria	547	Hominis temperatiss notæ	28
Herba apollinaris	551	Hominis morl <sup>9</sup> remedia	348
Herbæ quō coquendæ	652	Hordeum	511
Hermaphroditi unde appel-		Humanæ caro	47
lati	414	Humerus summus quid	454
Eorum quatuor differentix,		Humeri luxati curatio	454
in uiris tres, in mulieribus		Humiditates aurium defic-	
una ibidem curatio	ibidem	cantia	5
Hermodyctylus stomacho no		Humidi tēperamēti notæ	29
cer	261	Hyalos. 550	Hyacinthus 550
Herpes quid	287	Hydatis quid 371. notæ ibi-	
Herpes exedens	293	dem curatio, Hydnon	550
Herpes miliaris	ibidem	Hydor, & Hydrargyros	ibid.
		hydros	



# I N D E X.

hydros. 346	hydrocele 228	cinoris notæ ibi. curatio 225
hydrocephalon quid 364. Eius	causæ ibidem notæ ibidem cu	icteri ex calida intemperie so-
ratio ibidem	ratio ibidem	lidarum partium generatio
hydromalum uinosum 500		22. notæ 225. curatio ibid.
hydrops leucophlegmatias,		ictericis quæ uena secâda ibid.
hypofarcidos, uel anasarca,		Idæa radix 97
eiusque signa & causæ 219.		iecur 496. Canis rabidi ibid.
eiusdem curatio ibidem &		caprillum ibidem, hircinum
220. & 221		ibidem, lacertæ ibidem, Lupi
hydropeperi 550		num ibidem, Asininum, api
hydropicis aqua quomodo		ibidem, Mergi ibidem
emittatur 396		iecur animalium 47
hydrophobia 336		iecur suillum ibidem
hyemi quæ uictus ratio conue		iecur quomodo uratur 394
niat 24		ilambonis collyrium 603
hygra ex caualide 609		ileos quid 106 ilex 535
hygidion Ammonii 604		incrassantium alimentorum
hyoscyamus, hypericum 550		differentiæ & uires 40
hypericon. 509 hypecoön 551		incubo uel incubus unde dica
hypocistis, hypoglosson ibid		tur. 134 indicus lapis 517
hypoglottides medicamē. 176		infans recens natus quomodo
hypopyi. 374 hypopii 153		nutriendus 3
hypophæston 551		infantium uictus ratio 6
hyposphatismus 366		inflamatio proprie quid 287
hyposphadion 401		curatio 288
hyposphagma quid eiusq; cu		inflamatio erysipelacea 96
ratio 148		inguinalis herba 294
hyrcorum sanguis 470		inguinibus conueniens medi
hyslopum 550		camentum 290
I		inodora 464
I Aspis 516	Ichores 179	insaniæ curatio 147
I Ichthyocolla 599		intemperies frigida quomodo
Icterus quid 524		corrigitur 37
Icterus niger 221		intemperatorum corporum
Ictericorum remedium 217		notæ 29
icterus ratione iudicationis in		intertrigines femorum curan
febris facile curatur 224		tia. 5 intertrigines curan
icteri ex calida intemperie 10		tia. 286 intestina terræ 485
		intestini procidentia quomo

\*\*\* 3 do



# I N D E X.

Halatia, quasi dicas ex sale cō	Herpyllum	492	
fecta, purgatio	Hidos. 494	Hieracitis 517	
Halmi uires	41	Hiera Antiochi	567
Harmation	617	Hiera Archigenis	568
Haltula regia	479	Hiera Galeni	565
Hedera	566	Hiera Iusti, Hiera Rufi	568
Hedera terrestris	551	Hippocampus	497
Hedycroi confectio	571	Hippolapathum	ibidem
Hediosinus, Hedyfarum	494	Hippomarathon	ibidem
Helcysma, Helleborus	492	Hippopotami	447
Helechryson, Helenium, He-		Hippopotamus	480
liocæs medicamentum	595	Hipposelinon	ibidem
Helxine	491	Hipposelinon	542
Hemerocalles	495	Hipposelini uires	41
Hemicrania	117	Hippuris	480
Hemicraniæ curatio	118	Hircina caro	47
Hemina	661	Hircinum iecur	495
Hemionitis	495	Hircinu cornu	504
Hemiplagia quid	135	Hirundines	555
Hepar 495. Vide Iecur		Hirundinum cerebrum	489
Hepar quomodo uratur	395	Hirundinaria herba	555
Hepatis tēperaturæ notæ	34	Hirudinum deuoratarū digno	
Hepialus febris	82	tio 354 curatio	ibidem
Hepiali curatio	ibidem	Hysopi liquidi medicamenti	
Hepesma. 493 Heraclion	517	præparatio	625
Heraclius lapis	ibidem	Hædi sanguis	470
Herba lactaria	547	Hominis temperatiss notæ	28
Herba apollinaris	551	Hominis mori <sup>9</sup> remedia	348
Herbæ quō coquendæ	652	Hordeum	511
Hermaphroditi unde appel-		Humanæ caro	47
lati	414	Humerus summus quid	454
Eorum quatuor differentiæ,		Humeri luxati curatio	454
in uiris tres, in mulieribus		Humiditates aurium defic-	
una ibidem curatio	ibidem	cantia	5
Hermodaetylus stomacho no-		Humidi tēperamēti notæ	29
cer	261	Hyalos. 550 Hyacinthus	550
Herpes quid	287	Hydatis quid 372. notæ ibi-	
Herpes exedens	293	dem curatio, Hydnon	550
Herpes miliaris	ibidem	Hydor, & Hydrargyros	ibid.
		hydros	



# I N D E X.

hydros. 346	hydrocele 228	cinoris notæ ibi. curatio 225
hydrocephalon quid 364. Eius	causæ ibidem notæ ibidem cu	icteri ex calida intemperie so-
ratio ibidem	ratio ibidem	lidarum partium generatio
hydromalum uinosum 500		22. notæ 225. curatio ibid.
hydrops leucophlegmatias,		ictericis quæ uena secâda ibid.
hypofarcidos, uel anasarca,		Idæa radix 97
eiusque signa & causæ 219.		iecur 496. Canis rabidi ibid.
eiusdem curatio ibidem &		caprillum ibidem, hircinum
220. & 221		ibidem, lacertæ ibidem, Lupi
hydropesperi 550		num ibidem, Asininum, api
hydropicis aqua quomodo		ibidem, Mergi ibidem
emittatur 396		iecur animalium 47
hydrophobia 336		iecur suillum ibidem
hyemi quæ uictus ratio conue		iecur quomodo uratur 394
niat 24		ilambonis collyrium 603
hygra ex caualide 609		ileos quid. 206 ilex 535
hygidion Ammonii 604		incrassantium alimentorum
hyoscyamus, hypericum 550		differentiæ & uires 40
hypericon. 509 hypocoön 551		incubo uel incubus unde dica
hypocistis, hypoglosson ibid		tur. 134 indicus lapis 517
hypoglottides medicamē. 176		infans recens natus quomodo
hypopyi. 374 hypopii 153		nutriendus 3
hypophæston 551		infantium uictus ratio 6
hyposphatismus 366		inflâmatio proprie quid 287
hyposphadion 401		curatio 288
hyposphagma quid eiusq; cu		inflammatio erysipelacea 96
ratio 148		inguinalis herba 294
hyrcorum sanguis 470		inguinibus conueniens medi
hyllopum 550		camentum 290
I		inodora 464
I Aspis 516 Ichores 179		insaniæ curatio 147
I Ichthyocolla 599		intemperies frigida quomodo
Icterus quid 524		corrigatur 37
Icterus niger 221		intemperatorum corporum
Ictericorum remedium 217		notæ 29
icterus ratione iudicationis in		intertrigines femorum curan
febris facile curatur 224		tia. 5 intertrigines curan
icteri ex calida intemperie io		tia. 286 intestina terræ 485
		intestini procidentia quomo
		do

\*\*\*

3



# I N D E X.

do curan.	399	κακοχυσία quid	25
intestina animalium	48	καρωτικά medicamenta	122
intybus sylvestris	506	L	
intybi facultates	41	L Aboriosam uitam agen-	
iocinoris affectus	214	tium uictus ratio	25
iocinorosi qui	ibidem	Labrorū curta quomodo sar-	
iocinoris tēperaturæ notæ	34	cienda	371
iocinoris imbecillitas	214	Labrum ueneris	488
iocinoris frigidaē intemperiei		Lac recens multum	48
notæ ibidem curatio	216	Lac bubulum	484.
iocinoris caua pars per aluū		Muliebre	
gibba per urinas expurga-		ibid. Caprillū, Afininū, Ouil-	
rur	218	lum, Vaccinum	ibidem
iocinoris siccaē intemperiei		Lac coctum	48
notæ	215	Lac nutricis uiciatum quomo-	
humidaē notæ ibi.		do corrigatur	3
iocinoris inflammationis si-		Lac ouillum	48
gna ibid. eiusq; curatio	217	Lac scissilæ	49
iocinoris inflammatio à pleu-		lac humidius, Lac caprillū	48
ritide quō discernenda	215	lactis probatio	2
iocinoris inflammationum in		lac crassius	48
gibba eius parte, notæ ibid.		lac coquendi modus	ibidem
iocinoris uenarum obstructio		lac statim à partu redditū	49
nis notæ ibid. curat	216	lac nutricis quot modis uicie-	
ion. 497	ios, & iris	tur. 3 lactaria herba	545
isatis 498	isis emplast.	lacerta. 538	lacerta 536
isopyron	498	lacertæ iecur	495
isotheon collyrium	608	lactuca	496
itea 498	ἰτέαν 122	lactucæ facultates	41
iudicium futurum quomodo		ladanon. 514	lagopus 513
prænosendum	61	lanæ	492
iudicium instans quomodo		lanæ pinguitudo	526
agnoscendum. 61	iuglās	laparhum. 514	lapides 516
iuguli confracti curatio	440	lapides quō coquendi	649
iunctus angulosus	513	lapides argæi montis cappado-	
iunci odorati & rotundi flos		ciæ. 517	lapis specularis 543
546		apsana. 514	larinx 173
iuncus palustris	ibidem	larix. 537	laserpitium 540
iuniperus. 477	ixos 497	lassitudinem ob exercitatio-	
ixiæ signa 357. remedia	ibid.	nem quatuor species earum	
		que	



# I N D E X.

que remedia	9 & 10	lien quomodo aduratur	395		
Lateralis dolor quid	186. nota ibi. causæ ibi curatio	187	lien obstructionis notæ	222	
lathyrus	514	lien expultricis facultatis			
laurus arbor	487	imbecillitas quomodo cognoscenda	ibidem		
lauri foliorum uiridium pondus	159	lien intemperies quomodo curetur	ibidem		
Laurus Alexandrina	487	lienteria quid, eius species, causæ, notæ, & curatio	197		
laurinum oleum	641	lignys	516		
læna empla.	623 & 624	lignorum caries	538		
legumina. 44 lemæ quid	121	ligysticum	516		
lamonium	514	lilium	511		
lemina terra	484	liliaceum oleum	640		
lenticula	44	linguæ animalium	47		
lenticula palestris	552	linguæ morbus	171		
lenticula curantia	169	linguæ scabrities quomodo curanda	101		
lentiscus	546	lini semen, linospermon	517		
lentiscinum oleum	642	linozostis, liosporon	517		
leontopetalon	514	lipasmata	138		
lepidion, Lepidoile ossa	364	Lippitudinis causæ	145. curatio	ibidem	
lepis. 515 leporina caro	47	liquidorum mensuræ	662		
leporis cerebrum	488	liquidum collyrium ex calide	612		
lepra quid	276 causæ ibid. signa ibid. curatio	124	liquor 527. Cyrenaicus, medicus, Syriacus	ibidem	
lethargi causæ	123. signa ibidem curatio	124	lirinum suffimeu	649	
lethargus à caro quid differat	123	lylponium acopon	638		
leucacanthum	515	lithargyros, & lithi	516		
leucas, leuce, leuce quid	280 causæ ibidem curatio	ibid.	lithospermon	517	
leucas pastillus	592	litrum	518		
leuiraiæ	50	liuores corporis prohibetia	13		
libanius pessus	651	locustæ, & loligines	50		
libanotides, & libanotos	515	lolium. 470 lonchitis	518		
libanum	608 libella	50	lonchitidis seminis pondus & modus utendi.	562	
libra. 662 lichen herba	514	lothus herba.	518	lotus arbor	519
lichenes equorum	ibidem				
lien animalium	48				
		*** 4 lumbricorum			



# I N D E X.

lumblicorum origo	327	Malacia grauidarum Sympto	
lumbri rotundi infantibus		ma.1 Malache	519
peculiares	528	Mala costrata	50
lunare cyphi	649	malagma ad capitis dolorem	
lupinum. 496	lupinum 44		117
lupinum iecur	495	malagma anethine	635
luporum stercus	508	malagma ex baccis lauri	634
lupus, piscis	49	malagma ex seminibus	ibid.
luxatio quid	452	malagma erythrium	623
luxationis duæ species ibidem		malagma mendesium	630
luxatio cum fractura quomo-		malagma marciatum	631
do curetur	465	malagma pentamyron	632
luxatio cum ulcere quomodo		malagma euodes	633
curetur	464	malagma ex fertula campa-	
lycaonis signa 134. curatio		na	629
ibidem		malagma citrinum	634
lychnis	518	malagmatum differentia &	
lychnidis seminis pondus &		usus	629
modus utendi	561	Malagma dia sampsychu	635
lycium. 518	lycoctinon 471	malagma ex ninaceis	ibidem
lycopsis	513	malagma decamyron	632
lycopsis, lygis	468	malagma ex œnanthe	635
lynceus ad claritatem oculo-		malagma polyarchion ex Ga	
rum	607	leno 627. aliter	ibidem
lumpyriæ febres	83	malua. 519	maluæ uires 41
lysimachium	518	malicorium	537
M		malus armeniaca	522
<b>M</b> Acherionis emplastrum		malum citreum	46
uiride	625	malum medicum	506
Macedonicum emplastr.	624	malus persica, malum punicū	
Madarosis quid & eius cura-		cum 536. Eius acini	522
tio 150	Magnes 517	malum terræ	477
Magni aster. 609	Mala 521	mamillarum affectus curan-	
Mala dulcia ibidem austera,		tia	189
acida, assa, elixa	ibidem	maniras	519
Mala punica	45	mammarum inflammationes	
Malabathrinum collyriū	611	quomodo curandæ	300
Malabathron	519	mammis medicamētum con-	
Malacia piscis	50	ueniens	290
		mandragora	



# I N D E X.

mandragora	519	flauam purgantia	557
manethonis dia sphedes	595	medicamentum dia besafa ex	
manus summæ cõtufionis cu-		ruta syluestri	600
ratio	448	medicamentum ex syluestris	
manna thuris	519	maluæ feminæ	585
inanna thuris quomodo co-		medicamenti hyssopi liquidi	
quenda	651	præparatio	625
marathron	519	medicamentum philoxeni, pu-	
marasmôs	85	rulentis & longa defluxione	
marcellius thronus pastillus		infestatis idoneum	579
691		medicamentum è musto	598
marciatum malagma	628	medicamentum dodechateon	
marina aqua	496	578	
marrubium	534	medicamentũ dia citriu, tarde	
marrubium nigrum	481	concoquentibus efficax	581
masuaphion confectio	626	medicamentum massalioti	597
massalioti medicamentũ	597	medicamentum quod fumbi-	
mastiche	526	lico illinitur epomphalium	
maxillæ cõfractæ curatio	439	dictũ, ad aluũ subducẽdã	568
maxillarum luxatio quomo-		medicamentum ex myrto syl-	
do curanda	452	uestri	597
maza. 45		medicamentum dia coralliu	
mecon	521	podagricis idoneum	585
medicamentum ex thure	595	medic. dia calaminthes	581
medicamentum uomitum ci-		medicamentum dia bacanu,	
tantia	567	hepati accommodatum	582
medicamentum ex ostreis	595	medicamentũ zopyrios ibid.	
medicamentum ex duplici pi-		medicamentum Galeni è stil-	
pere	575	la comitialibus potissimum	
medicamentum ex charta, ad		efficax. 574	
nomas oris potissimũ & na-		medicamentum	
turalium ulcera	593	trion piperon	578
medicamenta purgantia com-		medicamentum ex succo ma-	
posita	562	li punici. 599	
medicamentum heliocæs, adu-		medicamentũ	
rens,	593	ex succis malorũ ad appeten-	
medicamenta atram bilẽ pur-		tiam abolitam & ægram con-	
gantia quibus & quãdo exhi-		coctionem probatum	580
benda	560	medicamentum fracturis ido-	
medicamenta simplicia bilẽm		neum Oribasii 628. Ex com-	
		mentariis Heraclei ibidem	
		medic.	



# I N D E X:

Medicamentum ex sanguine hircino	584	melanchloron emplastr.	616
medicamentum nephriticum excicadis	585	melanchlorus pastillus	593
medicamentum ex eruis	578	melancteria	520
medicamentum ex malorum cotoneorum carnibus	579	melaplacon tium quomodo paretur	580
medicamenta liquida quæ illi nuntur ad oris uicia, ac guttur accommodata	598	melenæ ierapionis empl.	619
medicamenta purgantia stomacho aduersantur, excepta aloë	558	melea	522
medicamentum à murino colore psaron dictum	596	melitera Oribasii	595
medicamentum emplastra ingredientium differentia eorumque coctio	612	meliceris quid 386. eius notæ ibidem curatio, & meliceris quid 306 curatio	ibidem
medicamentum ex lupino iecore præstantissimum	582	melilorus.	520
medicamentum xanthon	596	meline	491
medicum malum	506	melinum oleum	643
medimnus 662	medion 521	melitites.	516
medimnus atticus	663	melon	153
medulla animalium	47	melopepon	44
melan.	530	memæcylos	521
mel coctum	ibidem	membrum distortum callo firmatū quomodo curetur	451
mel non coctum	ibidem	membrorum attenuatorum curatio	28
mel sachar.	520	mēbrana cerebri si nigruerit quomodo curanda	437
mel uino quanto ponderosius	658	memoriæ noxæ quomodo accidat 126. quomodo cognoscatur ibid. quō curetur	127
mel oleo quanto grauius	658	menses scientia medicamentorum 2. 7 menses mouentia	21
mela	521	mēsum immoderatus fluxus quas causas habeat 238 quomodo curandus, Mensium suppressis cōplures affectus & lōgos procreare solet	236
melancholia quid	131	mensium suppressio ob intera nearum partium aliquā primario affectū quomodo curari debeant, Mensium suppressionis causæ quibus notis deprehendantur	ibidem
melancholiæ causæ	ibidem	mensium suppressorum causæ ibidem curatio	ibidem
melancholiæ signa	ibidem		mensēs
melancholiæ curatio	ibidem		
melancholia hypocondriaca	131		
melanthion, & meli	520		



# I N D E X:

mensēs uulneribus quādo flue re incipiant 235. quando de- sinant 236	morbus comitialis trifariam gignitur 128
mensium tempus, menses mo- ratos prouocantia ibidem	morbi publicè grassantes 86
mensuræ 657	morbi publicè grassantes un- de oriantur, morbi ex aeris flatu futuri quomodo præsa- giendi & prohibendi 87
mensurarum notæ ibidem	morbi letalis notæ 58
mensura aridorum ibi. & 663	morbi non letalis signa ibid.
mēsuræ liquidorū 657. & 662	morosis unde fiat 126
menta 494 meon 522	moroxus. 515 morus 522
mercurialis herba 517	motus mediocris ualetudini tuendæ summum affert præ- sidium. 40 muliebri lac 483
mergi uenter 507	mulier ægrè pariens superstes ne futura sit an minus quo- modo cognoscendum 416
mergi iecur 495	muliebris fluor 239 eius spe- cies causæ ibid. notæ ibid. cu- ratio, & muliebres loci, uide uulua & uterus
merulæ. 46 mespila 521	muliebrium locorum clausu- ræ causæ 415. incō moda ibi.
mespila. 45 metopion 645	curatio ibidem
milax. 522 millefolium 524	muliebrium locorum thymi condilomata & hæmorrhoi- des quō excindantur ibidem
miliū. 503 milium 43	mullus. 547 mullus piscis 49
milphosis quid & eius cura- tio 150	mulsa 51
mina, & mina ægyptia 662	mulsæ præparatio ibidem
mina attica ibidem	multipedæ 528 muria 472
mina Romana minium quo- modo coquendum 652	murenæ morsus curatio 347
minium rubricum 484	muris arane ictus notæ 342
misy 522	curatio ibidem
misy quomodo coquatur 652	muris auricula 523
mithridatis antidotū dia scin- cu. 573 Mnasæi emplastrum	murium, stercus 509
discutiens 917	musæ pastillus 590
modius 662	mustela 484
modius ægyptius 663	mustelæ uenter 507
modus Italicus, mota qd 246	mustelg
notæ ibid. curatio 247	
mola & aquæ inter cutē disse- rentia. 546 moly 524	
molybdos, & molydæna 522	
monohemeron collyriū 604	
mora. 45 moræa 522	
morbi principium quod 57	



# I N D E X.

mustelæ cerebrum	489	nares fractæ & contusæ quo-	
muscus, muscus marinus	483	modo curentur	438
myaces, myagros	523	narium uitia 165. & deinde	
myaron, mycete,	ibidem	per totum caput	
mydriasis oculorum	156	narium sanguinis fluxus quo-	
myelos	523	modo sistendus	166
myocephalon	153	narium ulcera quomodo cu-	
myopiæ qui, myopialis	153	rentur	166
myosote, myrica	523	narium fœdus odor quomo-	
myriophyllon	524	do curetur	ibidem
myrmecia	233	narium uitia quomodo emen-	
myrmecia quid 427 unde sic		dentur. 165 nartex	525
uocetur 428 curatio ibidem		nascâthon, nascaphthon	524
myrrha. 542 myrrha	524	nasturtium	501
myrrha quomodo coquenda	652	nasturtij uires	41
myrrhis, & myrrhine	524	natricis morsus notæ	346
myrsinatum emplastrum	618	curatio	ibidem
myrsine	524	naturalia. Vide pudenda	
myrsinoides. 506 myrtus	524	naturalium inflammationes	
myrtites quomodo fiat	561	quomodo curandæ	300
mystrum	658	naturalium ulcera citra inflam-	
mystrum magnum	ibidem	mationem oborta quomo-	
mystrum paruum	663	do curanda	232
mytuli	523	naturalium particularum con-	
myurus unde dicatur	66	seruatio	226
myxa	523	naturalium aquarum uis	24
N		naturalium aquarum dricæ ibid.	
N <sup>A</sup> pus. 42 Napy	524	naturalium balneorum diffe-	
Narce, & Narcissus	525	rentiæ	ibidem
Narcoticorum largior usus quæ		naturalium thymi	403
incommoda afferat	260	naugantium uictus	26
nardinum	607	nausea quomodo curanda	101
nardostachys	524	naxiæ cotis detrimētum	517
nardus cizicine iniectio pri-		nephriticis	207
ma 629 altera iniectio ibi-		nephriticum medicamentum	
dem tertia iniectio	ibidem	ex bellariis uescæ & renum	
nardus gallica	524	exulcerationi idoneum	584
nardus montana	ibidem	nephriticum medicamentum	
		ex cicadis	483
		nepita	



# I N D E X.

nepita. 598	nerion 525	nymphodoti pastillus 592
nerui testium 406		O
neruus præcisus quomodo curandus 326		O Bolus 662
neruis uulneratis aut punctis quæ accidunt 323		O Oboli grammæ 662
neruorum uulneratorum curatio ibidem		Ochra. 485 Ochron 44
neruorum contusorum curatio 326		Ocimum, & Ocimoides 557
neruicorum abscessum medicamenta 290		oculorum caliginem prohibentia 14
neuras 525		oculorum expressionis curatio. 158
nigellæ incommoda quomodo amolienda 362		oculorum medicamentorum differentia atque usus 603
nili dia rhodon 610		Oculorum suffusio 375. unde fiat ibid notæ ibi. curatio 376
nili malagma ad lienem omnemq; duritiem 633		Oculorum qui detractionibus infestantur agglutinamenta 612
nitrum 518		Oculorum carcinomati quid fieri debeat 155
nitrum quomodo coqui debeat 652		Oculi procidentia quomodo curanda 153
nitri spuma 480		Oculi humor crystalloides 157
nitrosæ & falsæ aquæ quibus conferant 24		Oculorum obscuritas 158
noctuæ sanguis 470		Oculorum suppurationem curantia 155
nuces 502 nuces 45		Oculi procidentia 153
nuces uirides, aridæ ibidem		Oculorum habetudo 158
nuclei acinorum uuæ 487		Oculorum confusio quomodo curanda 159
nutrix qualis esset debeat. 2		Oculi purulenti quomodo curandi. 152
nutrici quæ sint uitanda ibid.		Oculorum suffusio quid, eiusque curatio 157
nutricis lac laudatissimū ibid.		Oculi si cute non obtegatur, curatio. 370
nutricis lac quod modis ui-ciatur 3		Oculi purulenti quomodo curandi 374
nutricis lac uitiatum quomodo corrigatur ibidem		Oculi dolorum causæ 145
nyctalops quid & quomodo curetur. 156	nymphæa 525	Oculorum epiphora. id est, de fluxionis impetus quomodo curetur 147
nymphæ quid 415. Quomodo excindenda ibidem		Oculorum



# I N D E X.

Oculorum unguis 374. cura- tio	ibidem	Olea digerentia	89	
Oculorum phthysis eiusq; cu- ratio	156	Oleum	489	
Oculorum atrophia eiusque curatio	156	Oleum amaracinum	646	
Oculorum hebetudinem cu- rantia	155	Oleum amygdalinum	544	
Oculorum albugines quomo- do curentur	154	Olea Aethiopica	489	
Oculorum unguis qui prery- gion græcis dicitur, quid, eiusque curatio	ibidem	Oleum ægirinum	644	
Oculorum ulcera eamque cu- ratio. 152	Oculorum inflā- mationis curatio	Oleum anethinum	642	
Oculorum cicatritrices quo- modo curentur	154	Oleum balaninum	644	
Oculi membrana cornea	152	Oleum caryinum	ibidem	
Oculorum carbunculo quid faciendum	155	Oleum chamæmelinum	642	
Oculi tunica γαλοειδής	153	Oleum cicinum	644	
Oculi dolorum curatio	145	Oleū cyprinū posidonii	646	
Oculorum mydriasis	156	Aliud	ibidem	
Ocimum. 41	Odora	Olei cum cera qui modus esse debeat in cōficiēdis unguen- tis &c.	656	
Oe. 526	Oedema quid	Oleum crocinum	647	
Oedema quid 301. causæ ibid. curatio	ibidem	Oleum dulce 490	omotribes ibid. elotum ibid. Verus ibi- dem. Tenue ibidem. Sabinū ibid. Ex agresti olea ibid. Ri- cininum ibid. Sefaminum, Raphaninum	ibidem
Oedema aliorum morborum accidens nonnunquam 301. quomodo curandum ibidem	Oedemata pedum discutiē- tia. 2	Oleum iriunm	646	
Oedemata pedum discutiē- tia. 2	Oenanthe. 526	Oleum laurinum	645	
Oenantheria	647	Oleum liliaceum	643	
Onanthini confectio	ibidem	Oleum lentiscinum	646	
Alia. 649	Oenos, cæsypos	Oleum mastichinum	642. ma- gis uarium	ibidem
Osypus. 495	Olea. 489	Oleum sycioniū simplex	642	
radicis corricit. pontus & u- tendi modus	561	compositum ibidem aliud ef- ficacius, Oleū melinū	643	
		Oleum picinum	532	
		Oleum raphaninum	644	
		Oleum ricinum	ibidem	
		Olei rosacei confectio	642	
		Oleum sesaminum	643	
		Oleum susinum	ibidem	
		Oleum uiolaceum	644	
		Oleum		



# I N D E X.

- Oleum melle quanto leuius 662  
 Oleum uino quāto leuius ibi.  
 Oleum quō coquendum 653  
 Olei diuerso genera quomodo conficiantur 640  
 Oleosorum uires 470  
 Olearia cos 527  
 Olera syluestria uitiosos humores gignunt 41  
 Olerum facultates ibidem  
 Olera cruda peiores succos procreant quam cocta 42  
 Olera cōdita muria uel oxalme quas facultates habeant ibidem  
 olfactus uitia 165. & deinde per totum caput  
 ὀλγοφόρον uinum 122  
 oliuæ. 45 olostium 526  
 olympus seu olympiacū 607  
 olynthi 526  
 omenti procidentia quō curanda. 401 ὀμνήσις 174  
 omphaciū. 602 omphacome-  
 lis præparatio 602  
 onagra. 526 onobrychis 527  
 onochelos, & onoclea 468  
 onoma, & ononis 526  
 ononis 476 ononis 526  
 onothera, onothuris ibidem  
 onyches. 527 oon 557  
 ophiasis unde dicta 107  
 ophites 517  
 ophthalmia unde fiat 145  
 opisthocranion 363  
 opisthotonos. 142 opisthoto-  
 nicis potio accommoda 143  
 opopanax quō coqui deat 645  
 opos 527. Cytēnaicus, medi-  
 cus, syriac<sup>9</sup>, orchis herba 528  
 ordeum 43 oreoselinum 527  
 Oribasii clidion 589  
 oribasii dropax Gallus 636  
 oribasii melitera 595 oribasii  
 parygrum emplastrum 615  
 origanū. 527 oriogenes pastil-  
 lus. 593 oris affectus 168  
 oris uentriculi inflammatio-  
 nes quomodo, curentur 191  
 oryza. 43 orminum 528  
 orobanche, & orobos 528  
 orthopnœa. 179 oryza 528  
 ossa 528 osta, & ostheon 406  
 ostraca. 529 ostracoderma 49  
 ostracites. 517 ostrea 50  
 ostrea. 529 osyris 528  
 othoma 526  
 otium summum ualitudini  
 maxime obest 40  
 oua puncta 45. Fricta 47  
 ouilla caro 47  
 ouillum cerebrum 488  
 ouium stercus 509  
 ouillum lac 484  
 ouina pellis. 87 ouron 529  
 ouum, & oui candidum 557  
 oui luteum ibidem  
 ouum aceto incoctum uētris  
 fluxiones deficcet ibidem  
 oxera emplastr. 622 oxos 527  
 oxyacanthos, oxybaphus 662  
 oxymeli simplex 576 oxyme-  
 li Iuliani 560. Pondus 563  
 Vires ibidem  
 oxymeli splenicum 588  
 oxymeli scillinum 576  
 oxanas curantia 165

Præonia



# I N D E X.

Oculorum unguis 374. cura- tio	ibidem	Olea digerentia	89	
Oculorum phthysis eiusq; cu- ratio	156	Oleum	489	
Oculorum atrophia eiusque curatio	156	Oleum amaracinum	646	
Oculorum hebetudinem cu- rantia	155	Oleum amygdalinum	544	
Oculorum albugines quomo- do curentur	154	Olea Aethiopica	489	
Oculorum unguis qui ptery- gion græcis dicitur, quid, eiusque curatio	ibidem	Oleum ægirinum	644	
Oculorum ulcera eamque cu- ratio. 152 Oculorum inflā- mationis curatio	145	Oleum anethinum	642	
Oculorum cicatritrices quo- modo curentur	154	Oleum balaninum	644	
Oculi membrana cornea	152	Oleum caryinum	ibidem	
Oculorum carbunculo quid faciendum	155	Oleum chamæmelinum	642	
Oculi tunica γαγοειδής	153	Oleum cicinum	644	
Oculi dolorum curatio	145	Oleū cyprinū posidonii	646	
Oculorum mydriasis	156	Aliud	ibidem	
Ocimum. 41 Odora	466	Olei cum cera qui modus esse debeat in cōficiēdis unguen- tis &c.	656	
Oe. 526 Oedema quid	25	Oleum crocinum	647	
Oedema quid 301. causæ ibid. curatio	ibidem	Oleum dulce 490 omotribes ibid. elotum ibid. Vetus ibi- dem. Tenue ibidem. Sabinū ibid Ex agresti olea ibid. Ri- cininum ibid. Sesaminum, Raphaninum	ibidem	
Oedema aliorum morborum accidens nonnunquam 301. quomodo curandum ibidem		Oleum iriunm	646	
Oedemata pedum discutiē- tia. 2 Oenanthe. 526		Oleum laurinum	645	
Oenantheria	647	Oleum liliaceum	643	
Onanthini confectio ibidem		Oleum lentiscinum	646	
Alia. 649 Oenos, cæsypos	526	Oleum mastichinum	642. ma- gis uarium	ibidem
Osypus. 495 Olea. 489 Oleæ radicis corticis pontus & u- tendi modus	561	Oleum sycioniū simplex	642	
		compositum ibidem aliud ef- ficacius, Oleū melinū	643	
		Oleum picinum	532	
		Oleum raphaninum	644	
		Oleum ricinum	ibidem	
		Olei rosacei confectio	642	
		Oleum sesaminum	643	
		Oleum susinum	ibidem	
		Oleum uiolaceum	644	
		Oleum		



# I N D E X.

Oleum melle quanto leuius 662	opos 527. Cytenaicus, medi- cus, syriac <sup>o</sup> , orchis herba 528
Oleum uino quāto leuius ibi.	ordeum 43 oreoselinum 527
Oleum quō coquendum 653	Oribasii clidion 589
Olei diuerso genera quomo- do conficiantur 640	oribasii dropax Gallus 636
Oleoform uires 470	oribasii melitera 595 oribasii parygrum emplastrum 615
Olearia cos 527	origanū. 527 orioenes pastil- lus. 593 oris affectus 168
Olera syluestria uitiosos hu- mores gignunt 41	oris uentriculi inflammatio- nes quomodo, curentur 191
Olerum facultates ibidem	oryza. 43 orminum 528
Olera cruda peiores succos procreant quam cocta 42	orobanche, & orobos 528
Olera cōdita muria uel oxal- me quas facultates habeant ibidem	orthopnœa. 179 oryza 528
olfactus uitia 165. & deinde per totum caput	ossa 528 osta, & ostheon 406
ὀλιγοφόρον uinum 122	ostraca. 529 ostracoderma 49
oliuæ. 45 olostium 526	ostracites. 517 ostrea 50
olympus seu olympiacū 607	ostrea. 529 osyris 528
olynthi 526	orthoma 526
omenti procidentia quō cu- randa. 401 ὀμνήστις 174	otium summum ualeitudini maxime obest 40
omphaciū. 602 omphacome- lis præparatio 602	oua puncta 45. Fricta 47
onagra. 526 onobrychis 527	ouilla caro 47
onochelos, & onoclæa 468	ouillum cerebrum 488
onoma, & ononis 526	ouium stercus 509
ononis 476 ononis 526	ouillum lac 484
onothera, onothuris ibidem	ouina pellis. 87 ouron 529
onychis. 527 oon 557	ouum, & oui candidum 557
ophiasis unde dicta 107	oui luteum ibidem
ophites 517	ouum aceto incoctum uētris fluxiones deficcet ibidem
ophthalmia unde fiat 145	oxera emplastr. 622 oxos 527
opisthocranion 363	oxyacanthos, oxybaphus 662
opisthotonos. 142 opisthoto- nicis potio accommoda 143	oxymeli simplex 576 oxyme- li Iuliani 560. Pondus 563
opopanax quō coqui deat 645	Vires ibidem
	oxymeli splenicum 588
	oxymeli scillinum 576
	oxænas curantia 165
	Præonia



# I N D E X.

## P

- |                               |               |                                  |      |
|-------------------------------|---------------|----------------------------------|------|
| <b>P</b> Aconia               | 486           | particularum principaliū uul-    |      |
| Paonia compositio             | 583           | neratarum agnitio                | 431  |
| Paguri. 30                    | Paliuron 329  | partiū attenuatarū curatio       | 28   |
| Palma                         | 551           | partium extremarū præcisio       |      |
| Palpebrarum pili oculum utri- |               | quomodo administrāda             | 426  |
| cātes quomodo curandi         | 152           | parthenium. 491 parthenii ut     |      |
| Palpebrarum uestionē ex uren- |               | res, & utendi modus              | 559  |
| te medicamento facta uete-    |               | parthus difficilis causæ         | 253. |
| res omnes damnarunt           | 360           | curatio                          | 254  |
| palpebræ superioris sutura    |               | partus ex utero qua ratione      |      |
| quomodo administrāda          | 368           | exautiatur excindaturq;          | 417  |
| palpebrarum pediculi quomo-   |               | deinde per totum caput           |      |
| do accendi                    | 150           | parulis 379. Eius curatio ibid.  |      |
| palpitatio cordis             | 189           | parulis quid & quomodo cu-       |      |
| palumbus                      | 46            | retur                            | 170  |
| palumbi sanguis               | 470           | parygrum empl. Oribasii          | 618  |
| palumbi uenter                | 507           | passer troglodytes               | 550  |
| panaces Herculeum             | 529           | passeres exigui                  | 46   |
| pancratium                    | 529           | pastillus Oribasii elidion       | 580  |
| panicum. 491                  | panis 478     | pastillus dia spermation         | 588  |
| panis syncomistos             | 43            | pastillus purgans                | 562  |
| papauer                       | 521           | pastillus ex spina Aegyptia      |      |
| papaueris liquoris epoti no-  |               | 589                              |      |
| tæ 355                        | Curatio ibid. | pastillus dia castorieu, colicis |      |
| papyrus                       | 530           | efficax                          | 592  |
| paracynanche                  | 173           | pastilli scillini quomodo præ-   |      |
| paralysis quid                | 135           | parentur                         | 571  |
| pararthrema                   | 452           | pastillus dia rhodon             | 588  |
| parastatæ                     | 406           | pastillus faustini               | 591  |
| pardalianches                 | 471           | pastillus cui nomen est thro-    |      |
| parefis curatio               | 137           | nus Marcellus                    | 591  |
| parietaria                    | 491           | past. ex erica, lieni dicatus    | 590  |
| paronychia                    | 530           | pastillus neræ ex Heræ com-      |      |
| paronychia                    | 270           | mentariis                        | 590  |
| parotis quid                  | 164           | pastillus trigonus               | 588  |
| partes animalium              | 47            | pastillus nymphidoti             | 593  |
| particularum naturalium con-  |               | pastillus capnistos ad tussim    |      |
| seruatio                      | 226           | continuum                        | 178  |
|                               |               | pastillus Criogenes              | 592  |
|                               |               | pastillus                        |      |



# I N D E X.

pastillus musæ	590	periphymosis	402
pastillus ad capitis dolorem ex intemperie calida	115	peripneumonia quid	180
pastilli 584. eorum differentia		periscyphismus	367
ibidem. Vfus	ibidem	peritonæi uulnera quomodo manu curanda	398
pastillus aster dictus	588	perniones quid 267. eorum curatio, & persæa	531
pastillus dia coralliu	588	perturbarionis oculi causa	145
pastinaca	543	pesti. 645 pestus quid	237
pastinaca marina	549	pestorum differentia	649
pastinaca radix	42	pestus titianus	651
pastinacæ. 50 patella	448	pestorum aperientium mate- ria 650. Vfus	ibidem
patellæ fractæ curatio	ibidem	pestus Aegyptia	651
panicum. 43 pauo	46	pestilētia quō præcauenda	88
pectoris rupturæ, impressionis confractiois notæ & cura- tio	442	pestilentia notæ	87
pediculi capitis quomodo abi- gendi 114 pedis ossa fracta		pestilentiam arcentia	87
quomodo curentur	450	petalites 531 peuce	531
pedis digitorum luxatorum curatio	464	peucedanum	ibidem
pedū rimæ quō curandæ	268	phaci, & phacos	552
pedum œdemata discutiētia	2	phæo ad oculos sanguine suf- fusus, & magnos affectus	605
peganera emplastrum	625	phagedænæ remedia	311
paganum	531	phalangites	552
pelagii pisces	49	phalangiorum morsus notæ, & curatio 339 phalaris	552
pelarion ad ulcera	605	pharici poti ligna 358. reme- dia, & Pharynx	173
pelarion ex scorïa argēti	613	phaselum	44
pelecinus. 494 pelles calcea- mentorū ueterum	487	phasganion	525
penis glans nuda quomodo contegatur	401	phasianus	46
pentamyron malagma	632	phasolum	488
pentaphyllon	530	phellos	551
peperi, peplion, peplon her- ba, & pepon	44	philagrianum malagma.	
peponatum smegma	597	philocotyche emplastr.	618
perdix. 46 perdicium	490	philonis antidotum	577
periclymenon	530	philyras	552
		phlegmone quid	287
		****	
		phlomis	



# I N D E X:

Phlomis. 526	phlomos 552	pisces cetacei	56
phlyctena	153	pisces omnium deterrimi	49
phlyctenæ quō curandæ	284	pisces molles cute	50
phœnicine emplastrum	615	pisces pelagij	49
phœnix herba	552	piscium ius	498
φάρμακον	125	pissa. 531	pisselæon 532
phormion. 552	phrenes 121	pistacia. 46	pisum 44
phrenitis quid	120	pituita in uentriculo redun-	
phrenitidos causæ ibidem &		dans, quomodo uacu ā da	18
signa ibid Curatio	121	pityides, & pityocampæ	532
phrygius 517	phrynion 534	pityos phlœos, pityriasis	112
phthysis oculorum	155	pityriaseos curatio	ibidem
phthysis quō curetur	186	pityusa. 532	pix 531
phu	552	plantæ sordida ulcera quomo-	
phusca, ad conterendum cal-		do curāda. 267	platanus 533
culos	583	plethoricum corpus	62
phycos. 552	phygethlon 296	πλατὺς quid	25
phylites 553	phyllon 552	plumbago	522
phyma quid 296. curatio ibi.		plumbago quō coquenda	651
piceæ cortex, & picis flos	532	plumbum	522
picinum olenum	ibidem	plumbi scobis potæ signa	361
picra Galeni	581	remedæ, & pneumon	532
pilos argentia	109	pnigalion	134
pilos extenuantia	110	podagra quid 257	signa 258
pili palpebrarum oculum irri-		podagræ causæ	256
tantes quomodo curādi	151	podagrica remedia	586
pilos nutrientia	109	podagra ad arthride quid	
pinaster	531	differat	256
pingitis terra	485	podagra quomodo præcaue-	
pinguedo animalium	47	rit possit	267
pinguia quomodo coquenda		pœcilon acopon	634
653		pollen farinaceus	486
pini refina	536	polycnemon, polygalon	532
pini nucleus	45	polygonon polygonides	506
pinus. 531	piper 530	polyidæ sphragis	590
piper aquaticum	549	polypi	50
pappi quid 362 eorum reme-		polypus quid 373 unde dica-	
dia. 361	pirum agreste 480	tur ibid euratio	ibidem
pius. 476	pisces 49	polypodas curantia	165
		polypodion	



# I N D E X.

polypodion	533	psimmythion	557
polypodii radices vires & mo-		psitacium emplastrum	617
dus exhibendi	560	psora quid 276 causæ ibidem	
polymorū omniū facultates	44	signa ibidem curatio ibidem	
pompholyx	533	psoricō. 557 psorophthalmia	
pompholigeron emplastrum	618	quid eiusq; curatio	148
pondera, ponderum notæ	661	psydracia capitis	113
populus nigra	569	psyllium	555
porrigo capitis	112	psylli assumpti notæ 355 re-	
porphyra. 533	porrum 42	media	ibidem
porrum agrette	474	ptarmicæ	534
portulaca	475	ptelea, pteris, pterygion quid	
potamogeton	533	374 curatio, pterygion ocu-	
poterion 534	prasion 53+	lorū quid eiusq; curatio	154
prafoides. 491	præcocia 45	ptyas aspidis genus	346
præster unde dictus	345	pudendum masculi cerui	469
priapismus quid 231 causæ		pudendorum ulcera quomo-	
ibidem curatio	ibidem	do curanda	267. & 270
principium morbi quod	57	pudendorū rimas curatiā	232
prinos	534	puerorum stercus	508
proficiscentium uictus	26	puerorum aphthæ quomodo	
prueolis	534	curentur	5
propolis quomodo coqui de-		pueris quomodo cienda alius	
beat	654	4. & 5	
propomata	602	puerorum tussis quomodo cu-	
prosechii stacticum	607	randa	4
prospheysis	406	puerorum morbi & sympto-	
protelus ad claritatem oculo-		mata, & pueri quo tempore	
rum, cicatricesque extenuat		dient, & pulegium	486
610		pulegii vires, pondus & sūmen	
prunus, & prunus, pruni fru-		di modus	561
ctus, pruna damascena	507	pulicaris herba	557
pruritus causæ 269 signa ibi.		pullus columbinus	46
pruritum gingivarum puero-		pulmo 332. agninus, suillus,	
rum curatiā	45	uulpinus	ibidem
psaron medicamentum	596	pulmo animalium	48
pseudodictamnion	557	pulmonis tēperaturæ notæ	32
psilothrum	598	puls ad purgandum	563
psilothra medicamēta q̄	226	pulsus quid	63
		*** 2	pulsus



# INDEX:

pulsus usus duplex	ibidem	purulenti quō adurendi	393
pultus duri & uehementis dis-		purulentorum curatio	185
crimen	72	putredini quamlibet partem	
pulsuum genera & differentia		occupanti accommodata me-	
recensentur & explicantur		dicamenta	312
63. & deinceps		pycnoconō. 535 pyrethrū	535
pulsuū causæ & præfagia.	69	pyrethri pondus & utendi mo-	
& sequentibus		du. 559 pyrgite	46
puluis cephalicus, capiti con-		pyrine empl. 616 pyritis	524
ueniens	592	pyros. 536 pyxis acopon	639
puluis pilos abolens, ad poda-			
gram	595		
puluis ex aloe	592		
pumex	505		
pumex quomodo coqui de-			
beat	652		
purgans puls	563		
purgantia medicamenta non			
simplici quodam tempera-			
mento, sed totius substantiæ			
proprietate purgant	556		
purgantiæ oliuæ	563		
purgatio ex Rhodomelite A-			
lexxandri	563		
purgationibus quos uti conue-			
niat	556		
purgationis tempus	ibidem		
purgans fusca, & stomacho			
grata	562		
purgantia medicamenta com-			
polita	562		
purgans pastillus	564		
purgans uinum in hydropicis			
ibidem			
purgans bucellatus	563		
purgatio halatia	564		
purgatione modum exceden-			
te quid fieri debeat	566		
purpuræ	533		



# I N D E X:

Rapa, & Raphanis	42	ricinium oleum	644
Raphanidon	433	ricini pondus, utendi modus,	
Raphanus. 536		& uires	561
Raphano quādo & quomodo utēdum	42	ricinorum sanguis	470
Raphaninum oleum	644	rigoris in febrib <sup>9</sup> curatio	95
Rapum. 488		rimæ ani quomodo manu curandæ	424
Ratiocinationis offensa quomodo contingat		rimæ digitorum totorumque pedū quomodo curandæ	268
dignoscatur & curetur	126	rhododaphne. 525	rolæ 537
Raucitas	175	rosacei confectio	642
Racrementum	542	rosmarinus	515
Refracto. 432		rostra animalium	47
Remedia	435	rubia, & rubra tinctorum	492
Renes animalium	47	rubus 481	rubus caninus 513
Renum affectus quomodo dignoscendi & curandi	207	rubens cygnus	605
Repletionis curatio	15	rufi potio contra pestem	88
Resinæ	536	rumex	514
Resolutionis curatio	137	rumex grandis	498
Resolutionis ob colicum dolorem cōtractæ curatio	278	ruptorum remedia	303
Rha, & Rhacos	536	ruptis à quibus abstinēdū	228
Rhagadæ ani & pudendorum quomodo sanandæ	232	ruta. 531	ruta sylvestris 524
Rhamnus. 536		Rheon. 536	
Rhetinæ. 536		Rhinariū	608
Rhoda	537	rem obtundit	16
Rhodia radix	537	S	
Rhodia ad supprimendum sanguinem ulcera depascentia, & excreſcentias	596	Sabina. 482	Sachar 520
Rhodomalum	602	Sagapenum	537
Rhœ, & Rhœa	537	Sagapenū quomodo coquendum. 651	Sal. 471
Rhœlis confectio	603	Sal quōcoqui debeat	652
Rhogme. 432		Salis flos. 473	Salamādra 537
Rhu	553	Salamandræ assumptæ signa	
Rhyas quid eiusq; curat.	151	358. curatio	ibidem
Rhypos	537	Sales theriaci. 574	Salix 498
Rhythmus quid	65	salsamentum thymi	546
Rhythmū differentiæ	ibidem	Salsæ & nitrosæ aquæ quibus conferant	24
Rhythmus in pulſu quid	ibid.	Salſorum uires	467
ricinum	505	* * * * 3	
			Saluia



# I N D E X.

Salvia. 490	Sambucus 471	satyriasis quid eiusque causæ
Sambuci corticis radicis pon-		230 quæ symptomata eam
duſ, uires, & mod <sup>o</sup> utēdi 581		conſequantur ibidem
Samia terra 484		ſatyriacum antidotum 583
Sandaracha 514		ſatyrium. 538 ſaura 534
Sandaracha quomodo coquē		ſaxifraga, & ſaxiphages ibid.
da 647		ſcammonia 531
Sandix. 534	Sanguis 570	ſcandix 41 & 541
Sanguinē e naribus profluen-		ſcapularum compreſſionis, ru-
tem in febribus quomodo		ptoræ, refractiōis notæ &
ſiſtere oporteat 103		curatio 442
Sanguinis e naribus profluuiū		ſchidacidon 432
ſedantia 166		ſchinos. 546 ſchiſtos 516
ſanguinem cōmouentia 236		ſcillini paſtilli quomodo præ-
Sanguis bubulus 48. lepori-		parentur 592 ſcingos 541
nus ibidem, porci iuuenis ibi		ſcirrhus quid 303 eius diſſe-
dem, caprillus ibidem		rentiæ ibidem, qui ſit inſana
Sanguis ex uena, arteria uel		bilis ibidē, cauſæ ibidem, cu-
naribus profluens quomodo		ratio ibidem & 304
ſiſtendus 320		ſclerophthalmia quid eiusq;
ſanguinem uenane an arte-		curatio 118
ria profundat quomodo di-		ſcolopendra merina 541
gnoscatur 321		ſcolopēdræ morſus notæ 341
ſanguinis renum profluui cu-		curatio ibidem
ratio 211		ſcolopomachærion 366
ſanguinis profluuium curans		ſcolymon 541
medicamentum 212		ſcolymos quas uires habeat 41
ſanguinis ex ore profluuium		ſcordion. 541 ſcordon 512
quomodo ſiſtendum 173		ſcordopraſon 542
ſanguis animalium 48		ſcorpoides 542
ſanguinaria 534		ſcorpius. 406 ſcrotum 407
ſaporum ſpecies 462		ſcroti inflammationis notæ
ſapphyrus. 517 ſaprotes 537		228
ſarcocolla ibidem		ſcrupulus. 662
ſarcomata curantia 165		ſcylla 541
ſardonias herba 358		ſcytales morſus cura 344
ſardonias herbæ potæ ſigna		ſecundæ relictæ quomodo ma-
ibidem		nu educendæ 419
ſatureia 497		ſedes, Vide anus
		ſedi



# I N D E X.

fedi illita quæ purgent	568	signa concoctionis nunquam	
sedis tuberosa ulcera quomo-		sinistre apparent	ibidem
do curanda. 300	selache 50	signa decretoria ubi morbus	
selemusia terra	485	inclinauerit, bona sunt	ibid.
felinon	538	siliqua. 662	siliquæ 46
semen redundans quomodo		silphe, & silphium	540
imminuendum	17	silurus, silibon sinapi	524
semina quò coeuenda	656	sinapismi usus	636
feminis redundantis noxa	17	sinciput quibus scetur	367 &
feminaria uasa	35	quomodo	ibidem
semperuiuum	469	singultus causæ	102
senescio herba	495	sinus quid	216 eius cura ibid.
senecta anguis	479	sion	340
senum habitus quomodo ri-		sion quas habeat uires	41
calfaciendus	13	siræon. 493	siricum 538
seuum uictus ratio 12. & se-		sisarum, & siser	540
quentibus.		sisybrium, & sison	ibidem
sepiæ	50	sitis in febribus curatio	100
sepiæ testa, & seps	539	smegmata	594
serapionis melæne emp.	616	smegma dentium	170
serapias. 528 seris	59	smegma pepouatum	597
seriphum, serpillum	492	smilax	543
sertula campana	520	smilacis potè signa	357 reme
serum lactis quomodo à ca-		da	358
seo discernatur	49	smilion ad abscessus	612
sesamoides	539	smiris. 517	smyrna 543
sesaminum olenm	643	smyrnion	ibidem
sextarius	658. & deinceps	smyrni uires	41
sicci temperamenti notæ	29	stœchas	544
sicyos	540	sol si quem exusserit, quid fa-	
sicyos agrios	ibidem	ciendum	18
sicyonium oleū simplex	642	solani furiosi poti signa	358 re
compositum ibidem, aliud ef-		media, & solanum	544
ficacius	ibidem	solare cyphi	645
sideratio quid	291 uide sphaci	solstitium æstiuum quid effi-	
los, & sideritis	539	ciat in hominibus	56
sideros, & sidion	538	solstitium hyemale quid in	
signa decretoria in morborū		corporibus humanis effi-	
pric. pio praua sunt	61	ciat.	55

\* \* \* \* 4 somnus



# I N D E X.

Somnus quid	52	dus utendi	561
Somni uehementis causſæ.	53	squatinæ	50
curatio, & Sonchus	542	squillæ, & stachys	543
Soporis uehementis causſæ ibi		stacticum proſechii	608
dem curatio	ibidem	staphiloma	153
soporis noxiij curatio	93	staphyloma quid 374. curatio	
ſorba. 45	ſordes	ibidem	
ſordes balneorum	486	staphylinus. 543	ſteata 543
ſori	546	ſteatoma quid	306
ſotera, antidorum	486	ſtegnofis	10
ſparganium	542	ſtellio tranſmarinus	342
ſpartos, & ſpeclarium	543	ſtellionis tranſmarini morſus	
ſpecularis lapis	ibidem	remedia	ibidem
ſphacelos quid	291	ſtercus 508. Canum ibid. Pue	
Curatio	292	rorum ibid. Lupinorum ibid.	
ſthæriõ empl. ad ardoreſ	621	Caprillum ibid. Pubulũ ibid.	
ſphincter. 203 Σφίγκτης	332	ſtercus caprillum	262
ſphongion malagina	631	ſterilitatis remouendæ ratio	
ſphragis polyidæ	590	250. & deinceps.	
ſpica nardi 542. Indica. Syria-		ſternutamēta quæ citent	166
ca, & ſpina alba	471	ſternutamēta in febribus quo	
ſpina Aegyptia uel Arabica		modo curentur	98
ibidem		ſtigmata quõ curanda	282
ſpinæ gutturi quomodo exi-		ſtimmi, & ſtœbæ	544
mantur	382	ſtomachus quomodo adura-	
ſpirandi difficulcas	179	tur	396
ſpodium. 543 ſpondylion	545	ſtomachus atra bile uitioſus	
ſpondyli	50	quomodo curandus	192
ſpongia, & ſpongos	543	ſtomachi exundationē impe-	
ſpongiarum lapides	517	dientia. 1 ſtomacho in febr-	
ſpontanearum laſſitudinum		bus quæ cura adhibenda	94
tres ſpecies, earum curatio		ſtomachi doloreſ conuulſorii	
11. & deinceps.		quomodo curandi	195
ſpuma nitri	480	ſtomachi affectus curâtia	191
ſpumæ argēti potæ ſigna	361	ſtomachi roſtionē emēdâtia	1
remedia, ſputi notæ	76	ſtomatica Aegyptia	600
ſputum cruentũ curantia	177	ſtomatica medicamenta	598
ſquama.	515	ſtrabiſmus quid, & quomodo	
ſquamæ Cypriæ pōdus & mo-		curetur	158
		ſtrangulatorum	



# INDEX.

Strangulatorum curatio	173	sycomora.46	sycomorus	545
Stratiotes	544	sycoſis quid eiusq; curatio	150	
Strobilina reſina	538	ſymphytum petraeum	545	
Strobilus	45	ſymptomata & morbi puerorum		
Struma quid 385. Vnde dicatur ibidem ubi oriuntur ibidem curatio	ibidem,	rum dentientium 4 eorum curatio ibid. & ſequentibus.		
Strumæ quomodo curandæ	299	ſynanche	173	
Strutiocameli	46	ſyncopes in febrib. cauſæ.	89	
strychnon	544	remedia	ibidem & 90	
ſtulticia unde fiat	126	ſyntexis.48 ſyntexes quomodo curari debeant	92	
ſturnorum ſtercus	509	ſyriacis quid	6	
ſtyperia,& ſtyrax	544	ſyriaci ſuccurrentia,ſyrica	26	
ſtyracis albi pondus, & utendi modus.	560	ſymailmi.54 ſyſtole pulſus	63	
ſuccidanea inuicem medicamenta 6, 2 & deinde per totum cap.				
ſuccinum. 495	ſudor 497			
ſudorem elicentia	22			
ſudori in febribus quid adhibendum 96 ſuffimenta	648			
ſuffimen roſatum	ibidem			
ſuffocatorum curatio	173			
ſuffuſio	375			
ſuigillata quō curetur	163			
ſuilla caro	47			
ſuillus talus	528			
ſulphur quō coqui debeat	619			
ſulphuratae aquæ quibus conferantur 24	ſulphur 498			
ſuppuracionem oculorum curantia	155			
ſurditatis remedia	163			
ſuſinum compoſitum	643			
ſuſinum oleum	ibidem			
ſuſpicioſi qui 179. Eorum curatio, & ſyca	545			
ſycamina. 45	ſyce 545			



# I N D E X.

Terræ tuber	550	thermarum differentia & ui-	
terebinthus quid, eius causſæ,		res 24. & deinceps	
notæ & curatio	297	thermos	498
terebinthina refina	537	thlaſis	432 & 433
terebinthina ad aluum subdu-		thlaſis aurium	163
cendam quantitas & exhibi-		thlaſpi	498
tionis tempus	20	thoracis morbos quæ ſigna	
terminthos. 546	teſtæ 529	præcedant. 54	thridax 498
teſtes aphthæ ulceræ preſſi		thronus Marcellini paſtil. 588	
quomodo curandi	229	thus	515
teſticularum caro excreſcens		thuris lachryma quomodo co-	
quomodo amouēda ibidem		quenda	654
teſticularum inflammationis notæ		thuris manna	519
229 curatio	230	thylacitis 524	thymbra 497
teſticulus quid	406	thymus 498	thymus 233
teſticularum animalium	47	thymus locorū muliebriū 415	
teſticularum inflammationis		quomodo excindendus ibid.	
quomodo curandæ	300	thymi naturaliū quid 403. eo-	
teſticularum temperaturæ no-		rum differētia ibi curatio ibi.	
tæ. 35 teſtiū conſeruatio 225		Thynni prægrandes	50
teſtudinis mariniſque ſanguis quo-		tibiæ fracturæ quomodo cu-	
modo præparetur 348	Eius	randæ	449
uſus	ibidem	tilia. 552	tiphodes febres 83
tetræpharmacum empla	614	titanus	548
tettiges. 546	teucrion 545	tithymalus 546. Eius ſeptem	
teuton	ibidem	ſpecies	ibidem
thalaffion hydor	496	titianus peſſus	652
Thalafferos	610	tonſillæ 380. Eius cauſſæ ibi-	
thaliætrum	495	dem, Curatio	381
thapſia	498	tonſillarum inflammationi	
thapſia quō coquenda	654	reſiſtentia	171
thapſia quæ pericula nonnun-		tophos in artubus quid coale-	
quam aſſerat 362. eorundem		ſcere impediāt	263
remedia, & theion	498	tophi articulorum quomodo	
thelypteron	ibidem	curandi	164 & 266
theodothion minus	607	tophorum commune	266
theriace antidotū quomodo		tormina quomodo curentur	
paretur 570. Eius uſus	572		199
theriaci paſtilli quō fiant	570	torpedines	50
		torpedo	



# I N D E X.

torpedo marina	525	tylosis	150
toxicum unde dictum	359	V	
toxici poti notæ ibidem	Re-	V Accinum lac	483
media	ibidem	Valetudini tuendæ sum-	
trachoma quid, eius curatio		mū otium maximè obest	40
150		Varices	409
tragacantha	548	uaricosus uarix	ibidem
tragium, & tragoriganū ibid.		uari quid & quō curan.	168
tragostitodes	ibidem	uasa quomodo diuidantur &	
tragus frumentaceus	ibidem	quibus	565
terebinthus	546	uasorum adustio quomodo ad	
tremoris origo	144	ministranda	366
triblium. 662	tribolos 546	uenæ sectio quomodo admi-	
tribulus, & triches	549	nistranda 391 & deinceps	
τριχίαν quæ curent	151	uenena	347
trichismus	433	uenenorum simplicium enu-	
trifolium. 538	trigle 548	meratio	351
trigonus pastillus	586	uenter 507 Mergi ibidē, Gal-	
triorchis. 528	triphyllon 538	linarū uentris interior mem-	
tripolium	549	brana ibidem, Palumbi ibidi-	
triticum	43 & 535	dem, Mustelæ	ibidem
trixago palustris	541	uentriculi affectus curātia	191
trogodytes passor	549	uentris morborum signis ap-	
tryglion	658	parentibus quid faciendū	54
trygon, & tryx	549	uenter quō emolliendus	56
tuberum facultates	43	uentriculus animalium	46
tubercula ani quomodo ma-		uētriculi tēperaturæ notæ	32
nu curanda	423	uentriculi flatus unde gene-	
turdis, & turtur	46	rentur, & quō curentur	195
turturis sanguis	470	uentriculi intemperies quo-	
tussis	175	modo corrigantur	37
tussim continuam pastillus cu-		ueneris ardorem obtundit ru-	
rans	178	ta, Veneris commoda	16
tussi in febribus quomodo oc-		ueneris impotentia 231 caus-	
currendum	97	sæ ibidem. Curatio	ibidem
tussi grādines & calculi ex pe-		ueratrum	425
lore educti	175	ueratri albi assumpti noxæ	
tussilago	482	quomodo curandæ	362
tussiculæ puerorum curatio	4	ueratrū quibus cōueniat	558
		ueratrum	



# I N D E X.

Veratrū qūo exhibeatur	568	sumpti remedia	362
uerbasculū. 552 uerbenaca	532	uini moderate sumpti cōmo-	
uergiliarum exortus quid effi-		da. 51 uini immoderati sum-	
ciat in hominibus	56	pri incommoda	ibidem
ueri q̄ uict <sup>9</sup> ratio cōueniat	24	uinum omne nutrit	50
uermes terreni	486	uini potio in febribus quando	
uvertebrarum contusionis, &		conueniat	78
fracturæ notæ, & curatio	443	uinū purgās in hydropicis	503
uertiginis curatio	128	uinum rubens & crassum	50
uerruca quid 428. unde sic no-		uini uires, uiola	497
minetur ibid. Curatio ibid.		uiola alba	515
uerruca pensilis	233	uiolaceum oleum	643
uesicæ affectus quomodo di-		uipera	499
gnosceri, & curandi	207	uiperæ tum maris tum fœmi-	
uesicæ calculi signa	404	næ morsus notæ	343
uesicæ clystere	403	uires quæ dissoluant	72
uesicæ exulceratæ signa	210	uiride empl. Macherionis	625
uesicæ morbos quæ signa præ-		uirulentorū p̄cautiones	334
cedant. 55 uesicæ morborum		uisum. 499 uitis nigra	475
signi, neglectis quæ ægritudi-		uitrum. 550 uituli marini	50
nes sequantur	ibidem	ulcus simplex quid	307
uesicæ resolutio	213	ulcus cauū qūo implendū	309
uesicæ resolutionem comitan-		ulcera sordida quomodo pur-	
tia, Vespertilionū sāguis	470	ganda. 310 ulceri cicatrix	
uestis attritæ fragmentū	536	quomodo inducenda	313
uictus nauigantioni	26	ulcera carcinode quomodo	
uictus ratio omnium ætatū. 6		curentur. 300 ulcera chyro-	
& deinceps.		nia quomodo curanda	299
uictus ratio infantū, uictus rō		ulcera capitis manantia unde	
in laboribus uitam agentū	25	fiant 113. qūo curentur	114
uictus rō senū 12. & sequētib.		ulcera uermes qūo arcēdi	310
uictus ratio quolibet anni tē-		ulcera oculorū eorumq; cura-	
pore quæ seruanda	24	tio. 152 ulcera cacoethe	315
uigiliæ quomodo arceātur	52	ulcera chironia, telepha	ibid.
uigiliarum uariæ causæ	ibid.	ulcera uetera qūo cur.	299
uigiliis in febribus qūo resistē-		ulcera articularum quomodo	
dum 92. & sequentibus.		curentur	320
uinū albū 51 uinum dulce	50	ulcerū diruporum curatio	319
uinum meracioris copiosi as-		ulcus circa os sacrū unde pro-	
		ueniat	



# I N D E X.

- ueniat. 106 ulophonos 357  
 umbilico illita q̄ purgent 567  
 umbilici p̄minētis causſæ 397  
 umbilici p̄minētis curat. 226  
 uncia. 652 unedon. 491  
 unguenta q̄uo coquan. 652  
 unguentum zolimi ad tremu-  
 los celebratū 639 ungues 50  
 ungues qui laborauerint, ut ab-  
 ſcedant. 271 unguis oculorū,  
 quid eiusque curatio 154  
 unguum peteygiū quid 426  
 ungues cruēti q̄uo curan. 217  
 ungues contuſi quomodo cu-  
 rādī, unguiū reduuiæ qd̄ 270  
 uocis exercitatio qualis eſſe  
 debeat & quæ eius ſint cōmo-  
 da. 9 uolatilia. 46 uomenti  
 quid obſeruandum 19  
 uomitus q̄uo prouocādus 54  
 uomitus qui uti debeant, &  
 quomodo. 527 ſequentibus  
 uomitus quæ comod p̄ſtet 19  
 uomitioni bilis quomodo oc-  
 curendum. 102 uranium 609  
 ureteres. 210 urina 529  
 urinam cientia. 55 urinarū co-  
 lor aquoſus, rufus, & bilio-  
 ſus mediocriter pallidus qd̄  
 ſignificet. 7 urinæ difficultas  
 quomodo curatio. 213  
 urinæ difficultatem indican-  
 tia, & urinæ incontinentia  
 unde oriatur 214  
 urinā quæ mouent. 19 urinam  
 mouentia. 220 urinarum no-  
 tæ. 75 urinæ retentionis cauſ-  
 ſæ. 403 urforū ſanguis 470  
 urtica, uteri abſceſs⁹ notē 242  
 uteri affectus 235  
 uteri callus q̄uo curands 253  
 uteri cancrorum ſpecies 244  
 uteri clauſuræ, quam phinon  
 appellant cauſſæ 250  
 uteri duricies q̄uo curāda. 245  
 uteri hæmorrhoides quomo-  
 do deprehendendæ 253  
 uteri inflāmationis cauſſæ 240  
 uteri à naturali ſede declinan-  
 tis curat. 241 uteri mola 246  
 uteri ulcera paſcendo ſerpen-  
 tia quomodo curanda 243  
 uua. 381 uua. 44 uua inflam-  
 matio quomodo curāda 172  
 uua paſſa. 479 uulpes 573  
 uulua abſceſſus quomodo ma-  
 nu curandus 416  
 uulua animalium 48  
 uulua fluor 239  
 uulua oſtij phymus quomo-  
 do curetur 416

## X


- X** Anthion. 525 Xanthon  
 medicamentum 595  
 Xerophthalmia quid eiusque  
 curatio. 148 xeftes 658  
 xiphion, xyris. 525 xyraphiū  
 medic. aduerſus capitis & mē-  
 tiſiſcoſa exanthemata 114  
 xyris. 525 xyſter. 608

## Z


- Z** Armala. 524 Zea 493  
 Zingiber, & Zomos 495  
 Zopyrios medicamētum 580  
 Zolimi unguentum 639  
 Zynie, & Zythus 495

# F I N I S I N D I C I S.





PAULI AEGINETAE  
PERIODE VTI IN SVVM  
DE RE MEDICA OPVS,



P R A E F A T I O.

*Pauli laborem nosce me, qui plurimas  
Inuisit orbis terras, Aegina satus.*



ON EQVIDEM opus hoc quasi ue-  
teres aliqua arti necessaria prætermise-  
rint, componere sum aggressus, sed to-  
tam ut disciplinam in compendium re-  
digeré. E contrario enim illi rectè qui  
dem omnia & integrè e laborauerunt :  
recentiores autem præterquam quòd  
illos ne legere quidem curant, etiam  
loquacitatis adhuc coarguunt. Qua ra-  
tione impulsus uolumen istud elucubraui, quod illis sanè qui  
ipsum, ut uerisimile est habere uelint, eorum quæ legerunt cõ-  
mentarius, mihi uerò exercitii loco erit. Absurdum nanq; fue-  
rit rhetoras quidem compendiosis uti libellis iudicialibus, &  
ad circumferendum accommodis, in quibus legum capita con-  
tinentur, ut dum usus postulat, in promptu habeant, nos uerò,  
nullam eorum habere rationem : quum illis non pauco tantũ,  
sed iam longo etiam tempore, legibus inspiciendis immora-  
ri, ac differre iudicium liceat, nobis neutiquam, aut certe rarò  
ea facultas concedatur. Etenim necessitas in quibusdam mor-  
bis frequenter nullam ferens dilationem, subitam concreuitio-  
nem opemq; postulat. ob quod rectè Hippocrates occasionem  
dixit



## P R A E F A T I O .

dixit præcipitem . Illos præterea in solis ferè urbibus rerum utilitas incitat, & ubi libri nequaquam desiderantur ; medicis autem non tantum in urbibus, aut agris, aut etiam locis desertis, uerum iam quoq; per mare frequenter in ipsis nauibus subita morborum necessitas ingruit, in quibus dilatio mortem, aut omnino extremum adfert discrimen. Quoniam igitur uniuersas medendi rationes, aut particularem omnem materiam memoria tenere uel difficillimè, uel nequaquam aliquis possit, compendium hoc ex ueteribus collegi. Nulla enim de meo inserui, nisi paucula quædam in artis operibus mihi & uisa & comperta. Nam in pluribus egregiis authoribus, magisque in Oribasio uersatus, qui & ipse librum totum, quo uniuersam de tuenda ualetudine rationem comprehendit, aliunde collegit utpote Galeno posterior, adeoq; recentior adhuc, optima quæque ex ipsis se legi, nullum quatenus licuit, ex morbis prætergressus. Etenim Oribasii ipsius uolumen, à septuaginta libris quos continet Hebdomæ contrabiblon appellatum, quod tota in se artis materiam complectitur, non omnes, quod grandius sit comparare sibi possunt. In huius autem Epitome ad Eustadium scripta, præterquam quod pleriq; morbi non attingantur, etiam imperfectam reliquorum præceptionem uideas, partim causarum, partim signorum, nonnunquam & curatio integra desideratur, ceu alia in memoriam uenerint.

Præsens autem commentarius notas, causas, & curationem omnium morborum continet, simularium, instrumentorum, & eorum quæ ad unitatis diuortium pertinent: idque non summatim, sed quatenus licet amplè & diffuse. Ante hæc autem omnem uictus rationem quæ sanitati tuendæ facit, exposuimus. Postremum autem librum de simplicibus compositisque medicamentis conscripsimus.

*Quid singuli septem totius operis libri, nam totidem habentur, contineant.*

**P**rimus omnem sanitatis tuendæ rationem tradit, item quomodo morbi peculiare ætatibus, anni temporibus, temperaturis, aliisque nonnullis, caueantur, emendenturq;. Præterea ciborum omnium uires & usus habet, ut in capitibus comprehensum est.

Secundus



## P R A E F A T I O .

Secundus febreis uniuersas enumerat, ita ut praeponantur ipsis, quæ eò conferunt, exempli gratia, notæ ex recrementis, diebus decretoriis, & id genus aliæ. Subiunguntur autem casus qui febribus superueniunt.

Tertius affectus declarat, qui singulis corporis partibus obueniunt sicut à summo capite ad imos pedes, adeoque ungueis descendat.

Quartus agit de exterioribus, & ueluti in aperto contractis uitijs, quorum non certæ sedes assignari possunt, sed plureis particulas infestât. In quo & de tineis & dracunculis tractatur.

Quintus de animalibus ictu, morsuue uenenum relinquentibus differit, ubi & de rabiosi canis morsu, & metu aquæ adhæc de non rabidi canis morsu hominisque agitur. Inibi de uenis eorumque remediis disputatur.

Sextus chirurgicam omnem exponit, tum quæ carnis uicia curat, ubi & teli extrahendi ratio comprehenditur, tum quæ ossium fracturas, luxationesque artuum complectitur.

Septimus omnium medicamentorum uireis continet, primum quidem simplicium, deinde & compositorum, eorumque potius quæ in sex aliorum librorum discursu commemorari, præfertim maiorum & nominatarum compositionum. Scio enim illic non omneis diffusè explicari, ne disciplina, tædium afferatur, ut quærens aliquis unam, aut etiam plureis nobileis confecturas, faciliè inueniat. In fine adduntur nonnulla ad medicamentorum compositiones utilia. Item de alternantibus inuicem remediis agitur, ut totus liber in disciplinâ de ponderibus & mensuris definat. Incipiemus itaque primum uolumen.

Primus totius operis hic liber est, in quo omnia sanitatis tuendæ præcepta tradidimus, quemadmodum iam in præfatione dictum est. dicenturque iterum capita, ubi tantum hoc præbuerimus, quòd in primo, & secundo uolumine plurima ex Orisatio mutuati sumus. Non enim peculiarem uolumus constituere opinionem, sed ex omnibus utilitatem indipisci. In reliquis quinque libris paucissima tantum ex illius commentariis huc transtuli.

PAULI




I  
**PAVLI AEGINETAE**

**I IBER PRIMVS,**

**IOANNE GVINTERIO**

*Andernaco Medico Interprete.*



Quę grauidis superueniant, & quę uictus ra-  
tio eis conducatur. Cap. I.



VANDO QUIDEM inter ea quę  
gravidis superueniunt, hæc potissimū  
infestare solent, stomachi exundatio,  
continuae uomitiones, sputa crebra,  
oris uentriculi rosio, & cibi fastidium:  
non alienum fuit remedia quibus ab  
eis uindicentur, præscribere. Pro  
sunt itaque ob ambulationes, cibi nō  
nimium dulces, uina fulua, odora, ma-

xime quinquennia, & moderata potio. Hęc. n. omnia ne mu-  
lier stomachi exundationem experiatur uomatq; impediunt.

At medicamēti nomine, uincit polygoniū herbam aqua eli-  
xam bibere. item anethum & ponticam radicem, quę indigeti  
uocabulo rha nuncupatur, hæc tum ante, tum post cibum licet  
assumere Extrinsecus præcordia adiuuari debent cataplasma-  
re ex ænanthe balauftio, † cytisi smyrinijq; coma, & fœniculi  
semine, siue per se, siue quomocunq; uoles miscere, cum pal-  
mulis & uino ueteri. Aduersus stomachi rosiones confert, cali-  
dam aquam bibere, quiete in ambulare. præcordia contegere  
lana molli. At eas quę cibum fastidiunt, uarijs & ad uolupta-  
tem quæsitis cibis amyloq; sicco sollicitabis. magis autem hoc

PAVLI AEGIN.

a

obtuleris



obtruleris ijs quæ terram edere concupiscunt, ut in malacia, quod uicium Græcis Citta dicitur, accidere consuevit. id tertio à conceptu mense potissimum contrahitur. Nam tunc id quod in utero est, quicquid ratione alimenti ad ipsum fertur, tanquā imbecillius, nequit cōsumere, unde fit, ut quū uaria ex eo recrementa in stomacho grauidæ redundēt, uaria & nature aliena appetat, exempli gratia, carbones extinctos, cretam Cī molīā, aliāq; complura. Hanc n. ob causam appellationē huiusmodi affectus accepit, uel à picæ auis uarietate, uel q̄ eadē subinde hoc malo corripiatur. Iam labor, & longior peregrinatio etiam stomachum ad cibos excitat. Quæ uerò mulier citra labores agere consuevit, ea si uterū gerat, haud cōmode repentinās subibit moriones. Verūm acria quandoq; gustare, præferimq; sinapi cibū fastidienti non fuerit alienum. Cæterū eximios pedū tumores quos œdemata Græci dicūt, anthyllis quæ in aceto maduerit, foliaq; brassicæ in latū super deligata discutunt. Item Cimolia creta ex aceto illita, similiter alumen cū aceto proficit. Rectè etiā pedes malorū medicorū, quæ Citria alias dicuntur, in aqua decoctorum iure lauantur.

† Hic locus sic le gīt in ueteribus libris manuscriptis, *ἐξ ὧθεν δ' ἐοικάνθη, καὶ βαλαντίω, καὶ κυτίνω, καὶ σμυρνίῳ κόμῃ, καὶ μαράθρῳ σπέρματι, κοινῇ τε καὶ ὡς ἀνμίσι γενεῇ ἐδελης μετὰ φοινίκων καὶ οἷν παλαιῷ καταπλάσεις, &c.* Quæ lectio magis probatur quòd cytinus accōmodatior sit huic medicamento, q̄ cytilus.

### De Nutrire.

### Cap. II.

**D**ELIGI nutrix debet, nulli morbo obnoxia, ætate nec uetula nimium, nec adolescens, ita ut iunior quinque & uiginti annos compleuerit, grandior quinque & triginta non excedat: pectore sit amplo, mammis magnis, papillis neque conuenientibus neque auersis: reliquo corpore nec admodum obeso, nec nimium gracili. Præterea magnū est infanti commodū, si nutrix non multo antè pepererit, maiusq; si masculum. Vitanda ei sunt, admodum siccantia, falsa, acria, acerba, acida, amara, & ualidè calefacientia. Item odores tum fœdi, tum suaues præter modum, condimenta, aliāq; acria nocent. Ad hæc uenere nutrix abstineat, manus, humerosq; molendo texendoq; exerceat: puerum ulnis gestet, treis iam menses quatuorve natum.

De



*De lacte Nutricis.**Cap. II.*

**L**AVDATISSIMUM lac est, moderatū spissitudine, copia, colore, odore, & gustu. Cōmendatur & quod in unguem pollicis instillatum, eo inclinato ad lucem, neque subito neque tarde uidetur defluere. Iam uerò in hunc modum probari potest: infusio lacti in uas uitreum coaguli exiguum admiscetur, digitisq; agitur. in quo postquam concreuerit, inspicietur, num casei portio minor quàm seruū fuerit. hoc enim lac inutile est, contrarium huic, concoctu conumax: probatissimum quod utraque habet mediocria.

*Quomodo lac uitiatum corrigatur. Cap. IIII.*

**L**AC uitiatum hoc modo corrigi debet, si crassius fuerit, pituita uomitu elicietur, qui optime oxymelite epoto citatur: laboribus etiam cibum præcedentibus eadem ex tenuabitur. Tunc nimirum in cibo conducunt, origanum hyslopum, satureia, scandix & thymus, item raphani momentum, uetusq; salsamentū cum oxymelite. At si acrius tenuiusq; lac euaserit, multis quidem tunc laboribus nutricem leuare, sorbitionibus autem & carnibus suillis, sapæq; & uini dulcis potu, reficere conuenit. Si lac fuerit imminutum, sorbitionibus & pleniori modo sustentanda est, uinum dulce potui dabitur: pectus & mamillas perfricare oportet. Iisdem cucurbitula quoque defixa abundè præstitit. Medicamenta uerò etsi lacti generando proficere quidem aliquid sciam, non tamen frequenter ipsis uti præceperim, ut quæ uiolentius consumant. est autem fœniculi radix, & semen, ptisana incocta: item cytisi folia ex uino nigro aut ptisana: melanthum in passio & anethum, pastinacæ radix atq; semen, quæ calida prius irroratis admouenda sunt. Omni uerò lacte uitioso, siue crassum, siue acre fuerit & foetidum, prius emulcto, puer mamillis admouendus est. Lac autē acre nunquam ieiuno adhiberi debet, foetorem eius uinū odoratum & cibi dulces emendare possunt. Porro de caseato lacte tertio uolumine in capite de mamillis tractabimus.

*Educatio pueri.**Cap. V.*

**P**RIMUM infans recens natus melle nutrirī debet: mox lacte, idq; bis die, aut plurimum ter, cum autem promptē & alacriter puer assumit, ac spes est eum posse quod obla-



tum est concoquere, tunc iā & cibus solidior rectē datur qui nō ipsum repleat. At si fortē imprudentibus nobis puer repletus fuerit, somnulosior aut statim & torpidus magis euadat, uenter intumescat, inflaturq; & urinæ aquosiores reddantur, quæ repletionis notæ sunt, nihil exhibere oportet, donec cibus prius ingestos consumpserit. Abundē autem fuerit, duobus annis lacte puerum enutrire, inde ad cibos solidiores transgredi.

*De pustulis puero abortis quæ Exanthemata dicuntur. Cap. VI.*

**P**ustulis quæ quæ puero per cutē ueluti efflorescunt, Græci <sup>ἐξανθήματα</sup> nominant, primū sanē nullū facessere negotium oportet, ubi uerō probē ad summa eruperint, tunc iam curare tentabimus, balneis, quibus iniiciatur myrtum aut lentiscum, aut rosa. deinde rosaceo aut lentiscino utendum: ceratoq; cum cerussa, ad hæc nitro abstergere lenius expedit nam ualentiora non sustinebit. Optimum uerō est nutricem dulciori uictu uti. Laudatur autem maximē si puer etiam ipse neq; plenior, neque nimis tenui cibo alatur. At si uenter ipsius nō respondeat, tunc mel cibo infusum simul coquerere oportet: si ne sic quidem descenderit, terebinthinæ instar ciceris iniicies. Hamectata aluo, milium potissimum offerre conducit.

*De tussi & grauedine pueri. Cap. VII.*

**Q**uod si quandoq; tussicula aut grauedo puerū affligat, melitismi dicti adhiberi debent. Conuenit igitur puero liberaliore aqua calida loto caput ipsius melle copioso calido illinere, deinde digito linguam leniter premere: multum enim hoc pacto pituitæ uomitu egeret.

**P***De gingiuarum pruritu. Cap. VIII.*  
Ruriētibus gingiuis fomēto utēdū est, & liberali unctio-  
ne ex oleo discoctor in quo ceræ momentū eliquarū sit.

† In margine alterius exemplaris manuscripti hæc uerba leguntur, ὁ δ' ἀξιοῦς ἐστὶ περὶ αὐτῆς τῆς σέξ τῶν οὐλοῦν ἐπὶ φρυγμένη οικία ὁ δ' ὅτι. Id est, Odaxesmus est superuacanea quædam caro adnata gingiuis similis dentibus.

*De dentium ortu. Cap. IX.*

**D**entiunt septimo quidem mense pueri experiuntur autem tunc inflammationes gingiuarum, maxillarum, & tendinum, aliquando etiam conuulsiones Tunc igitur



tur puero nihil dudū, quod mādi postulet. digito aut in lauacro gingiue continenter contrectari, & gallinaceo adipe uel leporis cerebello emolliri debent. Vbi iam dentes prodierint, ceruix, caput, & maxillæ delicatis lanis puris contegentur, oleoque dulci & calido fouebuntur. idemq; meatibus auditorijs instillabitur. Cæterum plenius infantem tunc alere, & calida lauare oportet: & si alui profluuium experiatur, tentabimus eam epithematis quæ præcipuè sistunt, contrahere, inspergendo lanæ cuminum, aut anethum, aut apium.

Salutare est etiam semen rosarum admiscere, & summam† calidè desiccare. At si uenter nihil reddit, melle in glandis figuram coacto inferius leniter irritabitur, aut nepita detrita cum melle illinetur. Porro conuulsionibus puerorum optimè uidetur auxiliari heliotropium in aqua elixum, si puer in hac lauetur. confert & irino aut cyprino, & sycionio perungere, & uniuersum calefacere. Cum autē exortis dentibus digitos mordet uulneratq;, bene faciet radicem iridis derafam, nec admodum siccam, ore continere. Hoc remedium ulceribus quoque opitulatur: butyrumq; cum melle illitum adiuuat. Gingiuarū autem pruritus, ueteris salsamenti caro lenit.

† In ueteri codice hoc loco duplex est scriptura: prior enim καὶ ὁ δὲ θερμαίνει καὶ ξηραίνει Posterior καὶ θερμῶ ξηραίνει, calido desiccare.

*De oris ulceribus quæ Aphthæ dicuntur. Cap. X.*

**O**boritur puero etiam ulcus quod aphtha uocatur, nūc subalbidum, nunc subrubrum, alias ciustæ modo nigresces, quod omnium periculosissimū & lethale est. Remediū erit, iris cum melle, & sicca inspirata Item rosarum folia contusa, earumq; flos, crocum, myrrhæ exiguum, gallæ, lachryma thuris & cortex eiusdē, & simul & priuatim singula melle tincta: adhæc mulla, & mali punici dulcis succus ꝑhicit.

*Ad femorum intertrigines. Cap. XI.*

**F**emorum intertrigines myrtus arida iuncus angulosus, & rosæ inspersa iuuant.

*Ad aures humentes. Cap. XII.*

**A**urium humiditates lana ex alumine imposita, aut mullum, aut uinum uetus instillatum, aut crocum ex uino detritum, desiccant.



**S**Yriasis, est inflammatio partium circa cerebrū eiusq; mē-  
branas: concauum in ea fit sinciput, concaui iidem cum  
pallore oculi, accedit & corporis totius siccitas Succurrit  
huic malo uitellus oui sincipiti cum rosaceo, romenti modo  
impositus: sic tamen, ut continuè renouetur.

*Aliud ad Syriasm.*

† Oportet eidem loco imponere folia herbæ quam Græci  
heliotropion, latini solarem nuncupant, cucurbitæ ramenta,  
cucumeris, quem peponem dicunt, cutem carni adiacentem,  
aut hortensis solani succum cum rosaceo

† In ueteri codice hic locus sic legitur, κατὰ τὴν βρέγματος  
ἐπιτιθέναι χρὴ ἡλιότροπὸν καὶ ῥυκαλόμενον sed legendum su-  
spicamur ut est apud Aetiū ἡλιότροπὸν σκορπιούρε καλόμενον,  
Id est, heliotropij quod scorpiuron uel scorpionides dicitur,

*Ratio uictus infantium, atq; reliquarum deinceps  
ætatum, ad usq; declinantes. Cap. XIII.*

**P**OSTEAQUÀM lacte nutriri infantes desierint, liberiore eis  
modo & suo ingenio hilariter uiuere permittemus exer-  
citia autem & alimenta leuiora. Ab anno sexto & septi-  
mo, tum pueri, tum puellæ, literatoribus blandis humanisque  
tradentur, tales enim cum animi remissione & gratia docent.  
Animi autem relaxatio ad probam corporis educationē plu-  
rimum adfert momenti. Duodecimum annū egressi, ad gram-  
maticos iam & geometras mittendi sunt, corpusq; eorū exer-  
cere oportet. A quartodecimo usq; ad primum & uigesimum,  
mathematicis disciplinis & sapientiæ studio incumbent: exer-  
citijs pluribus propter corporis robur credentur, ut & animo  
& corpore laborantes, à libidinis impetu coerceantur: his etiā  
uinum circuncidendum est. Aetate florentibus educatio abso-  
luta tum animi, tum corporis congruit, eoq; exercitijs omni-  
bus, præsertim quibus quisq; assueuit, utendum cibo pleniore  
& ualenti Declinantibus autem remissa competit & animi &  
corporis educatio Exercitia enim qualiacūq; fuerint pro ho-  
rum ratione imminuere oportet: alimento detrahendum, ut  
quorum habitus iam frigescere incipiat,

De



*De frictione præparatoria, quæ parascenastice  
dicitur. Cap. XV.*

**A**Nte exercitationē corpus mediocriter calefacere oportet frictione linteis adhibita, deinde nudis manib<sup>9</sup> oleo intinctis perfricare, usq; dum bene incalescat emolliaturq; colore uiuido rubescat, & in tumorem attollatur.

*De exercitatione. Cap. XVI.*

**E**Xercitatio motus est uehemens: uehemētia autem finis est, respiratio crebra. Id uerò cōmodi præstat, quòd parteis instrumentarias morbis non opportunas efficit, & functionibus obeundis ualidas: præterea ut alimenta fortius attrahant, promptius immutent, & liberalius reficiantur, caloris beneficio quem illa excitauit. adde q̄ meatus expurget, recrementa, propter ualidam spiritus motionē, expellat. Quoniam igitur alimentorum per corpus membratim digestionem adiuuat, † non debet crudi incoctiq; siue cibi, siue humoris copia, in uentre, aut uasis cōtineri. periculum enim est, ne priusquam probè fuerint concocti, in uniuersas animantis particulas distrahantur. Vnde manifestò liquet exercitationē cibum præcedere oportere. Notæ autem quæ opportunitatem laboris subeundi ostendant, ex urinarum colore petuntur: erenim aquosa nondum coctum humorem qui ex uentre distributus est, significat: rufa autem & biliosa, iampridē elaboratum esse notat: mediocriter pallida, concoctionem modo factā indicat. Tunc igitur ad exercitia ueniendum est de positis prius recrementis: tū quæ in uesica, tū quæ in aluo cōtinētur.

† Veterum librorum alter habet hanc scripturam δὲ μήτε πλῆθος ὠμῶν καὶ ἀπέπτων, μήτε οἰτίων, μήτε περιττωμάτων, μήτε χυμῶν, &c. Id est non debet crudorum & incoctorum neque ciborum, neq; excrementorum, neq; humorum copia, &c. Quam lectionem meliorem esse facile quiuis ex secundo libro περὶ ὑγιεινῶν intelligere potest.

*De exercitationem generibus. Cap. XVII.*

**O**Mnis exercitationis commune est, q̄ animali ex ipso caloris augmentum excitat. Singulæ autem exercitationes proprium habēt officium, ualida sanè, hoc est, uiolenta musculis & neruis robur præstaret, cuius generis est



quum quis fodit, & maximo onere sublato, aut eodem loco manet, aut paululum procedit: item acchuis ambulatio huius quoque generis existit: praeterea per funem manibus apprehensum scandere, aliaque plurima consimilia. Celeris autem exercitatio citra robur uiolentiamque peragitur: id genus sunt, cursus umbratilis, armorum meditatio, aut quum duo summis manibus concertant, tum quae per corycum & paruam pilam fit exercitatio. Composita autem ex ualida & celeri, quando quas ualidas diximus ijs omnibus ut uehementibus uti licet, motus modo celeritatem adijcias. Praeterea per alias exercitationes lumbi magis quam brachia cruraue laborant: per alias spinatora, aut thorax tantum, aut pulmo. Exerceri uero oportet quousque corpus in tumorem attollatur & rubescat, motus prompte aequabiliter & continue aetat. Inter haec autem sudorem cum calido uapore mixtum cernes Pausandum uero ab exercitatione tunc primum est, quum aliquod horum fuerit immutatum, nempe si contactior corporis moles uidebitur, ilico desistendum est: similiter quum coloris gratia deperit, cessare oportet Quinetiam quum motus remittere quippiam cernitur, protinus desinere conueniet. Itidem si in sudore ulla qualitatis eius, aut quantitatatis mutatio accidat: quum enim is aut minor, aut frigidior factus intelligitur, tunc desistendum scias oleo mox corpori superfuso, apothera pia uti deinceps oportebit, inde frictionem apotherapeuticam adhibere, ut pedotribus facitare solent.

*De generibus frictionum.*

*Cap. XVIII.*

**I**nter frictiones, dura ligare corpus potest: mollis, soluere: quapropter quae supra modum resoluta sunt, duriter perfricare oportet: quae autem astricta, molliter. At si mediocri quis corpore praeditus sit, neque molliter, neque duriter fricandum id esse constat, sed quatenus licet uterque excessus uitari debet. Siquidem multa & dura frictio, corporis molem deprimat: modica uero & mollis, e contrario implet. Porro tres quantitatatis frictionum differentias, si tribus quae a qualitate ducuntur, iunxeris, nouem coniugationes effeceris, ut subiectum est. Etenim una iuxta quantitatem, nempe multa, si tribus quae a qualitate sumuntur, durae dico, molli, & mediocri, adiungatur, treis secundum duritiam differentias efficit: modica rursus si eisdem tribus addatur,



datur,treis alias procreat. At mediocris qualitate eisdē tribus iuncta,alias treis progignit,ut in formula subiecta uidere licet.

## Q V A N T I T A S

Multa }

Multa }

Multa }

Pauca }

Pauca }

Pauca }

Mediocris }

Mediocris }

Mediocris }

&amp;

&amp;

&amp;

## Q V A L I T A S

{ Dura

{ Mollis

{ Mediocris

{ Dura

{ Mollis

{ Mediocris

{ Dura

{ Mollis

{ Mediocris

*De uocis exercitatione.**Cap. XIX.*

**I**Nter uocis exercitationes suauiſ leniſq; modulatio nihil ad ſanitatē tuendā proficit: grauioris autē uocis ſonus utiliſ habetur, eoq; exercere eum oportet. Ita enim aer copioſiſſimus inſpiratu in corpus attractuſ, thoracē, uentrē, & meatuſ totiuſ corporiſ diducit, dilatat, aperitq;. Quapropter ipſa lectione humiditateſ quæ redundant, excernit. fortius igitur legentibuſ, magiſ & per ſudo: eſ: leniſ autem, per latentem totiuſ corporiſ perſpiratum. Accidit enim propter extenuationē multa recrementa, nempe ſputa, mucos & pituitam, per ſecreatum excerni cōſumiq;. Iſ uerò qui propter frigiditatem exalſieri deſiderant, quodnā aliud præſentiuſ remedium eſſe potuerit, quā functio quæ reſpiratione peragitur? Conſiliū igitur eſt, hoſ frequēter legere, ut toto corpore relaxato, ſuſa- que carne, arteriā & alioſ ſpirituſ trāſituſ ſtudioſē rarefacienteſ, per grauioreſ uocis actioneſ modulētur. Vti autē oportet uocis officio neq; temere, neq; incoſideratē: ſed quā nec uicioſiſ corruptiſq; humoribuſ repleti ſunt, neq; magnæ & euidēteſ ſtomachi cruditateſ apparēt, ad uocis exercitationē accedēdū eſt, ne corrupti uaporeſ per corpus largiuſ diſtribuanē.

*De laſſitudinibuſ ob exercitationem.**Cap. XX.*

**V**Lceroſa laſſitudo ab excrementorum tenuium ſimul & acriuſ copia contrahitur. Tenſoria nullum quidem excrementū, cuiuſ ratio aliqua ſit habenda, in corpore cōtineri indicat, ſed in muſculiſ neruiſ quæ affectuſ qdā quo



quo tendi videntur, residet. Ea uero quæ inflammationis speciẽ præ se fert, in qua nimirum ceu contusas, aut inflammatione obsessas partes sentimus, tunc solet incidere, quum musculi impendio excelsi, aliquid ex circumfusis sibi recrementis attraxerunt. Est & alia quædã præter has quarta affectio, quæ oritur, quum musculi supra quàm par est, siccantur, ita ut uestibus exutis squalens corpus contractumq; appareat, atq; ad motus pigrum. Remedium ulcerosæ lassitudinis est, si quæ redundât, euapores frictione multa molliq; cum oleo copiosiore, quod omnis astrictionis sit expers. Altera lassitudo in qua tẽtio sentitur, hoc pro curatione desiderat, ut relaxetur. sanè relaxatur quod distentum est, pauca & molli frictione, eaq; ex oleo dulciatq; egelido : item intermissione omnino, quiete, balneis tẽperatis atq; in calida, mora longiori : adeò si bis tẽrue ipsum laues, plus profeceris. Tertiæ lassitudinis inflammatoriæ curationis consilium, ad tria dirigitur, nempe superuacanei euacuationem, extenti remissionem & inflammationis refrigerium : itaq; & oleum copiosum tepidumq;, & frictiones molliissimæ, & lenta in temperatis aquis mora, eiusmodi lassitudines persanant. pari modo & multa quies, unctiones assiduæ. Quarta affectio nihil sanè à priori consuetudine immutari postulat, nisi calidiorem aquam quæ sensim contrahat : altero die, apothepiæ exercitationem. protinus autem in lauacra frigidi solij exilient, † omnes autem qui lassitudinibus laborant, cibo boni succi refici debent.

† Vetus codex hanc scripturam habet, ἐν θυς δ' ἐκβάιντες οὐκ ἐκκοπόμενοι δέονται τροφῆς. Id est simul atq; balneo excesserint oleo indigent. Quam lectionem Copus sequitur, sed scriptura quæ Orosius restituit ἐν χύμῳ δ' ἀπαντες δι' ἐκκοπόμενοι δέονται τροφῆς. melior est.

*De cute astricta.*

*Cap. XXI.*

**A**STRICATIO, quam Græci stegnosin uocant, accidit, aut obstruētis, aut densatis meatibus. obstruētio quidem ex copiosis crassiq; humoris crudis concoctionemq; non expertis, oritur : densatio autem, ab ijs quæ refrigerant, aut astringunt, aut desiccant. Ac deprehenditur sanè iam dictus affectus, statim ubi se exuerint, ex colore albo, & cutis tum durtie, tum densitate : tum q; in ipsa exercitatione



citatione uix incalescant. Succurrit huic affectioni calefactio, quæ ualentiore exercitio, balneisq; , calidioribus petenda est. Mora uerò in frigido solio diuturna non sit. imò nec ipsa aqua nimium sit frigida. Vbi uesteis sunt induturi, ungentur aliquo quod mediocriter calfaciat oleo, dulci ac tenui. Cutis autem densitatem abundè etiam sanat oleum anethinum, præsertim si uiride fuerit anethum, oleumq; ex populo nigra confectum.

*De spontaneis lassitudinibus. Cap. XXII.*

**Q**UONIAM ulcerosa lassitudo ex acrium recrementorum uitio contrahitur, siquidem paucus omnino uitiosus humor fuerit, apothepiæ exercitatio suffecerit: si copiosior, & altius in corpore redundarit, eiusmodi malo obnoxijis, nec exercitationem, nec ullum omnino motum iniungemus, sed quiete, somnoq; recreatos abstinere cibo totū diē cogemus, deinde uesperis pinguius unctis, temperatoq; balneo lautis, cibū boni succi & sorbilem modicum dabimus, non tamen à uino eos arcetes. hoc enim semicrudos humores, si aliquid aliud, cōcoquit. Si ergo his peractis symptoma conquieuerit, ad consueta munia paulatim reducendi sunt: sin in posterum etiā diem remaneat, de ualentiore iam remedio considerandū est. Si enim uires constent, duorum alrerum, aut sanguis mittendus est, aut purgatio exhibenda, sed ita ut discernamus, utrum magis expediat. Quòd si uires inualidæ sint, sanguinem dimittere haud quaquam oportet, sed deiectionem mediocre tentare. At si crudi humores omnino fuerint, neq; sanguinis detractio, neq; purgatio, neq; exercitium ex usu est, imò ne mouere quidem in totum, aut lauare expedit. Tales igitur in quiete omni seruandi sunt, cibis, potionibusq; , & medicamentis, quæ extenuent, incidantq; sine manifesto calore, reficiendi. Pro cibo igitur oxymel, modicum ptisanæ, nonnunquam, & mulsæ exhibebitur. Quoniam uerò præcordia eiusmodi omnibus turgida, inflataq; sunt, ac faciliè quicquid assumpserint in flatus conuertitur, satius fuerit cum cibo piperis aliquid offerre. Vtilius autem erit, & medicamento quod diospolites dicitur, uti: item diatrion pepereon, simplici: utilissimumq; ipsis est oxymel. Potui sumēt apomel, præsertim ubi coacuit, uinaq; leuiter aciescentia. cibi erūt qui siue calore attenuent, cuiusmodi est capparidis si ex oxymelite, aut



aut oxelæo assumatur. Porro tensionis lassitudo quæ sine exercitijs oboritur, copiam innuit solidas corporis parteis distendentem. Constat autem omnibus, optimum esse præsidium quum sanguinis copia subest, aut uenam incidere, aut malleolos scarificatu sauciare. Quæ uerò inflammationem repræsentat lassitudo spontanea, ea ne paucis quidem horis, nedum duobus, tribusue diebus eodem tenore consistit, sed protinus febrē accendit uehementissimam, nisi sanguinis detractioe malo prius occureris. Præstiterit autem, si fieri queat, bis eodem die sanguinem detrahare: ac primum quidem ita mittere conuenit, ne animi defectu homo periclitetur: secundo autem, ne defectio quidem ipsa formidari debet. At qui sic affecti sanguinem non dimiserint, hi ut periculum euadant seruenturque, bonæ fortunæ beneficio opus habent.

*Viētus senum ratio.*

*Cap. XXIII.*

**S**enectus quum sicca, frigidaq; existat, per calefacientia, humectantiaq; corrigi debet. Frictio itaq; adhibenda est, citra lassitudinem: imbecilliores ter die cibo refici debent: ad tertiam quidem horam, panis exiguo cum melle attico: septima uerò hora ubi frictionum, exercitationesq; ipsis congruas, & balneum fuerint experti, primum sanè quæ aluū emolliunt, assument, deinde pisces, aut auiculas, hinc in cœna ea quæ optimi succi sunt, & ægrè corrumpuntur. Non prohibeo item uinis ex melle præparatis uti præcipuè quibus de calculo in renibus creato, aut etiam podagra suspitio est, quando petroselinū uino rectè iniicitur. At si quādo pituita in uentriculo contracta, necessitas est aliqua quæ eam incidant, deligere, protinus ad humectantem uictus rationem, digrediendū est: ac fici maturæ ante alium cibum ipsis exhibentur: per hyemem uerò caricæ, si nullum in dextra præcordiorū parte symptoma accidere sentiant: At quia serosa pituitosaq; in senili corpore excrementa colliguntur, urinam quotidie promouere consilium est, & aluum subducere, præsertim oleo quod ante cibum absorbeant. Clarum uerò est, omnia olera ante cibū ex oleo, garoq; sumi oportere: item oliuas muria seruatas, quas halmadas dicunt, & damascena. Quod si uenter magis astrictus nihil deiecerit, & mercurialis herba, & cnicū abundè sunt. benefacit etiam resina terebinthina, interim unius auellanae



nae, interim duarum triumve magnitudine sumpta. Iam oleū quibus aluus contracta est, per clysterē utilissimè infunditur.

**E** De rugoso corpore. Cap. XXIIII.

Rugat corpus erui farina, uiti albæ mista.

*Aliud sinegma quo continue corpus abstergitur.*

**F** I C I pingues simul cum bryonia contusæ, farina erui, combusta sepiæ testa cum mellis momento affuso.

*Quomodo corpus suauiter oleat.* Cap. XXV.

**V** T corpus bene oleat, eidem unctiōi cupressi comam aridam contusam admisceto, aut piceæ cortice. Meminisse uerò debes, ut manè postquam corpus uestimentis menierint, pauxillum calix aut sabinæ herbæ degustent.

*Quomodo habitus recalescat.* Cap. XXVI.

**V** Vandoquidē uerò habitui senū succurrere oportet, utatur dū lauat, puluere calefacienti, aquæ indito qui constat, nepita, sampsocho, hyssopo, baccis lauri, rore marino, lapide pyrite, sale, fæce combusta, nitro, pumice, pro cuiusq; ratione: item sinapis, herbæ pediculariæ, & cocci gnidi, momento. à balneo, acopo quod calefaciat utatur, uinū fuluū uetus potest, sumatq; propoma ex mulso pipere, ruta, & consimilibus

*Quomodo color malus emendetur.* Cap. XXVII.

**C** Orpus declaratū pallidū uve uita læta & cibus gratus emendat, miscetur autē huic radícula, porrum, & uiride cicer. Iam mali punici dulcis succus forbitionis modo sumptus, bonū colorē efficit. Proficit et oleū cui bryoniæ radix diutius sit incocta. idē & corporis cutem intendit, erugatq;. Ijs autem, qui corpori nitorem conciliant miscere cōuenit pastillos, qui fiunt ex cuiusdā abstergentis farina, bulbo, narcisso, & bryoniæ radice. bene colorant, si copia datur, tū radix, tum semen amaræ amygdalæ in aqua elixa, qua pro lauacro utitur.

*Ad liuores.*

Cap. XXVIII.

**L** Iuescere senum corpora prohibemus, si cutē ipsorū crassam, & iniurijs haud faciliè opportunam, habitumq; calidiorem reddiderimus. Ut autem celerius id assequamur, sale in balneis, super partem quæ nigruerit uti conueniet eandemq; fomentis per spongas decocto raphani aut absinthij immerfas, adiuuare.

Quomodo



*Quomodo dentes ab iniuria asserantur. Cap. XXIX.*

**D**entes ab interitu uindicabis, si primum caueas ne cibi quos ingesseris corruptionem experiantur, adhuc ne continuè uomas, deinde escas dentibus incommodas, nempe ficus aridas, mel coctum quòd durum nimis sit, palmulas uix fragiles, adhuc omnia glutinosa, quæq; adeò frangi contumacia sunt, ut denteis commoueant insuper uitare oportet, quæ denteis stupefaciunt, perfrigida cuncta & putrida Conducit itidem secundum cibum denteis purgare.

*Quomodo grauis auditus corrigatur. Cap. XXX.*

**A** grauem auditum corrigendum, uincit primum meatus per quos audiendi facultas est, sordibus expurgare: per interualla autem linteum dropaci intinctū ipsis demittere, atq; prius expressum retrahere. Summe enim meatus purgat, & simul auditum auribus reddit. Deinde aliquo erui instar inserto, meatum ad diem obturbabis: postea ipso exempto quotidie oleo amygdalino, aut nardino, aut chamæmelino, aut pingui anserino, cum exiguo fellis bubuli perunges. Rursus diebus aliquot interpositis, sinapi, & ficis contritis factum penicillum ad horas duas imponis, inde hoc exempto infundis oleum, quod in asphodeli radice excauata efferbuerit.

*De oculorum caligine.**Cap. XXXI.*

**N**E caligine oculi corripiantur, quū in aquam frigidā temergis, illos diu in eadem apertos esse cōueniet. hinc enim robur uisui adijcitur, Lēctione uerò nō te fatigabis, uino crasso & dulci abstinebis. similiter cibus qui in superiore uētre diu remorantur, cōcoctu difficiles, & qui humores lentos, crassosq; generant: itē cauebis erucā, porrū, & omnia quorum acrimonia sursum effertur. Vitare etiā oportet supinum incubitum diuturnū, frigus uentos cōtra oculos flantes, fumū, & puluerem. Iam uerò aquā oculis instillare quotidie ad mensē totum, iuuat. quæ in hunc modū præparatur, fœniculum uiride fictili uasi extrinsecus picato, cum aqua cœlesti demittitur, deinde exempto fœniculo quod reliquum est repones.

*De repletionē.**Cap. XXXII.*

**P**Lurimum noxæ ciborum repletio conciliat, quamuis n. probè quippiam uenter concoquat, uenæ tamen nimium repletæ, laborant, distenduntur, rumpuntur, obstruuntur,



struuntur, flatu implentur, & ualde grauantur deterrimum autem habetur in morbis, uenas esse repletas. at uentris repletio si urget, interim uomitu quod redundat, interim per aluum excernitur: in totum inualidior hæc, ea est quæ uenis accidit, non tamen & ipsa admitti debet, sed si quis impendio plura assumpserit, statim eum uomere oportet. periculum etenim est, ne obita concoctione uenæ repleantur: magisque si intemperantius cibus continuè assumptis, nullam deinde uacuationem experiatur, uomitu, igitur sollicitari debet prius quàm cibi corrumpantur. At si aliquid eum impediat, aluus soluta frequenter succurrit. sin minus illa fluxerit, certè diutius dormire & potui aquam calidam frequenter sumere, consiliū est. Vbi iam abundè concòxerit, præsertim aluo largiter fusa, lauacris fomenti sique adiuuare, salsamenti parum ac potionem dilutam exhibere oportet. At si neq; descenderit aluus, neq; celeriter obita est concoctio, sed corpus uniuersum graue, ad motus pigrū, & sommolentum fuerit, mens præter rationem quodāmodo torpescat, uenarum repletionem esse cognoscas. Qui uerò præter hæc lassitudine premuntur, eos conquiescere dum uentriculus ingesta concoquat, deinde laboribus inanire expedit.

*De ebrietate.**Cap. XXXIII.*

**E** brietatem uomitus repentè obortus discutit: item aqua & mulsam liberalius superbibere uincit, atque sic uomere, usque dum plurima reiecerint, ac stomachi uellicatus obtundatur. à uomitu solum ingressi copiosè unguentur; reliquo tempore conquiescent, & accuratè & cooperti diutissime dormient, quousque temulentia discutiatur.

*Quibus cibi corrumpuntur.**Cap. XXXIII.*

**C** ibis in uentre uiciatis, si quæ corrupta sunt deiiciuntur, maximum ad sanitatem est compendium: sin minus, ijs quæ leniter subducunt aluus irritanda est. Huiusmodi autem malo affectis uomitus ante cibum, uini dulcis potu excitatus, conducit. Nullum prætereà cibum uel nidorosum, uel graueolentem, uel in totum corruptioni opportunum assumere ipsos consuluerim, sed ea quæ boni succi sunt deligere. Iam per interualla temporis mediocria alium subducere, ex ijs quæ mediocriter purgant, ita affectis confert.

De



**V**eneris hæc sunt commodi, repletos inanit, corpus agile præstat, in augmentum promouet, & uirile magis efficit. Quantum uerò ad animum spectat, impeditam intelligentiæ uim dissoluit, iratos mitigat, eoque melancholicis coitus, si quid aliud, remedium est accommodatissimum: item alio modo insanientibus integritatem sensuum restituit. Iam ex pituita morbis uenus est utilissima: cæterum alij etiã cibum respuentes, eius cupiditatem hinc recuperant: alij, continuis per somnum ueneris imaginibus liberati sunt. Porro natura ueneri idonea est calida, & humida, ut quæ reliquis salacior sit. Minimè uerò coitum excitat uictus qui siccet refrigeratque, ætas senilis, tempus autumnale. Quapropter uictus ratio humida calidaque adhiberi debet, mediocritas, & laborum, & ciborum. Quemadmodum uerò moderati labores, ita etiã concubitus ipse mediocris conuenit. Nam & ad opus incitat, & facilitatem quandam consuetudini præbet. Requirit autem libido, si quid aliud, alimenti exuberantiam, eoque cibi potissimum ualentis materiæ utiles sunt: ex piscibus autem polypodes, ut qui alioquin etiam ad uenerem incitare credantur his adduntur, molli cute præditi: ex oleribus autem, orminum, erysimum, eruca, & rapum, quæ in medicamentorum uicem dantur: ex leguminibus prosunt, faba, cicer, ochri, & dolichis, & pisæ, quæ præterquam quòd largiter corpus alunt, flatibus etiam replent. Rura igitur quia flatus discutit aboletque, ideo etiam ueneris ardorem obtundit. magnificè autem probouas, ut quæ humectent, & spiritu sanguinem repleant, qui in uenerem proritat. Quum igitur concubiturus es, nimiam satietatem, cruditatem, lassitudinem, cauebis: item ne uomitus, aut purgatio præcesserit. similiter repentinum alui profluuium: inueteratum enim fluorem uenus desiccet. At uehementis coeundi cupiditates non laudo, sed potius resistere eis consulo, præsertim ij quos morbus aliquis infestat. Saluberrimum igitur post exercitationem, balneum, moderatumque cibum, uenerem exercere ita enim uiribus conducit, & frigus obortum minus efficitur. Tempus autem concumbendi opportunum est, secundum cibum, ut supra dixi, antequàm somnus inuadat, lassitudo siquidem ex coitu contracta, obdormienti statim remittitur. Id uerò tempus etiam liberis procre-



procreandis accommodum est, tum alijs de causis, tum quòd mulier consopita, genituram facilius retinet,

† Hic locus sic legitur in antiquis codicibus, καὶ πνεύματος ἡμιπλάσι τὸ σῶμα, δὲ ἐξ ὁρμῆς πρὸς ἀφροδίσια. Idest, corpus flatu implent, qui ad libidinem excitat. Qui sensus simplicior est.

*Ad eos qui uenerē exercere nequeunt. Cap. XXXVI.*

**N**aturalia cōtinuè pingui ungentur, cui adiectum sit narcissi radice, aut cocci gnidij, aut pyrethri, aut herbæ pediculariæ, aut seminis urticæ, aut uiticis. Præbire autem ante uenerē oportet piper, aut satyrion aut erucam, aut cnicum, aut simul omnia. esse confert ante cibum bulbos tostos, rubentes ac exiguos, cum sale & oleo, aut scillæ marcidæ modicum: item compositis aduersus hoc uitiū inscriptis remedijs utendū est: item subinde lasciua legere competit.

*De ijs qui immodice coierint. Cap. XXXVII.*

**Q**uoniam ex immoderata uenere corpus ratius, frigidius, siccus, & imbecillius euadit, ratio est admouere nimirū quæ dēsent, calefaciant, humectēt, cōfirment. Que. Qui igitur immodico cōcubitu exhausti sunt, uestimētis calidis operti cōquiescēt, sōnoq; satis indulgebūt, donec corporis cōtentio subsidat, & illi ab imbecillitate sese recollerint.

*Si semen genitale redundet. Cap. XXXVIII.*

**N**onnulli semine copioso & calido collecto, in uenerem proruunt: quod cū in coitu egresserint, corpus inualidum & stomachum resolutum obtinent, extenuantur, siccanturq; ob quā causam si rursus à cōcubitu abstinerint, capite grauantur, & anxij fiunt, deinde statim ueneris insomnia experti eodē modo afficiunt. Nihil igitur his quod semini augendo efficax est, sed potius & cibi & medicamēta quæ id corrumpāt, offerri debēt, & balneo lūbos oleo rosaceo, melino, & omphacino perungere oportet. Satius autē est oleū cera addita, ne defluat, crassius efficere, miscereq; succū aliquē refrigerantē, nempe semperuiui, solani, cotyledonis & psillij: ac horū quidem per estatē, reliquis autē anni tēporibus, tum aliorum, tum lactucæ succū: item lini semē quod aqua fuerit incoctum. nam hoc quoque refrigerantem succum exhibet. Ad hæc la-

PAULI ÆGIN.

b main



mina plumbea lumbis subiecta, ueneris insomnia cohibet. Iam herbae refrigerante ui praedita si cum ruta substernantur, & teneris uiticis surculis, idem praestant. Praeterea semen uiticis & ruta in cibo sumptum. Cauendum uero est, ne lumbis uehementer refrigeratis, tenes offendantur.

*Si perfrictio nocuit.*

*Cap. XXXIX.*

**Q**VI frigori nimio patuerunt, locis calidioribus decumbent: cyprino aut irino peruncti. postea ubi modice incaluerint, piper, myrrha cum uino dulci odorato & ueteri assumet, aut liquor cyreniacum cum uino uel aceto, aut pyrethrum castoriumue ex aceto: cibo aut calidiore recreandi sunt.

*Si insolatus adussit.*

*Cap. XL.*

**S**I qui uero exusti in sole sunt, his locis aeri expositis decumbendum est, perfundendaque frigida, facies, manus, & crura: si siti conficiuntur, frigidam aquam qui assuerunt, bibent. atque haec paulatim, & non una uice ac subito facere expedit. cibum assument modicum, qui facile in membra distribuatur, humidiorum potius quam solidiorum.

† Vetus scriptura hoc loco habet, σκληροτέρων, id est, duriorum, ἀντιτὸ παχυτέρων καὶ στερεωτέρων, quibus nominibus medici cibum solidiorem significant. uix unquam inuenitur σιτωδέτερον in hac significatione.

*De pituita in superiore uentriculo redunda. Ca. XLI.*

† **Q**UOD si in aliquem interdum incidas fastidientem, qui quidem cibos ualentis materiae auersetur, & si assumere compellas nausea afficiatur, sola uero acrimia appetat, & ipsis quidem oblectetur, sed uentris inflationem experietur, nauseetque ac paululum ructibus solis leuetur, interim uero & ipsi cibi quos assumpsit, praesertim in acorem conuersi, uirientur, omnino intelligendum tibi uenit summam curationis existere, ut pituitam a uentriculo abstergas. Ego quandoque ita affectum noui, qui raphanis ex oxymelite sumptis, incredibili cassioris pituitae copia uomitu egesta, integre statim sanitati restitutus sit.

† Hic locus sic descriptus est in ueteribus libris. εἴ τιμι περιτετύχηκας ποτὲ τὰς μὲν τῆς τροφίμων σιτίων προσφορὰς ἀποστροφόμενος, ἀποσίτω καὶ μένοντι. Id est, Quod si aliquem incideris, qui cibos ualentis materiae auersetur, atque non alatur. ἀπόσιτος enim uidetur positum ἀντὶ τῆς ἀτροπῆς,

Quomodo



*Quomodo facile quis uomat. Cap. XLII.*

**Q**Voniam ualidè uomentibus multa solent absurda su-  
peruenire, cōmodum fuerit quomodo quis facilè uo-  
mat, exponere. Etenim uomitus pituitam inanit, ca-  
put leuat, & ne qui auidius nonnunquàm cibū ingesserint cru-  
ditate laborent, item ne qui uinum liberalius sumpserint, of-  
fendantur, prohibet. At quæ offerentur, neq; acerba, neq; sic-  
ca erunt, sed partim dulciora humidioraq; partim acriora Cō-  
mendatur ad hæc raphanus, eruca, falfamentum uetus, origa-  
num uiride, cepæ momentum & porri. Promouet uomitus  
etiam ex leguminibus ptisana cui mellis aliquid additum sit,  
ferculum ex fabis frefis confectum, magisq; carnes ipsarum. ue-  
rū non solum cremores ipsarum, sed ipsas quoque integras  
deglutire oportet, eoq; uomiturus non diu mandendis ipsis  
immorabitur, omnia uerò per coctionē mollia flaccidaq; erūt.  
Iam constat, uina dulciora deligi oportere, ut quæ in stoma-  
cho magis supernatent, atq; eam portionem tepidiorem assu-  
mi. Cōfert etiā amygdalas melli intinctas comedere, ac placen-  
tas gustare: item peponis & cucumeris semen maceratū detri-  
tūq; cum melle assumere, radicemq; cucumeris contritā ex  
melle. At qui ualentioribus uti uolunt, narcissi bulbo aquæ in-  
cocto, uinū temperant. Mouet autem uomitiones iritium quo-  
que unguentum, si digitis eo perunctis, irrites. Porro uomē-  
tis interest, ne cesset uel intermitrat, usque dum omnia eiece-  
rit: à uomitu os colluat, faciemq; posca aut aqua abstergat.  
id nanque dentibus conducit, & caput releuat.

*Quæ sanis aluum subducant, & quæ urinam  
moueant. Cap. XLIII.*

**V**Eterum nonnullis satis esse ad secundam ualetudinem  
tuendam uisum est, si aluus quotidie & urina pro inge-  
storum tum cibi, tum potus copia, sine uitio & abunde  
responderet. ac quum uacuatio iuxta assumptorum propor-  
tionem accidebat, commendabant: sin minus, promoue-  
bant, urinam quidem scandice, apio, asparago, petroseli-  
no, aniso, nepita, origano, absinthio, graminis carduique  
radice, cytiso, adiantho, omnibus in aqua elixis, quorum  
b 2 decoctum



decoctum cum uino potui exhibebant. hæc enim per urinam sanguinem repurgant, unde non parum utilitatis percipitur. Aluum adiuuabant terebinthina: ex qua oliuæ magnitudinē dormituris deglutiendā offerebant. At quum magis subducere eam cogitamus, rheu momentū admiscebimus. Accōmodata deiectioni sunt, oua sorbilia: ex oleribus, beta, malua, itē cochlearū ius, atq; hæc fortè abundè erunt. Efficacior est herba mercurialis, in aqua cum sale elixa comestaque, eiusq; decoctū potuit datum similiter folia sambuci. idem præstat polypodij radix duarū drachmarum pondere, salsamēto inspersa, aut etiā in ptisana sorpta, adhæc serum lactis cum sale aut melle, ad treis heminas quatuorve assumptum: ueteris quoq; gallinacei ius, tum per se, tum cum cnici drachmis duabus. nonnunquam & aloë trium cicerum instar secundū cœnam rectè assumitur. Præstantissimum uerò est epithymū in uino post mediocrem cœnam potum: qui uehementius uacuare desideret, manè epithymi drachmam ex oxymelite, uerno tempore ebibat.

*De clysteribus.*

*Cap. XLIIII.*

**I**N quibus uenter agrè descendit, & stomachus imbecillis medicamenta ad subducendum efficacia non sustinet, clysteribus utendum est, quum pituita quidem in intestino residet, ijs quæ fiunt decocto caricarum, betæ, nitri, syluestris cucumeris radices, melle, oleo chamæmelino, aut anethino: quum siccitas magis urget, ijs quæ constant, althæa, fœnu græco, chamæmelis, oleo, mellis exiguo interim etiam oleum per se dimidiæ heminæ mensura iniectum, abunde proficit. non tamen continuè id faciendum est, ne natura his irritata, spontaneæ excretionis obliuiscatur.

*De glandibus.*

*Cap. XLV.*

**V**Timur etiam glandibus subinde stercoreis excernendi gratia, & in quibus id quod per clysterem inditum est, non egeritur. Finguntur autem glandes ex sale tosto, melle, & nitro: item thymus discocto melli additur. Fiunt etiam ex resina terebinthina, & nitro: interdum & cocco gni-dio modico. Sed quia uellicatus mouet, parteis ipsas oleo delinere conuenit præterea pyrethrum aut piper admiscetur, conuenitque resolutionem expertis, & ijs qui ex perfrictione inflatioes contraxerunt. Insuper centaurium pici & ce-  
ræ



ra commiscetur, ac naturalium relaxationibus aptum est praesidium. Infantibus autem etiam salis grumus ano imponitur. Fit quoque glans ex ficu cum nitro.

*De ijs quae per os & nares caput euacuant quaeque eisdem partibus delinuntur. Cap. XLVI.*

**H**VMores in capite residentes per sputa uacuamus, quod si modicè facere uoluerimus, piper cum mastiche temperabimus: si largius uacuare libet, pyrethrum aut herbam pediculariam mandi praecipiemus. item anemonæ omnis radix mansa pituitam prouocat, capparidisque radicis cortex. Itaque huiusmodi remedia serosum excrementum uacuât, crassam uerò lentamque pituitam, sinapi cum oxymelite gargarizatum, aut sapa in qua origanum, aut hyssopum sit incoctum. Ego autem saram cum sinapi, & oxymelite misceo. At si cerebrum mucro purgari desiderat, acris remedijs, quorum nonnulla etiam sternutamenta mouent, euocabimus. Itaque anagallidis utriusque & anemonæ cuiusuis, & betæ, succus per nareis purgat: item cucumeris syluestris foliorum succus naribus ipse & per se & cum betarum decocto succoque infunditur. sternutamentum uerò crudis humoribus qui in thorace, pulmone, & capite continentur, non expedit. Quod autem ori illinetur tale est: sapo cum betæ succo palati regionibus & columellæ delitus bene facit, idem etiam per nareis purgat, melanthio uerò quod facile paratur, ad narium illitionem subinde usus sum, interim aceto acri pridie macerans, deinde postridie cum aceto rursus laeuigans infundensque naribus. Nonnunquam oleo ueteri idem melanthium deditum, similiter illeui. Sic igitur & Archigenes eo in narium obstructione usus est, priori autem, ex aceto, Crito in morbo regio uti solebat.

*Quae mensis ducunt. Cap. XLVII.*

**Q**Uaecumque urinæ ciendæ sunt, eadem omnia mensis ducunt, nempe brassicæ radicis decoctum potum, persicæ radix, ruta, chrysanthemon, dictamnū, & erucæ semen: item quæ ori uulua subiiciuntur, mensis commouent, ut ruta cum melle trita, aut porri succus, aut allium tritū subiectū, aut myrrha cum uino laeuigata, aut leporis coagulū.

b 3 Quæ



*Quæ sudorem mouent. Cap. XLIII.*

**S**udorem eliciunt chamæmelum aridum tritumq; , oleo inspersum, si summæ cuti ualidè infricetur: feseli, pyrethrū, cachry, anysum, similiter oleo inspersa. item nitrum tostum non nimis tenue, cum oleo efficax est: adhæc salis flos oleo temperatus, & liquor cyrenaicus aqua dilutus corpori infricatus epotusq; ciceris magnitudine: Pari modo nepita & pota cum mulsâ, & extrinsecus cum oleo infricata proficit.

*De aere. Cap. XLIX.*

**L**audatissimus aer est, qui exactè purus: is autem nimis erit qui non ex stagnorum, aut paludum uapore turbidus exurgit, neq; ex profundo quodam specu pestilentem aurâ exhalante prouenit: ita qui ex cloaca quadam magnâ ciuitatē expurgante turbidus exit, uitiosus est. Quinetiam nebulosus similiter sanitati nō facit, quemadmodū item qui in cauo loco altis undiq; mōtibus inclusus, nullā aurâ recipit. Hoc igitur modo uitiosus aer omni ex æquo ætati nocet, omniq; temperaturæ: sicut optimus prodest. At qualitate uarians aer colore dico, frigiditate, siccitate, & humiditate, nū similiter uniuersos afficit. Etenim temperatis corporibus aer temperatus utilis: intemperatis, qui contrariam temperiem habuerit confert.

*De aquis. Cap. L.*

**A** quarum præterea & uirtutes & uicia cognita habere expedit, ut quæ ex multiplici ipsarum usu magis ferè quàm omnia alia ad quamlibet uictus rationem requirantur. Ea igitur optima aqua censenda est, quæ nullā aut gustu, aut odore qualitatem repræsentat, sed protinus bibēdi suauis est, & uisu pura limpidaq; , quum uerò etiam à præcordiis statim descendit, melior alia quærenda non est. Nam quæ in præcordiis residet diutius, uentrē ferit, inflat, grauatq; , uitiosa censebitur, huiusmodi aqua neq; citò calefit, neq; refrigerat, sed quæ in ipsa relixantur, tardissimè peiusq; decoquuntur. Præstat itaq; talem aquam experimento discernere Qui uerò notis quoq; eam uolet agnoscere, iis quæ dicentur attendat, quæ enim ad septentrionem spectat: à sole auersa, tardè permeat, ægræ concoctionis lentè calefcit & refrigeratur: quæ autem ad orientem erumpit, ac per meatum quendam, aut terrā colatur



latur puram, eademq; citissimè calefit, iterumq; refrigeratur protinus, hanc optimā esse existimandū est. Probatur itē quæ ætate frigidior, hyeme calidior est. Nōnulli & pondere aquā examinant, leuē præstare credentes, hoc igitur si aliis à me cō memoratis accedit, commendatur, uerū sola hæc bonæ aquę nota non sufficit: At imbrium aqua auctore Hippocrate leuissima est dulcissima, limpidissima, tenuissimaq; eò q̃ sol leuissimum & tenuissimū attrahat, ac id nō ex alia aqua solum, uerū ex mari quoq; & corporibus: quapropter etiam omniū prōptissimè cōputrescit, ut quæ diuersis ex qualitatibus sit cōflata. Nemo autem aquā putrefactioni opportunā deterrimā esse existimet, nā mutationis facilitas uirtuti potius, quam uicio tribuitur. Quæ igitur aqua optimæ notas habet, si prōptè etiam putrescat, ea cēsebitur saluberrima, & si quū mutari incipit, occasionē raucedinis, tussiculæ, & grauitatis uocis iis quī biberunt præbeat. Ac inter imbrīū aquas. æstiuæ quę tonitru decidit, præstantior est, quā quæ nimbis demissa est. Ex glacie & niuib. aqua, insaluberrima est. Nam ea congelascente, tota pars tenuior exprimitur. Porro palustrem fœdīq; odoris & absurdas recipientem qualitates, rectè decoques, atq; ita meliorem redditam potui dabis uino temperatam: si adstringit, dulciori: aliam uerò acerbiori. Nonnullas percolare expedit, nempe limosas salsas, & bitumen referentes. At frigidæ nimīū à cibo assumi debent, non tamen subito, ac una uice. Non desunt qui cibos & potiones aduersus aquarum uicia inuenerint: ac alii cicerum decoctiones præbunt, uel eadem quoq; edūt: alii caualidem similiter cum pisciculo quodam elixam, item fœniculum reliqui betam & cucurbitam sale conspersam cū uino dilutiore præsumunt.

*De lauacris.**Cap. LI.*

**F** Rigidam lauationem ita quidem laudo, ut non iis qui nullo uictus delectu agunt, ex usu esse dicam, uerū solis illis qui accurate uiuunt, & laboribus, & cibis sicut expedit, utentes. Porro multis qui amplius interdum refrigerari desiderant, abundè est natare per æstatem, si iuuenes sint, carnosī & frictionibus ante excelsi. Sint autem qui aquam ingredientur, neque uenere, neque alio quodammodo lassī, neque cruditatem sentiant, neque uomitu,



aut aluo inaniti, neq; uigilijs defetigati. Periculosum enim si quis ita affectus frigida lauacro utatur. Calidum uero balneum & optimum & tutissimum est: lassitudinem soluit, humorum repletionem per halitum digerit: item excalfacit, mitigat, emollit, flatus ubicunq; decubuerint diffundit, somnum conciliat, carne replet. Est autem aptissimum omnibus, & uiro & mulieri, & puero & seni, & priuato.

*De balineis naturalibus.*

*Cap. LII.*

**N**aturalium balneorum alia nitrum, alia salem, alia alumen, alia sulfur, alia bitumen, alia aes, alia ferrum representant: nonnulla composita ex his omnibus reperiuntur. Itaq; aquarum naturalium uis est quae desiccat & calefaciat ampliter, ac humidis frigidisq; affectibus maxime conducit. Iam uero quae nitrum, & salem obtinent, capiti, thoraci fluxione tentato, stomacho humentiori, aquae inter cutem, tumoribus laxis, oedemata Graeci uocant, qui ex morbis proueniunt, & pituitosis sunt accommodatae. Aluminate sanguinis reiectioni, stomacho uomitioni opportuno, immoderaris mulierum purgationibus, continuisq; aborribus, utiles existunt;

Sulfuratae neruos emolliunt, calefaciuntq;, & dolores mitigant, stomachum uero eneruant euertuntq;. Bituminatae caput replent. instrumenta sensibus distribuendis dicata, offendunt: calefaciunt autem continue, & temporis processu emolliunt. Quae aeris naturam occupant, ori, tonsillis, uuae, & oculis praecipue conferunt. Ferri uirtutem sortitae, stomacho & lieni sunt utiles. Oportet autem in aquam sine tumultu, & lente descendere, quo uirtus corpori relaxato accedens immergatur.

*Quae uictus ratio quolibet anni tempore sit utilis.*

*Cap. LIII.*

**N**on alienum est, pro singulis quoq; anni temporibus uictum instituere. Ac hyeme quidem pluribus uti laboribus, plus esse conuenit praesertim diebus aquiloniis. Nam austrinis laborare quidem similiter, sed minus cibi & potus assumere oportet. Summatim humido tempore corpus omnino siccum reddere, quemadmodum in frigido, calidius: carnes calidas comedere & olera, plus uini bibere oportet. Verè autem ineunte, alius uomitu, alius per aluum euacuari debet, alius



alius sanguinis demissione, prout cuiusq; consuetudo & uoluntas fuerit. Per æstatem à laboribus conquiescendum, ciboq; demendum est, qui rectè frigidioris erit naturæ: portione largiore utendum, ac omnia fieri debent, quæ ad refrigerationem humiditatemq; conferunt. At in autumnno, quoniam prorsus inæqualis inordinatusq; est, & omnigenos morbos inuehit, magna uictus habenda sollicitudo est: frigus uitare, concubitu & frigida potu prorsus abstinere expedit. itè frigidus auroræ aer, meridianusq; ardor rectè cauebitur, poma affatim assumere noxium est, ut quæ non copia tantum obsint, uerum etiam uiciosos procreent humores, & inflationes. Etenim præstantissima ipsorum, nempe ficus & uuæ, flatus pariunt corrumpuntq; cibos, nisi ante alios præsumantur: ita uerò neq; instant, neque corrumpunt. Vbi aer frigidior euadit, corpus pro frigoris ratione calefacere, omniaq; peragere oportet, ceu hyeme aduētante. Nihil mali autem fuerit post æquinoctium uacuationē ex commemoratorum aliquo tentare, ne aliquid superfluum in corpore retentum, hyeme facessat negotium.

*Victus eorum qui in laboribus uitam  
agunt. Cap. LIIII.*

**S**I quis in laboribus uitam transigit, cōsiderandū est, priusne is exerceri consueuerit, an nullo exercitio se credens, mediocriter † eiusmodi consuetudinem ferat, ita ut non morbo implicetur, continuè, facili præditus perspiratu meatuum, eiusmodi enim corporis naturam ad aliā consuetudinē traducere non oportet, imò nec eos qui ex longiore temporis interuallo ægrotant. At si assiduè quis morbo conflictari uidetur, in humorum quidē redundantia *πληθωρίαν* græci appellant, eò per totam salubrem uictus rationem, consiliū diriges, ut humorū mediocris sit † copia: in eorū uerò prauitate *κωκοχυμία* græcis dicitur, ut optimos efficias. Qui igitur humorum redundantia laborant, in balneum deduci, deinde frictionem adhibere, & paululum dimoueri prius debent. Qui uerò eiusmodi facere antea sunt aggressi, ijs hæc eadem paululum augere, cibo autem detrahare, eumq; imbecillis materiæ ingerere consulemus. At qui prauos humores colligūt, non uno consilio tractantur, quoniam neque una uiciosi humoris species



cies est. Nonnulli si quidem frigidiorē magisq; pituitosā colligunt alij calidiorē biliosiorēq; quemadmodum alij melancholicā magis accumulānt. Quapropter singuli, cibo potuq; abstinebunt, quā collectā ipsis humorum colluuiem solent generare. In omnibus autem his commune est præsidium,alui subductio.

†Vetus scriptura est *ῥαδίως*, id est, facile: non *μερείως*.

‡Ante hoc uerbum in manu scripto est uox *ἀέ*, id est, semper, quā omīssa uidetur à librarijs.

*Proficiscentium uictus ratio.* Cap. LV.

**F**acillimè quis profectiōem inibit, si inunctus sit, & nō fortiter incedat. Præterea ad proficiscendi facilitatem conducit per æstatem fascia mollis digitos sex, aut septē lata, quinq; autem cubitos nō minus oblonga, lumbos ad ilia usq; cōplexa. Item baculus ad iter utilis habetur. Etenim per decliuiā præmissus, corpus quod præceps ruit ceu cōto cuidam innixū retinet, quum ascendendū est, ipsi innitentes facilius in accliuiā corpus promouemus. Porro cum in itinere cessamus, unctio & pauxillum cibi cuiusdā æstiuī, potioq; modica eo tēpore conuenit: à prandio antè quā iter arripiamus, conquiescendū est. Si uerò necessitas abeundi fuerit & sitis urgeat, tenuis polenta ex aqua cū salis momēto bibetur: æstus ardorq; solis caueri debet, cui nec corpus nudū exponere sed cōtectū esse oportet, ne ex itinere siccescant indurescat. Hac. n. ratione & minus lassatur, & nullū ex prædictis affectibus similiter percipit. Hyeme quū frigus urit, antequā itineri te accingas uentre subducto, & unctiōe adhibita hyemaleis cibos copiosè assumes, potionē modicā. Cæterū fascia longiore nō solū lumbos, sed spinā quoq; & pectus rectè inuolues. Requiescenti autem, si interea uehementis frigus urat, neq; ungi, neq; cibum potumue assumere præstat, neq; alio quodā modo refici debes, si inibi mansurus es. At si secundum longas profectiōes, aliosq; ualidos labores, et si lassitudinem quis non sentiat, non aliter quā lassī curabit. minus enim sic periculis erit opportunus.

*Nauigantium uictus.* Cap. LVI.

**V**omitibus quibus nauigantes premuntur, primum oborientibus nec facile, nec utiliter succurrimus: ut quā omnino magna ex parte præsidio esse soleāt. A uomitu  
autem



autem cibi non copiosi, nec quilibet offerri debent, sed aut lenticula uti sicca, decoctaq; cui pulegij modicum sit adiectum, aut panem ex uino aquoso, & odoro maceratum ingerere oportet: portione uti modica, eaq; uel ex uino prorsus aquoso, uel aceto mulso. Lenticulam incoqui dum emollescat, conueniet: mox in tenuem puluerem redigere, inde siccare, postea in uas fictile condere. At si diutius crebriusq; uomitus urgeat, cibo magis subtrahendum est, eademq; portione modica utendum, uel aceto mulso cum aqua, in quo thymum aut pulegium comaduerit: item aqua cum polentæ polline aut uino odorato, eoq; aquoso cum illius polline similiter, recreatio tentabitur. Ad graueis autem nauium odores, aut mala cotonea naribus admouentur, aut thymus, aut pulegiū. Mare nequaquam aspicendum est, usq; dū in nauibus uersari assuescas. Aquis porro cura adhibenda est, ne turbidæ, fœdi odoris, ac salis existant.

*Quomodo extenuetur corpus.*

*Cap. LVII.*

**Q**Uum immodicè corpus plenum est, extenuare ad atque imminuere oportet. Quia ergo calidior tēperatura & siccior gracile corpus reddere demonstrata est, crassis eam, si mediocres reddere uoluerimus inducemus. Didicisti autē citas exercitationes, uictū extenuantem, similiaq; medicamenta, & animi curas, temperamētum siccius & calidius, eoq; corpus gracilius efficere. Quæ igitur uictus ratio extenuet, nulli nō cognita est: medicamēta uerò uehemētiora hæc sunt, rutæ semen, præsertim syluestris, cum ipsis corymbis, aristolochia rotūda, tenue centauriū, gentiana, polium, quæque ad urinam ciendam ualentiora sunt, uti petroselinum: singula nāq; hæc, & per se, & cum aliis omnia, humores abundè extenuant, inaniuntq; corpus. Quinetiam sales ex crematis uiperis largiter extenuare solent: ipsaq; adeò theriace. digerit autem, extenuatque oleum cui radix syluatici cucumeris, hibisci, gentianæ, panacis, & aristolochiæ sit incocta, si illinatur: sic polium & centaurium. At cibus non statim à balneo dari debet, sed prius somnus est indicendus. Præstaret etiam aquam balnei ex iis esse quæ digerant, si quidem sponte sua scaturientem habeamus, qualis est Mitylenæ: si minus, salis florem aquæ marinæ commiscebimus. Vino utemur



mur tenui & albo. Cæterum frictio sicca linteis crassioribus durisq; adhibita, idem abundè efficit. Adhæc oportet cibum minus quàm pro exercitiorum ratione ipsos assumere: iuuat etiam obæsos insolatus. præbire autem non debent, sed epulas semel tantum die sumere, magis expedit. item corpus nitro & sale asperiore infricare. In balneis copiosum nitrum extenuat, modicum uerò probam corporis nutritionem excitat. Postremò extenuat & medicamentum, quod recipit piperis & petroselini duas portiones, assari & anisi dimidiam. Hoc & urinæ & aluo promouendæ efficax est.

*Quomodo tenues impleantur. Cap. LVIII.*

**Q**Uum extenuatos implere uolumus, uinum quidem crassum. cibus autem crassi succi, exercitatio modica, frictio mediocris, & ut summatim dicam omnia prædictis contraria expediunt. Commodum est iisdem & pice diebus tribus quatuorue interpositis. oblini. Si ieiunus aliquis lauetur, ante balneum linteis corpus donec rubescat, infricare debet, deinde frictione dura nō tamē multa cutē cogere, quod densa duraq; euadat. Expedit igitur ijs qui pallido sunt colore præditi, nec alimentum sentiūt, iram animiq; motus excitare.

*De partium attenuatarum curatione. Cap. LIX.*

**E**Xtenuantur plerunq; partes nonnullæ, uel diuturna ipsarum quiete, uel deligaturæ modo quo contrafacta sciātur. Itaq; uirtus partis extenuatæ firmari, sanguisque ad eā elici debet copiosus, frictione moderata, aptoq; motu, & calētis aquæ mediocri superfusione. Hæc sanè tantisper faciēda sunt, dū rubescēs corpus attollatur, cessandū uerò prius quàm collabāt. Iam & picationē prædictis membris, adhibere cōgruit. Quū autem frigidiorē partē senseris, linteis ipsam confricare, ac calefacienti quodā medicamine oportet. Vsum aliquādo & thapsia, nūc cum melle, nūc cū cerato illinēs.

*Optimi temperamenti notæ. Cap. LX.*

**T**EMperatissimus homo est, cuius corporis cōpositio omnium extremorū exactè mediū occupat, nēpe gracilitatis, crassitie, mollitudinis, duritiæ, caloris, frigiditatis, humiditatis, & siccitatis, in uniuersum naturæ ac animi functiones hēt inculpatas: medius quoq; est glabri & hirsuti, nigri & albi: pilos in pueritia rufos magis q̃ nigros hēt: in uigore, è p̃rio.

Interpe-



*Intemperatorum corporum notæ. Cap. LXI.*

**C**orpora moderato calidiora citius dentient, increſcēt-  
 que ſimiliter: tangentibus autem calidiora, munusque  
 pingua apparent: colore ſunt rubido, pilis nigris, me-  
 diocriter hiſpidis, & latis uenis. At ſi quis ſimul & pinguis, &  
 craſſus latiores uenas habeat, is ob conſuetudinem, non na-  
 tura pinguis euasit. Frigidioris temperaturæ nota eſt, ſi ad ta-  
 ctum frigidius apparet corpus, glabrumque ſit & pingue, color  
 unā cum capillis rufus, ſi multa ineſt frigiditas, liuens quodam-  
 modo & plumbeſ, uenæ anguſtiores: ſi gracilis eſt eo tempera-  
 mento præditus, neque neceſſariò talis, ſed ex conſuetudine  
 factus eſt. Sicca autem temperies durior eſt, graciliórque tem-  
 perata, atque hirsuta, durities igitur à ſicca temperie omnino  
 ſeparari nequit, gracilitas autem non modo naturaleis tempe-  
 raturas, ſed etiam ex longa conſuetudine acquiſitas comita-  
 tur. Indiciū ſiccitatis eſt, ſi corpus ægrè mouetur, ſiccum, &  
 ſqualidum à ſiccantibus euadat. Humida temperies, cætera  
 quidem temperatæ ſimilis eſt, ſed mollior, corpulentiorque; ac  
 ab hac ſeparari nequit, mollities, quemadmodum, & craſſitudo  
 non inſitum modo temperamentum, comitatur, ſed etiam ex  
 longa quadam conſuetudine conſtituitur. peculiare uerò hu-  
 miditatis ſignum eſt, corpus maximè hirsutum, facilis pilorum  
 capitis prouentus, ijque nigri ſunt, & per iuuentutem copioſi:  
 proceſſu temporis caluitium ſequitur, uenæ latæ ſunt, ſicuti &  
 arteriæ grandes, ſimulque uehementiſſimè pulſant. prætereà  
 totum corpus ualidum, articulatum, maſcuſoſum, pinguedi-  
 nis expers apparet, cutis dura, & nigrior. Frigidum humidam-  
 que temperaturam teſtatur thorax anguſtus, ſicut etiam to-  
 tum corpus glabrum, cutis tenera & alba, capilli, ſubrui, præ-  
 fertim in iuuentute, hac præditi in ſenio non calueſcunt, ue-  
 rùm ſtatim timidi, puſillanimes, pigri, uenis latentibus, craſſi  
 pinguesque & femoribus, & muſculis indiſtincti, inarticulati,  
 bleſique fiunt. At ſi humiditas frigiditasque magis fuerit ad-  
 aucta, color unā cum pilis rufus uidetur: ſi plurimum increue-  
 rit, liueſcit. Porro calidum ac humidum temperamentum  
 mollius carnoſiusque, optima temperie exiſtit: auctum am-  
 pliſſimè, putridis affectibus opportunum eſt. Quum autem  
 paulo quidem humidius, multo autē calidius fuerit, eo donati  
 mollio



molliores paulò, corpulentioresque temperatis existunt, non paulò uerò hispidiores, imò etiam ad tactum calidiores apparent, nigri ipsis pili existunt, & caro pinguitudinis expers. Quod si paulò quidem fuerit calidius, multo autem humidius, mollis his caro, multaque existit, & color ex rubro, & albo commistus, tangentibusque paulò calidiores apparent. At si frigiditas pariter cum siccitate ex æquo augetur, corpus erit durum gracile, album, non musculosum nec articulatum, pilisque uacuum, tangentibus frigidum deprehenditur: pinguedo tamen, graciles licet eiusmodi existant, per carnem dispersa est, color autem & capilli frigiditati proportionem respondent. Quod ad animi mores pertinet, pusillanimes, timidos & tristes eiusmodi temperamentum efficit. Ac, ut semel expediā, in coniugatis temperaturis semper euincens qualitatē notā superare solent.

*De capitis formatione.*

*Cap. LXII.*

**E**Xiguum sanè caput prauā cerebri structuram propriè notat: magnum uerò non necessariò bonam testatur. Si nanque tale insitque uirtutis, materiam probam, multamque efformantis robore factum est, bonum est indicium: sin ex solius materiæ copia, non item. Verum distinguere ea conuenit figura, & ijs quæ ex illo processerint. Figura quidem, si concinna, aptaque fuerit, hæc enim semper bona est constructio, ijs autem quæ ex illo procedunt, si optimè sit disposita, & si neruosum genus ipsi integrum, bene habitum, ualens, sique oculi acriter cernant. In acutum fastigiata capita, deficientem in fronte, uel occipite habent eminentiam, aut magis quam decens est, auctam. Plerumque igitur, ut magnam, ita has quoque deprauatas comperiemus sit tamen, sed rarò ut nonnullæ ex his bonæ proueniant, cum formas scilicet uis, non inualida fuerit.

*Temperaturæ cerebri notæ.*

*Cap. LXIII.*

**C**erebrum temperatum moderatas habet, & animi functiones, & excrementa, minimeque ab omnibus exteris offenditur. Talium pili capitis in infantia subruhi, pueritia subflauii apparent: ubi ad adoleuerint flauescunt, medijs quodammodo inter crispas exactæ ac simplices nec tamen faciliè caluescunt. Si uerò calidius temperato extiterit, omnia quæ circa caput existunt, & calidiora, & rubicundiora apparent, oculorum uenæ sensibiliter apparent, capilli his in lucem



cem æditis protinus in capite oriuntur. Ijs autem qui multò sunt calidiores, nigri, ualidi, & crispì: qui non multò, ijs flauì primum, deinde nigri proueniunt, procedente ætate caluescunt, interim his recrementa sunt exigua, & inculcata fruuntur ualitudine: capite uerò à calefacientibus cibis, potu, odoribus, & foris accedentibus implentur grauanturque, modicus somnus in huiusmodi temperaturis sufficit, neque is profundus ad modum. Frigidius autem quàm conuenit cerebrum fatentur, excrementa copiosiora per meatus ei peculiareis manantia, capilli recti, rufi, firmi, & facile à frigidioribus causis læduntur, destillationibus, & grauedinibus continuè infestantur, oculorum uenæ latent, somno maximè premuntur. Siccioris cerebri nota est, si nihil excrementi emanat, sensuum acrimonia, uigilia, capilli sunt robustissimi, statim ab ortu, ac ijs crispì magis, uerùm ex facili caluent. Humidioris autem, capilli simplices planique, & nequaquam caluitium experiuntur, sensus turbulenti, excrementorum copia, somnus multus & profundus. Calido, & sicco cerebro præditi, recrementis carent, exactos sensus obtinent, uigilantissimi sunt, facile caluent, primum uerò capilli celerrimè ipsis proueniunt, & optimè habiti, plenissimi que, nigri, calidi ad tactum capitis, rubrique usque ad uigorem apparent. At si calori humiditas accesserit, ita ut utraque paululum excedant mediocritatem, colorati calidique sunt, uenæ oculorum grandes, excrementa pleniora, mediocriter concocta, capilli recti, subflauì, caluitium haud facile experiuntur, uerùm capita ipsorum calefacientibus, humectantibusque implentur, grauanturque. Vbi uerò humiditas, caliditasque accreuerit, caput morbidum euadit, facileque ex calidis & humectantibus noxam contrahit. eiusmodi temperamento præditi, uigilare diu nequeunt, dormientes autem imaginibus, per insomnia torquentur, oculi carigant, non exactos sensus obtinent. Frigida uerò simul & sicca temperamenta cerebri, frigidum decolorque caput efficiunt, oculorum uenæ non extant, à frigidis causis promptè offenduntur eoque inæquali ualitudine fruuntur, sensibus per adolescentiam exactis inculpatisque, processu temporis subito contabescunt: summam circa omnes capitis partes cito consenscunt, capilli à natali die uix erumpunt, exorti non aluntur, rufescuntque humidum frigidumque temperamentum cerebri, reddit



reddit soporosos, somnolentos, sensibus uitiosos excrementitios, frigori opportunos, capita habentes quæ facile repleantur, destillationi, grauedini obnoxios, non tamen hi caluitum experiuntur.

*Ventriculi temperatura notæ. Cap. LXIII.*

**V**entriculi natura siccioris indicium est, si confestim eo donati sitiant, & modico sint contenti potu, largiore grauentur, fluctationes experiantur, uel id quod redundat in uentriculo supernatet, cibusque delectentur siccioribus. Humidiorem notant, si nulla sitis urget, & largior humor non molestatur, cibi; placent humidiores. Calidior natura uentriculi melius sanè concoquit, quàm appetat, & dura potius, quæque difficulter possint immutari, calidis cibus, & potionibus oblectatur, neque à frigidis quicquā incommodi percipit, si modicè utatur. Frigidior, appetendo quidè ualet, concoquendo minus, præsertim si contumacia frigidaque; alimenta assumpserit, quæ facile in eo acescunt, frigidis quidè gaudet, sed immoderatus assumptis promptè offenditur. At intemperies ex morbo contracta, hac ratione ab insitis differunt, quòd contraria sibi, non similia appetant. Si igitur uenter probè concoctionem obit, temperatus: si non concoquit, intemperatus est. Item si nidorosos ædat ructus, immodicum etiam feruorè igneum faretur: si acidus, contrarium. Rursus si rebelles concoctioni cibos propè concoquat, immodicum: si pices concoquat, illos minus imbecillem. Quod num ex humore quodam aliunde influente accidat, considerare oportet. Etenim pituitosi, acidum: biliosi nidrosus, graueolens, aliasque; extraneas qualitates ructant. Communiter autem utrisque; nausea superuenit. uerum si uitiosi humores in concauo uentriculi spatio supernatent, uomitu reijciuntur. qui autem corpore uentriculi contenti, tunicis eius adhærescunt, frustra eum ob inanem ad uomitum nauseam conturbant.

*Pulmonis notæ.*

*Cap. LXV.*

**N**on modo uentriculus sitim uel adfert, uel arcet, ac frigida calidaque; potionis appetentiam facit, sed etià quæ in thorace continentur uiscera, cor, pulmo, & iecur. Verum qui ob horum caliditatem sitiunt, largius inspirant, expirantque longius, item sentiunt in thorace ardorem: non sicuti qui in uentriculo subter præcordia illum experiuntur.

† Quin



† Quinetiam si biberint, non statim sit ire desinunt, ac frigida potio magis quàm calida admodum sitim ipsorum restinguit: frigidus autem aer inspiratus refocillat, quum nihil uentriculi uitio sitibundos soletur. Hac ratione qui è contrario affecti sunt, à frigido inspiratu sensibilem molestiã percipiunt, quòd maximum pulmonum frigiditatis indicium est, adeoq; pituita secreta & cū tussi reiiciunt. Sicci autem pulmones excrementis carent, & pituita, quemadmodū humidi excrementicij sunt, & obscuram raucamq; uocem efficiunt: ac recrementa ipsis interueniunt, ubi aut uehementius, aut acutius loqui studuerint.

† Hæc uerba ita leguntur in uetusto codice. καὶ μὲν δὴ καὶ πίνοντες, ἔκ, αὐτίκα πάνονται, καὶ τὸ ψυχρὸν εὐλίγον ποτὸν ἴτησιν αὐτῶν μᾶλλον τὸ δίψος, ἢ περὶ τὸ πολὺ θερμὸν. Id est. Quinetiam si bibant non statim sitire desinunt, ac frigida paucæ potio magis quàm multæ calidæ sitim ipsorum restinguit. Qui sensus huic loco magis conuenire uidetur.

*Cordis notæ.*

*Cap. LXVI.*

**C**ordis calidioris notæ sunt, respiratio magna, pulsus ne-  
lox & creber, itidem audacia, insanaq; ferocitas: tho-  
rax ipsis hirsutus, præsertim pectora existunt, ac præcor-  
diorum regio his uicina: magna uerò ex parte totum quoque  
corpus calidum, nisi iecur ualide renitatur. Quinetiam thora-  
cis latitudo calorem notat, nisi & hic cerebrum ualde resistat.  
Porro cor frigidius, pulsus habet mediocribus minores, ac qui  
tale habent, † timidi natura sunt & pusillanimes, negligentes  
pectore glabro. Cor siccius pulsus edit duros, iram excitat nō  
procliuem, sed feram & quæ non facile queat placari, magna  
uerò ex parte, uniuersum corpus reddit aridius, nisi iecur repu-  
gnet. Humidius cor testantur, pulsus molles, mores ad irē pro-  
ni, sed quæ facilè pacari possit, ac totū corpus humidius, nisi ie-  
cur resistat. Calidum & siccū cor ostendunt pulsus duri, magni  
ueloces, & crebri, item respiratio magna citata & frequens. hoc  
donati corde, maximè hirsutum pectus, nec non præcordia ob-  
tinent, impigri tractandis negotiis, furibundi, temerarii, mori-  
bus tyrannicis: etenim ad iram procliues, quæ non facilè con-  
quiescat. Si autem humiditas cum calore superauerit, ta-  
les minus hirsuti sunt, quàm commemorati, prompti autem  
functionibus obeundis, neque tamen fero animo, sed ad iram

PAULI AEGIN.

c piono



prono duntaxat existunt, pulsus in eis magni, molles, citati & crebri. Humidioris frigidiorisq; pulsus quidem molles, mores autem pusillanimes, timidi, & pigri: talium pectora pilis uacant, ac nequaquam iram retinent diu, quemadmodum neq; ad eandem proclues sunt. Frigidum & siccum cor pulsus duriores & exiguos efficit. huiusmodi corde donati minimè omnium iræ sunt obnoxii, sed ubi semel eam conceperint, diu retinent: pectora ipsorum omnium maximè pilis uacant.

† Auctor earum annotationum in Paul. Aeginetam quas Cratander formis expressit anno 1542. & Orosius locū hūc peruerterunt. Ita enim legendum putant, ἀτολμοὶ καὶ ἀμεληταὶ cūm ex fide exemplaris uetustissimi artis paruo Galeni (ex qua totus hic locus desumptus est) quod Aldus sequutus est, legendum sit μελληται. μελλητης. n. significat ἡπερθετικόν, id est, cunctatorem. Et μέλλησις uel μελλισμός, id est cunctatio propria eorum est, qui cor frigidum habent ut scribit Gal. lib. 2. περὶ κράσιον. Quod autem Orosius ex Oribasio legendū putat καὶ ἀτολμοὶ εἰσι καὶ λιθαργοὶ καὶ ἀμεληταί, æquè magnum uitium in ea scriptura. Nam pro λιθαργοὶ omnino legendum est ἀργοί, id est, pigri (Nam λιθαργὸς affectus est cerebri potius quàm signū, quo cognoscas cordis frigidā intemperie) pro ἀμεληταί uerò legendum est μελληταί, ut iam ostendemus. Ferè. n. sit ut curiosi hi διόρθωται, παραδιόρθωται inueniantur.

*Iocinoris temperatura notæ. Cap. LXVII.*

**I**Ecoris calidi notæ, uenarum latitudo, flauæ bilis copia, per ætatis autē uigorem, etiam atra, sanguis calidior, eoq; totum etiā corpus existit, nisi cor obstiterit, præcordia & uenter pilis obsita sunt. Frigidioris indicatiū, uenæ angustæ, pituita copiosior, sanguis, totusq; corporis habitus frigidior, nisi à corde incalescat: præcordia & uenter pilis uacant. Siccus iecur testatur, sanguis crassior minusq; redundans, uenæ duriores, ac uniuersa corporis habitudo aridior. Humidioris notæ sunt, sanguis copiosus & humidus, uenæ molliores: sic etiam totum corpus, nisi cor restiterit. Calidi simul & sicci indicia sunt, præcordia maximè hirsuta, sanguis crassior simul & paucior, amara bilis copiosissima, ac in ætatis uigore, atra, uenarum latitudo duritiesq;: pari modo & totum corpus calidum siccumq;.

Siquidem



Siquidem calor à corde procedens, frigiditatem à iocinore prouenientem potest euincere, quemadmodum & frigiditas caliditatem, siccitatem uerò non potest cor humidius ad contrarium perducere. Constat autem quòd si in idē utriusq; principij temperamenta concurrerint, totum omnino corpus, illorum ratione affici. At humidum simul & calidum iecur, minus q̃ calidam & siccum præcordia efficit hirsuta, plurimum uerò sanguinis, uenas grandes, habitum humidum & calidum, nisi cor obsistat. Quod si utraque qualitas longius à naturæ modo recesserit, morbis qui ex putredine uitioq; humorum habent originem, corripuntur: idq; magis, si plurimum humiditas, parum calor increuerit, ac humoribus uitiosi fiunt. Cæterum humidius frigidusq; glabra habet præcordia, sanguinem magis pituitosum, nec non uenas angustas, totumq; corpus similiter afficit, nisi cor ad contrarium deducat. Frigidum simul & siccum iecur corpus efficit, modico sanguine, uenisq; angustis, & frigidius, præcordia glabra, nisi & hic cor superauerit.

*Testiculorum temperaturæ notæ. Cap. LXVIII.*

**C**alida testiculorū temperatura, ad libidinem procliuius est, fœcunda, & masculos procreat, partem genitalem celeriter hispida efficit, ac uicinas etiam attingit. Frigida contrà. Humida, copioso ac humecto semine abundat. Sicca pauci & crassi seminis efficax est. Calida & sicca temperies mediocriter crassum semen progignit, estq; fœcundissima, ac celerimè ad libidinem iam inde ab initio animal incitat. Tales itaq; testiculi hispida statim genitalia, eorumq; uicinam efficiunt, sursum, usque ad umbilici regionē: infra, usq; ad media femora. ac eiusmodi temperamentū abundè uenerē commouet, sed celerrimè satiatur, & si cōpellas, offenditur. Porro si humiditas calori fuerit coniuncta, hispidos quidem minus tales reddit. copioso autem semine magis abundant, nō tamē magis q̃ alij appetunt, minus autē frequentiori concubitu læduntur: si autē utraq; & humidū & calidum impense creuerint, non sine noxa à uenere abstinēt. At humidi frigidiq; temperamento testiculi, uicinas partes glabras reddunt, ac tarde concumbere incipiunt. neque ad actionem excitantur, † aquosum, tenue, & inualidum semen, ac fœmine efficax projiciunt.

c 2 Siccum



Siccum frigidumq; temperamentum, alia quidem similia prædicto, crassius autem semen & planè exiguum progignit.

† Scriptura uetus huius loci est, ὁ δ' αὐτῶν δ' ἐκ καὶ λεπτόν αὐτοῖς τὸ σπέρμα καὶ ἄγονον ἐστὶ καὶ ἀκλύγονον, Semen ipsorum est aquosum, tenueq; ac infœcundum. quem locum ita legendum esse facilè ex arte parua Gal atq; adeò ex re ipsa intelligi potest. Sed id erratum Orosius prius emendauit.

*Quæ prætermissa sunt. Cap. LXIX.*

**S**ingulæ corporis nostri partes peculiarem quãdam & temperaturam & uim sortitæ sunt: omnium uerò notas hoc loco exponere necessarium nō esse duco, quum infinitæ prope modum sint & nos compendium scribere proposuerimus. Porro de iis egimus, quæ potissimum totum corpus consorti quodam lege afficiunt, de reliquis eadem ratione & uia considerare præcipimus, temperamenta ipsorum tū ab excrementis, tum ex reliquis functionibus, tum iis quæ superueniunt dignoscens. Tempestiuum igitur est, ut oratione conuersa, doceamus quomodo totius corporis intemperies corrigi debeat.

*Quomodo calida intemperies corrigatur. Cap. LXX.*

**Q**uam itaq; incalida intemperie bilis superet, si per inferiora descēdit, notū est omnibus, nullū oportere negotium facessere: si ad superiorē uentriculum tendit, uomitu euacuare, qui post exercitationem ante cibum factam aquæ potu cietur. Utilius autē exercitiū ipsis est, quod non uelox ac ualidum est, sed remissius tenusq;. Nonnulli uehementer calidi nequaquam exercitationem requirūt, uerū obambulatio balneumq; ipsis sufficit, iisdem lauacris quoq; secundū cibum oblectantur. Quibus adiuncta est siccitas, hi ratione uictus humectante indigent, ex cibis humectis, balneis, & exercitiis ualentium & multorum abstinentia. Quare per æstatem citius lauare, & à cibo rursus debent frigida hos potius iuuare. Venus autem siccis temperamentis maximè est inimica: cauēda ipsis lassitudo, insolatus, sollicitudo, & uigiliæ. Humidæ & calidæ natura intemperies in pueritia morbis patent rheumaticis, pletoricisq;, & præterea ijs qui putredini feruntur accepti. Itaque pluribus egent exercitiis, exacta in uentre concoctione



coctione excretioneq; per urinas . quapropter si etiā ante cibum bis tēue lauent, ut anturq; aquis natura calidis, magnum sentiunt præsidium . Porro defluxionibus prospiciendum est, lauacris, multa exercitatione etiam ante cibum, urinę, aluiq; excretionibus . Nihil autem prohibet, etiam apophlegmatismis nonnunquam uti, & purgationibus, cibis boni succi, & uino quod urinam moueat,

*Quomodo frigida intemperies emendetur.* Cap. LXXI.

**I**Nter frigidas intēperies, tres numerantur differentiæ, ex quibus sicca est deterrima quod enim processu tēporis senescentibus obuenit, id statim ab initio hos affligit . Itaq; humectare eos & calefacere oportet, quod cōmodè fiet exercitijs mediocribus, cibo humido & calido, uini calidioris potu, somno pleniore, cura tamē adhibita, ut quæ in corpore recrementa quotidie procreantur, oīa euacuētur. Cæterū uenus oēs sicciores, & præsertim qui præterea frigidi sunt, offendit : solis autē calidis humidisq; tuta . Porro uitiosa quoq; frigida tēpera mēta sunt quæ humiditatē habēt cōiunctā, & hæc potissimū rheumaticis corripuntur morbis, prodest ipsis balneo abstinerere, largius exerceri, uictus tenuior, unctiones mediocriter calidæ . Qui autē frigidiores natura sunt mediocriter uerò sicci humidisq; tēperamento, horū calor suscitari firmariq; debet, ac in humiditatis siccitatisq; totius uict<sup>9</sup> specie, media deligi debet.

*Quomodo sicca intemperies in uentriculo, ueluti exemplo, deinde & aliæ corrigantur.*

Cap. LXXII.

**I**Ntemperies sicca, alia est, ubi solida similariū partiū substantia reddita est siccior, quæ nihil in medicina spei habet, alia cū substantia, quæ ex humore cōcreto cōstat, est colliquata: tertia præter has cū propria humiditas unde partes nutriūtur omnino est absorpta: quæ cōtinetur in oībus animalis partibus, roris modo eis inspersa, hanc igitur particulis sine nutrimento inferere, nulla ratione queas, ideoq; difficillima est omniū eiusmodi affectuū curatio . At quæ in exilibus arterijs uenisq; cōsistit siccitas, curationē recipit, si singulas similarium partiū, propria humiditate, humectantis alimenti auxilio re-



pleas. Balneum igitur temperatum conuenit, in quo diutius uersari hominem expedit: inde statim lac exhibere asininum, quod recens mulctum fuerit, & pauxillum mellis tepidi adiectum habeat: postea conquiescere ad secundam usq; lauationem permittes, tum modicè fricabis simul & pinguiter, utiq; si lac quod sumplit, iam omnino confecit, id quod tum ex ructu tum uentris mole licet conijcere. modicum uerò temporis inter primam & secundam lauationem, interuallum erit, ut quatuor, aut quinq; æquinoctialium horarum spatium intersit, scilicet si tertio adhuc lauare paras: sin aliter, plurium. Quinetiam post unamquaq; lauationem, hominem, priusquam se uestiat, oleo perungenius: ac si quidem lactè oblectatur, post secundam quoq; lauationem id exhibebis: sin aliter, ptisanam diligenter incoctam, aut chondrum ptisanæ modo præparatum. hinc ubi rursus conquierit, ad tertiam reducendus est lauationem, aut ilico ad cœnam. Sit autem panis præparatus illi purus, & qui curiosè in furno sit coctus. obsonium quoque ex saxatilibus piscibus, aut ex albo iure asellus, & ut paucis alimenti summam complectar, concoctu sit facilè, nutriens, minimeq; glutinosum & excrementitium. potus, uinum aquosum & album, purum, & quod minimam, si diluitur, aquæ mitionem sustinet, oligophoron Græci nominant, modicæ astringentis particeps: atq; hæc maximæ siccitatis curatio est. Modica uerò non tam exacto uictu indiget, & plenior cibum admittit. Proponatur autem & nunc siccitas priori similis, copuleturq; ei frigiditas mediocris: in qua ad calefacientium materiam transeundum est: ac commemoratis modo adijciemus: in lactis quidem usu, mel copiosius: uinum autem minus aquosum priore dabimus. Quinetiam esculenta omnia calidiora, idq; non naturalibus modo ipsorum temperamētis, uerùm recentibus etiam qualitatibus, exhiberi debent. Nardino præterea unguento ungendus assidue uenter est, aut mastichino. At uerò si cum siccitatis intemperie multa sit frigiditas, primum ipsam difficillimam & uix emendabilem cēseto: eisdem uerò utere. & melle per se discocto despumatoq; uinū autem eliges antiquius. Optimum sanè medicamentum talibus est, quo picatores assidue utuntur. & illinere eo uentrem cōueniet, ac post auellere etiamnum calidum. Caterum iuuat eos probè carnosus puellus una sic accubans, ut semper abdomen



men contingat. Iam uerò multæ siccitati moderata caliditas iuncta esto. In eiusmodi sanè intemperie primum curationis modum seruabimus, ita ut mel prorsus nō degustetur, uinum uerò exhibeatur quod minimè sit uetustum. Porro cibos tepidos, lactis modo offeremus, & uentriculū oleo tum crudo tum melino perungemus. Verūm hos uehementer admodū refrigerare periculosum est, quandoquidē hæc affectio, febris quodammodo naturam, ubi calor superarit, imitatur. Fingamus itaq; rursus calidam intemperiem præpollere, huic autem adiunctam esse humiditatem talem, frigida aquæ potu curabimus, huc optimè facit usus ciborum astringentium, sed qui citra calorem sint austeri. Quum humida sola intemperies est, siccantes cibi, ita ut non calefaciant, aut refrigerent ualidè, auxiliantur adhæc consuetæ potionis penuria. Si cum frigiditate humida urget intemperies, optima remedia sunt, oīa acrimisci autem his debent etiam quæ sine manifesto frigore astringunt. optima simul his est exigua potio, eaq; uini ualidè calfacientis. Hoc igitur modo intemperies qualitatū curantur. Quoniam uerò sæpe in ipso uentriculi sinu contentus humor, interim autem in ipsas uentriculi tunicas absorptus, intemperiem procreat, non alienum est de his differere. Prior itaque affectio si semel radices egerit, purgatione per uomitum facile conquiescit, si autem rursus ex alia quapiam alijsuè particulis confluerit, exactam requirit dignotionem, curatio uerò statim subsequetur. Etenim uniuersam eam parti affectæ oportet accommodare, cura adhibita, ijs quæ recipiunt, ne facile quæ confluunt, admittant. Fiet autem hoc astringentibus & ijs quæ totum corpus ad bonam habitudinem perducunt: At uitiosos in uentriculi tunica humores mediocriter purgantibus educemus, cuiusmodi est aloë & ex ea confectum medicamentum amarum quod hiera picra dicitur. Verūm quibus lenta simul pituita uentriculo impacta est, ijs prius exhibenda sunt quæcunque hanc dissecant. deinde purgatio tentanda. Quòd ad uomitum sunt idonei, ex sumpta radícula uomant. Sin nec lentus humor sit nec crassus, utiq; abundè est à ptisanæ cremore uomuisse, item à mulsâ proficit & absynthii succū in mulsâ bibere, reliquarum uerò partium intemperies haud absimiliter curare oportet, ita ut humoribus idoneos effluxus inuenias. Nam si particula sensibilem, efflu-



xum non habeat, redundantem in ea uel saniem uel humores, quemadmodum si id quod continetur, spiritus sit flatulentus, euaporatu discutere ac uacuare conuenit.

*De alimentorum facultatibus. Cap. LXXIII.*

**Q**Uum de alimentorū facultatibus sermo, pars sit operis quod de sanitate tuenda præcipit, proximum est ut iam dictis eum subnectamus, ubi prius quàm particulatim ipsa persequamur, paucula quædā prælibauerimus. Quippe alimentorū uireis, si quid aliud, perceptas habere conuenit. Quæ igitur attenuandi uirtutem obtinent, meatus aperiunt, uiscosa adhærescentia abstergunt, crassa incidunt extenuantq; Quod si diutius ea in cibo adhibeas, serosa biliosaq; contrahes recrementa, ac si uberius ingeras, sanguis atra bile uitiosus redditur. Quare cōtinuus ipsorū usus præsertim biliosis temperamento uitari debet, conueniunt enim solis ijs, qui pituitam, humoremq; crudū, lentum, & crassum collegerunt. Porro quæ incrassandi uiribus cōstant, ualent is admodū materiæ sunt, & si in uentriculo ac iocinore decenter fuerint concocta, boni succi sanguinem producant, sed lienem & iecur obstruunt. Ex his alia sunt crassi duntaxat succi, ut lenticula: alia uiscosa, sicuti maluæ quibusdam utraq; contingunt, nēpe ut & crassi sint succi, & glutinosa, ut testaceo tegmine prædita. Itaq; uictus extenuans ad sanitatē tuendam tutior quam qui incrassat, existit. Quū uerò imbecillis sit materia nō robur nec uireis corporibus suppeditat, ac oportet nonnūquam ualentis materiæ cibum, quū inedia quædā pressit, mediocriter exhibere. præsertim uerò citra periculū assumunt, qui se exercent, & quantūlibet dormiunt, omnes autē quibus ante cibū exercitari nō licet, crassi succi alimēta euitabunt. Imò neq; in otio degentes eiusmodi cibos assument. Porro quemadmodū summum oriū maximè ualitudini tuendæ obest, ita mediocris motus summū adfert præsidū. Cæterū cibi inter eos qui incrassant & attenuāt, medii, omniū sunt laudatissimi, ut qui mediocrē substantia sanguinē procreent. Talis itaq; cibus corporibus nostris cōgruit: qui autē uitiosos humores gignit, noxius est, eoq; semper cauere debet. Iam & uaria ciborū genera assumere, cautio est, præsertim si ex diuersis constent facultatibus.

ingesta



ingesta enim concoctionem non, ut par est, sortiuntur.

*De oleribus.*

*Cap. LXXIIII.*

**L**actuca manifesto & refrigerat & humectat, eoq; somnū accersit. ut autem inter olera ualenter nutrit, ita boni succi sanguinis efficax est. Intibum frigidi humidiq; temperamenti, sed minus quam lactuca existit. Malua refrigerat quidē, sed non cuidenter, magis autē humectat: unde etiam aluum subducit, idq; propter genuinam eius uiscositatē. Beta ui absterforia uentrē subducit, eoq; stomachū largius comesta erodit, iecoris lienisq; meatus aperit. Brassica bis cocta si edatur, aluū cohibet: semel autem nō tamen uehementer cocta, cū oleo & garo, uel sale comesta, magis subducit, quemadmodum succus ipsius etiā lenticulæ efficacius purgat. Hac magis adhuc marina brassica aluū emollic: manifesto salsa, & subamara: idē præstat halimon, amphoris autē salis qualitatis particeps, aluum subducit, magis quam brassica stomacho conducit, ceu astrictionis modicæ compos: lac & semen producit. Blitum & atriplex humida quidem & uentrem soluunt, sed parum alimenti præstant. Omnia spinosa ut scolymos, attractylis, eiusq; generis alia stomacho præter cinaram conducunt, quæ cū dura euaserit, improbū succū procreat, quapropter optimum est, incoctam cum oleo, garo, & coriandro assumere: Apium, hipposelinum, sion, & smyrnium, omnia urinæ ciendæ sunt, sed smyrnium aromaticum spirat, magis acre, urinæ ducendæ proficit, & mulieribus menseis comouet: apia suauiora sunt, ideoq; stomacho magis amica. Eruca calida est, & seminis efficax, ob quod libidinem & capitis dolorem, quā cephalæam dicunt, excitat. Nasturcium, ocimum, & sinapi, calida quidem & acria, sed maximè nasturciū: concocta uerò difficilia, stomacho inimica, & uitiosi succi. Vrtica extenuat, uentrem subducit, modicè alit. Gingidion simile est scandici, astringentis & non parum amaræ qualitatis particeps. præterea stomacho congruit, ut etiam cibum fastidientibus cū aceto assumptum, proficiat: parum uerò alimenti corpori ministrat. Porro syluestria dicta olera maximè uitiosos gignunt humores. Capparis cibi cupiditatem proritat, iecocis lienisq; meatus aperit, pituitam subducit. Utendum uerò ea est ante cibum alium, ex oxymelite aut oxelæo.

De



*De asparagis.**Cap. LXXV.*

**B** Liti, lactucæ, atriplicis, maluæ & betæ, planta quidē humida est, asparagus autem siccus. Contra, raporum, sinapis, radiculæ, nastorcii, pyrethri, brassicæ omniumque aliorum quæ calida sunt planta quidem sicca, asparagus autē humidus est. At à spinosis stirpibus palustris & hortensis, asparagi, item qui à bryonia decerpuntur, stomacho quidem utiles sunt, & urinam citant, sed inualidè alunt. At si probè coquantur, magis quàm ij qui ex oleribus sumuntur nutriunt. Confimili modo & chamædaphnes asparagus agit.

*De ijs quæ radices esculentas habent.**Cap. LXXVI.*

**N** Apus & rapa si bis coquātur, nihilo minus quàm reliquæ stirpes alūt, cōtinuè autē assumpta, crassum succum procreant. Bulbi astringunt, abstergūt, cibi cupiditatē mouēt, stomachū cōfirmant, & uiscosos pectore humores eliciunt: bis incocti ualētius quidē nutriunt, sed nihil emolliunt, amara ipsorū qualitate sic abolita, præterea semē genitale augent, libidinemq; excitāt, si largius utare. itē inflationes & tormina, pariūt. Quod si ex aceto cū garo & oleo edātur, suauissimi sunt, flatus nō generāt, ualēter alunt, cōcoctu faciles. Pastinacæ uerò, dauci & cari radices quidē minus q̃ rapa nutriunt, calidæ autē aromaticæq; manifestè sunt, & urinā cient: Si uerò immoderatus utatur aliquis uitiosos humores gignunt & ægrè cōcoquuntur cōi radicum ratione. Nōnulli syluestre pastinacā daucū nomināt, efficaciore ad urinā ciendā uirtute præditū. Radicula quæ græcis raphanis dī extenuādi calefaciēdiq; uireis obtinet. sumitur rectè ante cibū ex aceto & garo, alui ducendæ gratia: secundū cibum, nequaquam Cēpa, alliū, porrum, & ampeloprasmū acri uirtute donata, corpus calefaciūt, extenuāt, & crassos in eo humores incidunt, bis cocta, parum alunt: cruda, oīno nihil. At qui alliū magis meatus referat, humoresq; discutit. Sunt autē porris sicciora ampeloprasa, utpote syluestria. In totum oīa cruda olera, si edātur, peiores quàm cocta succos procreant, ac plus humoris excrementitii continēt. Verū quæ cōdita, uel muria uel oxalme reponuntur, stomacho profunt & appetitiā excitāt, crudos humores incidunt, sed ægrè cōcoquuntur: & si abutare, uitiosos succos gignunt.

De



*De tuberibus & fungis. Cap. LXXVII.*

**T**Vber humorem de se reddit qualitatis expertē, sed frigidiorem & crassi succi. Fungi uerò frigidi pituitosi & mali succi sunt: in his ipsis minus nocētes boleti sunt, qualitatis expertes, si probè coquantur. Qui uero ammanitæ dicuntur, secundū ab his ordinē obtinēt: aliis fungis abstinentum, pleriq; siquidē ipsorum lethales: Ac ipsi boleti nisi exactius decocti edātur, periculi occasionem frequenter præbent.

*De frumentaceis. Cap. LXXVIII.*

**E**X iis quæ frumentacea nominantur, chondrus egregie nutrit, & glutinosos parit humores, uerū elotus, prauus habetur, quoniā promptè crassescēs, cōcoctionis expers permanet. probatur magis cremor chondri, si totus probe ptisanæ modo fuerit decoctus. Alica in cæteris chōdro quidem respōdet: sed aluū magis astringit. Triticū, elixum sanē, cōcoctu difficile est, & inflationes creat: ubi uerò concoctionem expertum est, alimentum præbet ualentissimū. In panem autem coactum minus inflat, minusq; ægrè concoquitur, utpote fermēti & salis particeps. Inter panes firmissimus est siligineus, deinde ex simila, tertius à quo cribro nihil excussum est, Græci syncomiston quasi dicas cōfusaneū appellāt. Sordidus panis minus quidem nutrit, sed magis per aluum deiicitur. Amylum parū alimenti præstat, quemadmodū & panis elotus, Ordeū frigida facultatis est & absterforiæ ptisanæ modo incoctum, humectat; torrefactū, quemadmodū in polentis fit, deficcatur. Polenta per æstatem ante balneum cum aqua pota, siti medetur. Panis ordeaceus fragilior est, & parum nutrit. Maza difficilior concoquitur flatusq; magis quàm panis ordeaceus gignit: melle autē adiecto aluū citat. Avena & calida est, & imbecillis materiæ. Milium & panicum refrigerant, siccant, pauxillum nutriunt, & aluū cohibēt. Omnino aut milium panico est præstantius. Oryza uix concoquitur, parū nutrit, & uentrē retinet. Porro ptisana in hunc modū coquitur: uni eius parti aquæ quindecim & olei momentum adiciuntur, ubi ebullierint acetum quoq; addes. quum iam exactè cocta fuerit, sal tenuis superiniicitur, in quibusdā porrum & anethum ei miscēt. Cæterum auena chondrusq; in ptisanæ modum decoquuntur.

De



*De leguminibus. Cap. LXXIX.*

**E**X leguminibus lenticula uitiosum succum, & melācho-  
licum perducit, imò etiam, præsertim bis cocta, aluū co-  
hibet. decoctū uerò ipsius cum oleo & garo potum aluū  
proritat. at quia inflationes mouet, satüreia, uel pulegiū admi-  
scendum est. Fabæ leues sunt, inflant & abstergunt. Aegyptia  
autē faba humidior nostra est, & excrementicia: Pisum laxum  
quidē, non tamen adeò flatuosum est. Cicer inflat, abstergit, ge-  
nitale semen auget, libidinē incitat, & calculos confringit: fri-  
ctum, minus quidem inflat, sed ægrè concoquitur. Lupinū con-  
coctioni rebelle, haud faciliè per aluū trāsmittitur, crudi humo-  
ris efficax. Fœnugræcum si ante cibū sumatur, calefacit, & aluū  
mouet. Ochron & phaselū macerata donec etiam radices suc-  
creuerint, ex garo ante cibū sumpta, aluum subducunt, ac plus  
quàm fœnugræcū alimēti exhibēt. At phaselū & dolichon in-  
tegra cū siliquis uiridia comesta, excrementicia magis reddūtur.

*De temporarijs fructibus. Cap. LXXX.*

**C**Vcurbita refrigerat humectatq; , & uentrem subducit,  
sed parum alit. Pepon totus uitiosi succi est, frigidus, hu-  
midus, & uomitioni dicatus: non coctus, bilem gene-  
rat. semen eius urinam citat & calculos in renibus confringit,  
ac in totum, abstergit uehementer. Melo pepon omnia quæ de  
pepone dicta sunt, inualidius efficit. Cucumer minus pepone  
frigidus, humidusq; est, sed acrius cit urinam, difficilis cōcoctu  
& uitiosi succi, etiam si concoctus fuerit. Summatim omnia po-  
ma refrigerant humectantq; , imbecilliter alunt, & uitiosum  
humorem progignunt.

*De arborum fructibus. Cap. LXXXI.*

**F**Icus & uuæ inter omnia poma principatum obtinent,  
ut quæ minus uitiosos humores generent, & magis nu-  
trians. Inter hæc ipsa ficus probioris succi sunt, ualen-  
tiorisq; materiæ aluo, & urinæ ducendæ, renibus purgandis, ido-  
neæ, præsertim admodū maturæ. Idem præstant caricę, quan-  
quam inflationes & sanguinem non probum pariant: eoquæ  
frequentius usurpatæ, pediculus procreant. Vuæ, si non de-  
scendunt, non quidem concoquuntur, uerū etiam crudum  
humorem generant: sin autem deijciuntur, moderatores  
sunt. Vuæ passæ alijs calidiores sunt, stomacho gratiores,  
ualent



ualentius alunt, sed minus subducunt aluum. Mora quæ aliàs sycamina Græcè appellantur, impensè humectant, mediocriter refrigerant, ac ante alios cibos præsumpta, uentrè soluunt, non admodum ingrata stomacho, sed exigui alimenti. Ex cerasiis, dulciora quidem aluum subducunt, uerùm stomacho inimica: quibus inest astrictio minus quidem stomachum lædūt, sed non uentrem citant. Atque hæc ratio tum in uitis & moris, tum in aliis compluribus seruatur. In uniuersum, astringentia si prius ante alium cibum aut eduntur, aut bibuntur, aluum comprimunt. quibus autem ob imbecillitatem uenter non respondet, ij molliendi uirtute prædita, nempe olera aut pisces, aut id genus aliud præsumunt: deinde astringentia, quæ dum ipsum firmant, deorsum propellunt, & ad excretionem incitant. Pini nucleus, qui & strobilus dicitur, boni quidem succi est crassique, & ad nutriendum ualens, non tamen ex facili concoquitur. Persica prauis succi, acidi que sunt, & faciliè corumpuntur. eo que primum exuberare debent, quod protinus deiciantur, nullam que in uentriculo diutius immorata, corruptionem sentiant, præcocia, duracina & armenia, persicis præstant, neque enim acescunt, neque similiter corumpuntur, ac sunt etiam gustu gratiora. Malorum, dulcia sanè aliis calidiora sunt, & faciliè in corpus distribuuntur, præcipuè uel assa, uel elixa: acida, magis refrigerant, & humores uentriculo impactos incidunt: austera stomachum firmant, & uentrem reprimunt, atque his magis cotonea. Idem præstant pira grandia matura que, præterea etiam ualentius nutriunt. Mala punica frigefaciunt, & parum alimenti præbent. Mespila sorbæ que uehementius astringunt, eo que aluo fusæ accommodantur. Palmulæ, nisi admodum sint pingues, stomacho prosunt, uentrem retinent, crassos, glutinososque humores gignunt, capiti faciunt dolores. Ex oliuis, druppæ stomacho aduersantur, crassi humoris efficaces: muria conditæ, & colymbades, si ante cibum sumantur, appetentiam faciunt, & aluum subducunt, ac magis quæ ex aceto & oxymelite præparantur. Inter nuces, iuglans, auellana minus nutrit, stomacho gratior. Nux uiridis humidior est, & uentrem citat: arida, si ubi in aqua commaduerit membrana ipsius interior adimatur, consimilem uiridi potestatem obtinent. Amygdala incidendi extenuandi que uiribus pollent, ideoque uiscera & thoracem expurgant, idque



idque efficacius amara. Similiter & pistacia, uerum iecur efficacius obstructione liberant. Damascena ante cibum sumpta & cruda, & in malsa elixa uentrē soluunt. Syrica aegrē coquuntur, stamacho noxia, modicique alimenti. Siliquae aegrē conficiuntur, aluum cohibent, & humores creant uitiosos. Sycomora manifestò & frige faciunt & humectant. Citrei mali pars exterior acris & concoctioni rebellis est: caro ualenter alit, & ipsa ad concoquendum contumax: interior pars siue acida, siue aquosa fuerit, abundè refrigerat. Glandes non minus quā frumentacea alunt, sed concoctu difficiles, crassi succi, & tardè permeant. Castaneae omni ex parte his praecellunt.

*De animalibus, & primo de uolatilibus.*

Cap.

LXXXII.

**A**Nimalia quae uolatu nituntur, minus quidem quàm quae pedibus fidunt, & praecipuè quàm sues, alunt, sed promptius concoquuntur, magisq; perdix, attagena, pullus columbinus, gallina & phasianus. At turdi, merulae, & exigui passeris, inter quos sunt etiam à turribus ubi nidificant pyrgitae appellati, durius alimentum praestant, atque his magis adhuc, turtur, palumbus, & anas: sed multo durius, concoctu difficilius, magisque fibrosum pauo exhibet. Anserum uerò & struthiocameli caro excrementicia, aegrus quàm omnia commemorata concoquitur, si alae excipiantur, quae non minus quàm aliarum auium probi succi existunt. Porro gruum caro fibrosum durumq; praebet alimentum. In totum iuniora ueteribus humidiora sunt, promptius concoctioni parent, ualentiorum cibum praestant, atque per aluum faciliè descendunt. Similiter elixa ab assis, & in sartagine fixis differunt. Iam quae in siccis locis & montosis proueniunt, citius concoquuntur, minusque excrementicia sunt, quàm quae in paludibus nutriuntur.

*De ouis.*

Cap. LXXXIII.

**O**Va gallinarum, phasianorumq; omnibus praestant. Anserum & struthiocamelorum praua habentur. Ex omnibus autē recentia ueteribus multo sunt praestantiora, ac tremula plus alimenti habent: sorbilia magis descendunt, ac faucium asperitates laeuigant. Reliqua omnia ad concoquendum, rebellia, tardè transeunt, & succum gignunt crassiorem, praeter ea quae pincta dicuntur, haec autē sunt si cruda immergantur  
in



in aquam calidam cum garo, uino, & oleo, & in uase mediocriter coagulentur. Huiusmodi enim coqui facilia & boni succi habentur. Omnia uerò quæ sartagine friguntur deteriora sunt.

*De pedestribus animalibus. Cap. LXXXIIII.*

**I**Nter animalium quæ pedibus fidunt, carnes, suilla maius quàm alij cibi alimentum præbet, eò quòd gustu & odore familiaritatem cum humanis corporibus sortita est, ut non nulli qui imprudenter humanas carnes gustarunt, cognouerunt. Alimentum uerò quod ex illis contrahitur, uiscosum est, & non facilè in memoria potest distrahi. Ouilla excrementicia prauique succi est. Caprilla acris est malumq; succum efficit. Deterima hircina, siue succi bonitatè, siue concoctionem respicias. Bubula melancholicum humorem facit. Leporina crassi succi est, sed minus quam ouilla & bubula. Ceruina dura est, & concoctioni rebellis. In totum, iuniora uetustis humidiora, mollioraq; & ad concoctionem facilia sunt. Hoc modo etiam castrata non castratis, bene habita macris præstant.

*De partibus animalium & sanguine. Cap. LXXXV.*

**S**VMMA corporis particulæ neruosæ sunt, citra pinguedinem, & excarnes, eoq; glutinosæ, exigui alimenti, ac ad aluum mouendâ efficaces, si excipias quæ uolatu nituntur, ob nimiam siccitatem. Rostra & aures cartilaginossæ, & ad concoctionem sunt pertinaces. Lingua, est fungosa laxa uel exanguis: parum alimenti habet. Glandulæ suauæ sunt, & friabiles, sed mammarum, præcipuè scropharum, quum lacte scatent, dulciores habentur, hæ autem non minus quàm carnes alunt. Renes & testiculi gustu insuauæ & concoqui difficiles. At saginatorum gallinaceorum testiculi & suauæ sunt, & probum corpori alimentum præstant: quemadmodum taurorum, hircorum, & arietum concoctioni resistunt, & uitiosos creant humores. Cerebrum pituitosum, crassum, uitiosumq; succi, lentè transit, concoctioni aduersatur, stomachum lædit, & nauseam excitat: si autem probe coquatur, plurimum exhibet alimenti. Medulla pinguis, & cerebro suauior est, in cæteris ei respondet. Pinguedo & adeps pauci alimenti sunt, & stomacho nocent. Cor & iecur crassi succi, ægrè concoquuntur, & lentè transeunt. At suillum iecur  
alijs



aliis præstat. Lien tum uitioli succi est, tum melancholicum humorem efficit. Pulmo facilius quidē, utpote fungosus, concoquitur, sed leuiorē cibum præbet, pituitæ generandæ efficax. Ventriculus, uulua, intestinaq; dura, concoctioni aduersantur, pituitæ efficacia. Summatim fera animalia sicciora, q̃ domestica alimentū exhibent, minusq; excrementiciū. Sanguis quilibet, uix concoquitur, præsertim crassius, & melancholicus, qualis nimirū est bubulus. Leporinus utpote suauissimus cōmendatur. Ac multi ipsum cum iecore solent incoquere, quidam uero, & cum aliis uisceribus. nonnulli & iuuenis porci sanguinē edūt. Caprillū uerò nonnullos comedisse, etiam Homerus testatur.

*De lacte.*

*Cap. LXXXVI.*

**L**ac coctum probè nutrit, gingiuis autem & dentibus nocet. quapropter ubi assumptum est, primum mulsa, deinde uino astringenti os colluere oportet. Item caput tenet, præcordia, uentremq; inflat, calculos in renibus gignit. Ac humidius, minus quidem alimenti præbet, sed magis aluum proritat: crassius autem è contrario, magis alit minus descendit. At caprillum lac, mediocri consistentia est, sicut ouillum, crassius: & quod statim à partu redditur tenuius est, procedente tempore crassius, deteriusq; efficitur.

*De lactis potione.*

*Cap. LXXXVII.*

**Q**ui lac potare uoluerit, ab aliis abstinere cibis debet, donec concoctū fuerit, & inferius descenderit. Satius itaq; est manē recens mulctū bibere, ac post id nihil assumere, nec non labores nimios deuitare, ut quod laborantibus necessario acefcat, sed lentè obambulare satius est, & interea uigiles conquiescere: hoc. n. pacto quamprimum per aluum descendit. Vbi deiectum fuerit, aliud bibendū est: ac si hoc quoque descendat, aliud. Initio itaq; purgat utiliter, non quidem copiosum ex reliqua corporis mole, sed quæ in uentre cōtinetur: mox, uenas ingreditur, ac optimè nutrit, atq; non amplius deicitur. Porro in biliosis fluxionibus, & quum syntexes, hoc est colliquamenta corporis ad uentrē concurrunt, coctum lac exhiberi debet. Coquetur autē primum lentè paulatimq; ut pars descendat, pars consumatur, deinde magis, ac magis incoquetur, cura adhibita, ne aduratur, aut in caseum coalescat. quod optimè fiet, si leniter ipsum coquamus, & agitando id quod



quod recesserit undiq; abradamus. Agitabitur autem ferula leui & tenui: & si quid oris ollæ inferuescat, hoc quoque spongia adimere oportet, id. n. subinde etiā reliquū lac corrumpit. Eo igitur modo quo dixi, lac coquendum est, usq; dum æquabiliter crassius dulciusq; crudo euaserit. Quod in eo tenue est & serosum, calculis marinis ignitis in id demissis, ebibit cōsumiturq;. Atq; hoc alui fluxionibus, præsertim biliosis est accōmodatum.

*De lacte scissili.**Cap. LXXXVIII.*

**S**erosa lactis portio à caseo discernitur, si uehementius ad ignem largiorem citra sumum excoquatur, deinde colo, aut panniculo exactè traiciatur. Porro miscetur sero mel lis momentum, aut oxymelitis, aliorūmve, daturq; subducendi uentris gratia, ætate quidem florentibus ad duos sextarios: iunioribus, non minus sextarios. Quod uerò marinis calculis ignitis aut ferro candenti demisso lac incrassatum est, intesti-  
norum torminibus & alui profluijs recte exhibetur.

*De caseo.**Cap. LXXXIX.*

**O**mnis casus acris est, sitim facit, ægre concoquitur, uitiosos succos, calculosq; generat. Laudatior est recens, laxis, mollis, suavis, & modici salis particeps: qui secus habet, pessimus est.

*De piscibus.**Cap. XC.*

**O**mnes pisces frigidioris, humidiorisque temperamenti esse, nulli non constat. Omnium uerò optimi sunt. saxatiles, ad concoquendum prompti, bonique succi, modice humectant, ubi non duram carnem occupauerint. Verū ex non saxatilibus, pelagij, multum ab ij uariant, qui in limo nutriuntur, uel in fluuii ostio, sed omnium deterrimi qui uel in stagnis uel mari stagnante uiuunt. Particulatim uerò capito, si pelagius fuerit, mediocriter suavis est, minus concoctioni rebellis, & boni succi, sanguinem uerò gignit tenuiorem imbecillio-  
riemq;. similia & lupus præstat. Mullus qui & ipse pelagius est, alijs piscibus durior est, fragilis, concoctu facilis, ualidæ ad alendum materiæ, suavis & pinguedinis expers.

*De testaceis.**Cap. XCI.*

**G**eneratim pisces qui testa conteguntur, Græci uocant ostracoderma, salsum crudumque humorem producunt.

PAULI ÆGIN.

d

Ex



Ex his ostrea mollissimam carnem obtinent & facilius descendunt Chamæ uerò, purpure, ungues, spōdyli, buccina, cochleæ, atque huiusmodi alia dura. Ac quæ molli testa integuntur, malacotrata græcis nominantur, nempe gammari, paguri, cancri, locustæ, & squillæ, concoctioni repugnant, sed alimentum præbent & uentrem comprimunt, si in aqua dulci sæpius decoquantur. Omnibus uerò crustatis inest succus, aluo subducendæ utilis, eoque etiam terrestribus cochleis. Ac quum hæc duram carnem, concoctu difficilem, ualentis materiæ & succis uitiosam fortiantur, nonnulli ius ipsorum cum oleo & garo conditum, ad aluum subducendam adhibent. Echini modice frige faciunt; exigui alimenti, & urinæ ciendæ efficaces.

*De mollibus, quæ malatia dicuntur. Cap. XCII.*

**M**olles cute pisces, utpote polypi, & sepia, loligines, dura carne & concoqui difficiles sunt, præcipue polypi, falsum humorem modicum obtinent: concocti autem non parum alimenti corpori exhibent.

*De cartilagineis. Cap. XCIII.*

**C**artilagineorum, quæ selache Græci dicunt, torpedines, pastinacæ, mollem suauemque carnem occupant, quæ celeriter descendit, facile cōcoquitur, & probe alit. Raia, leuiria, squatina, atque eius generis reliqua, duriora sunt, concoctioni renituntur, & ualētius nutriūt. In summa, quibus dura caro est, & ægre concoquuntur, & plenius alunt: ubi uerò concocta fuerint, copiosum solidumque alimentum præbent.

*De cetaceis. Cap. XCIII.*

**C**etacea, utpote balneæ, uituli marini, libellæ, delphini, & prætrades thynni, durā, cōcoctu difficile & crassi succi carnē habent. Sale cōdita eiusmodi moderatiora efficiuntur, iā qui ex alijs piscibus humidiores habentur & magis excrementicij, ad conditurā magis sunt accommodi. Talis autē in condituris est differentia, qualis & piscium, unde conficiuntur.

*De uini uiribus. Cap. XCV.*

**Q**ui sanitatis tuendæ curā susceperit, eū quoque uini facultates cognitās, habere expedit. In uniuersum itaque uinum omne nutrit, uerum rubens & crassum, magis: boni



boni autem succi non est efficax. Item dulce & ipsum quidem impense nutrit, sed stomacho nocet. Austerum stomacho quidem amicum est, uerum ægre in corpus distribuitur, leuiusque alit: hoc autem minus, album. Præstantissimum est colore fuluum. Porro uetustius nouo magis & calescit & desiccatur. hæc igitur uini sunt facultates ueluti summam expositæ. Cæterum uinum calorem genuinum refocillat, unde concoctio melior, & sanguis probus euadit, cibum per omnia corporis membra, ut quod facile penetraret, deducit. Quamobrem ex morbo emaciatis reficit, corpusque ipsorum auget. Etenim cibi cupiditatem facit, pituitam extenuat, bile per urinam educit, & bonum colorem conciliat, animo læticiam, uoluptatemque parit, & robur adiicit. Harum itaque commoditatum moderata uini potio, immoderata uero contrariorum occasionem præbet, eoque temulenti, animo turbantur desipiunt, & graui somno quæ cataphora dicitur premuntur quæ de causa immodica uini potio diligenter uitanda est, quanquam longiore temporis spacio interposito liberaliter bibere conducatur. ita namque, urina largius & sudores promouentur. Vincit autem mox uomere, assumpta prius mulsa. quod ne palulium quidem ab eo noxæ percipiatur. Qui igitur potationi indulget, alio cibo non admodum repleti debet, sed inter potandum brassicam elixam esse, & bellaria, præsertim amygdala assumere, ut quæ capitis dolores leuent, & uomentibus nihil adferant molestiæ. Præstaret autem absinthij dilutum ante potionem bibere, ut quod omnium maximè crapulæ discutiendæ sit efficax. At si quis rosionem à uino sentiat, frigidam bibet: insequenti die, absinthij rursus dilutum, obambulatione itidem, frictionibus, balneo, & exiguo cibo reficietur.

*De melle & mulsa.*

*Cap. XCVI.*

**M**EL coctum ualentius nutrit, quam subducatur aluum: non coctum, è contrario, ac frigidis humidisque temperaturis conducit: calidis, in bilem uertitur. Mulsa uero non admodum biliosis utilis est, ut quæ in bilem degeneret. Itaque in eiusmodi naturis dilutior mulsa recte dabitur: ijs qui viscera habent affectibus opportuna, incommoda est. Cæterum hoc modo præparari mulsa debet. Octupla aquæ portio mellis admiscetur, incoquiturque donec spumare desinat. spumam uero continenter ab ea tollere, simul atque orta est oportet.

d 2 De



*De somno.**Cap. XCVII.*

**P**rostea quàm omnia quæ ad uictus rationem spectant, sumus executi, superest ut de somno, eo quòd omnium potestremus magna ex parte inititur, disseramus. Itaq, somnus uirium animalium (ut ita dicam) requies est, utili humiditate cerebrum madefaciente proueniens. Qui si recte ineatur, multa præstat comoda, cibum elaborat, humores excoquit, dolorem lenit, lassitudinem solatur, intenta laxat, animi uerò ægritudines obliterat, rationem uitiatam corrigit. Porro tempus somni optimum est à cibo. sed diurnus haud omnibus est idoneus. Tempus enim quo obdormiscunt ad absolutam ciborum concoctionem non sufficit. interrupta enim ante horam suam concoctione, à meridie resurgentes, subinde acidoructus ædunt, & flatibus replentur. Nonnulli uerò fluctuatione uentris infestantur, nisi uel ex consuetudine, uel sufficienti somno usi, eiusmodi mala effugiant. Cæterum optimus somnus est nocturnus, quoniam nox naturali humiditate, silentioque animum in somnum deducens, absolutam molitur concoctionem. Item post somnum nocturnum plurima parte ad excretionem recrementorū instigamur. Terminus autem somni esse debet perfecta ciborum concoctio, quæ tum ructibus, tum uentris contractione deprehenditur, secundum quam uigilantia non inutilis, ut quæ recrementorum ex concoctione deiectionem moliatur.

*De uigilijs.**Cap. XCVIII.*

**V**igilias quæ laborantes iam affligunt, ex dolore, aut febre, aut acutiore quodam casu oboriētes, secundo libro de febribus persequemur quæ autē sanos infestant, hoc loco nobis exponendæ sunt. Si igitur aliquis ob mœrorē, aut curā, aut quandā animi ægritudinem uigilauerit, primū id quod molestat, quatenus licet protinus amputabimus, deinde suauium sonorum auditu mens à sollicitudinibus abducēda est, id quod nonnulli leni aquæ murmure machinantur. qui. n. sic permulcentur somno facile capiuntur. Præterea balneis præsertimq; uespertinis quum bene concoxerint utentur, ciboque humectanti utpote lactuca & id genus alijs. nonnunquam nigri papaueris folia uiridia obsonijs admiscebunt. Piscibus ad concoctionē promptis, uino largiore tenui & nō uetusto recreari debent.



bent. Dormituri rosaceo caput perungent, aut oleo in quo papaueris capita, aut mandragora sint incocta. item anethinum non uetus somnū accersit. Noui autem qui post lassitudinem quiete subito succedente, somno caperetur. Adhuc uenus moderata id ipsum præstat. Alii caput aut pedes refrigerantes, facile somno corripiuntur. At si ex cibi copia uitioque stomacho grauato uigilauerint (nam hoc etiam accidere nouimus) quæ admodum rursus alii præter consuetudinem inedia preissi, aut modico cibo sumpto, uigiliis sunt infestari, cōsiderare id, ac causam succidere, oportet.

*De sopore uehementi quæ cataphora græcis appellatur. Cap. XCIX.*

**A**T si è contrario alti uehementesq; somni, quæ cataphora dicitur, urgeant, ab assiduis lauacris & refrigerante uentione abstinebimus, medicamentis pituitam per os elicientibus utemur, atq; in totum ad calidiorem uictus rationem, sicciorum imbecilliorumq; ipsos traducemus, quando quidem huiusmodi affectio à frigidiore, ut plurimum & humidior materia cerebrum imbuente, accidit.

*Dioclis Epistola ad ualeitudinem tuendam conscripta. Cap. C.*

DIOCLES ANTIGONO REGI.

**Q**Voniam tibi omnium regū literatissimo esse contigit, & multum iam ætate prouecto, ois philosophiæ disciplinarumq; mathematicarū peritia excellere, existimaui eā philosophiæ partem quæ ualeitudinis tuendæ præcepta tradit, haud alienā à regia maiestate fore: eoq; tibi perscripsi, unde morbi hominibus oriatur, & quibus signis præcedentibus, quomodoq; ipsis succurrere cōueniat. Quæadmodū enim in cælo nunquam tempestas ingruit, quam non indicia quædā præcedant, quibus nautæ cæteri q; probe periti homines certiores reddantur, ita humanā naturā nullus inuadit morbus, quem nō signū aliquod denuntiarit. Tu itaq; si ijs quæ à nobis dicentur, animum attendas, exactā illorū cognitionem indipisceris. Hominis corpus in quatuor partibus diducimus, caput scilicet, thoracem, uentrē & uelicam. Igitur ubi caput morbo cōflicaturū est, hæc plurimi notæ solent præcedere, uertigo.

d 3

capitis



capitis dolor, superciliorum grauitas: aures sonant, tempora  
 saliant, oculi mane illachrymāt, caligantq; , nares oppletæ odo-  
 rem nō sentiunt, dentiū gingiuarū attolluntur. Quū ergo ex his  
 aliquod accidit, caput purgari oportet, nullo quidē medicamē-  
 to, sed uel hyssopi uel origani summitatibus tritis, quæ in ollu-  
 la cum musto, aut sapæ hemina dimidio deferbuerint, atq; hoc  
 absorbens ieiunus os colluet, & gargarizando humores ex alto  
 deducet, eaq; capitis affectuum curatione, nulla leuior est alia.  
 Optimè facit etiam si sinapi, mulla calida dilutū, ieiunus ab-  
 sorbens gargarizet, pituitamq; ex capite eliciat. Caterum ca-  
 put operimentis prius calefacere oportet, quo pituita liquefa-  
 cta, prōptè effluxioni pareat. Siquis hæc signa neglexerit, hu-  
 iusmodi ægritudines solet experiri, lippitudinem, glaucoma-  
 ta, aurium uomicas ac eruptiones, in ceruice strumas, cerebri  
 cariem quem σφακελόν græci uocant, grauedinem, anginam  
 nyctilopa, teredines, uuam, capillorum defluxus, capitis ulce-  
 ra, & dentium dolorem. Quum autem à thorace morbus na-  
 scetur, totū corpus incipit sudare, thoraxq; , lingua fit crassior,  
 sputum falsum, aut amarum, aut biliosum existit, dolor costas,  
 aut scapulas sine occasione inuadit, oscitatio frequēs, uigilia,  
 suffocatio, sitis ex somno, animus tristior: pectus frigidum, bra-  
 chia & manus tremiscunt. Succurrendum est prudenter hoc  
 modo, uomitus quāmoptime fieri potest, post cœnam sine re-  
 pletione, sineq; medicamento citari debet: utiles sunt & uo-  
 mitiones ante cibum, quas Græci syrmaismos appellāt. Opor-  
 tet autem eum qui sic uomet, radículas tenuis præsumere, na-  
 sturtium, erucam, sinapi, & portulacā, mox aqua tepida super-  
 bibita, uomere. At si huiusmodi indicia contemnantur, hi mor-  
 bi solent obuenire, pleuritis, peripneumonia, melancholia, fe-  
 bres acutæ, phrenitis, lethargus, febris ardens cum singultu:  
 Quod si à uentre morbus orietur, hæc erunt signa, uēter prius  
 cruciatur, turbaturq; , cibus & potio amara uidentur, genua gra-  
 uantur: lumbi nequeūt: flecti, totumq; corpus etiam sine oc-  
 casione laborat, crura torpent, febriculæ exiguæ affligunt. His  
 itaq; cognitis, uentrem prius emollire oportet, non medica-  
 mentis, sed uictu. Tutius enim est uti ijs quibus nullus error  
 committi potest, utpote betis mullæ incœctis, allijs elixis, mal-  
 uis, lapatho, mercuriali herba, & ex melle confectiōibus. Om-  
 nia siquidem aluo subducendæ sunt. Si quod è signis intenda-  
 tur,



rur, cnici succum omnibus decoctis admiscere oportet, ut quæ  
 suauiora & sine periculo sint. Iam & læuis brassica in aqua lar  
 giorē cocta, eiusq; succus ad heminas quatuor potus cum mel  
 le & sale, utilis est: uel ciceris, aut erui decocti aquam eodem  
 modo ieiunus utiliter bibet. Qui nullam eiusmodi signorum  
 rationem habent, ij his morbis tentari solent, alui profluuiō,  
 intestinorum torminibus, eorumq; læuitate, ilio, coxendice, fe  
 bre tertiana, podagra, apoplexia, hæmorrhoidibus, morbo ar  
 ticulari. A uelica qui nascuntur morbi, hæc dabunt signa: pleni  
 ex cibo modico esse uidentur, inflationes uentris urgent, ru  
 ctus, pallor totius corporis, somni graues, urina liuida & uix  
 erumpens, naturalia tument. Quum itaq; huiusmodi notæ ap  
 paruerint, odoratis urinam cientibus tutissimè occurrere ma  
 lo oportet. Itaque sceniculi apiiq; radices, uino albo odorato  
 madefacito, atq; huius diluti cyathos duos, mane ieiuno singu  
 lis diebus propinabis cum aqua dauci, smyrnii, helenij, quod  
 cunq; horum habuerit, nam omnia proficiunt: adhæc aqua ci  
 ceris macerati cum uino idem efficit. Qui hæc signa negligūt,  
 hos morbos expectent, aquam intercutem, lienem magnum,  
 iccoris dolores, calculos, renum cruciatus urinæ stillicidiū &  
 uentris tumorem. In omnibus huiusmodi indiciis infantes sa  
 nè leuiori, adultos, acriore curatione tractabimus. Cæterum  
 anni solstitia in quibus hæc solent ingruere silentio prætermi  
 tenda non sunt, sed quæ in singulis alimenta conueniant, pau  
 cis exequemur, auspicati ab hyemali.

### *Solstitium hyemale.*

**S**olstitium itaq; hyemale usq; ad uernum æquinoctium au  
 get in hominibus destillationes humiditatesq; ac ppter ea  
 calidioribus uti cibis, parciore potu, sed metaciore, atq; ex ori  
 gano bibere oportet, necnon ueneri indulgere. Numerantur  
 dies ad æquinoctium, nonaginta.

### *Æquinoctium uernum.*

**H**oc tempore pituita in hominibus crescit, & dulcis sanies  
 sanguinis, usq; ad uergiliarum ortum, eoq; tunc maximè  
 succosa acriaq; assumi debent, corpus exerceri, & uenus. Sunc  
 autem ad usq; uergiliarum ortum dies sex & quadraginta.



*Vergiliarum exortus.*

**H**Oc tempore bilis amara augetur, amaraq; sanies, usq; ad æstiuum solstitium, dulcia omnia tunc quæ aluū moueāt, conueniunt, uenus quā parcissimè exercenda, hinc ad solstitium æstiuum dies quinq; & quadraginta existunt.

*Solstitium æstiuum.*

**H**Oc anni tempus atram bilem ad usq; æquinoctium autūnale promouet, quapropter aqua frigida atq; odoratis omnibus utendum est: uenus perniciofa: aut innocentius saltem quæ de ea præscripsimus adhibeto. Porro sunt ad æquinoctiū autumnale, dies tres & nonaginta.

*Æquinoctium autumnale.*

**H**æc anni pars pituitæ copiam generat, tenuesq; defluxiones, donec uergiliæ occidant. Conuenit igitur tunc humores ex capite elicere, atq; acerrima, maximeq; succosa assumere, uomitum rarissimè citare, exerceri, atq; concubitū uitare. Numerantur ad uergiliarum occasum dies sex & quadraginta.


*Vergiliarum occasus.*

**H**Oc tempore pituita ad usq; solstitium hyemale in hominibus redundat, quam ob rem acerbissima quæq;, unum suauissimum, assumere oportet, pinguiibusq; uti & exercitari. Sūt autem ad solstitium hyemale dies quinq; & quadraginta.

FINIS LIBRI PRIMI IOANNE

GVINTERIO ANDERNACO

INTERPRETE.








PAVLI AEGINETAE  
LIBER SECVNDVS,  
DE FEBRIBVS.

IOANNE GVINTERIO

*Andernaco Medico Interprete.*



CAPVT I.



**B**SOLVITIS de ualitudine tuenda  
præceptis, exequi aggrediemur, quo-  
modo eos, qui morbis iam cōflictātur,  
restituamus, à similaribus utpote sim-  
plicioribus morbis exorſi. quales nīmī  
rum sunt, quos febriles appellant. Rur-  
sus igitur nos Oribasij cōpendio, qđ  
ex Galeni sanè potissimū, & aliorum  
præterea complurium cōmentariis est  
excerptū, utentes paucula quoq; ab illis omiſſa adiungemus.

*Quot & quæ principalia in morbis potissimum fe-  
brilibus perquirend.* Cap. II.

**P**Rimū quidē perquirere cōuenit, morbus salutēne, p-  
mittat, an mortē mineſ & si polliceat salutē, utrū acutus  
sit, an lōgus. Hæc sanè ī aliis quoq; magnis affectibus cō-  
modè quærunť. Tertiū quoq; nūquid una uice crisi expertu-  
rus, qđ febrib⁹ potissimū peculiare est, an particulatim soluet.

*Ex Galeni commentarijs, quale morbi princi-  
pium dicamus.* Cap. III.

**N**Eq; enim capitis dolores & febris idē existunt, quē ad-  
modum neq; uigilia, & cibi fastidiū totiusq; corporis  
grauitas, aut sensus lassitudinis: uerūm unūquodq; ha-  
rum



rum licet à febris sit diuersum, ipsam tamen denuntiat. porro febris inuadens, praesertim acuta, neq; nos potest, neq; imperium aliquem latere. Sed finge, si placet, etiam latere, miraculum tamen iudicauerim, si hora amplius ægrum subter fugerit. Quamobrem illud tempus morbi esse principium dicemus, quo manifestò febricitare incipientes decumbant.

*Vnde cognoscendum, morbusne sit sanabilis, an perniciosus. Cap. II II.*

**L**ethales notæ sunt, facies cadauerosæ, nares acutæ, oculi cõcaui, reliquaq; ab Hippocrate cõmemorata: si hæc neq; ex uigilia, neq; euacuatione, neq; inedia acciderint. Itē in p̃p̃inquo mors est, si ægri lumē refugiūt & illachrymant, nō ex quadā à foris accidēte causa, neq; tñ oculis peculiari uicio obnoxiiis. Adhæc si alter ex his minor appareat: quæque in ijs alba esse debēt, rubescāt, aut liueāt, aut nigricēt. Aut si pituita ipsis inhærescat, perq; somnū alba oculorū appareāt palpebris extrorsum nō cõmissis, nisi ea larga uacuatio expresserit, aut ex cõsuetudine ipsis hoc acciderit. Iā illa mortis sũt indicia, dētibus stridere, aut desipere, aut in ueste floccos legere, aut festucas carpere. Attendēdumq; , est ad in cubitū: nā si æger supinus cubat, & ueluti resolutus, uel si etiā deorsum à lecto ad pedes delabāt, extremā imbecillitatē fateretur. Multo adhuc peius est, frigidū spiritum ex naribus, & ore elidere: itē pulsus languidus creberq; , & deficiēs: item si æger ad animi deliquium sudore digeratur, perniciem præfagit. Si igitur omnia, quæ retulimus indicia, aut plura ex his appareant, aut etiā pauciora, sed ualida, nullumq; salutis argumentū affulserit, periculum mortis inuitabile signat. Cōtra spirandi facilitas, pulsus uegetior, mēs, sibi cōstās, bene erga cibū oblatum affici, adhæc facies iacentisq; habitus, sani similis, bona indicia sunt, & salutaria. In uniuersum quæ à naturali habitu maximè abhorrēt, pestifera sunt. quæ uerò ipsi respondent, salutaria. Cæterū præsigna ex urinis, deiectione, & sputo, paulo post exequemur.

*† De signis longæ uoletudinis. Cap. V.*

**Q**uatuor notis morbi dignoscūtur: ipsorū motu, ægrø tantis habitu, pulsu, febriū specie. Motu quidē in eummodum: si quatuor particularis accessionis tempora, ocyus & breuissimo spatio inuaserint, peracutus erit affectus, cuius



eius extremus terminus est. Septimana, magna uerò ex parte quarto die crisi experitur. At si longius quidē quā hic affligerit, sed duodecim horarū spaciū nō excedat, acutus prædicē qui intra quartūdecimū diem potissimū iudicā, si uerò in plures horas prorogetur, ut initiū dūtaxat, & incrementū longiore tū diei, tū noctis tēpore absoluat, talis morbus longus existit. at si particulares accessiones morbus nō habeat, sed inde ab initio ad usq; finē cōtinuet, tanquā una sit accessio, ueluti in continuis, etiā hunc nimirū acutis adscribes. Aegrotantis habitus hoc pacto deprehēdūtur. Si quidē facies, & totū corpus reliquū collabat, acutū morbū prælagire est. Si prorsus nihil emacrescit, longus erit. quippe copia materiæ longiore spatio cōcoquenda signat. Ex arteriarū motu ita diuineris. Magnus pulsus, uehemēs, citatus, creber, acutū morbū indicabit, prius, longum. A febriū specie hunc in modū, quatenus calidæ & urēres, acutum signant morbū, mitiores autē & ueluti delitescētes, diuturnū.

† Hic titulus sic legitur in uetusto Cod. πῶς ἐξαγγινώσκωμεν ὁξύ καὶ χρόνιον νόσημα, id est, de signis acuti & longi morbi. Qui quidem titulus huic capiti maximè conuenit.

*Quomodo præsciemus, an morbus iudicium subiturus soluendusue sit.* Cap. VI.

**H**oc quoq; præscire licet ex ijs quæ modo sunt nobis dicta, nempe ex febrium specie, & tempore. Forsan autem totum ex febrium specie. Siquidem calidæ, & perurentes, breui finiuntur, & excretionibus solui solēt. Mitiores, leuiorēsq; prorogantur diutius, & in abscessus magna ex parte erumpūt. Hinc liquido constat, non solum quādo morbus soluetur, sed etiam quo pacto, acuti enim potius per excreta iudicantur: quemadmodum rursus longiores, per abscessus.

*De diebus decretorijs.* Cap. VII.

**D**ierum decretoriorum alii de ægris frequenter, cum fide, salubriter, perfectè, manifesto, & insigniter iudicant, alii contrario his modo. Tertius decimus medium quendam inter utrunque dierum genus ordinem habere monstratus est. Ac sunt ex ipsis, qui uel exiguum naturæ impetum nactim de morbo possunt decernere: quemadmodum septimus, & quartus decimus: pleriq; uerò, nisi in uehementibus naturæ moribus, morbos neutiquā possunt per crīsim soluere.

Verūm



Verum nec uniuersi boni, simili inter se modo boni sunt: nec oēs mali, pari rōne sunt mali. item nec certo ordine bonitatē malignitatēque obtinent. Qui igitur primi sunt ordinis, nēpe bonorū numero cōprehensi, hunc in modū se habent. Præstantissimi oīum iūnt, septimus, & quartusdecimus: mox nonus, undecimus, & uigesimus: deinde decimusseptimus, & quintus. hos sequitur quartus, post hūc tertius, & decimusoctauus. His cōtrarij, ad secundū ordinem referūtur: pessimus, quiq; cū periculo, nec clarē de morbis iudicat, ac ueluti ex aduerso septimo diei opponitur, sextus est. Huic cōsimiles, octauus, & decimus: secundū quos duodecimus, sextusdecimus, & decimusnonus habētur. Medius horum est, & tertiusdecimus, nec ita repudiandus, sicut ordini secundo ascripti: nec tā feliciter morbum potest soluere, quā qui ad primā classē pertinet. Atq; hoc dignitatis ordine Galenus est usus. Numerorū uerō ordine boni sunt, tertius, quartus, quintus, undecimus, quartusdecimus, decimusoctauus, uigesimus: mali autem sextus, octauus, decimus, duodecimus, sextusdecimus, decimusnonus. inter hos medius consistit, tertiusdecimus: Porro ex his decretoriis nōnulli quoq; aliorum sunt indices, quos Hippocrates appellauit speculatorios, eō qd iudicia alio die decretorio futura prænunciēt contemplandaq; exhibeant: exempli gratia, quartus, iudicium septimo die futurū præmonstrat: dum uidelicet sudores quosdam, aut madores, aut eiusmodi particulares uacuationes molitur, aut significationes prius nō factas, aut concoctionis notas repræsentat. Iam uerō Galenus etiam sexti, licet nō boni, quartum esse iudicem asserit. Undecimus quartidecimi index est, septimusdecimus autem, uigesimi. Itaq; ad quartūdecimū usq; diem ualentissima de morbis fiunt iudicia proximē succedunt, qui usque ad uigesimum habentur. Qui post hunc ad usque quadragesimum porriguntur, paulatim uehementiā remittunt. Primæ dignitatis sunt, uigesimusseptimus, trigemusquartus, & quadragesimus. Hos sequuntur, uigesimusquartus, trigemusprimus, trigemusseptimus. Qui uerō dies reliqui à uigesimo ad usque quadragesimum intercedunt, omnes iudicii sunt expertes. Sicut qui post quadragesimum habentur, omnes prorsus elanguescunt, concoctione potius & abscessu, quā crisi morbū finientes. Atque alios quidē à quadragesimo die Hippocrates omnino negligere uidet, sexagesimi uerō,



uerò, octuagesimi, centesimi, & centesimi uigefimi rationem habet. Ab his deinde alios morbos septem mēlibus, alios septem annis, alios, ut uerisimile est, duobus & tribus annorum septenarijs iudicari tradit.

*Decretoria indicia in morborum principio esse praua.* Cap. VIII.

**C**oncoctionis signa nunquam sinistrè apparent. quippe omnis concoctio, naturæ uincens opus est, eoq; semper securitatem pollicetur. Decretoria uerò signa aliquando incommode apparent, propterea quòd crisis ipsa ambigat, nunc bona, nunc mala contingens, uti prius in capite de iudicatorijs diebus est comprehensum. Neque igitur per initia, neq; in augmento ipsa commodè apparent, sed ubi morbus inclinauerit, quo tempore natura morbo ualentior est.

*Quemadmodum futurum iudicium prænoscendum sit.* Cap. IX.

**S**i accessiones urgeant, præueniantq; tempus consuetū, & multo fiant uehementiores, ac tertio quoq; die significationem sui præbeant, tum concoctionis signa in urinis, aut deiectionibus, aut sputis cernantur, sine mora plane morbus iudicabitur. Sin accessiones lentè moueantur, eademq; hora inuadant, ac quotidie affligant, longiore tēporis spatio interposito morbi solutione expectabis. Itē ijs qui ob rigores uehementer febricitāt, fieri nō pōt, ut morbus ante soluat, q̃ illi fuerint leniti. si. n. rigor nihil remittat, haud quaquam morbus ad statum peruenerit, multoq; minus inclinatio ipsius speranda est.

*Quomodo instans morborum iudicium agnoscat.* Cap. X.

**A**n te quamlibet iudicationem ægrotus grauiter excrucietur. Atque si inter diu illa continget, noctu affligitur: si per noctem futura est, interdum exagitur. Ac superueniunt symptomata, utpote capitis dolor, quē prius non sensit, præterea collum simul dolet, præcordia sursum conueluntur, spirandi quædam difficultas repentina oritur, aliaque graua accidentia, quæ superiori tempore non percibebantur, apparent. Atque his obuenientibus, si pulsus non concidant, sed sublimius atollatur, uehementioresq; fiant, adhuc si dies decretorius



decretorius indicetur, isq; potissimum ex illorum ordine, qui probè decernunt, non iudicium modo futurum, uerum saluti-ferum quoq; expectato. Neq; de terrere in his te debet, si ægrū delirantem, exilientē mve conspicias. Etenim & hæ succorum ad superiora tendentium notæ sunt: sicut è diuerso inferiora pe- tentium, aliæ, puta imi uentris rosio, circa umbilicum tormina lumborum dolor, uentris murmuratio. Est cum alia quoque in- dicia consimilia deprehenduntur. Adhæc si per hæmorrhoidas uacuari laborans consuevit, etiam huius uacuationis circuitus unā incidit, repetitq;. Pari modo in menstruis, si mulier est quæ laborat, † non absurdum fuerit per talem uacuationem mor- bi fieri iudiciū. Iam sudores tum ex corporis madore qui præ- cessit, ut uerissimile est, & præsertim in die contēplatorio erum- pentes, tum ex meatuum adapertione prænoscenti sunt. Ac- quæ per superna uacuationes futuræ sint, ex his maximè intel- ligas licet. Nam præter ea quæ iam nobis sunt exposita, etiam ægrotantis facies intuenda est. Item si qua partium ipsius pal- paret, aut uenæ in temporibus pulsant, aut gena, aut nasus, aut oculus rubicundior appareat, maior spes uacuationis per superiora futuræ subest. Quod si etiam sine uoluntate illachy- ment, aut splendores oculis obduci imaginentur, ac naribus ue- luti scabendi studio manus admoueant: tunc quidem non am- plius morari, sed iam adesse fluore sanguinis uidebis. Vbi enim semel ac iterum scaberint, erumpit. Rosio uero stomachi, & la- bri inferioris tremor, trisim per uomitiones futuram subinde nuntiarunt. Atque de his abundè est. Accedit ipsis, ægrotantis ætas & natura, quæ spem nostram confirmant. præterea anni tempus, & præsens aeris status. Nam si æger adolescens est, aut alioquin naturæ calidæ, aut sanguinis copiosi compos, multo magis sperandum est. Quod si etiam antea, uel æger, uel sa- nus, ut supra dictum est, uacuationem sanguinis expertus fue- rit, hoc uel solū ad profundendi sanguinis spem exhibendam satis est. Iam uerò si anni tempus æstas est, aut si non æstas, cer- tè calidus aeris status, ac sæpè illo tempore per sanguinis pro- fluxum crism sustinuerunt, corpusque sanguine redundet, quod πλεωσικόν nominant, & consuetarum excretionum sic retentio, hæc quoque spem tibi auxerint. Similis porro, & in reliquis uacuationibus ratio habenda est. At si horum nihil ap- paruerit, sed æger in aliquo decretoriorum, qui post uigesi- mum



num maximè sunt, dierum grauitèr morbum ferat, idque cum consistit, ac dolores quidam in articulos aliquos decumbant, aut iuxta aures, alias ve particulas hereant, aut dolores quidem minimè infestent, uerum sudores, particulares continuè ex particula quadam erumpant, per abscessum crissim excipere oportet. Ac in illa potissimum particula abscessus se promet, quamcunque uel sudores, uel dolores, uel tumores exerceant.

† Hæc ita leguntur οὐδὲν ἄτοπον διὰ τῆς τοιαύτης κενώσεως προσδοκᾶν γίνεσθαι τὴν κρίσιν. i. non absurdū fuerit per talem uacuationem expectare morbi solutionem: sed hæc leuia sunt.

*Quemadmodum optimum iudicium peractum agnoscamus.* Cap. XI.

**S**I uacuatio competens post concoctionem accidat, & febris crissim experunti soluator, ægerque alijs liberetur accidentibus, & coloratio euaserit pro uacuationis ratione, pulsusque uegetiorem acceperit, ac tum insurgendo, tum sese erigendo fortior sit redditus, quodque omnium securissimum est, si ad morbum ferendum facilitas subsecuta sit, ea sanè laudatissima iudicatio habetur. Quod si horum aliquo deficit, tantum ab optima abest, quantum id ualeat, quo deficit.

*De pulsibus ex Galeni commentarijs.* Cap. XII.

**P**ulsus motus est, quo cor & arteriæ attolluntur, submitunturque. Pulsus ipse duplex est. Et enim eleuatione Græci Διαστολὴν appellant, qua arteria ueluti explicatur quodammodo, ac patescit, frigidus aer ingreditur, uitale robur euentilans recreansque ex quo etiam animalis spiritus habet originem. Submissione, συστολὴ Græcis uocatur, qua arteriæ extrema ad medium sui confidunt, conuicentque, fuliginosa recrementa expelluntur. Cæterum hæc arteriæ, oblonga sunt uasa, uenarum modo concava, sed duplici tunica muniuntur, tum prædicti motus gratia, tum quod sanguinē, spiritumque continent. Originem trahunt ex corde, sed per totum corpus membratim distribuuntur. Omnes igitur, & eodem pulsandi modo inter se, & cum corde conueniunt. Quamobrem ex una ipsarum, omnium rationem queas colligere, nō item omnium ex æquo motum percipere. Sed earum quæ ex carnes corporis partes



partes perreptant, promptios quæ carnosæ subsunt, obscurius. Porro ijs quæ per brachiale excurrunt omittis, nullam, aut congruentius, aut usu commodius attigeris. Primum pulsum genus ex motus tēpore sumitur, ut quod eleuatione arteriarū, atq; submissione examinetur. Differentiæ ipsius sunt, citatus pulsus, tardus, & mediocris: quoniam omne quod motui est accommodatum, aut celeriter, aut lentè, aut mediocriter pro temporis ratione mouetur. Citatus est, qui exiguo tempore multum spatij motu emetitur. Tardus, qui longo tēpore, paruum interuallum perficit. Mediocris, qui medium quendam motum inter citatum & tardum, peragit. Alterum genus diastoles quantitate constat. Quoniam enim quodlibet corpus tria sortitur interualla, longum, latū, profundum, arteria autē corpus etiam est: ipsam quoq; tribus constare interuallis, necessum est. Verū in naturali animantis habitu, mediocriter ipsam undequaque eleuari reperiēs. Contrā, cum animal præter naturam habuerit, nonnunquam in aliqua horum distantia deficit, aliquando excedit. In quo statu, meminisse conuenit, qualis pulsus naturalis fuerit. si latitudine maior inueniatur, latum uocabis. si longitudine, longum, si profunditate, sublimem. Liquet autem contrarios quoque ipsis, & naturali minores, ad eum esse modum appellandos, arctum, breuem, & humilem. at inter eos qui omni distantia æqualiter in statum naturæ contrarium uertuntur, quicumque hac ratione immutatus est, paruus: quicumque auctus, magnus nominatur. Tertium genus pulsum, ad uirtutis robur exigitur. Differentiæ ipsius tres sunt, uehemens, languidus, & mediocris. Vehemens quidem est, qui tangentis manum ualide percutit. Languidus, qui inualide, & imbecilliter. Mediocris, horum medio consistit, quem nonnulli naturalem esse putauerunt. Nam ira & exercitijs uehementiorem fieri pulsum asserunt, qui à naturæ habitu recedit, quorum dictis Galenus uenit obuiam, non constantem inquires, sed promptè mutari eum pulsum, qui ex causis non naturalibus uehementior euadit. Pulsus igitur uehementior, qui non expeditè mutatur, is nimirum naturalis, & moderatus fuerit. Quartum genus, instrumenti constitutione constat. dico autem arteriæ corporis statu. differentiæ huius quoque tres sunt. Vel enim instrumentum durius est, quē natura exigit, ac pulsus uocatur durus. Vel mollius,



lius, ac nominatur mollis. Vel mediocriter habet, ac moderatus inde nuncupatur. Quintum genus, ex quantitate humoris infusi arteriæ pendet. Hæc habet discrimina. Plenus est, uacuum, & mediocris: quoniam totum uas, aut plenum est, aut uacuum, aut mediocriter repletum. Plenus itaque est pulsus, ut Archigenes definit, qui arteriam pleniorē repræsentat, & occursum eius humiditate plenum, uacuum qui ætis modo arteriam excitat, ut digitorum impressione loci inanitas occurrat. Hæc igitur quinque pulsuum genera, uno arteriæ motu constant. quoniam uerò caloris, qui in corde habetur qualitas, ex arteria quodammodo magis euidenter apparet, dignati sunt quidam etiam hoc pulsuum genus Sextum commemoratis an numerare. Ad reliqua uerò genera, tum quæ ex uno, tum quæ ex multis pulsibus sumuntur, pertinet quod quietis tempore constat, & quod rhythmo & quod æqualitate, & inæqualitate, insuper quod ordine & inordinatione constituitur. Quod itaque quietis tempus spectat, Septimum à primo numeratum diuiditur in frequentem, & rarum, & moderatum. Nam cum arteria duplici ageretur motu, qui ex contrarijs constat particulis, necesse est ut duplex quies cum ipso coincidat. Altera quæ post eleuationem, ante submissionem est: altera quæ secū dum submissionē, eleuationem præcedit, quæ etiam quies plerisque imperceptibilis esse uidetur, ut inter duos motus quies aliqua media existat. Cui itaq; longum quietis tempus est, is rarus dicitur: cui breue, creber: cui mediū, moderatus. Octauum genus pulsū ad rhythmū pertinet. Est autē rhythmus summam quidem dispositio, aut temporis ad tempus proportio. In pulsū autem, secundum nonnullorum sententiam sanè, temporis motus, ad quietis tempus, ut eleuationis, & submissionis, ad aliquam quietem interpositam. Secundum aliorū uerò opinionem temporis motus, & quietis, ad motus quietisque tempus, aut motus ad motū, nempe eleuationis ad submissionem, aut quietis ad quietem, puta interioris ad exteriorē proportionem. Differētia rhythmī principes sunt duæ, pulsus boni rhythmī, & nullius rhythmī. Porro uocatur pulsus nullius rhythmī, num qui nullum rhythmum obtinet, id. n. fieri non potest, sed malo rhythmō præditus, quemadmodum nullam habere uocem nullam ceruicem, cum dicimus qui malam ceruicem malamque uocem sortitus est. Cæterum pulsus cui nullus rhyth-

PAULI AEGIN.

e mus



mus adest, triplex differentia existit. Alius siquidem est pararhythmus, mediocrem boni rhythmī peruersionem obtinens. Alius heterorhythmus, id est, alterius rhythmī, qui longius à bono recessit. Alius ecrhythmus, qui omnino bonitatē rhythmī corrumpit. Veluti cum puer significatur, peculiaris quidē puerili aetati secundum rhythmū pulsus eurhythmus appellatur: qui ad uigentē aetatem pertinet, heterorhythmus: qui nihil huius seruat, ecrhythmus dicitur. Nonum pulsum genus est, quod in omnibus praedictis inuenitur aequalitate & inaequalitate cōstans, quod uel in uno pulsu spectatur, uel in pluribus id quod à collectione plurium, systematicum quoque uocant, de quo prius tanquā manifestiore dicendum erit. Aequalis itaque pulsus est, qui consequentia par est siue magnitudine, siue robore, aut uelocitate, aut reliquorum aliquo, aut etiam omnibus. Inaequalis, qui consequentia impar est. Si enim subsequentes uniuersi pares magnitudine qualicunque inciderint eiusmodi pulsus aequalis uocatur. At si primus, secundus, & tertius pares fuerint, quartus autem impar: talis nimirum magnitudine inaequalis dicitur. Huius generis sunt, & deficiens, & coincidens. Non solum enim post unū aut etiam plures magnos unus minor apparet, sed nonnunquā totus quoque motus omnino aboletur, & pulsus deficiens appellatur, sicut alter huic contrarius coindicens, cum expectata quiete in medio tanquā superuacaneus aliquis pulsus inciderit. Sin autem secundus primo paulo minor factus sit, tertius secundo, & quartus tertio pari modo, idque deinceps longius, illiusmodi pulsus myurizontas & myuros nuncupant, nomē à figuris, quae in mucronem definiunt transferentes. Qui quidem perpetuo, ex ipsis immutuantur, ac nunquam decrescere cessant, in absolutam motus defectionem finiunt, ac uocamus ipsos myuros deficientes. Qui uerò cessant, duplici continentur differentia. Nonnulli siquidem ipsorum in qua primum defierant paruitate, hanc perpetuò conseruant. Quidam uerò augescunt rursus, uel in parem priori magnitudinem redeunt, uel ad minorem, uel ad maiorem, ij myuri recurrentes dicuntur. Iā uerò & in unius pulsus inaequalitate myuri pulsus fiunt, de quibus suo loco paulo post tractabitur. Huiusmodi sanē quaedā est pulsum inaequalitas, quae systematica appellatur: Atque uno in pulsu depræhenditur, uel in una arteriæ particula, uel in diuersis accidit. quem  
admodum



admodum in motu, exempli gratia, in una quidem particula arteriæ inæqualitas dicitur, cum aliter inceperit, ac aliter deficiat moueri circa unum digitum arteria, incipiens quidem citior, desinens autem tardior, uel è contrario. Atq; hoc triplici modo accidit, uel motus continue manet, uel intercedit, uel repetit, & ueluti bis percutit. Si igitur manens continuus & non intercisus, à celeritate ad tarditatem transierit, aut è contratio, impar citatus græcè *χυσταχύς* eiusmodi pulsus, & est, & dicitur. Quòd si quiescat, & quiete interpollata postmodum uelocior appareat, Caprizans appellatur, ex capra animatè sumpta translatione, quæ saliendo sublimis in aere consistit, & secundū quendam motū inopinatum priore citationē molitur. Porro si ab eleuatione recurrerit, & ante submissionem absolutam, secundo manum tangētis ferierit, dicrotus huiusmodi pulsus appellatur simile quippiam in incudibus fieri cernas licet, quippe mallei, simulatq; semel manu in ipsas incusseris, reciprocatur, incudum renixu, & secundū rursus, uel etiam terciū feriunt. At qui non solū inæqualitas quæ uno ictu in eademq; arteriæ particula accidit in motus tēpore, potest fieri, uerū & illa quæ uirtutis robore cōstat: nō autē ea, quæ distantiarū quantitate comprehenditur. Nullo n modo idem pulsus eadē in particula magnus & paruus queat effici: neq; in alio genere, sed in diuersis particulis. porro in uarijs arteriæ particulis unoq; in pulsū duplex fit inæqualitas nunc quidē cum motus manet continuus, & arteria iuxta quosdam digitos citius mouetur, iuxta quosdā uerò tardius. nunc autē cū motus quoq; interceditur, ut nonnulli quidem digiti motū apprehēdant, nonnulli uerò nō. Ac iuxta eleuationis quantitātē in pluribus quidem particulis inæqualitas manifesta est. Ex quo genere sunt myuri uno in ictu inclinantes, quos Græci uocant *ἐπιεευκότες*, & *περνευκότες*. Si namq; interna digiti parte magnus occurrit pulsus: & curuatus inde iuxta rationē minuitur, ut in exteriorē quæ ad ægroātis pollicē spectat arteriæ parte, minimus idem appareat, myurus uocatur ad muris caudę similitudinē, uel meiurus q; caudę modo imminuatur. At si iuxta medios digitos magnus occurrat, curuatusq; utrobq; minuat, minor apparens, hūc Archigenes *περνευκότες* quasi dicas latinē inclinātē, & *περνευκότες* appellauit, manifesto significare uolēs eleuationis breuitatē, cū extremorū utrorūq; ueluti inclinatione. Nō. n. ut abscisis uniuersim



ac subito, utrinque partibus, sed ueluti inflexis in arcum contractus est, utpote myurus, hoc est imminutus magnitudine utrisque in partibus. Ac cum secundum magnitudinem inaequalitas, id quod maturius est, aut tardius, assumpserit, tum undosus, tum uermiculantes, pulsus oriuntur. quod si id quod in situ est, acceperint, conuulsorij & turbulenti, ut uocant, constituuntur. exordiendum igitur est ab undosis, in quibus non simul apparet in tali inaequalitate arteria omnis eleuari, sed pars illius alia primū, mox alia, dein alia, postremo quarta, ut motus continuus maneat in modum undarum sese eleuantium. ac nonnulli undam in rectum tendentem obtinent. quidam in latus inclinantem, & alij in breui longitudinis distantia, altitudinem magnam habent, alij contra, aliquid latitudinem, aliqui angustiam. Similiter etiam celeritate & robore inaequales sunt. Undosus totus in paruitatem cessans, uermiculans appellatur, uermis gressui assimilatus. Quemadmodū uerō undosum pulsum minorem factū uermiculans excipit, ita uermiculantē formicans ubi motibus multis abolicis in unum eundemque per quam exiguum defierit. Vocatus hic quoque est à formicæ animantis similitudine, tum ob paruitatem, tum ob motus speciem. Est. n. formicans admodum exiguus, ut quo minor alius non extat. Pari modo languidissimus omnium creberrimus non tamen citatus, ut Archigenes existimauit. Huic confinis est Hecticus. quemadmodum enim febris, sic etiam pulsus Hecticus est, qui nullam magnam mutationem subit, sed perpetuo consimilis manet, trahitque ut ab initio incepit, & nunquam soluitur, toto habitu in morbum cōuerso. Porro conuulsorij pulsus utrinque ab extremis sursum retrahi, tendi, & conuelli uidentur, ceu chordæ cuiusdā tensæ sensum præbeant: at in turbulenti nihil tale reperitur. Sed maior in his eleuatio est, ut arteriæ particulæ quædam sursum ferantur, uno eodemque tempore, ac motum ipsarum spiculis rectissime assimilaueris: quæ ualidius emissæ, celeriter feruntur uibrata. Serratus pulsus est cum alia pars arteriæ elata, alia minus, ob duritiem nimirum ipsius esse uidetur. Cæterum pulsus hic est turbulenti quippiam possidet, ac citatus quidem est, creberque, non semper autem magnus. Decimū genus pulsuū ex inaequalitate profectū cōmemoratis succedit, quod ordine, & in ordinatione cōstat. Nam ordinatus & inordinatus inaequali in circuitu paritate: & prorsus imparitatem diuiso, ex utraque  
sectione



sectione originē trahunt. Ex circuituū paritate ordinatus: ex absoluta uerò imparitate inordinatus etenim pulsus æqualis omnino est etiā ordinatus, siquidē subsequētia parem ipsū dicebamus: inæqualis autē non oīno inordinatus est. Si nanq; paritatē corrūpat, circuitū uerò seruet aliquē, ut in eleuatōnis quātitate, uerbi gratia, si duo magni, & unus paruus sit: deinde rursus duo magni, & unus paruus, atq; sic deinceps, uocabitur inæqualis quidē, sed ordinatus. At si præterquā quod paritatem corrūpat, ne ordinē quidē aliquē inæqualitatis cōseruet, cū inæqualis tū inordinatus talis est: similiter in aliis quoque generibus se habet. Inordinatorū quidē, alii sunt ex toto inordinati, ne uel exigū quendam circuitū cōseruantes, alii uerò secūdu circuitus ordinati. Quatenus. n. cōtinuam ordinationē nō habēt, inordinati uocabūtur: quatenus autē diu circuitum quendā tuentur, secūdu circuitus, ordinati uocari queāt. Exempli gratia, si contingat duos magnos fieri, duos item paruos, deinde tres magnos, & tres exiguos: quatuor magnos, & pares exiguos, & rursus tanquam reflectentes duos magnos, & duos exiguos: tres magnos & totidem exiguos: & deinceps similiter. scire uerò conuenit, inter alios quidē contrarios singulos, quēdam esse medium. Aequalis autē & inæqualis mediū nullum, neq; ordinati, neq; inordinati: nisi uoles secūdu circuitus ordinatum medium dicere ordinati & inordinati. Cæterum aliorum omnium mediū, secundum naturam sunt, præterquam uehementis & languidi, ut à nobis ostensum est. Inter hos autem æqualis solus secūdu naturā est, reliqui præter naturam, inæqualis ordinatus & inordinatus. Hæc pulsuum genera uniuersa sunt, & generales ipsorum differentiarū. Nonnulli uerò his etiā alia duo annumerarunt. Primum à situ arteriæ sumitur, quatenus sursum, deorsum, dextrorsum, sinistrossum deducta esse uideatur. Alterū quo maturius, aut tardus: ex quorum numero undosos turbulētosq; pulsus esse diximus, ac nos compendii gratia simplices solum differentias prodidimus, ex dictis autem si coniungamus has facillē erit etiā cōpositas inuenire. † Porro opportunum erit deinceps, causas quoq; pulsibus conuenientes exponere, quas comitatur etiam præfagiū ab ipsis desumptum, ac initium à magnitudine capiemus, quoniam hæc aliis est manifestior. Magnus igitur pulsus redditur, uel propter usum urgētē, qui calor est in corde exuperās, externæ



appetens refrigerationis, & ueluti euentilationis, aut propter corporis gracilitatem, ut posterius ostendetur. Porro augetur calor, ut ex causis naturalibus, utpote ætate florida, aut puerili, aut simpliciter calida, anni tempore, regione, & temperamento calidior. Aut causis non naturalibus, ueluti aëre qui nos ambit calidior, balneis calidis, exercitiis, cibis uino, medicamentis calfacientibus. Aut causis naturæ contrariis, puta intemperie calida, aut humorum putredine, aut ira, aut similibus. Discernes uniuscuiusque pulsus hoc discrimine, quod causæ naturales magnitudinem ipsius faciunt stabilem, & quæ difficulter mutari queat. Reliquæ uerò, ex facili mutabilem, ut etiam manu adhuc admota frequenter, aut certè paulopost subsidat. Iam uerò pulsibus, qui sane ob balineas calentes magni sunt, mollietates quoque accedit, quemadmodum iis, qui ob calidam & præsertim cum siccitate intemperiem magni existunt, durities. Exercitatis uerò mediocriter, aut perfrictis, nec duri, nec molles sunt, medio statu præditi. Pectoris autem regio, multo calidior est, quod iam & iratis accidit. Ex cibo autem magnis, aut uini usu, aut ita, præter magnitudinem etiam uehementia inest. Qui uerò occultare iram student, aut aliud quid præter medici permissionem factum, uerbi gratia medicamen calidum sumptum, eundem medicum simulatque manum attingat, interrogantem celare uolentes, iis præter magnitudinem manifesta quoque oboritur inæqualitas. Ad hæc ægrotantis mores & consuetudo non mediocriter ad pulsus dignotionem faciunt. Consuetudo quidem, si medicaminum appetens sit si & iudis mores, si opinionis eximendæ peritus & calidus sit. Ex humorum putredine magnus, ad magnitudinem adhuc submissionem magis citatam habet. Verum ad magnum pulsus efficiendum, non solum usus abundè est, sed etiam uirtutis ministerium desideratur, instrumentique commoderatio inter siccitatem & mollietatem. Aucto igitur cordis calore propter quālibet causam ex commoratis, primum quidem magnus pulsus efficitur: ubi uerò magnitudo usui non suffecerit, statim etiam celeritas ipsi accidit. At si ne sic quidem satis fuerit, mox frequentiam assumit, parui autem, tardi & rari pulsus, itidem à contrariis fiunt. Sed quādoque à magno citato & crebro ad contrarios fit mutatio, usu nimirum postulante, non amplius id quod in pulsu primum factum est, id etiam primum cessat, uerum quod postea acquisiuit, id primum



primum abiicit, statim quidem rarus euadēs, deinde tardus, postea quoque exiguus. Sin autem tarditas prauitasque accreuerint, è contrario raritas in crebritudinem trāsmutatur, ut per eam utcunq; usui fiat abundē. Hæ igitur magnitudinis, celeritatis, frequentię, & contrariorum ipsis pulsum causæ habentur. At iungetur ipsis ea quoque pulsus immutatio, quæ una solum distantia constat. Itaque latitudo sola augetur, dum humiditas potissimum, uel secundum naturam, uel etiā ab exterioribus causis redundat, quemadmodum sublimitatis pulsus ob instrumenti mollitiem uirtute ad hoc opitulante, longitudo à siccitate, & carniū circumpositarum emaciatu palam efficitur, reliquis distantijs collapsis. Non enim arteria longior, quā postulat natura fieri potest, ac propriè magis pulsum huiusmodi gracilem appellaueris, quemadmodum ipsi contrarium secundum latitudinem solam, & profunditatem adauctum, amplū. Contrariis autem horum affectibus pulsus nonnunquam incidit, & in aliqua, aut aliquibus distantijs prohibetur, humilis, aut arctus, aut breuis apparens, cū talis non sit, sed ob pinguedinis cuiusdam, aut carniū, aut mēbranarum oppositarum crassitiem apparens. interim, etiā totus paruus uidetur, cum re uera paruus non sit, & languidus similiter. Quid opus est uerbis: sæpe absoluta pulsus defectio quibusdā esse putatur in omnibus arterijs, cum uerè non sit, & maximè ijs qui negligentius ipsum tangunt, sed cum motus ob carniū copiam delitescit, re uera obscurus existent, non enim extrema pulsus defectio homini potest accidere, quoad uita fruatur, quemadmodum igitur rursus in locis ex carniū, etiam parui pulsas, magni esse uidentur. Corpore itaque uehementer emaciato, arteria spinam perreptans, sæpe tangentibus abdomen, motum repræsentat, ac nonnulli etiam ex his, quæ prius in artubus nō erāt, conspicuæ. Quamobrem omnibus causis diligenter attendendum censeo, ne dignorio ipsorum nos lateat. Pulsus autem uehemens uirtutis robore efficitur, si nulla ex causis reliquis renitatur, utpote usus dissolutus, aut instrumenti durities. Languidus autem pulsus, imbecillæ uirtutis & solius soboles est, aliud licet nullum adfuerit. Si quidem uehemens omnibus causis ad sui generationem indiget, languidum etiam sola imbecillitas efficit. Qui igitur per initia uehemens est, ætates anni tēpora, regiones, & tēperamenta moderata comitatur,

c 4      languidus



languidus immoderata. Porro qui à languore in uehementiā incidit, uirtute uindicta ab imbecillitate prius occupante efficitur. Vindicatur uero, aut ex his quæ in ipso corpore continentur, ueluti humorum concoctione, uel excretionē uel ira: aut ad exterioribus, nempe uino, cibo, exercitijs, ac alijs quæ intemperiem corrigūt. Vires dissoluunt, inedia, uigiliæ, uacuationes immodicæ, tristitia, curæ & dolores, maxime animæ defectiōnem inferentes, ac omnia quæ intemperiem faciunt. Quidam uero ex rudibus ac in exercitatis, durum pulsum uehemētem esse putauerunt, quod discrimen exercitatum, tum ratione, tū tactu, nunquam latuerit. Nam uehemens magna ex parte cū magnitudine in sublimitatem attollitur, tactum ualidē percutiens: durus magnitudinem non recipit propter arteriæ contumaciam: fit igitur durus, ob instrumenti duritiem, quā refrigeratio immodica, aut siccitas, aut tensio ab inflammatione profecta, aut conuulsio generat. Statim uero duritiem etiam paruitas, & celeritas nonnunquam, & frequentia magnitudinis loco propter usum sequitur. Mollis pulsus, arteriæ humiditatis comes est, quam humidiores reddunt ex iis quæ secundum naturam sunt, humectiores cibi, balnea frequentia, somnus multus, uictus copiosior & animi oblectatio, ex his quæ præter naturam sunt, sopores, lethargi, aquæ subter cutem, & reliqua pituitæ uicia. Plenus pulsus, aut humorum copiā, aut ciborum, aut uini portionis abundantiam indicat, quemadmodum uacuum cōtraria, aut enim inediam, aut uacuationem. Vbi calidius arteriæ corpus occurrit, multam in corde caliditatē, reliquo corpore refrigerante, aut conuulsoriam quampiam arteriarum uiolento motu incalescentium, dispositionem faretur. Archigenes uero tradit arteriæ locum propriē in catochis calidiorem deprehendi, quemadmodum in iis, qui conuulsionem cum graui animi in somnum delatione quam caraphoram appellant. At rhythmus, de quo disputatum est, si par sit motu & quiete, probam totius corporis temperiem præsefert, quantum ad se pertinet, uel non magnam à bona declinationem, sicut in ætate puerili, & corporibus alioquin téperatis. Ac si longius quietis tempus fuerit eo quo motus peragitur, calorem præpollere notat, quemadmodum in ætate florētibus, & his proximis, ueluti igit in corporibus senilibus æqualiter frigidis, diuturnius motionis tempus est quam quietis.

Notare



Notare autem oportet rhythmum inæqualitatem mensuræ esse eius quæ celeritate & frequentia consistit. hanc autem ueluti materiæ rationem ad rhythmum obtinere. Iam uerò deficientes, coincidentēsq; pulsus fiunt, uiribus oppressis, & ueluti aggrauatis, sed coincidentes minorem offensam, deficientes maiorem significant, ac in uniuersum uirtus oppressa grauataque pulsus mutat ad inæqualitatem inordinationemq; tum aliam quamlibet, tum eam quæ uehementia & magnitudine constat. Ac ex myuris pulsibus genere duplicibus demonstratis (uel enim in systematica, ut uocant, inæqualitate, uel in ea quæ uno fit ictu, deprehenduntur) deficientes quidem extremam uirtutis internitionem notant, repetentes autem recurrentesq;, & ipsi quidem imbecillem, sed repugnantem adhuc resistentemque, & renuentem indicant, in uno autem ictu myuri & inclinantes, quos *περιεσπυκτός* uel *περιεσπυκτός* appellamus, maxime ijs fiunt, qui paulatim contabuerunt, inflammationibus non solutis, præterea plurimis quomodocunq; tabescentibus, dum partes quæ circa arterias habentur, emarcescunt. Porro inæqualiter citati & caprizantes, febriles potissimum calores comitantur: uerum si pulsus eleuationis principia dissoluens, extremum ipsius acceleret, & submissionis initium, putredinem exuperantem notat, natura fuliginosis recrementis excernendis incubente. Sin autem è contrario submissionis initium dissoluerit, ac eleuationem uero magis instet, calorem præpollere scias, qui refrigerationem desideret. Comitatur hæc in febricitate crebritudo plurima ex parte, interdum magnitudo quoq;, nisi uirtutem instrumenti duritia impediat. Cum autem hæc in arteria intenditur, & uirtus non sit inualida, pulsus fit qui à bis feriendo dicrotus appellatur. Porro undosus humidiores potissimum affectus sequitur, atq; his magis aquæ subtertum genus, quod Anasarca uocant, ite lethargos, & peripneumoniam. At cum uirtus dissolui inceperit, sed paululum adhuc resistat, undosus in uermiculantem decidit, ubi extremè collapsa fuerit, etiam hunc formicans excipit. Hecticus autem propriè contrabescentes & alioqui emarcescentes sequitur. Cōuulsorius fit, quā neruorū origo inflammatoria quadam affectione cōflicatur, sicut in phreneticis, & acuta epilepsia correptis, quando etiā moriuntur, adhuc calēres, qui hoc uitio sunt occupati, cōtrario his modo quos syncope inuadit, illi namq; uehementer



menter etiam frigidi, adhuc uiuūt. Turbulentus autem pulsus efficitur, cū uis magnā eleuationem requirit, ac uitale robur eam potest creare, solum uero arteriæ corpus præ duritie, in magnam attolli diastolen, ut in magnis inflammationibus, obstructionibusq; diuturnis, impotens refragatur. Pulsus serratus in totum index est inflammationis, & præsertim partium quarundam neruolarum: quinetiam pleuritidi peculiaris est: remittens quidem, leni & ex facili concoquendæ: intensus autem difficili, & concoctu peruicaci: quæ cum imbecilla quidē uirtute, subito in periculū præcipitat: cum ualida autem longo tempore concoquetur. Vel enim in uomicam transijt subinde, uel marcida tabes ipsam excepit. Iam uerò sciendum uenit, in ordinationem comitari inæqualitates. rarò siquidem inuenire est inæqualem pulsum, ordinatum. Minores offensæ, inæquales pulsus & ordinatos: maiores, inæquales & inordinatos procreant. Hæ igitur simplices pulsuum causæ sunt & præfagia. Ex his etiam compositas, ut in sermone de differentiis ipsorum dicebamus, haud negotiosum est inuenire.

† Rectior est hæc scriptura quæ in uetusto codice est. *ἐξ ἧς δὲ ἀντὶ λέγειν καὶ τὰ αἰτία τὰ τρέποντα τῆς σφυγμῆς*. Porro opportunum erit deinceps causas pulsuum immutantes exponere facile enim fuit librario scribere *πρέποντα* pro *τρέποντα*.

*De deiectionibus.*

*Cap. XIII.*

**A**luus optima est: mollis, coharens, & eodem tempore quo in secunda ualitudine afflueuit, reddita. Talis nimirum est quæ leuiter ruffa est, simul & cōuenienter spissata, nō nimis fœtida: quæ talis non est, mala censetur. Quæ igitur colore similis cibo ingesto cernitur, & tenuis, & nō exucata & celeriter descendēs, cruda est, At mere ruffa, initio quidem biliosiorē morbum indicabit. Sin autem in declinatione talis excernatur, corpus probe expurgari denuntiat, uiridis æruginosæ bilis nota est, nigra, uel atræ bilis, uel sanguinis cuiusdam indidē adusti, luidi, refrigerare quodammodo, & emori non parū interiora significat oleosa pinguisq; , corporis pinguitudinem consumi innuit: quemadmodum rursus uiscosa, pingui cum sit deterior, animantis particularum consumptionem præ se fert. Nimis fœtida haud exiguum fatetur putrefactionem. Porro in omnibus hisce, si alius qualitate cibo assumpto non



pro non respondeat eodem iam modo affectio quoq; confiderabitur. Omniū deterrima & pestifera, erit nigra, liuida, oleosa, celeriter transiens.

*De urinarum notis.**Cap. XIII.*

**Q**uemadmodum in deiectionibus, ita in urinis quoq; regula sanorū usi, de ærotis indicia sumemus. Urina igitur præstâtissima est, quæ sanis simillima. Talis nimirum est subrufa simul & subflava: nimirū uero hæc & crassitiem moderatā habet. At cū triplex turbidarū urinarū sit differentia, (uel enim redditæ tales, paulopost subsidunt, uel confirmiles perpetuo manēt: uel puræ excernūtur deinde uero turbantur) praua quidem existit tertia ordine dicta, moderata benigna q; prima: medio utriusq; cōsistit secunda: summè cruda est, exacte aquosa, ueluti desperatæ concoctionis uenosi generis accidens. Quando autem celeriter descēderit, diabetes, ut Græci appellāt, efficitur. Verum hæc sanè inter urinas crudas deterrima est, succedit autē ipsi, tenuis admodū & aquæ modo exalbida. Huic uicina est alia urina, quæ multis in morbis apparet, tenuis admodū, & albæ propinqua. Subpallida uerò hæc sequitur: quæ pallida quidē modo erit, & subrufa, cōcoquitur autem tam quantū ad colorē ipsius attinet. Tantū uerò crassitiē ipsam ab aquosa recessisse oportet, si probè concoqui debeat, quantū etiā colore, sin aut hec secundū naturā adamussim seruato, subsidens album, leue, æquale, & copiosum reddit, exactæ nimirum concoctionis nota fuerit: largius autem crudū, humorem, expurgari signat. Iam uerò si urina crassa modicè fuerit, habeatq; subsidens aliquod, non cruda, iam ex toto erit. Si. u. subsidencia parti farinæ crassiori, aut laminis similia, aut furfuri, aut nigra, aut liuida, aut uiridia, aut fœdi odoris, habeat, præterquàm q̄ quæuis huiusmodi in cruditate est, etiam mortis periculum aliàs ostendit. Porro boni coloris urinæ quæq; simul, uel subsidencia alba, leuia, & equalia representent, uel nebulas quasdam similes, uel suspensa, omnium urinarū sunt laudatissimæ, & præcipuæ, quarum subsidens, tale extiterit. Deinde commendatur urina cuius suspensa huiusmodi cernuntur. Tertium bonitatis locum habet, cuius nebulae tales apparent. Ac, ut uno uerbo expediam, quæ urinis probè innatant, quanto inferius subsiderunt, tanto magis laudantur.

De



**S**putum subflauum, subrufum, leuiter spumans, & tenue, solum cruditate, malum uero nullum insignius denuntiat. At sincere flauum, rufum, spumosum, uiride, glutinosum, rotundum, atq; his adhuc magis nigrum, prauum est. Etenim praeter sanguinem, quisquis alius humor sincerus est, prauam ostendit affectionem, caloris flammæ sobolem. Cruenta igitur sputa mediocria sunt: flauæ, aut nigræ bilis, difficilia. Cæterum quomodo ipsa ædantur, inspicere simul expedit. Nam si promptè excreentur, liquido constat talia quidem esse salubria. contraria uero periculum testari absolutam itaq; concoctionem fatetur sputum leue, album, æquale: & substantia neq; liquidum, neque ualdè crassum. Summæ uero cruditatis nota est, si nihil prorsus expuitur. At si expuatur quidem, sed tenne, languidæ concoctionis argumentum est, Sin autem Sincere rufum, prodierit, aut flauum, nihil boni pollicetur. Si liuidum, aut æruginosum, aut atrum, summam perniciem portendit.

*De febribus diarijs dignoscendis curandisque. Cap. XVI.*

**D**arias febres, urinarum in primo die concoctio, calorisq; suauitas seu propriæ ipsarum & inseparabiles notæ testantur. Verum à prima febris solutione, certiorè habiturus es earum cognitione. Quippe arteriarum in hac motus ei q; in secunda uoletudine fuit, ex toto respondet, cum nulla ex aliis febribus in naturalè statum reuertatur iam uerò q; facile morbum fert æger, maximè & id indicium est. Opportuni sunt id genus febribus, in quorum corpore quod defluit, halituosum non est, sed mordax & acre, sumi instar. Hi autem sunt calidi & sicci temperamento: breuiter, biliosi, quos πικροχολής Græci uocant, q; igitur ob lassitudinē febricitarunt, pinguius simul ac molliter fricandi sunt, in balneumq; ducendi. Quibus siccitas febrē intulit, fricandi hi quidē minus, sed lauandi sunt liberalius. Quos curæ mœiores, uigiliæ & ira exercuerunt: lauare quidē non subinde oportet, uerum oleo copiosiore tepido, cui minimè astringēs uis insit, tum paululū fricare, tum ex cōsuetudine lauare conuenit. Ab insolatu uisti, protinus ab initio refrigerationem desiderant, tum crebriorem lauationem minimè, uerò aut oleum largum, aut crebram frictionem. Sint autem quæ refrigerent & rosaceum & omphacinum



omphacinum sine sale confecta: eadem uero sincipiti uehementer refrigerata super fundere oportet, & ubi febris inclinauerit, in balneum æger ducendus est. Si quis ex frigoris iniuria febrem concepit, etiam is in remissione lauandus est. At si cum grauedine, & destillatione febriat, priusquam hæ concoquantur, lauatiōi non committetur. Porro qui ex æstu Solis febri-  
citant, ij, etiam cum hæc adsunt, lauandi sunt: qui autē ex frigore, ijs quoque caput mediocriter calefacientibus perfundendū est, cuiusmodi irinum est, & nardinum unguentum. Verum in quibus meatuum constipatio febrem excitat, his conuenit ex aqua dulci, & temperata lauatio, tum frictio, quæ rarefaciat, & exercitationes modicę, uictusque bonis procreandis succis idoneus. At cui propter inedia, febris contracta fuerit, ei opus est statim, ubi prima accessio remiserit, in balneum perducī, & tepente oleo largissime perfundi, tum molli manu perfricari, diutissime in calidi solij aqua immorari. Simulatque exierit, ac sese recollegerit, denuo balneum ingredi, postea aquam calidam potare, mox prisanæ cremorem, deinde lactucam assumere, & aliquid piscium eorum qui molli sunt carne, ex albo iure. Omnium uerò communis esto uictus species, quæ & boni sit succi, & concoctu facilis, & quæ nusquam exiguis cutis meatibus inhæreat. Vinum propinetur & aspectu, & uiribus aquosum. Oportet autem in primæ febrium accessionis insultu nonnunquam aliquos horum nutrire, in quibus corporis intemperies ad calidius, siccusque transiens, febres accendit. Qui ob bubonem hoc est inguinum inflammationem febrem conceperunt, ne medicum quidem interrogant quid sit faciendum, sed ulceri, quod bubonis occasio fuit, prospiciētes lauant, ubi accessio declinauerit. Cæterum à uino ipsi sunt arcedi, donec inflammationes inguinum fuerint, solutæ, & tenuiore uictu enutriendi.

*De putridarum febrium agnitione. Cap. XVII.*

**P**utridæ febres dignoscuntur eo quod nulla ipsas exterior causa præcedat: item quod à rigore incipiant, neque insolatu, neque uehementi frigore prægresso. id quoque peculiare est febrium putridarum indicium, sicut & pulsuum depressio. Nominant sic, cum incipiente accessione per exitus quos quidem ipsos & inæquales obtinent: hoc enim singulariter huiusmodi febrium est proprium. maxima autem putrida



tridarum febrium nota est etiam qualitas caloris, qui fuliginosus adeo existit, ut manum erodat. Similiter ad ipsas proprie spectat etiam urinarum cruditas, & obscura concoctio. Magnū uerò & notabile concoctionis indicium, in primis urinis nunquam eiusmodi febres repræsentant.

*Curatio febrium putridarum. Cap. XVIII.*

**S**i uires sint ualidæ ei qui ex putredine febricitat, sanguinē dimittes protinus, modo cruditas in uentre non existat. At si uires imbecillæ, aut ætas prohibeat, sanguinem non detrahes: cuius uacuatione, putrida per urinas, aluum, & sudores expurgare conuenit. Sin autem sponte sua nonnunquam impetum ad os uentriculi capeſſant, etiam per uomitum: alioquin non oportet ea præter naturam irritare: cæteum deligi materiæ debent, quæ sine calefaciendo siccandoq; ualenter, prædictas uacuationes moliri possunt, ueluti ptisanæ cremor, aqua mulsa, oxymeli, & apomeli, apiq; radix in aqua potabili incocta. Cum aluus nihil deijcit, ex aqua mulsa cum oleo clystere ducenda est uerum totum corpus rarefacere prius non expedit quàm uacuatum fuerit: ubi uacuaueris, rarefacias utiq; licet, medicamento tepido calore prædito, quale est, quod ex chamæmelo conficitur. in hoc tempore uinum aquosum potui datum, uniuerſas promouet uacuationes: eiusdem facultatis est temperatum dulcis aquæ lauacrū. Quod si uerò febris magnitudine obstiterit, neq; uino utendum, neq; lauacro, neq; unctionibus rarefaciendi uirtute præditis, sed aqua frigida his in febribus commodè bibitur, nisi quid & hanc prohibeat. Ergo si quidem & uires robustæ omnes fuerint, & febris ardentissima, & concoctionis signa planè euidentia, frigidam cum fiducia exhibebis. Prætereà si bona corporis habitudine sit æget, tum status cœli calidus ac siccus, etiam si in frigidam natationem hunc dimittas, haud quaquam lædetur: sin autē mediocris existat febris, & uires inualidæ sed cum notis concoctionis, ijs qui ita habent balneum prodest, & uini potio. Tum uerò ex unctionibus eæ quæ rarefaciunt.

*De tertianarum agnitione. Cap. XIX.*

**T**ertiana febris cum sit flauæ bilis cōmotæ soboles, protinus ab initio rigorem, haud exiguum infert. hoc discrimine à quartanæ rigore uariat, quod pungere uideatur, & cutem



& cutem conuulnerare. In quartanis autem, accessionis insul-  
tus uehementem perfrictionem habet. Quotidianas uerò ne-  
quaquam rigor præcedit: sed solum perfrigescunt. Cæterum  
tertiana etiam exactum pulsum ordinem obtinet. siti uerò ue-  
hementi in statu affligit, & hominē perurit, ac paulò post con-  
sistit, calorque æquabiliter per omnes corporis partes diffundi-  
tur. Et si manum inijcis, primo quidem contactu, calor copio-  
sius & acris occurrit, ueluti cum uapore quodam crumpens,  
sed paulò post à manu remanente uincitur. Vbi potione æger  
fuerit recreatus, statim copia uaporis calidi per cutem emer-  
git, sudorum nuntia. Bilis uomitio superuenit, aut aluus solu-  
tur, perque urinam biliosa redduntur. Præterea ad integra-  
tem tertiana desinit, ubi accessionis tempus, horarum non plu-  
rium duodecim expedierit. Febrem igitur quæ intra duode-  
cim horas terminatur, exactam tertianam nominamus: quæ  
uerò diuturniorem accessionem habuerit, illam simplici uoca-  
bulo tertianam nuncupamus. quæcunque autem longissimè  
productam accessionem seruauerit, exiguum uero interual-  
lum, hanc rursus extensam tertianam dicimus.

*Curatio tertianæ.**Cap. XX.*

**E**Xquisitam tertianam, ut quam flauabilis procreet, hu-  
mectare oportet ac refrigerare. & sanè quod in uentri-  
culū confluit, uomitionibus, & inferius elicere. Itē per  
urinas, & sudores deducere idipsum conuenit. Aluus itaq; mol-  
libus clysteriis euocatur. urina potionibus, in quibus apium, &  
anethū maduerunt, & si concoctionis signa deprehenderis, ma-  
gna iam confidētia etiā absynthiū dabis. Balnea uero ex aqua  
calida potulenta conueniunt: quibus neq; nitrum, neq; sal, ne-  
que sinapi adici, sed ægrum oleo quam maximè calido perfu-  
sum in solium descendere oportet. At qui balneis admodum  
gaudent, eos etiā si bis die laueris, haud peccabis. Vbi uerò con-  
coctionis notas perceperis, tūc, uel si sæpius laueris, nihil offen-  
des. Porro uinū priusquam morbus concoquatur, ex toto cir-  
cuncidendū est. simul atq; uerò cōcoqui inceperit, tenue, a quo  
sum, modicum, primo die exhibendum. Cibi humectantes, refri-  
gerantesq; utiliter assumuntur. A melle abstinendum, sinapi,  
salis & acris omnibus uinis autē admodum rutiſtis, & na-  
tura calidis Cæterum nihil miri est, si in hominibus primi exer-  
citis, in ediamque, expertis, nunc autem ordine conuerso otio-  
sis



90  
 fis ciboq; usis plenior, bilis maxima ex parte mixta pituita reperitur. Cuius rei gratia complures tertianæ, aut citra rigorem sunt: aut perexiguus ipsis oboritur, unde etiam animaduersionem propriam desiderant. Neq; enim balneum, neq; cibus aliquis liberalior tertianis spuris ante concoctionem conuenit: quoniam ne panis quidem micæ, oua, & consimilia.

*Curatio tertianæ nothæ.**Cap. XXI.*

**L** Auare in tertianis spuris per initia salubre non est, sed quando iam concoctionis notæ apparent, neque cibum quotidie exhibere, sed alternis diebus abundè est. Quies autem, & præcordiorum fatus ipsis conducit, tum sorbitiones concoctu faciles, & clysteres aluo inditi non admodum molles. Atq; si sanguinem detrahre opus est, neque hoc omittere oportet. Tota uerò uictus ratio erit, non quæ refrigeret in totum, humectetq; uerum etiam modus aliquis qui magis incidat, ac calefaciat, adhibeatur. Maximè uerò conduxerit ipsis ptisanæ cremor pipere iniecto. uel hyssopum quoq; nonnunquam uel origanum, uel spica nardi, aquæ mulsæ admixta, incocta q; potui exhiberi, & alia quæ urinæ ciendæ sunt, præterquam ea, quæ nehementer calefaciunt, exiceantq; Potissimum uerò ab synthium, post septimum diem porrigi debet. Iam & oxymel epotum, multis fuit auxilio. ad hæc nonnulla ex his quæ moliter uentrem subducunt. Porro uomitus secundum cibum, iis quibus hæc febris in uetustatem incidit, utilissimus est.

*Quartanarum cognitio.**Cap. XXII.*

**Q**uartana inuadit multa cum perfrictione, ut quæ ex frigido humore, atra bile originem trahat. Calorem uerò feruoremq; febrilem tertianæ modo non obtinet, imò nec bilis uomitibus eam comitatur. Adhæc si urinæ tennes, albæ, & aquosæ fuerint, quartana erit febris. Eximia uerò ipsius nota est, pulsus exiguus, & rarus, Cæterum in autumno potissimum incipit, erraticis superueniens febribus, ac nonnunquam in forma eius potissimum subsistit quæ quarto die reuertitur aliquando etiam plurium dierum interuallo, iuxta quosdam circivus accessionem habet.

*Curatio quartanarum.**Cap. XXIII.*

**Q**uartana laborans leniter tractandi sunt, neque medicamenro ullo forti sollicitandi, neque uacuatione, nisi



ne, nisi forte sanguis uehementer exuperare uideatur, cum uenam diffecare conuenit. Victus eis offertur optimus, qui non inflat, & uenter his quibus uti consuevit, emolliri debet. Quod si hæc nihil proficiant, clysteribus per initia quidem mollibus, deinde uerò acribus utendum est. A suilla carne prohibeantur ægri, atq; ab omnibus cibis qui glutinosi, ad exitum tardi sunt, tum qui refrigerant corpus, siccantq;. Vinum utile est tenue, album & modice calidum. Item salsa & sinapi ex usu sunt, tum per dies aliquot assumptum medicamentum diatrion pipereon, id est, quod triplici constat pipere, uel quod diospoliticon appellant. Iam & piper solum recte ex aqua quotidie sumitur. In morbi statu uictus ægro tenuissimus præcipietur, statim uerò etiam ut diu conquiescat, iniungendū est, tum uisceribus prospiciendum per ea quæ emolliunt, relaxantq;. In secutis diebus medicamenta conferunt, quæ urinam cient. atq; si concoctionis notæ apparuerint, cum fiducia tunc quoq; ijs uti expedit, quæ atros humores uacuant, idq; non semel duntaxat, uerum etiam sæpius. Porro secundum ualidam purgationem, & medicamentum quod uiperis constat, exhibetur, & alia quæ ad eiusmodi febres commendantur, inter quæ est & nobis familiare, omniū probatissimū, quod succum cyreniacum recipit.

*Quotidianæ agnitio.**Cap. XXIII.*

**Q**uotidiana haud quaquam cū rigore primo statim die inuadi sed procedēte tempore perfrictio magis quam rigor oritur. Aegre uerò incalescit, & diurnum habet incrementum: imò neq; adurit ægros, neq; multū, & crebro spirare compellit, neq; efflare, uel frigidam bibere. pituitosi autem uomitus hic accidunt, & quæ per aluum uacuantur, frigidiora, crudiora, aquosiora cernuntur: totum corpus crudis humoribus redundat: sudores minimè primis diebus erumpunt, neq; ad integritatem uenitur, cutis ægrotantibus albicat, urinæ uel tenues sunt & exalbidae, uel crassæ, turbidæ & rubræ.

*Curatio quotidiana.**Cap. XXV.*

**Q**uotidianam curantes, oxymelite primis diebus utimur, tum ijs quæ urinā probe eliciunt, ac uniuersa uictus species incisoria esto, circa statum uerò uentri culi habēda est rō, præsertim ipsius orificij, deinde ægris iubēdū est, ut à radícula & cibis assumptis uomāt. Idē utantur ijs quæ

PAULI ÆGIN. f. pitui-



pituitam subducunt, idque tamdiu quam febris cessauerit.

*De hepialo febris & rigore qui ægrè potest excale-  
fieri. Cap. XXVI.*

**S**I uitrea pituita, quæ omnium aliarum frigidissima est, non-  
dum putrefacta toto in corpore exundauerit, rigorem qui  
ægrè excalefieri potest, sine febris excitat. In febribus enim  
quæ humoris uitio accenduntur, putrefactio maxime febrilem  
calorem suscitatur. At si tota hæc pituita putruerit, quod tamen  
rarò fit, ob immensam frigiditatem quotidianæ febris causa  
redditur. Quando uero non tota æqualiter, sed ex dimidio ip-  
sius putrida fuerit, aut aliqua ipsius partes, nonnullæ uero non  
putruerint. Hepialum febrē hanc facit: in qua simul & rigent,  
& febricitant. Particulæ quidem humoris eius necdum putre-  
dinem expertæ, omnibus uenis, uel etiam reliquo corpori com-  
municatæ & sparsæ, rigorem creant: putrefactæ uero febrem ac-  
cendunt. † Dicta est autem Hepialos per translationem à sa-  
le: dico autem mari, quod tranquillum quidem apparet, in prin-  
cipio autem difficile turbulentumque erat. Vel ab Hepios,  
quod est molliter & alacrin, quod signat calefacere, quasi di-  
cas, quoniam blande & leniter calefacit. Atque hæc febris cum  
ex quotidianarum genere existat, utpote ex pituita nascens, il-  
larum curationi subiicitur speciali, nisi quod tanto commemo-  
rata quotidiana calidioribus magisque incidentibus præsi-  
dijs indiget, quanto etiam pituita frigidior illa existat. Hepiali uero  
rigor multo magis calefacientia requirit. Itaque medicamen-  
tum ex triplici confectum pipere, ex calaminthe præterea, &  
quod liquore cyrenaico constat, his sunt accommodata. Item  
ex castoreo, similibusque præparata remedia conueniunt. La-  
tius autem diffusiusque explicatam curationem horum repe-  
ries in capite quadragesimo quinto de rigore & perfrictione.  
Insuper Lypyræ & Tiphodes, quæque præter commemoratas  
febres dicuntur cum sint ex relatarum numero, etiam curatio-  
nes, tum in illis expositas, tum exponendas postulant.

† Locus hic multò rectius in libris manuscriptis quam im-  
pressis, quos interpretes sequuntur, exaratus est. Sic enim legi-  
tur in antiquis cod. λέγεται δὲ ἡπίαλος ἢ ἀπὸ μεταφορᾶς τῆς  
ἀλὸς, λέγω δὲ θαλάσσης, ἡπίας μὲν φαινομένης, χαλεπῆς δὲ κατὰ  
τὰς ταραχὰς αὐτῆς ὑπαρχούσης, non κατὰ τὰς ἀρχὰς. quibus  
uerbis



uerbis significatur mare esse molestum & difficile cum turbulentum est & agitur.

*De febribus continentibus. Cap. XXVII.*

**C**ontinentes finitimæ sunt singulis intermittentibus: tertianæ quidem exacte ardens, quæ causos dicitur: quotidiana, ea quæ singulis diebus accessionem habet, non autem ad integritatem desinit. Sic etiã quartanæ, ea quæ quarto die accedit. Exactus nanque causos: cum omnes alias exquisitæ tertianæ notas seruet, hoc solo discrimine uariat, quod non cum rigore inuadat, neque ad integritatem ueniat. Qui singulis diebus accessionem obtinet causos, omnes similiter exactis quotidianis notas præse fert. quod autem ad integritatem non peruenit, hac re à quotidiana specie consimili differt: ea ratione & quæ quarto quoque die accessionem habet, uerum ad integritatem non cessat, finitima est quartanæ. Continens itaque febris est, quæ non ante ad integritatem terminatur, quam ex toto fuerit soluta. Quum autem ne declinatio quidem accidit, quæ sensibus queat percipi, hæc quoque ex ardentium genere habetur, sed acumine ab ipsis uariat.

*Agnitio febrium continuarum quas synochos græci uocant, & curatio. Cap. XXVIII.*

**C**ontinuarum febrium, synochos græci appellant, origo ex sanguine est, nunc efferuescente, nunc putrefacto propter obstructionem. Qua propter accessio ipsis adusque finem una est. Indicia uerò sunt, pulsus maximi uehementes, citati, crebri, æquabiles, non mordaces. Urinæ non multum adeò à sanis recedunt. Curatio est, sanguinis quousque deficiat anima, dimissio. Qui si non fuerit detractus, febricitantes in summum ueniunt discrimen. At si quid per uenæ sectionem uacuare prohibuerit, alijs uti remedijs oportet, quæ meatus recludunt, copiam materiæ uacuant, & febrium feruorem leniunt. Cum autem euidentes humorum concoctionis notas in ipsis uideris, neque in principe particula inflammatio quædam, aut tumor œdematis speciem repræsentans, aut scirrurus fuerit, neque particula aliqua adeò frigida, ut in hanc noxa procumbat, cum fiducia frigidam propinato: maximè si æger eius porioni allueuerit.

f 2 Ardentium



*Ardentium agnitio.*

Cap. XXIX.

**A**rdentibus hæc superueniunt, arida lingua, aspera & nigra, uentris rosio, deiectiones pallidæ, sitis uehementis, uigiliæ nonnunquam etiam delirium.

*Ardentium curatio.*

Cap. XXX.

**H**orum alterutrum fieri necessarium est. si perfectè morbus solui debet: aut biliosos excerni humores, aut eosdem extingui. Excernuntur itaq; per sudores, uomitiones, & imum uentrem. Extinguuntur aut frigidæ potu: quo nos urentes febres, causas appellat, ex toto curamus. Sustinere eos qui his cruciantur, non aqua sola conuenit: neq; mulsa duntaxat, uerum aquosa mulsa exhibita. Nā qui huiusmodi morbis conflictantur, sola portione sustentandi sunt. Porro balneum illis solum usui est, qui citra tumorem inflātorium, aut erysipelatum, ardenti febre laborant. Quod si uerò concoctionis noctæ percipiantur, multo magis ipsis conducet. Qui ex falso humore, febrim ardentem conceperunt, his est inutile. Verum iisdem prīsanæ etiam cremorem cibi loco offerre conuenit.

*Februm quibus ex affectu erysipelaceo origo est, curatio & agnitio.*

Cap. XXXI.

**F**ebres quæ ex Erysipelaceo uiscerū affectu procreantur, his notis agnosces. interna feruēt immodice, dolor urget uehemens, præterea sitis excruciat, & ardor immoderatus. Sūmatim ex indicijis accerrimæ bilis cum paucis sanguine putrescentis deprehēdes. Hunc in modū curabitur. A balneo in totū abstinere decet. Aqua frigida per morbi statū uehementi, hoc est frigidissima utendū est: per initia nō itē. Extrinsecus uero refrigerantia imponētur: & si nihil hæc promouerint, etiā intro eadē sumere ægri cogentur. Maximè ipsis conueniunt lactucæ, & quæ parē his facultatē obtinent à foris & ipse lactucæ succus idoneus est, adeoq; intybi & semperuiui, & reliqua refrigerandi uirtute prædita. sed præstātissimo parte plurima utimur. Nam liquorem refrigerantis alicuius expressum pilæ cū portulaca injicimus, deinde cōtusa exprimimus. cum usus exigit, modico polentæ mixto hæc in aqua frigida mersa, refrigeramus. Linteum uerò duplicatum in ea intinctū extrinsecus aut ubi calor sentitur, præcordijs obtendimus, non diu adhære sinentes, uerū aliud frigidum eius loco applicantes. Iā uerò



to & oleum omphacinum medicamini nonnunquā miscemus.

*Hæcticarum februm agnitio. Cap. XXXII.*

**H**ætica febris non in humoribus, & spiritu solū, sed iam partibus etiam solidis consistit. Hæc absq; dolore consistit, & qui ea detinentur, nequaquam febricitare se existimant: neq; enim calorem percipiunt, cū uniuersæ ipsis particulæ æqualiter sint excelsæ. Duplex hæcticarum februm species est, prima ardentibus magna ex parte superuenit quæ prorogantur adeo ut tempore corporis ipsius cordis madore absumant, uel etiam multo adhuc permanente. Quæ uero manente etiamnum humiditate sunt cordi corpus occupantes, inde potissimū accenduntur. Vnam sanè ipsius generationem prodidimus. Reliqua uero est cū statim ab initio inuadit, primam originē diarijs similem, ex mœrore, ita lassitudine maiore, una cum exustione in sole, sortita. Hæc igitur non difficulter cedit remedijs. Quæ uerò ex ipsis in marcorem qui Græcis dicitur *μαρasmus* deuenit, omnem respuit curationem. Atque hæc sanè cognitu est facillima: oculi siquidem præter modum concaui eam testantur, & lemæ ipsis inhærescentes aridæ, tum dispositio quædā squalida, uiuidi ipsorum coloris flos emarcuit, frons sicca est & intenta. Quinetiam conuiuent plurimū, hac occupati, quemadmodum dormituriens. uerū affectio, somnus non est, sed uigilandi impotentia: tempora collapsa sunt & quid. n. aliud præter ossa & cutē solam habent? Nam si depudatis ipsis uentrem inspexeris, neq; intestinū, neq; uiscus ullum superesse tibi uidebitur: præcordia sursum conuelluntur, & cutis ipsis extrema resiccata est, pulsus gracilis, creber & durus. Caliditas autem primo occurso lāguida, paulopost acris & rodens erumpit. quousq; igitur humiditatis aliquid reliquū est, hætica solum febris dicitur. Cum uero periclitat, ne nihil amplius humoris superfit, absolutus iam marcor constituitur.

*Hæcticarum februm curatio. Cap. XXXIII.*

**H**ætica febre laborantes, statim ab initio nutriri desiderant, humorum rodentium gratia. Maximum uero remedium huius est, uictus humectans. Conuenit igitur quàm maxima prisanae cremoris halicæq; sorbitionibus, & pane præterea adiecto agrū nutritū, moderato frigida potu curare: si neq; inflammatio quædā, neq; humorū putrefactio sub-



est, atsi magnam inde offensam fore coniecturaueris, frigida abstinere oportet, extrinsecus autem impositis, quæ refrigerant auxiliis, uti. Balnea uerò hoc morbo obnox iis, quolibet tempore sunt idonea.

*De semitertianis. Cap. XXXIIII.*

**Q**Vandoquidem tertiana cū rigore, quotidiana uerò citra illū inuadit: quæ ambarū mistura cōstat, horrorē inducit, qui minor quidē res est rigore, maior autem perfrictione. Quapropter cū horror equali ab utrisq; extremis interuallo, mediū amborū rigoris nimirū & frigoris occupet, quod cōtemperatis inuicē extremis accidit, non abs re nomen huiusmodi febris semitertianæ indiderunt. Porro duplici modo generatur uel enim duæ accessiones in idē tempus concurrūt, uel statim ab initio ambæ inuicē iunguntur. Qñ igitur tertiana præpollet, magis horrida febris efficitur, & rigoris ēt non nihil per accessionem assumit. Protinus aut talis calidior est & ardentior, tum vomitionē quandā bilis, aut deiectionem, aut madorē adfert. Quando altera pituitosa superat, perfrictiones quidē summa exercēt, pauci uerò horrores: neq; tñ sitis, neq; ardor in his affligit. Cum pares magnitudine sunt tertiana intermittens, & quotidiana continua, insultus quidem accessionis cū horrore accidit. At cum ex pituita proueniēs febris præcelluerit, depressiones pulsuum fiunt, & horrescentes. Si uerò calidior præualeat, subito ac una uice incalescunt. Talis sanē est exacta semitertiana, ex æquivalente duarum febrium, puta tertianæ intermittētis & quotidianæ continuæ tēperatura proficiscens. Non exquisita uerò uel bilem largiorem, uel pituitam causatur, quæ iam magis etiam curationi renititur, cum modicus humor à copiosioris dominio artisq; auxilio expedite uinci possit. Si enim pituita sit superior, præfidijs maximē utemur quæ in quotidiana exposuimus: sin autem flauabilis, ijs quæ in tertiana comprehēsa sunt: In totum ei quod urget incumbentes, sed ita, ne alterum prorsus negligamus.

*De morbis publicè grassantibus. Cap. XXXV.*

**P**ublicè grassantes cōmunesq; morbos nomināt, qui multis simul obueniunt, quorum ut generatio, sic etiā causa cōis est. Cibiq; igitur cōes prauī, illiusmodi morbos communes pariunt: item aquæ uitiatæ potio, exercitia immoderata,



rata, labores quibus quisq; assueuerat omitti, inedia, repletio, idq; dum fames grassatur, aut fecundus annonæ prouentus est. Item regionum naturæ, cōes subinde morbos intulerunt, quæ nonnunquā palustres sunt, aliquando barathrum habent uicinum, quod uaporem exitiosum prauumq; exhalet. Hæc quidē nō continuē accidere consueuerunt. Taer uerò nos ambiens, tēperamenta corporū cōmutat, uel calidior impendit, uel frigidior, uel humidior euadens, siquidē in alias causas neque oēs simul incidimus, neq; eis toto die immoramur. aer autem qm̄ omnibus circūfusus est, & per inspiratū attrahitur, ut animalium corpora, pro tēperamenti ipsius immutationibus simul afficiat, necesse est. Qui igitur hæc intelligit, non solum morbos ex unoquoq; aeris statu futuros prælagiet, sed etiam ne fiant prohibebit, cōtrarium immoderatis circumflui aeris temperaturis uictū accommodās. Itaq; corpora morbo alicui ex propria intemperie uicina, hæc à simili circūdātis nos aeris tēperamento deprehenduntur. Quæ cōtrariā cœlo temperiē obtinent, præterquàm q̄ nullam offensam experiuntur, etiam meliora fiunt, dū repugnans aeris immoderatio temperamenti immoderationē punit, ac qui hoc nouit, secundam ualitudinē tuebitur, contraria corporibus inducens, nunc refrigerātia scilicet, nunc calida: aqua quidem superinfusa refrigerans, itidem ocio, ciborum inedia, & potu largiore: calefaciens autē, operimento, laboribus, cibo liberaliore, & interdum parciore. Præterea lignorum acruatim constructorum incendio haud mediocriter aerem ad calidū & siccum mutaueris, si tūc humidus fuerit, quo modo Acronem agrigentinum fractitasse ferunt.

¶ In antiquo codice hac aliquanto explanatiora sunt in eo enim hæc uerba ita leguntur. ὁ δὲ περιέχων ἡμᾶς αἷρ, τρέπει τὰς κράτας, ἢ τοι θερμότερος ἢ μετρώς, ἢ ψυχρότερος, ἢ ξηρότερος, ἢ ὑγρότερος γινόμενος: Id est, Aer qui nos circumstat uel calidior, uel frigidior, uel siccior uel humidior temperamēta immutat. Quam huius loci ueram esse scripturam uel ex ijs quæ de eadem re scribi Aetius intelligi potest.

*De pestilentia ex commentarijs Ruffi.*

Cap. XXXVI.

**P**estilentia grauiſſima omnia superueniunt: nihilque in hac sicut in aliis morbis singulis occultatum. Etenim  
f 4 delirium



delirium accidit, & bilis uomitio, praecordiorum intentiones, labores, sudores largi, extrema algent, alui profluvia urgēt biliosa, tenuia, & flatulenta, urinæ cernuntur aquosæ, tenues, biliosæ, nigræ, mala habent subsidientia, suspensa pessima, nares destillāt, pectus ardet, lingua torrida est, siticulosa, remissa, torquent uigiliæ, conuulsiones uiolentæ, aliaq; multa praua. † At si quis peltem uenturam prænoscet, ex malignorum anni temporum, & uitæ studiorum ad sanitatem haud conducentiū animaduersione, aliorumq; animalium præcedente interitu, his apud se consideratis, & illud præterea perpedito cuiusmodi sit præsens anni tempus, qualisq; uniuersus annus. Inde si quidē qualis uictus ratio esse debeat, optimè deprehendes: utpote cum anni tempus, si quidem rectè ortum est, ex sicco humidū nunc euaserit necessum est uictus ratione deficcare, ut humor superfluous absumatur. item uentris quoque habenda est ratio. Quibus superior uentriculus pituitam continet, uomitionibus sollicitare: quibus autem sanguis inundauerit, secare uenā oportet. Iam per urinas purgatio, aliaq; & totius corporis, proficiunt. Quod si etiam æger ardore æstuet, & flamma usq; ad pectus pertineat, haud abs te fuerit refrigeria pectori applicare, & potionem frigidam offerre, idq; non paulatim, nam magis hoc pacto incendit, uerum una uice ac semel, ut flammam extinguat. In quibus autem ardor interiora occupat, summa uero inalgescunt, cutis in superficie frigida percipitur, præcordia contrahuntur, uenter colliquata, partim supra, partim inferius transmittit, uigiliæ urgent, mens desipit, lingua est aspera, hi calefacientia requirunt remedia, ut calor per totum corpus distrahatur, † ac si alio quopiam modo ab internis foras poterit elici. Iam uero & hæc potio utiliter præsumitur. Aloës partes duæ guttæ ammoniaci partes duæ, myrrhæ pars una. Hæc in uino odorato contrita instar dimidiæ fabæ exhibentur. nimirum quotidie. Haud noui, inquit Rufus, qui hoc potu pestem non superauerit. Hæc quidem Rufus memoriæ prodidit. Galenus autem tradit ad pestilenciales putredines bolum armeniacum salubriter potari. Simili felicitate etiam Theriacem ex uiperis magnam prodesse. Etenim in pestilentia quæ Romam inter necino morbi genere depopulata est, omnes quos nullum ex his medicamentis adiuuit, interiisse scriptum reliquit.

†Simplicior



†Simplicior & meo quidē iudicio huius loci sensus uerior est in exemplaribus manu scriptis. Sic enim ea habent, σύνειδοι δ' ἂν τις μέλλοντα ἤξειν τὸν λοιμὸν προσέχων ταῖς τεώραις, &c. id est, conijciet, autem quispiam futuram pestilentiam, si attentè consideret temporum &c.

‡Quod est in impressis καὶ θωθεν, in manu scriptis magis explanatum est, ἐκ τῆ βάθους, id est, ex profundo.

*De ijs qui ex redundantia crudorum humorum syncope periclitantur. Cap. XXXVII.*

**N**onnulli, febricitate incipiunt, ubi magnam crudorum humorum copiam ore uentriculi simul offenso, congesterunt. His & præcordia inflātur, & os uentriculi uastiore mole, quā pro naturæ modo cernitur: adhæc color ipsius ab albidius, aquosiusq; magis est, mutatus. quibusdam ad nigrius. Nulli taliū sanguis mitti sine maximo dispendio solet, etsi uacuationem desiderent. Verum nec sanguinis dimissionem, nec purgationem sustinent, utpote quos etiam sine his syncope subito adoriatur. Ratio igitur medēdi talibus est, quā frictione molimur. Incipere uero per initia statim morbi oportet, ac primum à superiore crurum parte deorsum, idq; linteis nō admodū mollibus, sed modicè asperis. Deinde tota brachia ab humeris usq; , & superiore parte deorsum simili modo sunt fricanda. Vbi uero artus omnes abundè calidi uidentur: & metus est, ne quis ex ampla frictione lassitudinis sensus superueniat, oleo relaxante uteris, ab astringētibus autem abstinebis. per hyemem uero etiam digerētium usus erit, quod genus est ficionium, & chamæmelinum. Cum iam artus plurimum perfricueris, postea oleum detergetur, inde ad spinam dorsi transitus est: hæc q; tota perfricabitur similiter, ab hac rursus ad crura te conferes: & hinc ad brachia exinde rursus ad spinam. ita toto die facies. Porro mulsā, in qua coctum hyssopum fuit, his est aptissima, cauendumq; ne uel cibum, uel sorbitionem, uel aquam exhibeas, uel omnino liberaliter bibere sinas, nisi mulsam tribus primis diebus duntaxat, tuis ipse manibus, quas dixi partes ordine perfricans. Sin autem robore mediocri sit, & aluus sua sponte commodè non deijciat, cum fiducia aliquid ab inferioribus partibus infundes. Quod si maior iusto recrementorum impetus ad aluum citetur: principio quidem percoquere



coquere mulsam amplius oportebit: minus enim ea subducit. At si plenius superuacua descendant, ne sic quidē sistēda, alius sed exhibendus pro aqua mulsā ptisanæ cremor est. Si uero fluere pergāt, chondri sorbitione nutries. Si ex pulsu uires col lapsas ob imbecillitatē didicerimus, panem ex uino diluto exhibere conueniet: utiq; si nec uenter nec iecur inflammatione laboret quando si hac infestentur iam corpore crudis succis referto, nulla planē medicina periculo subtrahit. Sin autē quandoq; crassi abundē humores deprehendātur, oxymeli pro mulsā continuē exhibebitur. Ergo si æstas sit, & æger calidi tēperamenti frigidæq; potioni afluētus, frigidum huic oxymeli dabis. sin hyems sit, calidum omnibus. Sanē balneum his est aduersissimū. Porro ijs quos syncope iam premit, si partes modo commemoratæ inflammatione uacent, panis exhibebitur modicus, isq; ex uino quod celerem in corpus digestionē adiuet, statimq; ad frictionem ueniundum est, quæ pro tradito quoq; iam modo administrabitur, uerum quibus ex flaua bili, quæ os uentriculi, infestet, syncope incidit, is frigida offerenda potio est uinum tamen tenue, fuluum & uetus.

*De his qui ob prætenues humores syncope opprimuntur. Cap. XXXVIII.*

**Q**ui tenuium humorum uitio syncope premuntur, diuersam à supradictis curandi rationem desiderant, ut quos dignoscendi notæ illis contrariæ testentur. Nutrire hos oportet paulatim & continuē. Porro ad exitium spectare existimandi sunt, si uel iecur ipsorum, uel uētriculum inflammatio obsedit, uiribus iam languentibus. In eiusmodi affectibus emortua illa species in facie celeriter apparet. Sanē nutrire est necesse: sicut etiam corporis summa densare, non secus quàm priorum rarefacere, & frigidum ipsis aerem accersire. Ungendi sunt præterea astrictorijs unguentis. tum cibi ijs dandi, qui non admodum promptè diffuant, non aqua mulsā, non ptisanæ cremor, sed panis & sorbitio ex chondro, & fructus austeri, qui non faciliè corrumpantur, tum ipsi per se, tum uero & cum pane. Vinum ijs aquosum necessarium inter initia est, sumptum post cibum.

De



*De reliquis occasionibus, quibus syncope succedunt.* Cap. XXXIX.

**R**eliquæ occasiones, quæ syncopas concitant, quatuor sunt numero: dolor uehemens, uigiliæ, immodica inanities, ac in ijs qui aliena loquuntur, aliquando motus. Sed & quintam, si placet, addas, nempe principiorum intemperiem. Celerrimè igitur cor affectum in perniciem præcipitatur, mox cerebrum, deinde breui iecur.

*De dolore.*

Cap. XL.

**I**taque dolor stupidus ex frigida oritur affectione. Pulsatilis autem dolor magnæ inflammationi peculiaris est. Sim autè tanquã à palo impacto, aut ueluti a terebro forari putres, crassi intestini species doloris est. Punctorius autem, circa mēbranas cōstituitur. Pertundens uehementissimis nō heterocranijs solū, sed cephalæis quoq; accidit. Est autè pertundens dolor, cum à parte primario affecta, ceu à radice subito in uicinas perfertur. Porro distendentes utrinq; neruorum dolores sunt, cum & laborāt, & ad utraq; extrema tēdūtur. minimè uerò in latitudinē porrectos nerui dolores percipiūt. at tensuos, stupefacientesq; dolores mēbrana quidē sub cute porrecta inducit, quæ uerò inter carnē hærescit, tanquã diuellētes cruciatus excitat. multæ si quidē existunt inæqualiterq; inhærescūt, & ipsam carnē amplectūtur. Mēbranarū uero quæ ossibus circūdantur, profundī sunt, ipsorumq; ossium tanquã dolentium imaginē repræsentant. Quando igitur nulla extrinsecus doloris occasio fieri apparet, præcedēs uictus ratio uenit inspiciēda, fuerit ne præter cōsuetudinē otiosa, aut cibis homo usus sit largioribus, ijsq; ex ualēti materia, uel solita excretio sit retenta. Nā si ex aliquod, uel oīa quoq; appareāt, doloris causa est repletio: ac quā citissimè homo uacuari debet. Sic. n. licebit tibi maxima cū securitate ijs uti remediis, quæ fluxiones dolentibus particulis incūbentes repellāt. Si igitur sanguinis sit copia, quod distēdit, ueluti in inflāmatione oriri solet, protinus si uires patiūtur, sanguis dimittēdus est, per magnā uenā patienti particulę propinquā. Vbi autè uitiosus humor dūtaxat affligit, purgandus est. Si utraq; coeant, ambabus utere uacuationibus, sanguine prius emissio. Quod si his peractis dolor etiam remanet, constat profecto in ægrotante particula impactū esse, quod



quod afficit. Pater uerò curationem ipsam per digerētia quoque medicamenta esse moliendam. Pari ratione, & qui ex flatuoso spiritu dolores contrahuntur, curabimus: auxiliātes simul in his potius tum extenuantibus cibis, tum per sedē iniectionibus, item cataplasmatibus irrorationibus atq; fomētis ambiens ipsum corpus rarefacientes. Sin moles grauando, contundendūe dolorem excitet, moli eidem est medendum. Sin rodens humor est qui affligit, aduersissima huic sunt quæ extenuant, & calefaciunt. Anethum oleo incoctum, dolorem lenit, & somniferum est: & uiride sicco magis.

*Ad syntexes, hoc est corporis colliquamenta. Cap. XLI.*

**Q**Uum per uentrem aliquid non ex esculentis, poculentisq; uerum ex ipsius corporis substantia excernitur, humore in aluum ipsam cōfluente: qui quidem flauæ bili continuè per uomitum, & infra erumpenti cōsimilis est, odoris autem sceditate ab ipsa differt, tum q̄ deiectus rufus magis, & crassitie glutinosus, interim uerò oleosus appareat, tunc nimirum caro pinguis & recens coacta ab ardenti febre resoluitur, & eliquescit. Malo inueterante, nō nihil etiam ex ipsis solidis partibus absumitur. In hac perniciosissima febre frigida potio utilis est, quæ ex fonte frigidissima petitur. Huiusmodi quoq; esse conuenit cataplasmata, & epithemata, quæ refrigerent, thoraci, & præcordiis imposita. Item cibi refrigerantes, rectè offeruntur.

*De uigijs in febris. Cap. XLII.*

**A**T uero eorum, qui immodicis torquentur uigijs, crura & brachia uincire. † quo tēpore somnū captare solēt, iubemus, & excitari. nonnunquam palpebras aperire, si conuiueant cōpellimus, donec abundè fatigentur. Inde subito uincula soluimus, lucernamq; tollimus, & altā esse quietē iniungimus. si nihilo minus uigiliæ pertinaciter urgēt, ubi accessio remiserit, frōs nigri papaueris capitū decocto illuitur, naribusq; offert papaueris albi cortex torrefactus detritusq; & mādragoræ radicis leuigatæ tantundem cum uino, & rosaceo maglagmatis forma fronti applicetur, serpillōq; cum meliloto in passo decocto. Hoc etiā in accessionibus est utēdū, uel trita papaueris capita excipietes pane cū rosaceo, uel eiusdē cerato illinimus.



linimus. Cibus quodammodo sit magis accuratus. Adijciatur autem sorbitionibus capitum papaueris albi seminis cochlearium trium instar. † Oleribus commisceatur papaueris nigri, si quidem folia fuerint uirida, quantum tribus digitis potest comprehendere: sin minus, tria quatuorve papaueris capita sicca, simul incocta deligantur. Si ne sic quidem somnus accesserit, papaueris lachryma, aut succo mandragoræ circumlinetur. Iam linctus ex papaueris capitibus compositus, & præsertim ex sapamensura cochlearij, uel unius, uel dimidij potus, somnum frequenter accersuit. In quibus autem caput non facile humoribus repletur, & uigiliæ infestant, utere in declinationibus etiam tali suffitu. folij amomi, costi, arnabo singulorum uncia. carpobalsami drachma, styracis, amomi, ammoniaci, bdellij scythici, mandragoræ radice, lachrymæ papaueris, singulorum drachmis quatuor. Ex lignis cupressi accensis suffito.

† Hæc uerba sic leguntur in uteri codice, ἡπερβαλλόντων δὲ ἀγρυπνούντων, σκέλη καὶ χεῖρας δεσμεῖν ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ καθ' ὃν ἐπὶ τῶν ὑπνόνειώθασιν ἐρέπεσθαι κελεύομεν καὶ ἐγρηγορέναι δίδωκεν τε πολλάκις μῦσαι ἀναγκάζομεν τὰ βλέφαρα, id est, eorum uerò qui multis uigilijs torquentur, crura & brachia iubemus, quo tempore somnum capere solent, ligari, & excitari, palpebrasque sæpe aperire & claudere cogimus donec, &c. Qui sensus magis concinnus est.

† Id sic legitur in antiq lib. τοῖς δὲ λαχάνοις συνεξεέσθω μήκωνος μελάνης, simul coquatur & ferueat cū oleribus papaueris nigri.

*Curatio soporis noxij, qui cataphora Græcis dicitur.*

*Cap. XLIII.*

**F**rons posca lactis modo tepenti abstergitur, & summa ualide ligamentis excipiuntur. naribus admouentur quæ incisoriam facultatem obtinent. In remissionibus etiam cucurbitulæ ualenter dorso, & spinæ defiguntur. Si uero morbus his non cedit remediis, etiam quæ sternutamēta excitant obiciuntur. Ciborum materia sit sit, quæ incidat, diuidatq; ueluti in præceptis de sanitate tuenda est comprehensum.

*Curatio doloris capitis in febris.* *Cap. XLIIII.*

† **S**I capitis dolor in febris affligit, post conuenientem febrium uacuationē in accessionum declinationibus, caput inungi debet, primum communi oleo crudo, uel rosaceo,



rosaceo, cui etiam aceti pauxillum sit admixtum: si æstas sit, & febris ardens, frigidus: si hyems, neque febris ardens, calidus, aut tepido. Incoquatur nonnunquam oleo & serpilli polygonique succus, per æstatem etiam papaueris capita uel ipsum papauer: quemadmodum hyeme peucedani momētum. Quod si uerò dolor in fronte perseueret, sinciputq; pilis car eat, hoc quoque obducendum est ueteri polenta, & polygonio, uel pane similiter & rosis, uel modica myrto, uel serpillio. Quosdam & pulegium applicatum magis leuauit. Nonnullis etiam cum igneus sensus inest, psyllium polenta temperatum profuit, uel ipsum per se inuisum coctione redactum, & continuè mutatum. Item coriandrum similiter cum polenta, & aloe cū aceto illinitur, myrrhaq; & ammoniacū pari modo, necnon crocomagma. Pulsatiles autē dolores ruta, mentaq; cum panem diffiat, rosaceo quoq; superaddito. Atqui si dolor commemoratis auxilijs non eliditur, primum caput ad cutem attondere oportet, deinde pinguioribus asperginibus totum ipsum foueri, mox cucurbitulæ occipitio agglutinari, & summæ partes deligari debent, permulceriq;. Iam uerò hirudines recte affiguntur. Cæterum si defluxio quædam à capite, uel grauedo oborta capitis dolorem suscitauerit, ijs utendum est auxilijs, quæ aduersus hæc suo loco perscribentur. Sin autem à stomachi regionibus uapores sursum tendentes caput offenderint, etiam horum ratio habenda est, ueluti præceptum à nobis est.

† Vera scriptura huius loci est, μετὰ τὴν προσήκυσαν τῶν περιττῶν κένωσιν, id est, post, conuenientem excrementorum uacuationem, facilis enim fuit librarii lapsus.

*Quomodo stomachi curam habere conueniat.*

*Cap.*

*XLV.*

**S**I stomachus imbecillis fuerit, corroborantibus oblineatur, quod genus palmulæ sunt, uinum, polenta, crocus, mastiche, & aloe. aspergiq; debet oleis ex absinthio, melino, mastichino, nardino, & uino. At si ardorem experiatur, miscendum aliquod ex refrigerantibus, puta cucurbitæ succus, lactucæ, portulacæ, solani, sereos, † & uuæ immaturæ. Sin autem inflammatorium quiddam in uisceribus appareat, etiam relaxantia quædam adiungenda sunt: aspergionibus, oleum chamæmelinum, cyprinum, adipēs gallinæ, aut anseris, bdellium, uel ammoniacum,



noniacum, & similia. cataplasmatibus autem, apii semen, foenu-  
græcum, altheæ, chamæmelorum flos, & ut uno uerbo ex-  
pediam, compositam habeant facultatem, tum relaxantem  
subtilium partium, amaramque, tum astringentem.

† Hic locus integer est in ueteri exemplari: sic enim descri-  
ptus est, οἷον κολοκίνθης τε τὸν χυλὸν, καὶ θριδάκινης, καὶ τῆς ἀν-  
δράχνης, καὶ τῆς τρήχνης, καὶ τῆς σέρεως, καὶ τῆς ὀμφακός, οὗτος  
μὲν γὰρ οὐ φύχει μόνον, ἀλλὰ καὶ τύφει, idest, ut succus cucurbitæ,  
lactucæ, portulacæ, solani, sereos, & uuxæ immaturæ. Hic enim  
non solum refrigerat, sed etiam adstringit

*De immodica perfrictione in febribus, & rigore.*

Cap.

X L V I.

**R**igori, qui crisis ratione obuenit, remediis occurrere nõ  
oportet: nec concertationem naturæ dissoluere. Quod  
ex sudore frigus prouenit, promptè remittitur, ac nihil  
adfert molestiæ. In solo autem rigore, aut perfrictione (ex fri-  
gidioris uero, copiosaq; maxime pituita nascitur) primum qui-  
dem artus plurimis in locis constringendi sunt, mox oleo deli-  
nendi chamæmelino, aut cyprino, aut iriño. Sin autem maio-  
re auxilio tibi opus sit, etiã piper oleo admiscebis, uel cachry,  
uel adarcen, uel castoreum. molliterq; totum corpus infrica-  
bis. Porro ne facile oleosum istud præsidium defluat, haud fue-  
rit absurdum & ceræ momentum colliquefacere. At si per hæc  
rigor non possit excalferi, ualentioribus quoque ex his factis  
acopis, necnon dropacibus, & sinapismis uti consilium est, alia-  
que fomenta ritè admoliri. Item acriora ex iis quæ admo-  
uentur naribus, commodè faciunt, calaminthe, pulegium, & hyssö-  
pum. Potui dabitur ante accessionem mulsæ, in qua piper, &  
ruta sit incocta, adhæc liquoris cyrenaici cocto melle formati  
instar milii duabus horis ante accessionem præstabitur. Simi-  
liter & liquoris silphi. Adhæc quod in quartanis ex liquore  
cyrenaico componitur, multis fuit auxilio. Iam uerò in o-  
leum largius, quod incaluerit nonnulli descendentes, rigores  
pertinacissimos absterferunt, ut Archigenes memoriæ pro-  
didit. Galenus autem ante accessionem, cutem abrotano in-  
fricandam præcipit, uel calamintha arida, uel cunile tum fo-  
liis, tum floribus, uel costo, uel pyrethro. utroque horum cum  
oleo



oleo. unde fiet, ut uel nequaquam, uel certè minus rigeant.

*De sudoribus.*

*Cap. XLVII.*

**S**udores, in crisi erumpentes excipere oportet, quandiu satis uacuatum fuerit, adiutareque calore mediocri, & quiete, adeò ut neque abstergantur, quoniam alius quoque alium elicit. item calido clystere in aluum dato, & sorbitione, & somno. At sudores in remissionibus morborum apparentes idem quod in crisi prouenientes, administerium capient. Itaque praesidia quibus sudores euocantur, libro superiore, capite quadragesimo octauo abundè sunt comprehensa. Cum uerò sudores largius eruperint, tunc abstergendo, leuandoque operimenta recreare conuenit. Etenim lassant, supra modum excident, ut in syncopen frequenter ægros perduxerint. Tenui uelamine madidoque debent esse contacti, perflatus aeris frigidior accedat. his somnus adiungatur, & euentilatio. In super myrtus nigra in pollinem coacta, corpori inspergatur. Similiter galla, piceæ cortex, electrum, & polenta cum uino astringente, particulis sudores recipientibus imponantur, faciesque posca per spongiam aspergatur. Archigenes etiam calcem non restinctam, & floces uini combustas, tum in his, tum in rigore, quem nullus euincit calor, assumit. Ambæ siquidem inquit, recalcrescentes, siccantur. Media uerò corporis loca delinenda succo plantaginis, uel coriandri, uel portulacæ, uel brassicæ præcipit, ut undique concreta, sudores reprimant. † Per somnum uerò creta cimolia aqua dissoluta, dorso, & thoraci subiecta proficit. Totum uerò corpus rosaceo perungitur, uel melino, uel myrteo, uel lentiscino, uel ceratis quæ ex his confiunt. Nam magis sunt his idoneæ reunctiones, quæ latentes meatus obstruendo, humidum exitum prohibeant. Patet autem omnibus, quòd cibus quoque siccior his conuenit, & uina mediocriter astringentia. Cæterum largiore potu, & præsertim humidior, tum crebris per aluum iniectionibus abstineant. Si autem fieri potest, gestatione corpus agitandum, in frigidioris aeris statu, & summæ his partes potissimum refrigerentur. Qui per ualidam expressionem sudores fiunt, (hi autem uel ob dolores excitantur, uel conuulsiones) faciliè curantur, † si extrema deligentur, calfiant, & per laneos panniculos reficiantur.

† Scri-



† Scriptura quæ in ueteri exemplari multò melior & synce-  
rior est Sic enim habet. ἐν δὲ τοῖς ὑπὸ τοῖς κυμωλίσιν ὕδατι διαλυ-  
θεῖον πικρὸν ὑποβάλλεται μεταφρένῳ, καὶ θασακί.  
Id est, panni pinguefacti cimolia dissoluta aqua subiiciuntur  
dorso & thoraci. librarius enim indoctus ex ῥάκη, fecit θασακί.

† Concinnior sensus est in ueteri codice. ita enim in eo scri-  
ptū est. καὶ θάλλει τῶν ἀκρῶν καὶ ἀποφύξει διὰ ῥακιδίων ἀραιῶν  
κέφας θασαπέειν, id est, leuiter curare oportet extremorum  
deligatione foruque ac exiccatione per pannos raros.

## De tussi in febris.

## Cap. XLVIII.

**T**Vssi in febris, præsertim cum rigore obuenientibus,  
occurrere conuenit. Nam tussis intentione, febris quæ  
inclinabat uires resumit, ac redintegratur. Aduersus hanc  
formulæ medicamenti ex melle cocto coactoque, hypoglottia  
uocant, offeruntur. Linguae autem supposita, unde nomen  
habent, eliquescent: & quod spirandi impedit facilitatem, di-  
scutiunt: tempus ipsarum est in accessionum statu, & spatio  
quod paulum accessionem præcedit. datur etiam hydromeli  
discoctum. Quibus autem de neruoso genere metus non est,  
temporis processu exhibebis cum fiducia & oxymeli. sin minus  
hyslopi decoctum, quod etiam rigentibus auxiliatur. Itē casto-  
reum cum febris ardens non est, neruoso quoque generi cōfert.  
Adhuc linctus ex piceæ fructu, nucleis pineis, iride, semine, li-  
ni, amygdalis amaris, & urticæ semine plurima uero ex parte  
cibis quoque hæc simul adiungentur. Ac resina quoque terebin-  
thina in ouo exhibetur. Extrinsecus aut thoraci, & locis arte-  
riæ uicinis, lana sulfure imbuta imponatur, ac pingue, oleum ue-  
rutaceum esto, uel irinum, uel anethinum. Præterea deligatu-  
ra ualida in longum porrecta, tussim exactè cohibet: dico au-  
tem per medias partes extremasque. Non ratione caret, & uua  
syluestri quæ staphis agria dicitur, tussis gratia uti, simul cum  
domestica, aut cum mastiche mansa. summa debent infricari,  
permulceri, & ligaturis intercipi. deinde rursus soluenda est in  
contrarium retractio. At si propter febris acrimoniam tussis  
concitatur, utendum est gargarizationibus ex aqua tepida,  
nec non frigida subinde profuit, & ex posca, & palmarum de-  
cocto, uel rosarum, uel dulcis radiculae. Visceribus autem, uel  
etiam cordi ipsi iniiciuntur quæ modice refrigerant.

PAULI AEGIN.

g De



*De sternutamento.**Cap. XLIX.*

**S**ternutamenta febribus sæpe incidentia, molestant. Etenim caput replent, & uirtutem arguunt. Nonnullis sanguinem quoque eliciunt, & alia huiusmodi inferunt incommoda. Quare aduersus ipsa remedijs pugnandum est. Cohibet itaque sternutamentum irruens, nali, frontis & oculorum perfrictio, item oscitatio, studiosa palati, frictio, ructus, ilium intentio, capitis in altum eleuatio, inclinatioque ad latus, summarum partium mollis contrectatio, maxillæ musculorū perunctio, calentis olei in aures infusio, puluinum calidum mento subiectum. Caueri debet repentina ex somno excitatio, fumus, puluis, acrior odoratus piperis, castorei, sinapis. Mentæ autem malorum, & polentæ odor conducit. obtundit enim sternutamenti elisum: Idem spongiæ ex mari uacuae efficiunt. Vbi uerò cupiditas sternutandi oborta fuerit: non autem sternutamentum erumpat, labij quies accommodetur, & continue acriorum odorum experientia, & mentis remissio.

*De cibi fastidio.**Cap. L.*

**Q**uibus uitiosi humores fastidium procrearint, iis illa & esculenta & procurenta dare conuenit, quæ huiusmodi succos uel abstergendo per uomitiones, seu per aluum excernere soleant, uel attéperando, meliores reddant, quorum materiam libro superiore, qui totius operis optimus est, comprehendimus. At si ob uirtutis imbecillitatem, cibum respiciant, quoniã omnis facultas ex particularum intemperie infirmatur: conuenit in temperamenti speciem, contrarijs medicari. Plura de fastidio, in stomachi uitij libro tertio pertractabimus. In febricitantibus autem, statim per initia cibi cupiditas, ijs quæ odorem mouent, recuperanda est. Potissimum uerò polenta in aquâ mersa, uel posca, uel diluta uini potione. Aut cuiusdã odorati pomi, & astringentis decocto, item perunctione odore grata, & moderata totius corporis frictione, ac blanda contrectatione tum faciei collutione, aquæ sorbitione modicæ. Iam stomachus digito immisso turbatus, ad cibum assumendum quodammodo conuertitur, præsertim, ubi biliosum quid aut acidum sursum eiecerit. Secundum primos dies, † cataplasmatibus quoque à foris stomachus ad cibum sollicitetur, ex palmulis, malis cotoneis, ænanthæ, absinthio & aloe confectis.

Cibi



Cibi autem præparentur plures simplicesque, & frumentacei: qui alterius quoque generis uarietatem quandam habeant non tamē ab ijs multum recedant, qui in febribus dātur, in quibus & poma conueniunt, quæ non ex facili acescunt, neque nimium dulcia sunt, sed matura, neque ad satietatem exhibenda, uerum solum quod ad aliorum ciborū cupiditatem excitandam sufficit. Præsto autem sint ægris dum alentur familiarissimi, qui tum corripere eos, tum inhortari queant. Porro febribus solutis, si in uitium recreatione perduret fastidium, etiam sisarū cum oxymelite coctum, lactuca, oliuæ halmades, capparis, salamentum, bulbi, & quicquid ad bonitatem stomachi facit, accommodetur. Necnon & illud ipsum in memoriam reducatur quibus cibis per sanitatem maximē usi sint. itē ambulationes, gestationes, uociferationes, dropacismi, frictiones & exercitia adhibeantur. Præterea absinthii succi potio, uel aloes, aceti, scilicet instar mystri absorbtum, in id uehementer efficax est.

† Simplicior scriptura est, καὶ καταπλάσματος ἐφωθεν ὁ τόμαχος ἰαρεῖν δῶ, id est, cataplasmati à foris stomachus curetur. Nam quod est in exemplari typis expressio ἐπετρεφέδω omnino deprauatum est.

*De grandi fame. quæ græcis bulimos dicitur. Cap. LI.*

**S**I uerò in grandem famem, quam bulimon appellant Græci (dico autē cum minus quàm par est, cibos corpora sentiunt) fastidium deuenierit, hisce reficiemus, tum aliis, quæ naribus admouentur, tum suillis carnibus assis, & hædinis. In summa omnibus, quæ nidorosum odorem repræsentant: sæuitia sane febrium præterita, extremæ partes deligari. ipsiq; excitari debent, maxillas pungendo, & crines, uel auriculas uellendo, relictis autē, panis ex diluta uini potione, uel aliud quippiam distribui facile exhibetur.

*De canino appetitu.*

*Cap. LII.*

**E**T si hoc symptoma febribus non adeo superueniat, sed nonnunquàm secundum ipsas, atramen gratia cognationis, quam cum fastidio habet, nil fuerit mali, etiam de smmodico appetitu, quum ambo naturæ modum excedant, sermonem instituere. Quoniam igitur à pituita potissimum

g 2 acida



acida constituitur affectus, iis utendum est, quæ hanc incident, abstergeantque. Talia autem sunt maximè, dulcia, salsa, † & alioquin derergentia calida. Vinum igitur ipsis recte datur copiosum, ex eorum numero, quæ impense calefaciunt, cuiusmodi habentur colore fulua aut rubra, astringentis expertia. Verùm dulciora potius propinantur, etiam non sitientibus. At cum ad prandium uenerint, primum ipsis pingua, mox alia omnia ex oleo largiore præparata, quibus nihil austerum, aut astringens sit adiectum, offerentur. Hæc etenim, licet aduersus ipsam causam man fesse non pugnent, attamen impotentem ad cibos animi impetum dissoluunt. Inedia uerò spissitudinem pituitæ stomacho inhaerentis absomit, minuitque. Iam salsamenta ipsis commodè exhibentur, ab his uina commemorata liberaliter assumpta prosunt: quod ubi longiori tempore fecerint, caninus appetitus finitur.

† Codex manu scriptus habet, καὶ ἄλλως τμητικὰ θερμαίνοντα, id est, & alioquin incidentia calida. qui sensus huic loco conuenit, quanquam σμητικὰ etiam recte legi potest.

## De siti.

## Cap. LIII

**S**itum admodum longam fieri existimabis, ex siccitate, aut caliditate particularum, per quas humor ex ore in uentrem defertur, & siccitatis quidè remediū est somnus, caliditatis autem uigiliæ. Nonnulli uerò sitibundi ex uino, ciborumque caliditate fiunt, quibus medetur frigida potio. Prauas autem potiones appetunt, quemadmodum & cibos, præpollenti in eis humorum uitio respondentes. Cæterum siti pressos inextinguibili quandoque uidimus, ex quorū numero etiam mortem oppetierunt, tum qui uiperas dipsadas deuorant, tū qui uino ueteri sese inebriant. adhæc qui in nauigio ob aquæ potabilis defectum, marinam bibere ausi fuerunt. Verùm sitim in febribus placare solet, aspersio ex oleo frigidissimo, uel rosaceo cum impetu salientis modo super caput deturbata. Optime facit ad sitim nigræ lactucæ semen commanducatū. item glycyrriza appellata. adhæc cucumeris semen in ore retentum. Datur etiam ad sitim hoc catapotium cucumeris domestici drachmæ octo, tragacanthi drachmæ quatuor: tragacanthum soluitur ouorū crudorum recentium albumine. & cum fuerit dissolutum contritumque, cucumeris semini prius leuigato adiungitur.



tur. Postquam emollieris, pilulæ formantur, in umbraq; siccantur, ex his una sub lingua tenenda exhibetur: humor paulatim salua solutus deglutitur. Iam dilutum malorum cydoniorû, uel pirorum, uel mespilorum, uel pampinorum uitis, uel mali granati succus sorbitioni datur.

*De lingua scabritie. Cap. LIIII.*

**H**umectanda est linguæ scabrities, lini seminis decocto ægris ut in ore teneantur dato: melius autē facit myxion cum lini semine incocta, ac digito in hunc succum demerso lingua infricata, aqua puriore abluatur, uel spōgia undiquaq; abstergitur, deinde rosaceo illinitur. iam ipsum rosaceum melle cōtemperatum, in id ualde efficax est. & portulacæ succus in ore retentus. item rhu obsoniorum mulsæ admixtum bene facit. insuper Damascena, & myselii (hoc autem est myxa) ossa ore retenta & linguæ circumdata. His adde etiam lactucæ cauliculum Archigenes autem tradit etiam salem indicum, colore quidem & substantia communi similem, gustu autem melleum, lenticulæ instar, uel plurimum ad fabæ magnitudinē deuoratum, uehementer posse humectare. Cæterum in latus decumbere prodest, nam supinus cubitus exiccat. item os conuiuere. hiatus enim madorem absūmit. Sternutamenta porro accersita, linguas quouis alio plenius humectant.

*De nausea. Cap. LV.*

† **C**um sine cibo assumpto nauseabundus æger efficitur, cuius licet, arbitror, ratiocinari prauos humores uentriculum infestare. Nonnulli uerò turbantur, sed nihil euomūt, humore ipsis tunicis imbibito. Pituitosos itaq; succos concoquere oportet, seruādo ægrū in quiete, inedia, & somno. tenuiores autē uomitus eiicit, qui nōnunquā ex ptisanæ cremore, uel mulsæ excitatur. glutinosi humores & crassi, attenuātia desiderāt, quod genus est oxymel, & similia. Humiditate autē praua in tunicis absorpta, picra ex aloe utilis est, uerum quæ altringūt, haud mediocrē noxā cōciliant, quēadmodū rursus, cum humiditas multa citra malitiā inest, astringentia quidem quā utilissima sunt: medicamentū uerò ex aloe in marcorem perducit. Cū uerò frigiditas humorum adest, astringentibus misceri etiam debēt calefaciētia. Nota est frigidi affectus, quod neq; sitim, neq; ardorem eo detenti experiantur.



† Hic locus sic legitur in ueteri, ὅταν χωρὶς τῆ προσενεχθῆ-  
ναι τὸ ἐμετικόν καὶ τὴν δὲ κάμνῳ γίνηται, id est, cum æger si-  
ne assumptione eorum, quæ uomitum mouent, nausæbundus  
fuerit. Quæ scriptura clarior est.

*De bilis uomitione.*

*Cap. LV I.*

**B**ilem uomentibus cataplasma applicandum ex est pal-  
mulis, malicorio, galla, uino incoctis, uel posca, pane si-  
mul contrito. Item acacia, hypocystis, balaustium & rhu  
cataplasmati adiungantur. Præter hæc cucurbitula admota ma-  
gnificè auxiliatur, cum largiore flamma. Cibum uero frequen-  
ter paulatim dabimus. † In his autem qui atram bilem uo-  
munt, & inflationes stomachi experiuntur, spongiæ aceto quā  
acerrimo calente madidas imposito, uel hederæ folia uino in-  
cocta applicato

† Vetus codex hanc scripturnam habet, ἐπὶ δὲ τῶν χολὴν μέ-  
λαιναν ἐμούντων καὶ φουσωμένων τὸν τόμαχον καὶ τὰ ἐντερα καὶ  
τὴν κοιλίαν. i. in his autem qui atrā bilē uomūt, & inflationes  
stomachi, intestinorum & uentris experiuntur spongiæ, &c.

*De singultibus.*

*Cap. LV II.*

**S**ingultus oritur uel ex repletione, uel inanitione, uel suc-  
cis acrioribus stomachū erodentibus, quibus per uomitio-  
nē redditis, cessat. Pleriq; uero medicamentū diatrion pe-  
pereon assumentes, si statim uinū superbiberint, singultiunt. ¶  
aūt nōnulli etiā cibo intus corrupto singultu infestentur, cui-  
libet notū est, iam nō pauci rigore correpti, singultiunt. Vo-  
mitū itaq; ijs qui ex repletione, aut rosione stomachi singultu  
cruciantur mederi abundè comperimus, calida uero, ijs qui ob  
perfrictionē. At quum ab humorū repletione singultus origi-  
nem habuerit, uiolenta indiget euacuatione, quam sternuta-  
mentum præstat, ob inanitionē uero creatos singultus sternu-  
tatio nō finit, datur autem singultientibus ruta cum uino, uel  
nitrum in mulsā, uel sesili, uel daucum, uel cymīnū, uel gingi-  
ber, uel calamintha, uel nardus gallica. Hæc sanè singultus ex  
ciborū corruptione, aut frigore, aut repletione cōtracti, auxilia  
sunt. qui autē ex frigidorum uiscosorumq; humorum copia sin-  
gultum experiuntur, castoreū tribus obolis potui sument ex po-  
sca, idem cuti impositū una cum oleo ueteri sicyonio adiuuat.

*Insuper*



Insuper acetum scillites, uel oxymeli potum conuenit. denique spiritus retentio, præsens est remedium.

*De aluo in febribus astricta, & cita.*

*Cap. LVIII.*

**Q**Uæ crescentem aluum proritant, libro priore quantum res exegerit comprehendimus. quoniam uero eadem quoq; liquida febribus incidit, in præsentiarum mentionem ipsius facere oportet. Multi enim non febris ratione, sed ob hoc solum accidens in perniciem præcipitati sunt. Principio igitur excipiemus quæ egeruntur, nullo remedio occurrentes ut quæ à corruptione & cruditate emanent. Sin autem uacuatio modum excedat, cohibenda aluus est, & si quidè acriora efferuntur boni succi esse, & alioquin crassioris cōuenit, quæ assumuntur. huiusmodi existunt ex chondro, & prisana sorbitiones. balnea his post morbi concoctionem sunt idonea. Cum uerò pituitosiore & fluida erumpunt, contra sicciores calidioresq; cibi erunt, quatenus febres permittant. Huius generis habentur, quæ ex cōdimentis calidis confiunt. Balneis hi prohibendi si nihil aliud cōpulerit. Porro ubi cōcoctrix facultas infirmatur, astringentibus tū cibis, tū remedijs utendū est: cibis sanè, in quibus maximè malum granatum, aut mala cydonea, aut pira, aut mespila sint iniecta, uel etiam hi ipsi, & uino tenui odorato astringente: remedijs autē cataplasmatibus, nimirū ex polenta, palmulis, absinthio, rosīs, myrtis, & cōsimili materia. Cæterum considerandū uenit, quibus potissimū particulis cataplasmata debeāt imponi. dico autem stomacho, aut imo uentri: nonnūquam & circa lumbos applicamus. Cruentæ autē excretionēs reprimunt ex thure cōfecta, deficcantq;, uel subtilior portio polentæ cū thure, uel manna uino macerata, uel posca. Porro acriorē humiditatem etiā iniectione per aluum, edulcare cōpetit, nunc ipsa aqua, nunc prisanae cremore, uel chondri, uel oryzae, uel tragi, idq; nō semel uerū sæpius. Postea uerò adiungentur etiam rosæ siccae, uel myrti. nonnūquam & gallæ, & ouum simul cum rosaceo uinoq; tenui astringenti, uel rosarum decocto inditum uel sedi quoq; subiectum excernenti cupiditates retundit. Cum frequens desidendi est appetitus. Agathium sedi accommodatum ex calidis spissamentis immitatur.



*De sanguinis distillatione, & eiusdem ex naribus  
profluio. Cap. LIX.*

**Q**uoniam sanguinis distillatio totius corporis, aut capitis redundantiam innuit, per contusionem, uel densitatem eueniens: largior autem excretio habilis est laxare & minuere copiam, ratioq; est inde ipsam moliri, unde natura proclinauerit, his ego consideratis ausus sum in quartanarum distillationibus thyphie, ut mos est, narium uasa conuulnerare: oportet autem non exiguo fluore contentum esse, sed pro uiribus detrahare. Spontanea uerò in febribus per nares sanguinis profluvia, si in crisi fiant, excipere cōuenit. Si autem sanguis immodicè erumpat, sistere conandum est. Primū itaq; extremæ partes ualidè deligabuntur, æger sublimi capite figurabitur. Videtur etiam præputij deligatura sanguinis peculiariter ex naribus profluvia cohibere, æger non expurget narium foramina, neq; locum irriteret, uerum sanguinē concrefcere sinat. Nasus spongia, quæ in posca maduerit, refrigescat, ac obturamen ex panniculo naribus profluentibus demittatur, medicamento quodam ex eis quæ sanguinem comprimunt, inuncto: horum materiam, & reliquam curationem inter remedia unicuiq; loco affecto conuenientia libro subsequenti uerbosius persequemur.

*Si anima deficiat. Cap. LX.*

**Q**ui ex cholera, alui profluio, aliisq; multis, & uniuersim factis uacuationibus, resoluuntur, ijs aqua frigida aspergitur, & nares cōprehenduntur, os uentriculi infricatur, uomitus præcipitur, sto machus turbat, uel digitis immisissis, uel pinnis. præterea pluribus uinculis ualidè deligari debent. Cū per imas particulas uacuationes fiunt, brachia: cum per superiores, crura. Cæterum sanguinem fundentibus prospicienda est & figura sine dolore sursum uergens, & cucurbitula defigetur, quæ ad particulas retrahat situ contrarias uacuationem experiūtibus. Curat etiam uinum aqua temperatum resolutiones ex subitis uacuationibus ortas, nisi uiscerum inflammatio, aut uehemens capitis dolor, aut mentem turbans aliquis affectus, aut febris ardens, in cruro morbo prohibeat: in his siquidem magna uinum adfert incommoda. Et si æstus fuerit, calidiq; temperamenti æger, ac frigida assueuerit, frigidum uinum



uinum exhibebitur. sin contraria euenerint, calidum. At si ex sudoris copia anima deficiunt, cutis densanda est, quemadmodum à nobis prius est dictum. Tum ut frigidus aeris perflatus accedat, prospiciendum est. Porro in uentriculum defluxionibus nihil horum conuenit, præterquàm ipsi uentriculo stomachoq; corroborantia adiuuere, & affectos in balneum ducere. Hoc siquidem illiusmodi fluxibus est accommodatissimum, uerum sanguinis profluvia, & sudores uehementer proritat. Qui ob plenitudinem animo destituuntur, uino ciboque abstinebunt, item balneis, si febricitent. Potio autem mulsæ datur, in qua uel thymus, uel origanum, uel pulegium uel hyssopum sic incoctum. Propitium uero iis est & oxymeli. At si propter humores uitiosos in stomacho contentos anima defecerit, iubendi sunt uomere ab hydrelæo, digitis aut pinnis in os demissis. Sin autem uomere nequeant, oleum quam laudatissimum ipsis propinabitur hoc enim & aluo ex inferioribus partibus infusum, subinde uacuat. Iam uero absinthium ipsis auxiliatur. Porro si propter stomachi imbecillitatem dissoluantur, iis uti expedit quæ firmando ipsi sunt: ueluti antea in capite de eodem comprehensum est, summaque perfricare oportet. Exusti in sole ad balneum ducuntur: qui perfrixerunt, medicamen diatrion pipereon, ipsumq; piper assumant. Qui uero ob caliditatem largiorem, æstumue, aut lentā in balneo moram animo deficiunt, curantur frigida aspersa, & si aduentum conuertas, stomachi frictione, uini cibiq; usu. Sin autem propter inflammationis magnitudinem, aut febris malignitatem in accessionibus animus deliquerit perfrigescantq; artus fricare ualenter iubeto calefacere & deligare. Adhæc uigilias in ediamq; præcipito. Ea uerò & ante accessionem faciunda sunt. Quibus ob siccitatem anima deficit, duabus tribusue horis ante accessionem, cibus offeretur, uel chondri cremor, uel panis ex aqua simul cum mali grauiati nucleis, aut malis, aut piris. Si autem magni periculi metus sit, etiam uinum dabitur item iis qui subito animam perdunt, his remediis succurrendum est, ac ubique causam considerare conuenit, propter quam animæ defectus accidat, atque contra hanc pugnandum est. Nonnunquam uero & symptomatis maior habenda est sollicitudo, nempe cum periculum, uel etiam mortem minatur.

Quomodo




*Quomodo ulcus circa os sacrum proveniens  
curetur. Cap. LX.*


**E**T hic affectus, febribus potissimum lentis, ex diuturno  
decubitu superuenit. Cum itaq; sacri ossis regio incipit  
rubescere, circulum ex lana iustæ magnitudinis, parti  
subijciemus, postea rosaceum, uel myrteum ceratum,  
quod argenti spumam, aut cerusam habeat super-  
accommodabimus. Inflammatione autem  
oborta, cataplasma ex pane cum solano,  
uel polygonio, uel plantagine, uel  
tenera brassica applicatur. Si  
ulcus serpat, lenticu-  
la cum malicorio  
in star cata-  
plaf-  
matis induci-  
tur.

FINIS LIBRI SECVNDI IOANNE

GVINTERIO ANDERNACO MEDI-  
CO INTERPRETE.








PAVLI AEGINETAE

I IBER TERTIVS,

IOANNE GVINTERIO

*Andernaco Medico Interprete.*



DE PILORVM AFFECTIBVS.

De alopecia, & ophiasis, & caluitio. Cap. I.



VENADMODVM stirpiū nonnullæ succi defectu inarescentes contabescunt: nonnullæ uero alienis à natura sua humoribus infectæ: emarcent, haud dissimili ratione idipsum quoq; pilis usu uenit. Etenim Caluitiū, humidi penuria fieri cōsuevit: prauitatē aut, uitioq; succi, Alopecia, & Ophiasis, figura tātū inter se differētes. Qm̄ in Ophiasis, partē oblesam, serpentis modo glabrā, ostendit: alopecia, q̄ uulpes cōtinuē infestet, sic appellata est. Itaq; coniecturā de humore, qui superat, ex cutis colore facientes, uacuationē medicamēto purgante prius moliemur: deinde loco uitiato auxilia inducemus. Si igitur color ad nigrius, albidiusue mutatus fuerit, Antidoto Hiera quod pituitā educēdā, humoriq; melācholico est. utemur: sin ad pallidius, catapotia ex aloē exhibebimus: singulorū aut ipsorū descriptionē in lib. de medicamentis cōpositis inuenies. Vbi corpus iam totū inanieris, medicamēti quod pituitā per os extrahit, apophlegmatismōn Graci uocāt, usus erit, ex aceto, sinapi, & melle: isq; nō semel, uerum



uerum crebrior. Satius autem fuerit, si etiam in aceto origanū uel pulegium, uel thymus, uel hyssopū cōmauerit. Cæterum in aliis quoq; capitis affectibus eadem utemur curandi ratione: primum humorem, qui præpollet euacuantes, uel purgatione, uel etiam sanguinis emissionē, si eius subest redundantiā, dein ad præsidia quæ parti extrinsecus iniiciuntur, transgredi conuenit.

*De alopecia.*

**C**Vtis nitro confricata, linteoq; aspero, lanāue potius deterfa, & iterum defricata, adeò ut ruborem contraxerit, uerbena in Sole ex aceto detrita, illiniē. Aut alcyonio primæ asperitatis combusto, reductoq; in puluerem cū oleo ex lucerna inungitur. Aut arūdinis radix, aut amygdalæ amaræ cortex torridus, oleo, uel adipe ursina exceptus inducitur. Hæc itaq; sunt mitiora medicamina, uerum ex euphorbio, thapsia, & adarce, oleo leuigata laurino, uel pice liquidā, uehementiorē uim representant. **ALIUD.** Erinaceorū marinorū testa ignē experta cū adipe ursino excepta, loco prius nitro exterfo illiniē. **ALIUD.** Piperis, stercois ouilli sicci, erysimi, ærucæ seminis singulorū drachmæ quatuor, ueratri albi drachmæ treis, murium stercois drachma. Excipiuntur felle taurino, aut hircino, aut suillo.

*Aliud experientia probatum ad alopeciam.*

**M**Andragoræ, radice, mali terræ, ari radice, ceræ, picis liquidæ singulorum uncia octo, axungia porci subrumis, nerii herbæ medullæ modicū. Axungiam, & nerii incoquito, donec herba intabescat: deinde exēptam proiicito: & reliqua axungia adiungito, incoquitoq; mox ceram, & picem liquidam. Utitur in sole audacius. Vbi iam ulcera ad cicatricē uenerint, caput uulpeculæ urito, & alcyoniū, anchusæq; nigræ folia omnia contrita super inunctioni inducito, ut capiti pili succrescāt. **ALIUD.** Muris capitis combusti pars una, testarum marinarū tantundem, cum axungia porcina. omnia in fictili coctis utitor inspergens etiam ex ipsis siccis aliquid.

*Medicamentum ex thapsia ad omnes inueteratos affectus.*

**E**Vphorbii, thapsiæ, baccarum lauri singulorum uncia, sulfuris ignem non experti semuncia, ueratri tantundem, ceræ uncia sex, laurini, uel ricinini, aut ueteris olei quod



quod satis est. In ualidioribus etiam uti uincit nasturtij uncia, alcyonij combusti uncia : iisq; nō solū ad Alopecias, uerum etiam ad omnē diuturnam perfrictionem. Summatim in Alopecijs cutis prius nitro est extergenda, infricandaq; , & frequenter pili nouacula radendi. Si quidem plerisque noui ex sola infricatione, frequentiūque rasura pilos prouenisse.

*Quomodo caluitium abigatur, & pili crescunt.*

*Ex Critonis commentationibus.*

**L**EPORVM uentriculi quinque arefacti diligenter olla subtili friguntur. His adijcito, myrtorum, myrti summitatū, acaciæ fructus, acaciæ succi, rubi canini, æqualem modū, adianthi uncias tres. Hæc omnia accuratē resiccata in pollinem coguntur, & subtili cribro incernuntur: deinde adipis ursini libris quatuor, & phocæ totidem admistis denuō tunduntur. Excepta pixide plumbea reseruantur. Cum usus postulat, quolibet oleo aromatis imbuto diluuntur.

*Quæ pilos conseruent.*

**P**OLYTRICHI hærbæ pars una, ladani partes duæ, uino myrteoq; oleo exceptæ in usum adhibentur. **ALIVD.** Anemonæ flos tritus cum oleo inungitur: idem uerò, & nigrefacit. **ALIVD.** Verbenacam rectam unā cum radicibus torrefactā, rusamque tenui cribro incernito, mixtam oleo ut sordium habeat spissitudinem æreo uase reponito. Cum liquefeceris, utitor inuicem olei similiter.

*Aqua pilos augens, eosdemque denigrans.*

**A**QUAE pluuiialis sextarij sex, rhus alexandrini sextarij tres, polytrichi uncia quatuor, hærbæ sabinæ tantundem, ladani uncia, myrti uncia, cucurbitæ aridæ tantundem. Si nitro ad dies uiginti uitreo uase cōmadescere, bis mouens quotidie rudicula tedacea. † In sequenti tempore in aquam pilos singulos tingens, utitor quotidie. Item semen althææ in balneo illlitum pilos conseruat, augetq; . pari modo oleum inunctum, in quo semen ipsum althææ decoctum est, uel simul impositum.

† Vera scriptura est in antiquo cod. τῇ δὲ ἐπιβῆκη καταβάπτωντες τὸ ὕδωρ τὸν κτένα χρῶν καὶ ἔγω πόκι καὶ ἐκόφην ἡμέραν, id est, in sequenti die pectinem in aquam intingens utere, atque ita fac quotidie.

Quæ



*Quæ medicamenta pilos extenuent.*

**F**icus foliorū, uitis agrestis albæ corticis, pumicis, testarū buccinorum, terræ cinoliæ singulorum mina. Omnibus in nouam, crudamq; ollā coniectis, lutoq; oblitis, in camino coquito, tertioq; adiciens aphronitri minæ semissem, gallas immaturas numero triginta. In puluerē redacta excipito, ac utitor. **A. L. I. V. D.** Aphronitri minæ septē, pumicis tosti minę quatuor aluminis fissi, iridis siccæ, myrti syluestris nigræ, gūmi, bryoniæ radicis singulorū drachmæ quatuor, lupinorū crudorū in pollinem detritorum, congii pars quarta: Vtere absque pingui.

*Ad fluentes pilos.*

**A**loe ex uino nigro austero illinitur, uel purpuræ tegmina ex oleo cocta, uel myrrha, & ladanum cum uino, myrteoq; uel caprillum stercus in testa combustum ex oleo leuigatur ac cuti prius rasæ inungitur.

*Quomodo pili crispi fiant, & tincturis inficiantur, ex Cleopatrar libris, quos de capillis crispis faciendis prodidit.*

*Cap. II.*

**C**apite prius deterso, spondyli radix cū mero pilis inungitur. **A. L. I. V. D.** Nux pinea recens ad cinerē usq; comburitur, iniecta q; pilæ teritur, myrteum unguentum superinfunditur, donec mellis fiat spissitudo. Atq; sic pili raso capite abstersoq; delinuntur. **A. L. I. V. D.** Myrti, & betæ pari mensura cum oleo pilos abstergens utitor. **A. L. I. V. D.** Gallæ uiginti numero, adianthi uncia duæ ex aqua marina in mellis crassitiem coactæ inducuntur, sed pilo urina prius deterso, uel lixiuio, & aqua calente abluto, oblinetur medicamentū ad biduū, per quod ubi ipsum retinuerit, tertio die ablui debet, piliq; resiccati myrteo inungi. Id tenerū crispumq; & nigrum efficit capillum. At si prius caput nouacula raseris, crispior euadet.

*Quæ canos arcent, & eosdem denigrant.*

**O**lei, quod immaturæ oliuæ fuderunt sextarii tres, spicæ nardi drachma, unguis odorati drachmæ quatuor, iunci rotundi floris tantundem: incoquantur cum oleo. seorsim habebitur. Acaciæ succi uncia una, uino soluta leuigataq; diligenter. Vbi uero tertia pars olei fuerit relicta, hanc per colato, & acaciæ mixtā in sieldia excipito, ac utitor quotidie pilos inungens. **A. L. I. V. D.** Nucum uiridium corticis uncias tres, ilicis ra

ici



dicis tantundem, uini nigri sextarios tres, ad tertias decoqueto, ac ubi id quod reliquum est, exprefferis cum olei myrtei sextario iterum subiges, usus eius quotidianus.

*Aqua pilos denigrans.*

**G**Allæ sextarius unus, rhus coriarii sextarii duo, myrtinigræ totidem, cyperi foliorum æqualis mensura, cinaræ manipulus, papaueris nigrorum in floribus capitulorum tantundem, aquæ lacustris sextarii duodecim. Omnia multis ante diebus macerata, ad tertias decoquuntur. Deinde illinuntur, absterfis, siccatisq; crinibus. Ac cimoliæ terræ acetabulum cum uiua calce pari mensura inungitur. Hæc autem succo betæ elixæ soluta illinuntur. Deinde betæ folia tegminis gratia super accommodantur. ac ubi satis adhæserint, in balneo abluuntur.

*Vt ruffi capilli tingantur, & flauescant.*

**M**Yrrhæ pars una cum salis floris altera, accuratè teritur. ubi sordium facta est crassities, caput prius detersum medicamento inungitur. siniturq; per noctem, & diem, postea tunc ablui præcipies. **ALIVD.** Lupinos crudos cum aqua illinito. **ALIVD.** Argentæ spumæ drachmam, terræ creticæ drachmas quatuor, calcis uiuæ drachmā. Ex aqua mellis crassitiē faciēs inūgito, & betæ foliis adiectis ad duos, tresve dies abluito.

*Vt pili nigri flauescant.*

**F**Loces uini in balnei sordes mittuntur, & spissitudine ceratī facta sub somnū illinuntur, & mane pili flauescunt. **ALIVD.** Cyperi folia succo herbæ lanariæ fruticis madescunt. Et diluto uteris.

*Quæ capillum red dunt colore aureum.*

**A**Luminis, sandarachæ, singulorum drachmæ sex, croci drachmæ duæ, thapsi qua tinctorum utuntur, Romani uocant herbam rubiam, drachmæ octo, è cinere lixiuii quo pilearij utuntur sextarii quatuor. Lixiuuium cum thapso contusa incoquito. ubi dimidia portio relicta fuerit, humorem exprimito quo alumen, sandaracham, & crocum dilues. Deinde uase uitreo condas. Vbi usus uenerit, pilos prius absterfos illinito. postquam uerò combiberint, ablues decocto scænuigræci, hordei, & cumini, aquæ prius tepidæ superfusa, quod sufficit, ad hæc saponis quantum satis est adicies. **ALIVD.** Flores uini ustæ unā cum oleo balanino, pilis oblinuntur.



nuntur. *ALIUD.* Saponē gallico cum aqua in singulis balneis pili absterguntur.

*Aliud ualde generosum.*

**R**HYS rubri sextarius, gallarum libra una, Selydri uncia duarum, herbe aurū colore imitantis (quam Romani rubiam uocant) uncia duarum, polytrychi fasciculi duo, absynthij unus, lupinorum quibus cortex sit detractus cyathi duo, aquae sextarij septem. Omnia in uitreum uas coniecta, dies nouē finito comadescere: quotidie bis rudicula agitans cum usus exigit, auferes quod satis est. & hoc spongiam madefaciens, pilos confricato humectosq; combibere finito. ubi siccati fuerint, saponē calidā aqua soluto, abluuntur.

*Quae pilos albos faciunt.*

**V**ERBAsCI candidi flos combustus aceto mergitur, & in saponem miscetur. *ALIUD.* Verbasci seminis, aluminis, raphanorū corticis singulorum drachma. Contundito, & glutini quod ex tergoribus bouum confit, ταυρακόλλην Græci uocant, drachmas quatuor misceto.

*De capitis affectibus cutem infestantibus, porrigine, quæ pityriasis dicitur. Cap. III.*

**P**ORRIGO, quæ pityriasis Græcè dicitur, est, cum tenues, & furfuraceæ squamulae ex capitis, uel etiā reliqui corporis superficie citra exulcerationem resoluuntur. Id autē euenit uicioso, corporis humore, salsaue pituita, aut bilioso, & melancholico sanguine caput subeunte. Itaq; corpore toto (ut dictum est) euacuato, subscriptis remedijs utemur. Cimoliam aqua prius maceratā betæ succo miscebis illinesq; & tantisper ita permittes, donec inaruerit. Deinde postquā ablueris, thus ex uino oleoque detritum perunges: die in sequenti staphida agriam, hoc herbam pediculariā ex oleo inunges. *ALIUD.* Nitri, fecis concrematae, myrobalanorum, singulorum libra, herbae pediculariae libra una semis uino dilutis caput abstergitur. sin autem reliquum corpus pruritu uexetur, siccis. Ad humidiores uero pityriasis, muria uel lupinorem decocto caput abluendum est. hoc enim subinde sum expertus.

*Ad psydracia & exanthemata capitis.*

**P**SYDRACIA exigua capitis tubercula sunt, pustulis similia, quæ summam cutem excedunt. Exanthemata uero cutis



cutis sunt exulcerationes, subrubicundæ, & asperæ. Vtrunque uitium præsidij infra positis exteritur. Argentæ spumæ, cerusæ singulorum drachmæ quatuor, aluminis drachmæ duæ, rutæ foliorum uiridium totidem. ex aceto myrteoq, oleo leuigata cuti illnuntur. *ALIVD.* Ruta & alumen cum melle trita, capiti prius raso inunguntur. Sin autem cutis à capite abscedit, olæ folia elixa cum melle cataplasmatibus modo inducuntur. *ALIVD.* Argenti spumæ, cerusæ singulorum drachmæ duodecim, sulfuris uiui drachmæ octo, cerato myrteo excipiuntur.

*Ad hufcuscula capitis densa rubraque.*

**H**Aec papillis sunt similia, ex quibus sanies eliquatur. Capite prius nouacula raso, & aqua nitroque absterfo, sulfure uiuo ex hominis urina contrito utitor. Vel cretam sutoriam *μελανηρία* uocant Græci, cum aceto inungito.

*De manantibus capitis ulceribus, quæ acores  
græce dicuntur, & fauis.*

**I**Nter capitis uitia, quæ in cute oboriuntur, unum est quod appellatur Græcis Achor, à nostris manantia ulcera, tenuissimis cutem foraminibus perforans: per quæ glutinosa fertur sanies. Simile ipsi malū specie est, quod à faui similitudine *κηρίον* à Græcis nominatur, quod magis amplis foraminibus constat, quibus humor crassitudinem mellis referens sicut in apium fauis, continetur. Origo est ex nitrosa salsaque pituita. uictus igitur ratio ex cibis boni succi constare: omnia acria & salsa uitari debent: præsertim si inflammationem affectus resipiat. postquam corpus superfluo decenter erit leuatum, derafis capillis caput fouendum bis ter'ue die, aut etiam sæpius, aqua calida, in qua myrtus sit decocta, uel rubus, uel lenticula, uel amari lupini, uel asparagi radix. Quum uerò plus saniei emanat, salicis folia cum aqua, uel lenticula, instar cataplasmatibus applicantur. terra autem cimolia uel cretica, uel samia, uel pompholix, uel spodium, uel argenti spuma, uel cadmia, uel charta combusta, uel etiam medicamentum ex charta Xerion, omnia ex aceto inducuntur. Smegmate uerò hoc utendum est, sulfure uiuo, & perdicij herbæ, saponisque æquali pondere. Composita hæc sunt, argenti spumæ drachmæ duodecim, rutæ foliorum drachmæ octo, herbæ pediculariæ quam staphida agriam Græci uocant, drachmæ quatuor, chalchanthi drachmæ duæ. Aceto

PAULI ÆGIN. h myrteoque



myrteoq; in sordium spissitudinē coacta illinuntur. ALIVD. Sandicis drachmæ quatuor, myrrhæ drachmæ quatuor, sulphuris ignē non experti pondo drachmę duæ, pollinis thuris drachmæ quatuor, ex oleo ueteri inunguntur.

*Aliud ad achoras.*

AD achoras recrementū argenti, uel molibdenam contritā oblineto. ALIVD. Ad achoras & humidās scabies, rhododaphnæ, rosarum uncie quatuor, sulfuris uiui uncie quatuor, picis liquidæ, & picis aridæ utriusq; uncie tres, cere selibra, olei myrtei quantū opus est. in pueris autē, lacte soluta illinuntur.

*De fisis.*

Ficus, nominant eruptiones, ulcerosas, rotundas, subduras, rubentes, quas dolor etiam comitatur. Fit uerò hoc mali plurima ex parte in capite, nascitur tamen & in reliquo corpore. Probatum maximè contra hos alumē fissile, æris flos tostus, & glutinum pari mensura cum squamæ æris duplo. Teruntur ex aceto illinunturq; . Præstans etiam remedium est menarum capita, combusta, elixiq; bulbi, & cinis aceto mixtus.

*Aduersus capitis & menti ficiosa exanthemata, xyraphium.*

Misyos drachma una semis, chalcitidis drachmæ duæ semis, squamæ æris drachma, aluminis fissi, drachma. Bene loto, hoc medicamen aridum impositum dimittitur. Die in sequenti rursus pars lauatur, spongiaq; detergæ idem applicatur. Decidit enim ramentum crassissimum. Et si diebus subsequētis idem fiat, sine cicatrice breui consanescit. Cæterum medicamen hoc non mediocriter adhæret.

*Ad capitis pediculos.*

Uspinorum in aqua coctorum diluto, caput detergeri iubetor: uel herba pedicularia, uel sandaracha, uel utraq; contrita ex oleo ueteri, seu aceto illinitur, uel piperis momentū, ne exulceret cū oleo, aut hederæ succo cū melle, † aut minio synopico cum aceto, aut cedrino liquore, aut pice liquida cum alumine, aut baccarum lauri expresso, aut oleo raphanino. Ego pediculariam ex aceto oleoque tritam inunxi, ac semper quod uolui, sum affecutus.

† Græcus codex manu scriptus ἡ σίνιπι, id est, uel sinapi cū aceto, quæ scriptura uerior est.

De



*De capitis dolore, quem græci κεφαλαλγίαν  
uocant. Cap. II II.*

**C**apitis dolor qui græcis dicitur κεφαλαλγία, symptoma est grauissimū, ac nunc ex sola intēperata qualitate ori-  
tur, nunc ex nimia humorū copia. Interim ex utraque  
causa: interim uero ex primaria causa, nēpe solis æstu extrinse-  
cus, frigore, ebrietate, aut ictu. Vehemētissimi igitur capitis do-  
lores ex efficiētibus qualitatibus nascūtur, & potissimū ex cali-  
da: qui uerò ob siccitatē cōtrahuntur, nō æquē uehemētes exi-  
stunt. Humida qualitas sui ipsius respectu, nullū plane dolorē  
cōciliat, nisi caliditati, aut frigori, aut humorū copię adiuncta.  
Itaq; de eo capitis dolore qui cū febris est eo loco explicatum  
est, quo febrīū curatio exposita est nūc de cæteris dicēdum est.

*De capitis dolore ex insolatu contraçto.*

**Q**ui ex insolatu capite dolēt, eorū cutis tactu calida est,  
& primo statim manus iniectu aridior apparet: oculos  
habēt rubētes, frigidis asperginibus, & inunctionibus oblectan-  
tur, sentiuntq; ab ipsis præsiidiū. Cæterū curatio his conueniet,  
etiā ea, quā dolori in febribus præscripsimus. Si dolor perseue-  
rat, infra scriptis utēdū est cataplasmatis. prodest frōti & tēpibus  
inductus panis ex posca, & rosaceo. Interdū cū amygdalis, uel  
rosis, siccis, aut teneris, uel cū mentha cui pulegiū sit adiectum,  
uel panis cū perfici folijs facit ēt ocymū ex aceto & rosaceo tri-  
tū, uel hederæ corymbi in aceto elixi. Iā farinā triticeā cū ro-  
ceo leuigatā, uel serpilli ex aqua decocto miscere cōuenit, uel  
cardamomū torridū leuigatumq; ex aceto & rosaceo: uel fer-  
mentū cū rosaceo, uel iridē aridā cū aceto. Sed mutantur conti-  
nue singula: nam si diutius adhæreant, inefficacia redduntur.

*Pastilli ad capitis dolorem ex intemperie calida.*

**C**Roci drachmæ quinque, chalchanti drachmæ decem, alu-  
minis drachmæ sedecim, myrrhæ drachmæ septem, om-  
phacij drachmæ tres, chalcitidis drachmæ tres, gummi drach-  
mæ tres. Vini austeri quod sufficit. Ex posca sumuntur. Sin  
etiam uigiliæ infestent, aliquid ex somniferis applicatur.

*De ijs quibus caput ex frigida intemperie indolescit.*

**†** **A**T si frigus nocuit, cōtraria ijs qui ex solis æstu dolēt, af-  
fectos signa testātur. Etenim facies ipsorū non cōcidit,  
h 2 sed



sed colorē decorēq; amisit. Item frigidis nec gaudent, nec iuuantur. Verum horū agnitionē tum uictus ratio, tum reliqua concurrētia firmabunt. Inunctiones igitur adhibendæ ex oleo rutaceo, laurino, uel irino, uel nardino, uel etiam opobalsamo, præsertim si recrementa fuerint crassiora uiscosaq;. Frons autem cū hoc liquore, tum ijs medicamentis debet illini, quæ ex pipere, & euphorbio præparantur. Vinū subtilius propinandū: corporis motione & balneis uti calidis præcipiendum, interim à radícula uomitu. In quibus autē qualitas citra humorū copiā diutius persistat, hoc utendū est medicamine. Piperis albi drachmæ duæ, crocomagmatis drachmæ duæ, euphorbij recentis drachmæ octo S, stercoris columbini drachma una S, aceti acerrimi quantū satis est. Illinitur pars laborans, sed prius infricata.

† Locus hic sic legitur in ueteri græco exemplari. τῶς ἐπὶ ἐγκανσει κεφαλαλγῶσιν ὑπεναντίως ἔχει τὰ τε σημεῖα, καὶ ἡ θεραπεία τῶν ἐπὶ φύξι. idest, signa & curatio eorum, quibus caput ex frigore dolet, sunt contraria signis & curationi eorum, quibus caput ab æstu dolet.

*Si biliosus humor dolorem inuexerit.*

**N**Otæ horum per similes ijs, quos ob solis æstum dolor affligit. Sed maior ipsis rosio accedit, & faciei pallor. interim etiā os ina marefcit. Porro affectus hic ætatibus potius uigentibus, & tēperaturis calidioribus, uitę sollicitę, & bilem flauā coaceruantibus solet accidere. Quamobrē balneū temperatū his, in unctiones, aquæ potus, & uniuerſa uictus ratio humidior, bonique succi adhiberi debet. Biliosus humor absynthij diluto, uacuabitur: uel aloe, aut ipsa Picra, antidoto per se, aut cum modica scāmonia, aut catapotijs quæ ex aloe constant. Inungenda frons, aut crocodi pastillo, aut trigono, aut quodā simili.

*Si caput consortij lege indoleſcat.*

**S**I caput consortij lege cū toto corpore afficiatur, cura adhibenda, ut contra intemperiem, & superantem materiam pugnemus. & si copia quidem premit & maximè in uenis, sanguis mittendus est: sin autem magis qualitas urgeat, purganti utendum medicamine. Quod si particula laborante aliqua simul condoleſcat, ueluti iocinore, aut uentriculo, aut stomacho, his succurrendum est. Vbi calida afficit intēperies, panis ex aquo-  
so uino



so uino exhibetur, uel etiam ex chondro sorbitiūculæ. Extrinsecus uincit superfundere, quæ modicè refrigerent, uiresq; conserment, sicut à me prius cōprehensum est. At si glutinosi, crassiq; humores in stomacho infarcti, capitis dolorem concitent, hos quoq; anollemur potu oxymelitis, tum simplicis, tum Iuliani. Insuper medicamentis ex hyssopo & origano, & his adhuc calidioribus magisq; incidentibus. Iam uomitus à radícula utilis, superfusiones calidiores, & cataplasmata.

*De capitis dolore ex uino.*

**S**I uinum adhuc incoctū in stomacho fluctuet, tepentis aquæ potu uomere dolentem iubebis. Quod si etiam post concoctionem caput indoleat, refrigerantibus, repellentibusq; utemur, quale est rosaceum priuatim sumptum, & cum aceto, uel hederæ succo, uel brassicæ. Quin & ipsa brassicæ folia in aquā calidam demersa, & capiti circumdata ligataque, naturaliter ebrietatem arcet. eiusdem decoctæ eius in id efficax est. Item lenticula hos adiuuat, potissimumq; uētriculo humidiorē præditos. Adhæc alica, malicorium, & mala ipsa, piraq; , tum aquæ potio, utiliter assumuntur.

*De capitis dolore ex ictu.*

**Q**UI ex ictu capitis dolorem conceperunt, iis, nisi summa omnino cute percussi sint, sanguis statim emittendus est, & conuenientes aspergines capiti sunt adhibendæ. Oleoque dulci irrigandum ipsum sanisq; contegendum. Vino ciboq; pleniori, præsertim si febris adest, ægros coercere expedit. Et tota curatio ceu ad neruorum partium inflammationem & præcipuè membranarum cerebri quas meningas appellāt, adaptabitur. Si uerò & uulnus factum fuerit, huic quoque decenter medebimur.

*Malagma ad capitis dolorem.*

**C**ERÆ drachmæ septem, amygdalini olei uncia tres, terebinthinæ drachmæ octo, æruginis rasæ, cimoliæ, chalcitidis singulorum drachmæ quatuor, pumicis drachmæ tres, æris usti, squamæ stomomatis singulorum drachmæ duæ. Si uidetur paulo esse durus, amygdalino emolliendum.

*De cephalæa, & hemicrania.*

**V**TERq; hic affectus, stabilis ac permanens capitis dolor est, qui strepitu, clamoribus, claritate lucis uini potu, & impletibus

h 3 tibua



tibus caput odoribus excandescit ex acuiturq; . Ac alijs totum ferri caput in hoc dolore , alijs alteram ipsius partem dūtaxat excruciarī uidetur, quos etiam hemicranicos nominant. Quibus sanè intra caluariam malū consistit, ijs dolor ad oculorum radices porrigitur : quibus extra est, circa ipsam caluariam indolefcunt. Quapropter dolores cum grauitate molesti, plenitudinem testantur cum erosione infestantes, uel humorum, uel uaporum acrimoniam : qui cum pulsibus obueniunt, inflammationem : qui cum tentione, si quidem grauitas & pulsus nō adsit, spiritus tenuis, & flatulenti redundantia inuuit, si cū pulsu, membranosa partis inflammationem : cū grauitate uero, copiam intra membranas cōtineri. At si putridus etiā humor, calidior euaserit, & cum febris simul capite dolitant : febriunt autem omnino, & quibus inflammatio dolorē parit. Quū igitur corpus totum succis æquabiliter omnibus redundat, quod plethoricum dicitur : uenā secare si uires patiantur, & acrioribus, uti clysteriis conuenit. Inde si adhuc sanguis uidetur exuberare, etiam uena nariū adaperita, quantum satis esse uidetur, detrahes. Mox liera, quam exacueris, intenderisq; exhibēda, deinde pituitæ eductionibus, apophlegmatismos uocant, utendū est, tum ijs quæ per nares uacuant, ἑξῆς & græcis dicuntur. Eiusmodi est elaterij succus cum lacte infusus, uel etiam aridum elateriū inspiratum, succusq; cyclamini & porri. Hæc quæ sequuntur, sunt composita. Medicamentū quod naribus inditur ad ueteres cephalæas lippitudines & morbos comitiales, melanchij drachmæ octo, salis ammoniaci drachmæ quatuor, elaterij drachmæ quatuor. Tūsa, oleo sycionio, uel irino, uel cyprino excepta, ut cerati fiat spissitudo, narib. demittunt.

*Medicamentum quod pituitam extrahit,  
naribus inspiratum.*

**C**yclamini sicci drachmæ octo, nitri rubri drachmæ quatuor. Sin autem in uicem nitri elaterium indideris, magis proficiet. Tritum accurate calamo scriptorio naribus inspirabitur. Porro epithemata quoq; capiti admovento, & inunctiones : ubi morbus in nerūstatem magis inciderit.

*Epithema ad cephalæam.*

**V**nguenti irini, peucedani, castorei singulorū drachma, baccarum lauri drachmæ duæ, rutæ summitatum drachmæ quatuor.



quatuor. Excipitur cerato rosaceo, rasoq; capiti, toti ipsi imponitur. Mulier quædam in hemicranicis hoc etiam quod sequitur epithemate usâ, mirandû in modû inclaruit. Radicē cucumis syluestris uiridem minutim cōcisam, absinthiumq; cum hydrelæo incoquebat: dum intabescerent. Ac hydrelæo calente mediocriter partem affectâ irrorabat. radicē uero & absinthium, in puluerē contrita oblinebat. Atq; hoc solo medicamine, hemicranicos, id est, altera capitis parte dolentes, & cum febre, & sine ipsa, curauit. At si malum maximè increuerit, ut dolorem ferre nequeant, utitor medicamentis etiam quæ lepire possunt, & noxia euocare, quale est quod sequitur.

*Unguentum ad cephalæam.*

**L**iquoris peucedani drachmæ sedecim, lachrymę papaueris, anisi, alterci quod hyoscyamū græci uocāt, croci, myrrhæ, scāmoniæ singulorū drachmæ duæ. Aceto excepta in pastillos coguntur. Cum usus postulat, ex aceto uel posca illinūtur iis, quibus humores crassi, uel spiritus flatulentus dolorē fecit. Iā dropax & sinapisimus iisdē benefacit: & pastillus ex taphia. Iā qui ex atramento scriptorio fit mirificè eidē causæ medetur, quo post hæc utendum est sicut in opere de compositis docebitur. Quin & istud mirabilem in modum ad hemicranicos ex crasso glutinosoq; humore dolentes efficax est. Euphorbij portio una cum pari castorei modo aqua excepta auriculę demittitur qua parte indolescit, inde balneū adeundū, ubi paululum immorati ipsum assument, & cōsuetō more lauabunt. Sic quidem expertum est, uerum non alienum absurdumq; fuerit, & oleo ipsa excepta, in aurem instillare. Item quod medicamē ad coxendices inscribitur, etiam longo capitis dolore laborantes, & hemicranicos ex toto per sanat.

*Ad hemicraniam ueterem.*

**A**lliorū drachmæ quatuor, ceræ drachmæ duæ, axūgiæ ueteris drachmæ duæ, cātharidū drachmæ duæ. Vesperis allitunt snito p noctē adhærere. Mane, iuxta papula, malagmate, quia liquidū est, πικρυγδὸν appellāt, si medeberis. ALIUD. Baccarū lauri quibus cortex sit ablati, drach. duæ, rutæ foliorū, drach. duæ, sinapios, drachma. Aqua dilutū oblinito. At iis q; frigori patuerūt, utilissimū est infra scriptū medicamentū ut plerūq; semel ante balneas illitū, confestim afficitui medeatur, & agrotātes



omnino sani post lauacrum euadant. Olei sabini pondo, ceræ quadrans, euphorbii uncia. Hoc dimidiæ frontis partinempe qua temporum musculus habetur, delini debet. Qui uero frigoris iniuriam non senserunt, ijs gallæ, & crocomagmatis parē portionem cum uino detritam iniugito. Sed qui ex calidis uaporibus, uel succis capite dolitant, ijs medicamēta quæ euphorbio constant, non applicabis.

*Apophlegmatismus, id est, medicamentum quod saliuam mouet contro cephalæam.*

**S**inapeos contriti & in succū redacti ex aceto & melle drachmæ quatuordecim, herbæ pediculariæ drachmæ quatuor, pyrethri tantundem. Tusa, cribrataq; misceto, & in sole gargarizato. Porro si ob biliosum humorem, aut quandam intemperiem orta Cephalæa diutius prorogetur, eorū usu ueniet quæ in sermone de dolore capitis cōprehensa sunt. Si ne sic quidem dolor finitur, neq; cucurbitulis, neq; hirudinibus adhibitis, sed suspicio sit humores per arterias in caput esse distributos, non absurdum fuerit & arteriam post aures incidere. Porro humidioribus, etiam balineæ naturales rectè adhibentur.

*De phrenitide.*

*Cap. VI.*

**P**hrenitis, membranarum cerebri, quas meningas græci appellant, inflammatio est, nunc quidē ipso quoq; cerebro simul eam experiunte, nunc autem calore præter naturam in eo consistente. Causa morbi est, uel sanguis superās, uel biliosus humor: nonnunquā & flaua bilis perusta, adeo ut in nigrā degenerauerit, quando etiā grauissima phrenitis nascitur. Aliquando cerebrū septi transuersi cōsortio dolens, ex neruis qui in ipsum sparguntur uitiū cōcipit. At quæ mentis alienatio in ardentissimarum febrium statibus accidit, quæq; ex stomachi consensu exoritur, phrenitis non est, sed hoc solū, puta delirium. Comitantur propriè phreniticos uigiliæ quidem plurima parte: interdum uero & somnus turbulentus accedit, ut consurgant, exilient, & furibunde uociferentur. Quibus sanguineus humor morbum fecit, ij cum risu insaniunt: quibus flaua bilis ferociter, quemadmodum quibus atra uitiū contraxit, tam immaniter sæuiunt ut coerceri nequeant, omnium quæ dicunt, faciunt uē, obliuiscuntur. Oculos habent sanguineo colore tetricos, ac perfricant: interim aridos, interim lachry-



lachrymātes, uel lemis, hoc est crassiore pituita oppletos. Lingua est aspera, & sanguis è naribus destillat: floccos festucasq; colligunt, febris per totum morbi decursum acuta conficiuntur: sed quæ in alto maligna delitescat. Pulsus ædunt exiguos, languidos, & quadantenus etiam duos. Respirationē magnā & raram, cum cerebrum primariò afficitur. At si phrenitis septi transuersi, quod græci phrēnas uocant, consortio concite-  
tur, & respiratio inæqualis est, & præcordia sursum conuellun-  
tur, & multo calore ardent: sicut iis qui ex cerebri uitio insa-  
niunt, facies incalescit, & subcruenta est, uenæ repletæ. Quod  
si humor pituitosus sit temperatus bilioso, uti causam, ita ap-  
pellationem quoq; compositam habet. Nam uigilans coma,  
nominant, in uniuersum quidem cū biliosus superauerit, quip-  
pe tales ægri uigiles phrenitide laborant: cum uero pituito-  
sus præpoller, contra in grauiorem ueluti somnum quem co-  
ma uocant græci, deferuntur. Atq; hoc malum antiquiores Ga-  
leno medici, Cathocon uocauerunt.

*Curatio phrenitidis.*

**Q**Uod si uires ægri patiantur, sanguis protinus è cubito  
mitti debet, & copiosior. At si desipiens brachium non  
porrigat, aut si porrigat, metus sit secundū uacuationem, san-  
guinis profluuij, dum manū æger subinde ob mētis turbationē  
iactitet, recta in fronte uena diuisa, una uice quod satis est au-  
feremus: itē clysteriis utemur, ex hydrelæo, uel rosaceo cum  
ptisanæ cremore. Si uigiliæ urgent, rosaceū, uel oxyrhodinum  
in caput dandū est. Aliquādo calida ipsum aqua prius superfund-  
endū: & medicamentū quod ex papaueris capitibus uocatur  
diacodyon exhibebitur, nisi uirtus imbecilla prohibeat. Et alia  
quæ ad somnum conciliandū superius scripta sunt, huc trans-  
feremus. Decumbat æger in loco, tum lumine, tum tēperie mo-  
derato: & uariis quibusdā picturis libero, ut quæ tales deter-  
reant. Quò amici quidā gratissimi ingredientur, & commodū  
incident, qui nūc blande ægrotum alloquantur, nunc acerbius  
corripiant. Cibis primum esto aqua mulsa, deinde ptisanæ cre-  
mor, & sorbitiones ex chondro cum quadam dulci potione, ut  
apomelite, uel hydrorofato, uel rhodomelo, uel dulci hydro-  
melo. Nam uinosum hydromelum, quod in paruis uasculis ex  
Cibyra apportatur, repudiandum, ut quod grauiores uino no-

xas



xas in talibus excitet, & maximè in capitis affectibus, idq; ante  
 concoctionem. Panis quoq; aqua lotus rectè exhibetur, intubi,  
 lactucæ clixæ. Si multus feruor conficiat, etiam cruda hæc  
 dantur. Item cucumeris medulla, peponis, duracini, & similiū.  
 Aquæ frigida potu coercendi sunt, potissimum si septum tri-  
 uersum consortii lege malo dedisse originem deprehenderi-  
 mus. Quod si urina ipsis, ut consentaneum est, delirij uitio co-  
 hibeatur, † fota adhibito calente hydrelæo & inferiorem uen-  
 tris ab umbilico regionem, ἡτρον græci uocant, & uesicam su-  
 perfundemus, deinde digitis manus, loco innixis ad reddendū  
 urinam incitabimus. Reliquum corpus ipsis decumbentibus  
 calido oleo perungi debet. Etenim in quiete, quoad eius fieri  
 licet, seruari debent, ita ut siquidem prædiuites aliqui fuerint,  
 per famulos contineantur: sin minus, uinculis constringantur.  
 Nam inordinata motio uires conuellit. Iam uero alia etiam  
 de causa pedes prius foti, deligaturis constringi, manuq; con-  
 tractari debent, nempe quò humores deorsum reuellantur.  
 Porro si longior affectus, & contumax fuerit, ab iis quæ sopo-  
 rem accersunt, κερωτικά græci appellant, abstinendum: ea ue-  
 rò quæ digerendi facultatem obtinent, capitis perfusionibus  
 miscenda, scilicet mentæ succus, uel serpilli uel calaminthæ,  
 uel turbæ. Tum iis quoq; utendum quæ naribus inseruntur. A  
 septimo die si uiscera sentiant inflammationem, cataplasmatibus  
 ex lini semine, & hordeacea farina cum hydrelæo leniemus.  
 Deinde cucurbitulas leues, aut cum scarificatione, tum his ip-  
 sis, tum occipicio, & spinæ accommodabimus. Si corpus squali-  
 dum perustumq; esse coniecturaueris, febrisq; adsit, etiam bal-  
 neis utendum aquæ potabilis, & unctione liberaliore. Vinum  
 tenue & aquosum, quod ὀλιγοφύρον appellant, uiribus re colli-  
 gendis propinabimus, nullam inde mentis turbationem, ut est  
 uerisimile, futuram suspicantes. Aut enim nulla sit cum mor-  
 bus declinat, aut certè si sit, ex facili subsidet. Processu au-  
 tem declinationis, gestatione corporis uti expedit, & congrua  
 uirium recreatione. Sed ita phrenitici se se recolligent, ut  
 ebrietatem, ciborum corruptiones, & in primis solis æstum  
 caueant.

† Hæc sic leguntur in antiquo codice, ποιήσαντες ἀλέαν κα-  
 ταντλήσωμεν θερμῇ ὕδατι καὶ ὕδρελαίῳ id est, fota adhibita  
 calente aqua, aut hydrelæo.

De



*De inflammatione cerebri. Cap. VII.*

**C**erebrum inflammatione laborans, sæpe ita intumescit, ut capitis suturæ distendantur. Dolor comitatur maximus, & diuturnus, multus angor, rubor in facie multus cum tumore molli: oculi fiunt emissicii, caput inturgescit, Qui hoc malo impliciti sunt, sanguinē ex cubito mittere, item ex naribus, & uasis linguæ subditis debēt. Porro utitor & asperfusionibus quæ per inflammationes capiti adhibentur, & cataplasmatis, quæ humectare, & maturare sunt idonea.

*De erysipellate cerebri. Cap. VIII.*

**A**ccidit quoq; erysipelas cerebro, quo laborans hæc patitur: capite dolet uniuerso, adeo ut flammis id uri putet. facies frigida est, & subpallida, os siccescit. Quare sic affecto sanguis detrahendus est, & potissimum ex uenis sub lingua sitis. Refrigerantia conueniunt: quibus in aliis quoque erysipelatis utimur.

*De lethargo. Cap. IX.*

**L**ethargus itidem, cum ratiocinatricis animæ noxa sit aliqua, locum eundem quem phrenitis, nempe cerebrum, occupat: materia uerò mali, contraria est. Nam ex pituita humidior, frigidiorq; cerebrum madefaciente, contrahitur. Lethargicos comitatur febris lenta, non impensè acris erodensq; cū alto sopore, quæ cataphora Græcis dicitur, Pulsus his magni, rariq; sunt, & undosi, respiratio nimis rara & imbecillis. somno perpetuo præmuntur, à quo ægrè possunt excitari, & quocunq; modo interpellentur, uix respondent: obliuiosi, mente capti, oscitant crebro, & hiant, ore nonnunquam persistunt, tanquā claudere id obliti. Deijciunt per aluū copiores quidem, liquidiora: nonnullis autē contra ueter inarescit. Urinā reddunt iumentorum lotio similem. Quidā ex eis tremiscunt, & undiquaq; desudāt. Huic affectui respondet Carus quasi dicas ueternus sopor ex eadē materiæ proficiscens: sed hoc discrimine uariatur. Febris Carum præcedit, eaq; uehementior: Lethargum subsequitur. item quod Carus etiam alia comitetur symptomata. siquidem frequenter febrium accessionibus superuenit comitialibus, cerebri compressionibus, modo esse quidem in fracturis, modo autem membranæ custode, quæ *μηνυγγοφύλακα* Græci uocant, priorem cerebri uentriculū premente.



premente. Lethargus autem peculiarem quandam cōstitutionem obtinet : superuenit comitialibus.

*Curatio lethargi.*

**V**ires si permittunt, etiam hic uena secari debet: sin minus, clysteriis acribus aluū ducemus. Aeger decumbet in domo spatiosa, mediocriter lucida. Caput eius oleo perfundi oportet, cui etiam castoreum sit adiectum. Nonnulli in uicem olei, oxyrhodino cū castoreo utuntur: robur hinc capiti caloremque simul accersentes: reliquū uero corpus delinētes, & praeipue extrema, olei ueteri: cū nitro tosto, uel pyrethro, uel pipere, uel cocco gnidio extergūt. Licet & cerato quod his & castoreo simul cōstet, uti. Porro naribus admouentur odorāda thymū ex aceto cōtritū, aut origanū, aut pulegiū. Os ungi conuenit, & palati coelū detrito sinapi, cū mellis momēto. Conantq; oportet pituitā indidē affixā digitis eiicere. Si admittant etiā apophlegmatismi usus erit ex oxymelite cū hyssopo, aut pulegio, aut orygeno, aut ipso quoq; sinapi. Potui exhibebit aliquid ex iis uuae citō trāseūt praesertim diaspolites cochlearii, mēsurā cū posca. iis aut qui in uetustatē inciderūt, & tremuli sunt, castorei quoq; scrupulos duos, trēsue dabimus. Si humoris inest copia, nihilq; aliud prohibeat, scāmoniae scrupulū, castoreo tēperatū exhibebimus. At si his affectus nō discutiē, caput radēdū fouēdumq; est sale, milio, & similibus per sacculos adhibitis: Adhāc sinapismis uti in capite prodest, tū iis quae p sternutamēra euocāt. Postea cucurbitulas occipitio agglutinare partim leues cū multa flāma partim cū scarificatione. Praeterea ad naturae excretionem frequēter sollicitare oportebit tū iniectionibus, tū iis quae urinā mouēt. Inferiorē uētris ab umbilico regionē oleo rutaceo, aut sycionio cui sit adiectū castorei paululū aspergere fouereq;: Iā uerō ut deglutiāt crebrius admonebimus, cū calida aqua dulciū potionū, aliquam praesertim apomeli ex angusti oris uasculis, βομβύλια graeci uocāt, instillātes. Quod si mediā infestet regionē qdā inflāmatio, hinc itidē medebimur supfusionib. & cataplasmatibus. Nari bus sinapi aceto tritū, uel castoreū ustū admouere profuerit. Alimētū esto cremor ptisanæ, uel auenæ, uel alicæ cū oxymelite, uel salibus uel pulegio, nūc quotidie nūc uno die īterposito. A cibo uincie ri debet: summa cedere multū oportet, cruraq; pūgere, nōnunq; pilos



pilos ēt in ipsis uehementius euellere cōniti, quò excitent. Iñ femorū & crurū rubores excitari, φοινίκας Græci uocāt, subinde profunt. Cæterum ubi morbus inclinare inceperit, gestationibus statim congruis utendū, & ad balneū reducendi sunt. Victus qui uires recolligat, recreetq; decenter adhibendus.

*De catocho, aut uigili comate.*

*Cap. X.*

**H**Vius morbi causam, ubi de phrenitide sermo est habitus sumus complexi. notæ, ut summatim dicam, communes quodammodo sunt phrenitidis, & lethargi. Sed pro materia abundante uariant, peculiare autem hæ. Detinetur æger supinus, extensusq; interim facies subtumescit, & modice lethargicorum modo liuet: interim rubore tincta est, & superior gena sursum conuelli uidetur, ac excedere, ut ne conuiere quidem æger queat: respiratio nulla apparet, sed quasi emortuus decumbit. pulsus est exiguus, languidus, & creberrimus. Vrina & alius cohibetur, aut certè modice redditur. ac qui sanè mediocriter habent, liquorem aliquem infusum deglutiunt: qui uerò malo uicti sunt, ad nares regurgitant. Itaque affectus qui pituita bilem superante constituuntur à lethargicis discernimus, eo quòd neque facies tumescit, neq; liuida est, sicut lethargicis: præterquàm quòd paulatim etiam leuiter desudant. In iis autem periculum maius est, quibus peruigilium ad est continens, urinæ non respondent, difficultas spirandi intenditur, sudores erumpunt, item quibus ad nares potus resorbetur. At si mulier hoc laborare uitio cœperit, ab ea quæ uulnæ strangulatu correpta est, hac nota discernes, quòd naturaliter iacere uideatur, & inclamantes percipiat, excitetur, rursusque somno graui sopiatur. Est ubi dicunt catochon diuersum à uigili comate, quod simplicem non mixtam habet causam, nimirum frigidiorē sicciorēq; materiā, quæ posteriore cerebri uentriculo obstructo malum hoc excitarit. Ob quā etiā æger, si corripitur subitò in illa permanet figura, qua correptus est, stans scilicet, uel sedens, clausis oculis, aut respiciens. Quam ob causam antiquiores Græci hoc pressos morbo, catochos, uel catochomenos, quasi dicas occupatos, detentosq; nominauerunt: recetiores affectū catochen, & catalepsin, ueluti detentionem, & deprehensionem Curatio prædictis quidem est, sed pro symptomatum ratione quæ superueniunt, euariat.

Curatio



*Curatio catochi.*

**H**ic quoque malo sanguinis missione succurritur, praesertim quibus facies rubescit, modo uires suadeant: aut clysteres injiciendi partim qui pituitam pollentem eliciant, partim qui bilem abundantem leniant: pari modo aliorum quoque praesidiorum usus erit. Similiter aegros nutrire cōfert, interim diebus singulis, interim uno interposito. Porro affectus admodum periculosus est, si ex quodam alimentis, aut potus errato acciderit, qui statim ad uomitum cogendi sunt, ac parciore uictu continendi, aluus irritari, ac uiscera resperisionibus ex cumino, aut ruta foueri debent. Qui ex ebrietate uitium conceperunt, crapula dissoluta, humidior cibo tractandi sunt, qualis est prisanæ cremor. Praeterea caput inunctionibus accommodis per aestatem frigidis, per hyemē tepidis obducetur. Si crapula nequitiam fuerit soluta, neque ad sobrietatem reditus est, desperatae ualeitudinis ægrum longe fugere oportet.

*De memoriae iactura, & ratiocinationis, item de caro  
hoc est, ueternoso sopore, et fatuitate. Cap. XI.*

**M**emoriae iactura partim per se, partim etiam cum aliqua ratiocinationis offensa accidit: quemadmodum, & mentis seu ratiocinandi facultatis noxa priuatim prius accidit. deinde memoriae iactura insequitur. Verum cum utraque pars malè fuerit affecta, fatuitas seu stultitia, quæ Græcis morosis appellatur, oboritur, causam habent communem efficientem, nempe intemperiem. Quod si humida solum fuerit, memoriae & ratiocinationis uirium creabit, torpores graues, animi sopores, cataphoras Græci uocant, longos, altosque somnos. Si uero humori frigiditas etiam accesserit, caros & lethargos: eodemque modo si sola quidem fuerit siccitas, uigilias tantum inducit: sin autem calor accesserit siccitas, deliria, & phrenitidas mouebit. Porro intemperies hæ nonnunquam obueniunt humoribus, nonnunquam cerebri uentriculis, uel ipsius uasis: uel utique in humiditate insparsæ, uel in ipsomet cerebri corpore, uel etiam temporum musculis tali modo uitiatis. At si quando humiores cum ipsis fuerint mixti, similem quoque morbum inferent: uerum simplex, an composita sit intemperies, efficiens, ex specie excrementorum condisces. Quod enim memoriae,



memoriæ, & ratiocinationis iactura, frigiditati soboles existat, compertum habemus: ea uero humiditati ne, an siccitati iuncta sit, ex recrementis, ægri habitu temperatura, uictus ratione, anni tempore, & loco deprehendemus.

*Curatio.*

**S**I frigida male habuerit intemperies, calefacere, si humiditati iuncta sit, etiam exiccare oportet. rursus si mixta cum siccitate, humectare simul, & calefacere. Pari modo etiam in calida intemperie refrigerare conuenit si siccitas accesserit, pariter humectare. si humiditas, refrigerare simul & siccare. In quibus autem sanguineum humorem deprehendis abundantem, uenam aperire, uel clysterijs acribus uti consilium est. deinde etiam hiera exhiberi debet, & apophlegmatismis uti conuenit. Item inunctiones capiti sunt inducendæ ex oleo, cui adiecta sint quæ refrigerant, exiccantque, rosæ dico, myrti, lentiscus, aliaque similia: necnon toti corpori prospiciendum est. Quod si ex æstu, & lassitudine orta fuerit intemperies, caput oxyrhodino perfundendum, tum reliqua curandi ratione frigida, humectaque; uti conuenit: cum in alijs tum in cibo & potu. Quod si caros fatuitati, uel obliuioni accedat, huic etiam prospiciendum est, ut in lethargicis prius comprehendimus, ubi & ipsorum discrimen explicitum est.

*De uertiginibus.*

*Cap. XII.*

**V**ertiginum affectus nascitur cum frigidus, glutinosusque humor cerebrum occupat: unde leui occasione protinus etiam concidunt, ueluti quando aliqua circumagi extrinsecus aspexerint, ut rotas, uertices uel, aut quando etiam ipsi circumaguntur. Interim uero etiam calfacti capite, cum humores in eo contenti, uel spiritus quoque commouentur: interim prioribus cerebri uentriculis, dum caluaria confracta perforatur pressis, in quibus etiam uehementes oboriuntur cruciatus. præcedit autem in eis, quibus caput primario afficiatur, uehementis in eo dolor ueternosus sapor qui καλῶς Græcis dicitur, & aurium sonitus. & quidam sanè olfactu læduntur, quidam uerò gustu at quibus ex consensu uentriculi oris uertigines accidunt & stomachi rosio, quam cardiogmon Græci appellant, & nausæ simul comitantur.

*Curatio.*



## Curatio.

**V**ertiginosos in accessione quidem medicamentis quæ odore mouent idoneis, excitare cōuenit. Item frictionibus uti, & id genus alijs. Vbi morbus remiserit, eius amoliendi gratia sanguis primū mittendus est: deinde purgatio ex hiera præstanda. Interposito tēpore acri clystere ex centaurei. uel cucurbitæ syluestris decocto utendum est. Secundū huiusmodi uacuationes caput ipsum cucurbitulis ad occipitium cū scarificatione lancinari debet, mox apophlegmatismi, id est, medicamenta quæ saliuā per os eliciant adhiberi, & sternutamenta moueri. At quos capitis calor, auriumque sonitus male hēt, ceu uapori bus calidiorib. per arterias sursum elatis, etiā arteriæ sectio retro aures ijs adhibēda est: ut in parte chirurgica sumus dicturi.

## De morbo comitali.

## Cap. XIII.

**M**orbus comitalis, cum totius corporis sit conuulsio, cum principis animæ functionum noxa, partim sanē in ipso cerebro, partim uero in uniuersis huius uentri culis causam habet constitutam: ea modo est humor pituitosus, modo melācholicus, prætereā etiam ore uentriculi affecto consortii lege oboritur. quemadmodū in colicis quoque sicuti cum de illis agemus exequemur, uel certē aliis quoq; partibus contagionē impartientibus nascitur, cū aura quædam frigidior ad cerebrum ascendit, aliās à crure, aliās à manus digitis. Insuper uisus est quandoq; prouenire etiam in quadam muliere ab utero quo tempore esset grauida: à partu autem cessauit. Occupat hoc morbi genus maximē pueros, eosq; adhuc paruulos. deinde uero adolescentes, & iuuenes, minime senes & decrepitos. Præcedit igitur comitiales inuitus corporis, animique status, tristitia, eorū quæ perceperant obliuio, turbulentæ insomniorum imagines capitis dolor, eiusq; repletio continua ob iracundiam maximē, & pallor faciei, & inordinatus linguæ motus: nonnulli ipsam quoque commordent. Quibus autem à stomacho uitiū oritur, etiam palpitatio ipsius præcedit, turbatio, & erosio: Iam ex inedia seu cibo tardius assumpto, irritantur. Vbi uero symptoma iam institerit, ægri derepente concidunt, conuellunturque: interdum etiam exclamant uoce nihil significante at eximia, peculiarisque admodū nota ipsorum existit, oris spuma: cum alia communiter aliis quoq; mor-



morbis eueniant. Non defunt quibus etiam urina & stercus præter uoluntatem excernitur. nonnullis & genitura. In quibus igitur acutissimus est affectus, statim iugulat, & accessio-num cōtinuatione, & symptomatis, uehementia. In pluribus autem longus esse solet: eoq; si non in pubertate, uel mensstruis purgationibus, uel per cōceptum solutus fuerit, aut si post hoc tempus contractus fuerit, sæpe usq; ad mortis diem prorogatur, nisi congruam medici curationem consequatur. Coarguunt comitiales suffimenta, bitumen, uel lapis gagates, uel cornu caprillum, iecur hircinum comestum & iecoris tolli odor.

*Curatio.*

**S**I infans adhuc fuerit qui ægrotat: nihil moliendum est. nam sætate ad biliosiores, siccioremq; statum trāseunte, & uictu moderatiore adhibito, sua spontæ plerunque morbus finitur. Conuenit autem uictus etiam solum tum infantium, tum nutricum rationē habere. Qui uerò post annos pueriles in morbum hunc prolabantur, eorum partes conuulsæ ac distractæ pingui oleorum aspergine foueri, uinciri & in rectum dirigi debent. Deinde ore distento digitus demitti, aut penna oleo irino unctæ, pituitæ auferendæ gratia. Quin & medicamētis quæ naribus adhibentur sensum mouere conuenit, ut peucedano, cyrenaico liquore, bitumine, pice cedrina. Post accessiones si nihil prohibet, sanguis utiq; è cubito mittendus est. At si nihil remittat accessio, summæ partes sinapismo delinendæ sunt: cucurbitula autem præcordijs defigetur. Quod si nec his morbus comprimitur, minimum in medicina spei superest. nihilo se eius tamen medicus animo confidente castoreum necessitate adactus, & liquorem cyreniacum cum melle & aceto ori infundet. in anum centaurei decoctum, uel cucurbitæ syluestris dabit. ubi ad se redierint ex morbo comitali uiribus ante recreatis purgatione ex hiera uacuandi sunt hæc sanè est recentis & acuti morbi comitalis curatio. Deinceps quomodo inueterato succurratur, trademus. Itaq; ægrotos aquæ potu continere diu expedit. aggredientes autem curationem, si nihil obest, sanguinem dimittere. Interpositis quatuor aut quinque diebus corpusculum reficere, & sic purgante medicamēto euacuare, præsertim ueratro nigro, uel cucurbita syluestri, uel certe scammonia. Porro ueratrum sine medulla tunsum cribratumq;

PAULI AEGIN.

i aquæ



aquæ mulsæ cyathis quinque, uel sex inspargere oportet, aut melle discocto cum piperis momento excipere. Cucurbitam uerò syluestrem, semine eiecto, sed quæ medullâ referuet, passo implebis, linesq; totam noctem commadescere: mane passum auferetur potuiq; dabitur. Vel etiam medicamento ex ueratro albo purgationem molieris: quod hæc recipit: baccarum lauri purgaturum, piperis albi, alypiados, euphorbij, ueratri albi singulorum drachmas octo. Hoc totum datur cum passo quod in cucurbita syluestri pernoctarit, probe uacuat per uomitum. Vbi uerò sat purgari sunt, ægri balneo credentur. Tercio die in præcordijs & dorso cute scalpello incisa cucurbitulæ affigendæ sunt. deinde complusculis diebus interpositis corpusculum reficiendum est, & Hiera diacolocynthidos assumi debet, postea capiti & occipitio cucurbitula agglutinari. Sequenti die panis coctus in mulsâ, tritus autem cum amaris amygdalis, uel serpyllo, uel menta, uel calamintha, uel ruta superdandus: atq; id per triduum continuabitur. ab hoc, caput radendum est, & peucedani liquore, ex aceto diluto, in quo spondylion sit coctum perungendum: rursus interposito spacio corpusculum reficitur: & antidoti diacolocynthidos oboli nouem ex aqua mulsâ exhibentur: & interpositis diebus iterum tres ex antidoto offerre conuenit. Inde medicamentis uti quæ sternutamenta ciunt. post quinque decemue dies castoreum ex mulsâ præbetur: tempore rursus interposito in aluum dabitur centaurei decoctum & cucurbitæ syluestris: ab hoc iterum hiera offeretur mox utendum ijs quæ sal uam per os & nares educant, deinde sinapismus capiti inducitur. iam etiam acrium ciborum esus conuenit, cū opportunitas est, adhibitus. Auxiliatur his etiâ oxymel scilliticum quotidie potum, & mel, in quo scilla intabuerit, instar cochlearij assumptum. Victus autem ratio est quæ incidat, extenuetq;. Capparis igitur frequenter esus, & salsamentum prodest. Fugere oportet carnes, legumina, uinum copiosius, uenerē liberaliorem, balnea, sinapi, & potum statim à balneo, præsertim uini meraci. Exercitia prosunt & frictiones, sed capiti post reliquas omnes corporis partes adhibita.

*De ijs qui stomachi uitio comitali morbo corripiuntur.*

**S**I stomachus primariò affectus, morbum inuexerit, sollicitudo habenda est, ut ex facili æger concoquat. Panis igitur accurate



accurate elaboratus ex nino tēperato quod leuiter astringat, albumq; colore sit ad horam tertiam allumi debet medicamentum uerò ex aloe bis, ter' uel singulis annis dare his expedit. Vidi autem quandoq; puellum (inquit Galenus) neutiquam hoc tentatum morbo posteaquàm radicem glycyldis (dicit autem pæoniam magnam recentemq;) ex collo suspensam gestaret. Insuper agaricum opitulatur comitialibus, idem præstat scilicet, spondylii fructus, radixq; aristolochia rotunda ex aqua pota, non parum huc fuit, & continua crurum scarificatio.

*De ijs qui à particula quadam morbum concipiunt.*

**I**n uasuro quidem symptomate, ubi particulam cōmunicare morbum, senserint, siue ea fuerit manus, siue pes, fune excipiente ualenter debet quæ superposita est. Cum autē remittit, recreare corpus oportet, adurens quoddam medicamentum particulæ inducentes, cuiusmodi est lepidium, & diacantharidos dicta similiaq;. Ad hæc oxymel Iulianum comitiales uehementer adiuuat, particulatim materiā emolliens. Post omnia cōmemorata & Theriace, & naturales balineæ locū obtinēt. per totum autem uitæ curriculum, cauenda maxime cruditas, cibus ante concoctionē obitam, isq; crassi succi, tarda cibi assumptio, corporis exagitatio, uinū largius & potus à balneo, sicut cōprehensum est, maximè, meracus, præterea ualde uetusta, crassaq; uina, tū acris ex his quæ odore mouēt, & caput replēt, icōueniēs ē sublimi cōspectus, in balneo mora, & capitis ex sole exustio.

*De melancholia.*

*Cap. XIII.*

**M**elancholia mentis quædam alienatio est sine febris, ex melancholico maxime humore nascens, qui mentē occupauerit: alias cerebro ipso per se ægrotante, aliàs totius corporis consensu immutato. Tertia uerò melancholiæ species est, quam flatulentam & à præcordijs hypochondriacā appellant, ob inflammata circa stomachum præcordia proueniens. quæ modo aurā quandam maligniorē, modo substantiæ humoris partē ad cerebrū sursum transmittāt. Cōmunia omnium signa sunt, metus, tristitia, homines auersantur, alij se cedunt animalia quædam bruta esse, & uoces ipsorum imitantur: alij uasa fictilia, metuuntq; ne rumpantur. adhæc mortem hi expetunt, illi eandem expauescunt, nonnulli semper rident, nonnulli plorant. Alij uerò putant à maiore quadā ui se inuadi,

1 2 di, &



di, & uaticinantur futura, non aliter quàm uates & diuinaculi quos græci ἐνθεοδικούς proprie nominant. Peculiares autem notæ eorum sunt, qui ex totius corporis consensu melancholia laborant, gracilis corporis habitus, niger, hirsutus, & ex toto melancholicus, uel natura, uel etiam ex acquisito per sollicitudines quasdam, aut uigilias, aut prauorum ciborum esus, aut hæmorrhoidum, aut menstruorum suppressionem. At qui ex præcordijs melancholici existunt, eos testantur cruditates, acidi ructus, ardor, & ipsorum grauitas, tum quòd præcordia sursum conuellantur: interim etiam inflammatione conflentur. Adhæc quòd incipientibus, deinde maioribus effectis melancholica comitentur symptomata. quodque hæc leuentur, concoctione, uel alui excretionc, uel multis flatibus, uel uomitu, uel ructu. Cum autem nullum ex his, aut certe pauca eueniunt, melancholica quæ apparent signa cerebrum primario affici in totum succi contagione melancholici fatentur. Porro si quando flauæ bilis supra modum exustæ in nigram fiat mutatio, insaniam, dictam græce manian inferet, ob quam ferarum modo efferuntur insani, ut etiam eos qui imprudentius ipsis occurrunt, manu uiolenter tractent.

*Curatio melancholiæ.*

**Q**ui igitur ex primario cerebri affectu melācholici sunt, crebris balneis, uictu boni succi & humido curantur unā cum decetī animi delectatione, sine alio præsidio, cū certe humor qui molestat nondum ob temporis longitudinem excerni cōtumax est, quādo etiam ualentiora magisq; uaria tentare oportet remedia. Itaque purgentur per initia epithymo, aut aloe. Nam uel pauxillum ex his sumptū quotidie maxime iuuat, & leuiter aluum subducit ubi uerò purgati fuerint, uti dictum est, absynthium propinabitur: nunc quidem herba ipsa in aqua macerata cocta q; duorū cyathorū intar, nunc autem eius succi drachma semissis, cum aqua continue liquefacta. Aceti quam acerrimi modicum sorbitioni datur somnum inituro. Iam multa obsonia in id intincta, esse conuenit. præstantius autem fuerit aceto mixtam esse scillam, polium, & tenuem aristolochiā. At cum morbo quidē incipienti ex totius corporis affectus cōsortio, ut supra dictum est, incidis, corpus autē, uiribus constat, à sanguinis missione incipiendū est: post hanc, uiribus



bus relictis, inferius purgare conuenit medicamento ex cucurbita syluestri, tū eo quod cōstat nigro ueratro, ac si hæmorrhoidibus, aut mensibus suppressis malū fuerit concitatū, illas adaperiemus, hos proritabimus. Laudantur etiā facultates, tū quæ urinæ ciendæ sunt, tū quæ per sudores purgāt. Sin autem præcordiorū offensionī morbus debetur, & horū habenda erit sollicitudo: ac fouebūtur ipsa decocto rutæ, anethi, absynthii, pulegij, agni seminis, & fructus lauri perfundēdo. Hæc etenim dolores quoq; leniūt & flatus discutiūt, oleo incocta, & sic affectæ parti applicata. Cæterū præter hæc insint, cataplasmatibus etiā ea quæ flatibus discutiēdis faciunt. nēpe apiū, uel anisum, uel cuminū. Nil mali fuerit, si indatur cataplasmati & cyperus, & iris, & libanotis quam rosamarinum uocant. Cum & hæc ad moues longū tēpore per diē & pasto & ieiuno adhærere fines. Vbi ademeris, aliud quoddā operimētū super accommodato, lanam scilicet latiorē Cucurbitulis ad flatus digerendos leuibus utitor: ad dolores uero inflammationesq; cū scarificatione. Porro adhibita curationi diligentia, nec sinapi obliuiscere, sed acribus sinegmatis, & dropacibus super dorsum, uentremq; uti conuenit. Quibus uitū inueterauerit præsentissimum est remediū etiā citato per ueratrū albū uomitu purgatio. Viētus oībus melancholicis conferet probi succi, & mediocriter humectās. Virāda sunt, caro bubula ceruina, lenticula brassicæ cochleæ, uina crassa, & nigra: breuiter, quæ atrā bilē generant.

### *Curatio insaniæ.*

**I**nsanientes cōsimilē melancholicis curationem recipiunt, Propriā uero habēt, ut caput ipsorū tum rosaceo tum oxyrhodino perfundatur. Itē ex antidoto picra purgabimus, uerū sanguine prius misso: nec non hirudinibus in capite utemur. Vnicē ipsos iuvat hippomarathi radix, semenq; eius ex aqua potum. Insuper Brioniæ radicis drachma ex aqua quotidie assumpta. Sin autem delirantes purgantium medicamentorum potionē renuāt, misceri debēt ea nesciētibus ipsi, cibis nempe buccellis uel ficibus pinguibus, uel palmulis, interdum uero potionibus adiicienda sunt. † Ante omnia uero aut in lecto uinciendi, ne & sibi, & iis quibus incidunt mali quippiam inferāt: aut gestandi grabato intra lecticam quandam insaniētibus. peculiarem *γέγραδον* græci uocant, ex alto pensili.



†Plura leguntur in nostro codice, ita enim habet, πρὸ δ' ἐπεὶ πάντων κρατέουσιν ἐπὶ τινῶν παίδων, ἢ σὺν δ' ἐσ μέθυσαν, &c. id est, ante omnia contineantur à seruis aliquot.

*De incubone, qui ephialtes græcè dicitur. Cap. XV.*

**E**Phialten, qui latinis incubo est, aliqui à uiro dictū asserunt, uel inde quod hoc malo correpti ceu insipientē aliquem se imaginentur Themison autē decimo epistolarū uolumine à suffocando forte, Pnigalionem appellauit, Cōstituitur id uitij ex crapula, & cōtinua stomachi cruditate. Comitatur eo detētos difficilis morus, torpidus in somno sensus, suffocationis imaginatio, & ueluti quodā super incidente, oppressio, ita ut exclamare nequeāt hoc detēti, aut uocē edāt nihil significantē. Nōnulli uerò etiā audire sæpe eum qui super ipsos inciderit, ac uenerē exigere imaginātur, sed cōtractis eos digitis fugere. Cura itaq; habenda est mali per initia, nā si diutius prorogetur, continuē per noctem incidens, magnū aliquē morbum nunciat, ut apoplexiā, insaniam, & morbū comitialē, cum in caput huius uitij causa ferri cōperit. Quæ enim comitiales interdiu, eadem ephialtici dormientes noctu patiuntur. Itaq; cōmodū est sanguinis detractione & purgationibus uniuersum ægri corpus vacuare. Maximè his opitulatur, nigri uerati diachma, cui scammonia oboli tres sint adiecti, & nonnulla ex odoratis, anisum, daucū, petroselinū. Iam hiera diacolocynthidos, strenue auxiliatur: est autē ea quæ ad Rufum aethiorem refertur. Victus porrò sit tenuis, nō qui inflationes pariat. Succurrit ipsis & pæonia semen. Dandaq; continuē sunt potui ex aqua grana eius nigra quindecim contrita.

*De lycæone, uel lycanthropia. Cap. XVI.*

**Q**ui lycanthropia detinentur, noctu domo ægressi, lupos in oībus imitātur, & donec dies illucescat, circa defunctorū monumēta plerunq; uagātur. Hæ comites ipsorū notæ sunt, facies pallida, oculi ad uidēdū imbecilles & sicci, lingua aridissima, nulla in ore saliuæ, sitis immodica, tibiæ quod frequēter impingāt exulceratæ. adeo ut sanari nequeāt. Tales quidā sunt notæ: speciē uerò melancholia lycanthropiā esse existimare cōuenit, curādumq; in accessionis tēpore, sanguinis ex uena ad animi usq; defectū detractione: item, cibis, probi



probi succi, æger, & balneis dulcis aquæ sustinendus est. Deinde lactis sero per triduum usus, etiam hiera diacolocynthidos, bis terue purgabitur à purgationibus, Theriacè quoq; ex uiperis assumet, ac alia reliqua in melancholico affectu cōmemorata. Inuadenti iam morbo, asperginibus somnū accersere cōuenit, in id efficacibus, ubi somnus accesserit, nares opio illinuntur.

*De amantibus.*

*Cap. XVII.*

**A** Mores cerebri affectibus annumerare cū sint quædā cura, haud fuerit absurdū. Cura uero affectus est animi, ratiocinatione in motu laborioso occupata. Hæ sequaces amantiū sunt notæ. Oculi cōcaui nō illachrymant, sed tanquā, uoluptate pleni apparēt, cōtinens palpebrarū motus, & cū reliquæ corporis partes nō collabantur soli hi amantibus cōcidunt. Pulsus ipsorū propriè nullus est, ut quidā opinati sunt uerum, qualis eorū deprehenditur, qui crura cōficiūtur. Cum uero id quod amatur in mentē ipsīs uel auditu, uel uisu, & præsertim repente uenerit, tūc pulsum animo turbato cōtingit immutari neq; naturalē æqualitatē, neq; ordinē retinere. Hos igitur & tristet, & uigiliis torfos nōnulli qui dispositionē ignorarēt, balnei abstinentia, solitudine & tenui uictu consumpserunt, in quibus sapiētiores cū amantem deprehendunt, ad balnea, cōputationem, gestationem, ludos, fabulasq; animum abducunt. nonnullis merum incurere conuenit. Nam qui amorī semper indulgent, iis difficulter abigi potest affectio. Quidam igitur obiurgandi sunt, pro ratione uitæ quam singuli delegerint. In uniuersum mens ad alias curas abducenda est.

*De apoplexia & hemiplagia, uel paralyfi.*

*Cap. XVIII.*

**Q** Vando commune quidem neruorum principiū affectum est, eoq; omnes corporis particulæ motum simul & sensum amiserunt, apoplexia morbus appellatur ita ut pariter principis animæ functiones sint oblesæ. Sin autem in altera capitis parte obstructio fuerit oborta, hemiplagia & paralyfis nominatur. Si uero unam quandam particulam talis noxa occupauerit, illius affectio particulæ dicitur. Quippe Hippocrates memoriæ prodit, apoplecton hoc est resolutum ipsi crus euaserat. Seruatur itaque in apoplectis modica quædam respiratio, quæ si permultum à naturali



naturali functione recesserit, maximam esse affectionem puta-  
 bis si paululum, exiguam. Deterrima uerò est respiratio, cum  
 intermittitur, uel etiam ubi magna cū uolentia trahitur. Ori-  
 go uitij est ex frigidiorē pituita, quæ principalissimos cerebri  
 uentriculos uniuersæ & subito repleat. Sin autē spinalis me-  
 dullæ principium quandoq; totum huic cōflicatur malo, om-  
 nes faciei subiectæ partes resoluuntur, ipsa manēte incolumi,  
 eo q̄ sensum motumq; partes quæ ibidem habentur à cerebro  
 excipiant. Si dimidia ipsius regio infestatur illarum partiū re-  
 solutio quæ dicitur paraplusia constituitur. Si odoratus uitia-  
 tus fuerit, uel ad priores cerebri uentriculos intēperiē expertos,  
 uel ad meatus osiū quæ à percolando ethmoide dicuntur, ob-  
 structos, talis referetur affectio. Itaq; iacēt apoplecti, uoce in-  
 termortua, sensus motusq; expertes, citra febrē. Præcedit hoc  
 mali, capitis subitus, acutusq; dolor, uenarū circa guttur exan-  
 tium, sphagitidas Græci uocant, toruli eleuantur, tenebræ ocu-  
 li offunduntur: itemq; splendorēs eisdē oboriuntur, & extre-  
 marum partiū sine ratione algores, totius corporis palpitatio,  
 difficilis motus, & dentium inter dormiendum stridores, urina  
 ueluti æruginosa, atra, modica, & farinæ crassiori similia subsi-  
 dentia quædam refert. Accidit autem hic affectus circa ætatē  
 senilem tēperaturis pituitosioribus, uictuq; tali usis. At si iuue-  
 nes, & per ætatem infester, magnam necessitatem fatetur.

### *Curatio.*

**A** Poplexiæ morbus, nequaquā, aut raro curatur, ut qui mor-  
 tem minetur præcipit. Si uero etiā discussa fuerit, plurimū  
 cum partis cuiusdam corporis resolutione discedit. Qui igitur  
 quoquo modo curationē recipiunt, iis statim sanguis ex uena  
 detrahendus est, & sicubi remissionē quandā habuerint, detrahe-  
 re cōuenit eadē die, aut sequenti, aluū autē acri clystere ex mu-  
 ria & melle cōtemperatis ducere. Dein oleo copiosiore sulfu-  
 rato totū corpus perungere, caputq; chamæmelino, uel ane-  
 thino oleo, in quo spondiliū decoctū sit uel calamintha: mul-  
 saq; instillatur, & ea quæ odore mouēt, naribus admoventur,  
 uti opopanax, uel sagapenum, & galbanū, uel castoreū. Opor-  
 tet autē & ori per uim aperto digitū, uel pinnam oleo made-  
 factā inferere, ut ea quæ ipsi inhærescunt, eiiciantur. Cæterum  
 sedes etiam iis quæ flatus educunt, perungenda est: mulsa uel  
 oxymel



oxymel potioni dabitur Quinetiā apophlegmatismis ex thymo, uel origano cū aceto decoctis utemur. Vbi morbus se remiserit, cibus mollis, distribui facilis & succulentus assumetur. Si uox nondum redit, & uires permittunt, cucurbitulæ occipitio cum scarificatione deligentur si fieri possit etiam præcordiis. deinde gestabuntur ægri curru, aut lectica, aut lecto pensili. assumi etiam debent crebrius quæ sternutamenta excitāt, & apophlegmatismi. Vbi quatuordecim dies morbus excessit, ad reliquas gestationes ducentur. Cæterum sermonis etiam sollicitudo habenda est. uetus apomeli cum micis panis, uel alica dabitur: mox paxillum ex hiera. Post uigesimum primū diem balneo ægroti credentur. † Vinum tenerū calente aqua temperatum potui exhibebitur: ac reliquo tempore uires balneis & unctionibus reficiendæ sunt: degent autem ægri in locis si fieri potest, mari uicinis.

† Melius hic locus descriptus est in ueteri καὶ δινον παλαιὸν δόσομεν πιεῖν, id est uinum uetus &c. quanquam hæc admodū leuia sunt cum nemo tam stupidus sit qui δινον ἀπαλὸν nunquam dici non sentiat.

*Curatio resolutionis, quæ paresis dicitur.*

**A**T si principis animæ functionibus liberis, omniū particularū aut quarundā remissio acciderit, etiā hic qui molestat humor, qualiscunq; ille fuerit, euacuari debet. Mox hiera, cui castorei quoq; pars sit adiecta, dabitur: per initia drachma semissis, cū tantillo mellis, & aqua calente soluta, uel per se, piperis quoq; dimidio scrupuli addito. Quatuor deinde diebus interpositis integra drachma assumetur, dehinc una & semissis, postea duæ, atq; tres. Rursus totidē diebus interpositis quatuor drachmæ, si ægri uires sustinent, offerentur, mellis adiecto cochleario. Particulis autē, medicamēta quædā discutiētia, & ea quæ cutē possunt cruentare, imponūtur: addendo simul castoreum, aut piper, aut pyrethrū, aut cachry, aut euphorbiū. Prodest etiā eis oleū rutaceū, uel sycioniū, uel uetus superfundere. Cibi cōueniunt frumētacei, sorbiles, uel alioqui ad cōcoctionē expediti: nec recremēticei. Cucurbitulæ remissis partibus agglutinātur, si multæ fuerint, distinctim, si paucae, uni: post cucurbitulas delinūtur medicamēta ex pice, uel resina, uel manna. optimè autē facit cū artemisia simul incocta calamintha, & cunyla.



cunyla, & nitrum ex aqua modica, quæ inter coquendum absumatur. Alius iterum subducatur ex aloe, uel polypodio, uel scammonia, uel ex pulve diacolocynthidos. unctio uerò accommodata λιπάσματα græci à pinguitudine appellant, huiusmodi habentur uetus oleum, in quo scilla quadraginta diebus sub sole intabuerit. Si huius copia nō est, duas scillæ uncias in oleo coquito, illinitoq; uel cachry similiter præparatū, miscenda uero & ceræ uncia, ne illita diffuant. At si galbani, castorii, euphorbii, adarce, & nitri singulorum unciam semissem acceperit, multo erit medicacius. appositu etiam cōuenit ranunculus herba incocta oleo, in quo per insolatum intabescat. Portiones erunt castorei circiter drachma: opopanax succus fabæ instar deglutitus. Mirificè facit etiā sagapenon ad erui magnitudinē, ex mulsā & castoreū cū opopanace. itē liquoris cyrenaici milij instar. Auxiliatur & antidotum ex triplici pipere, quod dyatrion pipereon dicitur græcis. Vtemur etiam acopis calefacientibus, & apophlegmatismis. Post diē quartumdecimū solidioribus uti cibis expedit, & auxilio multum proficiēte, in balneū deducere. A trigesimo dropacem adferre cōuenit, & balineis cōmittere: reliquo tēpore sinapi cataplasinatis modo obducere, in quibus & motus & sensus perit: attēdentes ne ideo quod nō sentiūt magis q̄ par est urātur. In iis aut qui sensus cōpotes sunt, cutis ruborē dūtaxat oportet excitare post tumorē factū ad lauacrum mittere, & mollibus ceratis medicari. Vomitus à cœna cōueniet, & is qui radiculis assumptis cietur: item gestationes, sella, aut lectica, aut uehiculo: postea ducētur ad balnea naturalia. Victus siccior utilis est, potio modica, & frictio. cibos igitur siccos esse debent, sitim quantam possunt sustinentes.

*De ijs qui laxatione, aut distentione resoluti sunt.*

**Q**uoniam resolutæ partes uel conuelluntur, uel laxantur: idq; uel à repletionē, uel inanitionē, attendēdum rursus est, partim etiam sanguinem detrahi debere, partim nō. Deinde in relaxatis quidē mēbris adstringentia, iis quæ laxant miscere, & frictionē intensam moliri cōuenit. In cōtrariis, laxantibus dūtaxat utendū. frictione simul molli adhibita: oleo in relaxatis nitri paulū & fēcule cōtritū adiciat. fots erūt ex aqua uehementer calida, & potissimū marina, in qua decoctæ sunt lauri, uel uiticis germina, uel samfucus, uel aliquid huiusmodi.



modi. Si aut æstas fuerit et natationes in mari: rubores autem in cute excitati his maximè cōferunt. Itaq; cedantur et particula ferulis, uel urticae ramis. Quod si perseveret resolutio, carnem, quæ intra articulos resoluta est, attractam ferris oportet candentibus exiguis tenuibusq; transiussis adurere. Cōtractis aut membris dropacem continuè superlicere commodum est.

*De resolutione quæ unamquamque  
particulam obsedit.*

**Q**Uæ à nerui diuisione oritur particularum resolutio, insanabilis est: quæ uero ab intēperie, uel humore quodam cōtrahitur, cōe quidem ex remediis cōmemoratis præsidium recipit. sunt aut peculiaria quædā singulis ipsorū dicata, quæ subiungemus. In his igit qui canū more cōuelluntur, æqualiter in oppositū capistro appellato deduces. Profuerit etiā sanguinis detractio, ex uasis linguæ subiectis: itē cucurbitulæ priori uertebrae defixæ, tū apophlegmatismi & per nariū clysterem facta purgatio. Sciendum itaq; est nō eam maxillā quæ peruersa esse apparet, sed oppositā resolutione infestari. Guttur autē resolutum, cucurbitulas mēto agglutinabis, perungesq; medicamentis ex castoreo, sagapeno, & liquore partico. auxiliatur et gargarizatio ex acribus. Vbi lingua resoluta fuerit, uenæ ipsius incidendæ sunt, cucurbitulæ mēto admouendæ & apophlegmatismis ex sinapi utēdum est, & linguæ exercitiis. Si uocis instrumenta resoluta sunt, thoraci præsidia adhibenda sunt, spiritus retentione, & uociferatu utēdum. In superciliis aut palpebrarum inunctiones similiter profunt, iam & futura proficit. Vesica uero resoluta siue urina impediāt, siue præter uoluntatem excernat, inferiori uentris ab umbelico regioni, & ei quæ scrotum & anū intercedit medicamenta applicanda sunt: sedi aut immittendū est oleū rutaceū, uel sycioniū cū butyro, castoreo, galbano, uel opopanace, uel liquore silphii: uesicæ porrò hæc per colem trāsmissa ualde profecerūt, uel sola etiā suffecerūt: ex centaureo autem, & colocynthide cum sycionio clysteres etiam intestinis utiles sunt, bene faciunt & medicamina urina cientiā potui data, & castoreum consimiliter. In primis iis, qui nihil urinæ reddunt, per rectos siphones, quos catheteras dicunt, in uesicam medicamina infundentur. Præterea laxantibus insidebunt, & eisdem cataplasmatibus forma oblinentur.

Qui



Qui præter uoluntatem urinam excernunt, corroborantibus auxiliis astringendi sunt, cibis siccis, potione frigida utentur: ubi se recolligunt, summæ cutis ad ruborem usq; exasperatione, & lauacris sponte prouenientibus frigidis utentur. Eos aut qui resolutionem experti sunt ob spinæ uulnus, aut casum, aut uertebræ luxationem, superuenientibus, quæ mortem fatetur, symptomatis, nulla medicina periculo subtrahit. Quod si coles resolutus fuerit, iis quæ in uesica dixi, utendum: in eisdem partibus & lumbis: item quæ intendendi uim habent, usurpabimus. nō cōuenit autem lac, caseus, & reliqua bellaria, lactuæ, aliæq; olera. Longanone uerò soluto, in quo nōnunquam citra uoluntatē stercus erumpit, nonnunquam cohibetur iisdem uti par est: interim hæc ab inferioribus partibus clystere demitti: aliàs astringentia, ut cupressi decoctum, lentisci, rubi: laxantia, ut adipem suillum, & anserinum, uitulinumq; & oleū: interdum rodentia, qualis est muria, uel cucurbitæ syluestris, uel similibus decoctum. Neq; enim quicquam sic motum promouet, ueluti uaria agitatio. At si frigus prehenderit, etiam ex euphorbio acopon oleo dilutum per inferiora inditur. Artus autem resolutionem experti, cum communi curatione flectantur, perfricentur, extendanturq; in modum prædictum. Nam in frictione spei plurimum consistit.

*De resolutione ob colicum dolorem contracta.*

NOstra ætate colicus quidam dolor incruduit: ex quo præsertim superstites futuros consummata artuum motus priuatio comitabatur: tactus sensu, ut uidebatur, incolumi seruato, ceu Critica quadam ex alto oborta transmutatione, unde motus plerisq; spatio temporis sponte rediit. Qui uero difficiliore curatu extitere. etiam simplicioribus ex prædictis inunctionibus leuati sunt. præcipuè autem efficacia sunt experti, acopon ex populo nigra confectum: item quod abiete constat. Sed quæ roborandi uim obtinent, ac modicè refrigerant, multis præclare opitulata sunt.

*De conuulsionibus.*

*Cap. XIX.*

POSTquàm de resolutione tractauerimus, proximum est, ut de cōuulsionibus agamus quoniam neruorum uterque affectus est: quare etiam de tremoribus dehinc dicitur. Cū igitur statim ab initio, uel nō multo post morbi principia



cipia ex orientes conuulsiones longius prorogantur, ex repletionem ducunt originem. Vbi uerò sudores largos, aut uomitū, aut deiectione, aut sanguinis profluvia, aut uigilias, & aut famem, aut motus, tum multos, tum uementes subsequuntur, inanitioni feruntur acceptæ. Et cum ex sanis alicui repentina superuenit conuulsio, ob repletionem cum fieri necesse est. At si uniuersum corpus, neruiq; ex febribus perardentibus inauerint, ac deinde ob siccitatem conuellantur, maximum sanè hoc malum est, & propemodum insanabile. Primum itaque partes quæ contrahuntur, ualenter uinciendæ sunt, & inordinatis resistendum motibus, oleo perfricare oportet rutaceo, aut sycionio, aut ueteri, aut quodam ex hoc genere: tum aquā nullam potui præbere. Eos autem qui ex inanitione conuelluntur, oleo, uel hydrelæo calido fouere competit, si nihil prohibet etiam ad lauacrum deducere, temperatoq; solio uti, cum oleo & frictione leuissima. Nutriendi sunt sorbitionibus ex chondro & alica, unioque tenui & quod facile distribui possit, aquoso, nisi febris adfuerit: tunc enim ptisanæ cremor utilis erit, somnumque accersemus. Iam uerò ex plenitudine, aut inflammatione, contractas conuulsiones curabis, si copiam euacues, inflammationem uerò proprijs ipsi præsidijs discutias. fit etiam conuulsio, cum uementes uehementius turbantur. Succurrit autem conuulsis acanthij radix, spinæ albæ, & ægyptiæ semen epotum, nonnulli centauri tenuis succum potui exhibent, cum repletio conuulsionem parit. Atqui non modo potui dato castoreum, sed etiam à fortis cuti unà cum sycionio ilinito. Si uero malum hoc modo non finiatur, cucurbitulas cū scarificatione admouere prodest: si crura contrahantur, coxis, & postremæ uertebæ: si manus conuellantur, etiam dorso, & primæ ipsius uertebæ, tum ei quæ humeros superiacet. In uniuersum corpore ab affectu immuni, si labrum, aut palpebra, aut lingua contrahuntur, graue symptoma existimandum est, quòd maxima inuehat pericula, licet exiguæ partes affectæ uideantur. In his itaque sanguinis ex occipitio, & primis uertebis detractio rectè adhibebitur.

*De tetano eiusque differentijs. Cap. XX.*

**T**etanus, cum & ipse conuulsio quædam sit, procreatur musculis corporis, & præsertim spinæ, à frigido humore



re intus & foris infixo ceu congelatis: ideoq; hoc malo occupati, flectere sese nequeunt. Verum cū particulę corporis in anteriora tenduntur, affectus nominatur emprosthotonos: cum in posteriora, opisthotonos: cum in alterutram partē æquali robore intenduntur, tetanus appellatur. Pelops hæc uitia tētionem uocat, & contensionē musculorum ceruicis, neruorumq; , per quos caput inclinat, tenuit & circumuoluitur. At si circa posteriores ceruicis musculos malum consistat, opisthotonos ex accidente: si circa priores, emprosthotonos: si utrinque, tetanus nuncupatur. Causam tribuit musculis repletis spiritu, & aere crasso, nebulosoq; quem impense frigidum, & concretum, eoq; ad motum contumacem affirmat, unde etiā sicca potius quā humida fomenta malo prehensis conuenire. Hæ quidem tetani differentię sunt. Curatio autem in his cum communis quædam sit, non euariat. Optimum itaque præsidium ipsis est febris, quæ per initia non fuerit, superueniens. Notæ horū sunt, angusta respiratio, pulsus rarus & exiguus, nonnunquam & risus ipsis sardonius oboritur, rubet facies, oculi magis intumescent, adhæc aut non urinam reddunt, aut aquæ similem, aut cruentam, cum bullis quibusdam: item aluus succescit, uigiliæ magis urgent, crebroq; à conuulsionibus periculum est, ne lecto ægri excidant, quinetiam singultire incipiunt: indolentq;, alii capite, alii clauiculis, & lumbis, quidā ipsorum subtremuli quoque euadunt. Porro facit affectū (quamuis raro) lassitudo, humi dormitio, pōderis eleuatio, casus, uulnus, ardor, ictus, & alia quæ eandē neruis offensam inferre possunt. Curatur, quo modo conuulsionones ob inanitionem generatæ, solent.

*Curatio tetanorum.*

**Q**uibus ceruix recta intenditur, initio sanguis detrahendus est, partes lanis oleo madidis sycionio, castoreoque cum ueteri contegendæ, aut uesicam quoque latam calido oleo repletam, tendinibus superimponere oportet, & cucurbitulas admouere, cum lancinatu. leues enim noxam quoque inferunt, item ceruicibus nonnunquam cucurbitulæ defigētur, & utrique spinæ parti, adhæc pectori, quæ est musculosius, & præcordiis: interim uesicæ regioni, & renum. Porro liberaliter sanguinem auferre conuenit, modo non uniuersim id fiat. sed particulatim & per uices. Sudores lanis oleo madentibus



tibus abstergere, ne imprudentes refrigescant. Quod si tetanus in uetustatem inciderit, in oleum bis quotidie descendere confert, non tamen diutius immorari: quippe in oleum descensus, maximè uires conuellit. Potus erit hydromeli spissus ad dimidias decoctum. Qui robusti sunt, panacis liquoris drachmam bibent. sin minus, tres obolos, uel minimum, obolum. At si quis ipsum ceu stomacho inimicum habeat suspectum, ammoniacum quoque exhibeatur, uel liquoris cyrenai ci instar erui discocto melli circumlitum deuoretur, & laserpicii radices duo cochlearia, tribus mulsæ cyathis inspersa, uel ipsius decoctum exhibentur, uel myrrhæ drachma ex mulsâ, hyssopi quæ decocto: sed omnium securissimum expeditissimumque est duo, tria uel castorei cochlearia, partita ipsius quantitate, & per uices data. Non enim offendet etiam si secundum cibum ex eo quid exhibeas. Potus uerò ipse præter alia tum paulatim, tum modicè assumetur. Nam dum ægre potionem transmittunt, in nares ipsam propellunt, unde uehementer turbati, ad conuulsionem prouocantur. Sedes oleo rutaceo cum opopanace perungi debet, quod ab inferioribus quoque partibus iniicietur. frigidæ superfusionem, cum sit (quemadmodum ait Hippocrates) maximè temeraria, † eo quæ posteris, credo, uituperata, & nos damnamus, deuitamusque. Unguentum hoc conuenit, nardi sextarius, ceræ uncia duæ, folii, amomi, styracis, mastiches singulorum uncia: castorei, adaracæ, euphorbii, piperis singulorum uncia: spicæ nardi, opobalsami, singulorum tantundem.

† Hæc ita scripta sunt ueteri codi. τὴν δὲ τῆ ψυχρῆ κατὰ χύσιν, ὡς ἰπποκράτης φησὶν τολμηροτάτην ἔσαν καὶ διὰ τὐτο τοῖς μεταγενετέροις ὁμοί, παραλειφθεῖσαν, frigidæ autem affusionem (quemadmodum Hippocrates ait) quum maximè temeraria sit, & ob id à posteris prætermittā utamus.

*Potio opisthotonicis accommoda.*

**P**Anacis radices, piperis albi, costi, myrrhæ, papaueris lachrymæ, singulorum pares portiones, exhibentur cicerculæ modo somnum capturis: benefacit etiam orthopnæicis. Porro uictus erit tenuis, qui expeditè distribuatur, & recrementis omnino uacet.

De



**T**Remoris origo in uniuersum quidem ex neruorum imbecillitate est, quod ætas senilis palam testatur: priuatim uero plures causæ ipsum efficiunt: nempe frigida in temperies, frigida potio, & præsertim in febribus intempestiue assumpta: frigidi, glutinosique humoris redundantia, & uini usus liberalior. Qui igitur ex erroribus commissis manifesto tremunt, à noxijs abstineant. At si perseverat etiam in febribus tremor, primum corpus totum oleo sabino perfundatur: ubi autem accessiones remittunt, ueteri, aut sycionio: summa uero corporis membra lanis mollibus prius tamen præuncta congregantur. Deinde cucurbitulæ à priori uertebra usque ad spinam, lumbosque agglutinentur, sic ut particulæ prius cū præcordijs cruda hordei farina ὀμυλύσιν Græci uocant, delinantur. Iam hæ quoque partes lanis ex ueteri, aut sycionio oleo respersi operiantur. Quod si febres inueterauerint, die uno interposito in oleum, aut hydrelæum tremuli descendant, utanturque frictionibus mollibus. Si longius prorogatur dispositio frigoris suspicione, mulsa, castoreumque potui dabitur, & calidis locis gestari debent. Cibus diductu facilis offeretur, primum sorbilis, mox uolatilium, & piscium, qui molli carne sunt præditi: febribus solutis lauandum est, sed uitari debet frigidum solum, uinique potio. Porro si crassorum, uiscosorumque succorum copia fuerit, uti conuenit iis quæ incidunt, extenuantque, uerbi gratia, rutæ ramusculo, spondylii, quantum tribus digitis comprehendi possit, castorei, & nitri singulorum obolis duobus: Datur quotidie cochleare unum cum oxymelite ad tres usque dies ieiuno, uel panacis, & piperis grana quinque ex mulsæ cyatho. Simplicia præsumpta trementes adiuuant, castoreum, leporis cerebrum comestum, althææ radicis decoctum, damassonij foliorum drachmæ quatuor in mulsa, eupatorium ex aqua. Superante autem frigore etiam zosymi unguine, item acopis ad resolutionem conscriptis, unctionibusque & cutis ad ruborem usque exasperatione, phænigmon Græci uocant, utemur: præterea exertitijs, perfricationibusque. uero qui ex uini potu tremunt, uinum circuncidendum est, quoad in totum morbo fuerint liberati.

Ocula



*Ocularia, & primum de dolore ex Galeni commentarijs. Cap. XXII.*

**C**um in oculis uehementiores oboriuntur dolores, considerato, quam ex affectione corporis dolore ipsis in inflammationibus accidat. Vel. n. dum ab influentiū acrimonia uehementius eroduntur, uel quia tunica succis repleta tenduntur, uel quod crassis succia, aut spiritibus flatulentis quodāmodo intenduntur, graues in ipsis dolores oboriuntur. Resolutiones igitur purgantibus curare præsidij, noxium humorē uacuando par est, item cācido oui liquore in oculos infuso. Vbi uero concocta iam fuerit inflammatio, corpusq; superfluis uacuum balnea ipsis aptissima sunt. Ex repletionē autē contrāctas inflammationes sanguinis detractione, alui ductione, & partim inferiorum frictione persanare conuenit. Intensiones autem, toto prius corpore uacuo: item humoribus qui sursum tendūt, ad inferiora reuulsis, deinde loco iniectis remedijs, quæ discutiendi facultatem habeant. fomenta itaq; adhibenda ipsis sunt, & fœnugræci decoctum infundendum. In quibus autem sanguis crassus oculorum uenulas intendit, sic tamen ut corpus totum plethoricā affectionem non præ se ferat, uini usus est, quod possit excalfacere, uacuare, & meatus aperire.

*De perturbatione, & lippitudine quam proprie ophthalmiam græci uocant.*

**P**erturbatio humiditas oculi est, & calor cum rubore naturæ alieno, non ex corpore, sed ab externa causa aliqua proueniens, ut à sole, fumo, puluere, oleo: quare etiam occasione ipsius separata, promptissime soluitur. In genere huius perturbationis, lippitudo est: uerum non extrinsecus tantum, sed ex interiore etiam causa cæca ingruit, perque tres quatuorue, aut quinque dies plerumque durat. facillime descutitur, si obseruentur oia quæ foris acciderētur turbare lumē possint, itē parciorē cibo, aque potu, aut inambulatione, & aluo ex facili respondente.

*De inflammatione.*

**C**um inflammatio ipsos oculos occupauerit, post totius corporis uacuationem, perungendi sunt ijs quæ impetus humorum possunt repellere, & irritationem lenire, quale est, quod ad Neilum authorem refertur, diarodon, uel etiam Me-

PAULI ÆGIN.

diacum.



diacum, Nardinumq; Vbi membrana adnata inflammatione tenetur, medicamentis utemur, quæ græci ab uno die monemera uocant, cum oui cādido infusis. Die insecuto nisi inflammatio crescat, nardino delinentur: foru ex meliloti decocto uti conuenit ubi uerò crassus humor est, qui lippitudinē facit, medicamenta accommodantur, quæ neq; infarciendi uim habent, emplastica græci uocant, neq; humores incrassent, sed quæ diffundere, humectare, & excernere idonea sint, quale est Chiacū. At si humores in capite fuerint impacti, cucurbitulā occipiti admouere oportet, uel scarificare, nel hyrudines fronti qua oculus dolet, adhibere, panemq; purum aqua maceratum cū modico rosaceo, aut polentis incoctis capitū papaueris decocto, similiter cum rosaceo, superdare efficaciore autem utendū est cataplasmate, ex croco, melilotis, palmularū carnibus, teneris coriandri folijs ouorum luteis tostis micis panis in sapā intinctis, rosacei momento, & papaueris capitum contritorū decocto. Interdum semen quoq; ipsius ad leniendū dolorem miscetur. Si magna doloris necessitas est, etiam opij paupillū adijcitur: ubi dolor abest, stupefacientia græci *ναρκοτική* appellant uitari debent. Quòd si mediocri inflammatione infestet, aloen per se, uel aqua uel oui albo dissolutā illinito. ut autē expeditius sit auxilium, croci drachmas sex, aloes drachmas sedecim, gūmi drachmas nouē coniecta in unū aqua pluuiali excipito, fingitoq; collyria. † Iā quæ uocantur diacrocu lippitudinū initiis sunt idonea: in quibus uerò tumor œdematodes hoc est mollis cedensq; & exalbidus habetur: tū circa palpebras, tū membranā adnatam sine tunicarū offensa, benefaciunt etiā liquida collyria (Græci hygrocollyria uocant) & ex croco, & atramento sutorio & melle præparata. hoc autem est laudatissimum.

† Aliter hæc leguntur in antiquo exemplari, καὶ τὰ διάκροκα δὲ προσαρρόδύμια πρὸς τὰ ραχὰς ὀφθαλμῶν εἰσὶν ἐπιτήδεια, id est, quæ diacroca appellantur oculorum conturbationibus sunt accommodata.

*Liquidum collyrium quod dolorem leuet anodynou appellatum.*

**C**Retæ sutorie, mellis attici, succi fœnigræci singulorum partes portiones incoquito, donec mellis spissitudinem habeant. deinde specillo duos angulos attingito.

Ad



*Ad defluxionis impetum, qui epiphora græcis dicitur.*

**A**D fluxionum imperus, per initia quidem conuenit in educti, aquæ potus, & multo magis ueneris abstinētia: Alius subduci, facies posca aquosa collui debet. præsertim si feruens fuerit fluxio. sin minus, atramento sutorio cum melle frons & palpebræ delinantur. Nonnulli atramentū sutorio aqua dissolutū ad collutionem exhibent. Porro qui defluxu citra inflāmationem uexantur, uel etiā cum inflammatione quidem, sed ita ut supra os caluariæ affectus consistat, agglutinamentis utendum est in frōte: simplicibus sanè, uiridibus uitis folijs, uel rubi succo, uel portulacæ, uel cotoniorū cum polēta tenui, uel galla leui cum uino, & polentæ polline, uel cicuta, uel psyllio cū aqua, uel solano, uel cochleis cū testis suis in puluerē redactis, à tempore ad alterū tempus illitis: In uniuersum iis quæ astringunt, refrigerantq; Compositis autē his: pollen frumēraceus, & myrrha, uel thus cū oui aquato illinat, uel samia terracū myrrha, & manna similiter ut oui albor inungetur. In frigidioribus autem humorū cursibus sulfuris uiui, bituminis, picis, colophonix singulorum drachmæ duæ item Musæ pastillus, & Aster, similiaq; probe repellunt. Iam uerò Theriace uino astringente dissoluta, fronti q; illita frigidos humorum influxu, sistit. quin etiam eadem pota uehementer his succurrit. Ipsi uerò oculo, lana, aut panniculus tenuis, oui albo madens imponitur, item caseus recens similiter oculo applicatus, acres maxime influxus cohibet. tum collyria à reprimendo dicta staltica, si illinantur, instillanturq; ex oui aquato idem efficiunt. At si in imo, & sub ossē hærescens humor longiore spatio duret post generales corporis uacuationes, medicamentorū usus est quæ per nares atq; os pituitam eliciunt, errhina & apophlegmatismos appellāt: caput radetur, & rubor in cutæ excitabitur. Porro in his etiā curandi rationes, quas in capite manu administramus assumunt, nempe Angiologiam arteriotomiā, hypospatismum, & periscyphismū, ut græci appellant: & in uertice usq; ad os adustionem. Iam cucurbitulæ occipitio incisa cute admotæ, impetum floris possunt reuellere. Fluxiones extra caluariā notāt, uasā in fronte & tēporibus distēta, & capitis ueluti uinculū, tū quod ex agglutimētis sicca præsidio sunt. Si hæc desinit, & floris impetus prorogetur, & iterutāmētā nonnunquā mo' esse elidantur, humorem sub caluaria teneri, censendum est.



*De chemosi.*

**C**Hemosin appellant, cū utrāq; palpebræ ex uehemēti inflā-  
matione inuersæ fuerint, ut uix oculi ab ipsis cōtegātur, &  
albū oculi nigro sublimius euaserit, rubrumq; ēt magna ex par-  
te nigrū occupet. Cura ē uenæ sectione, medicamine purgāte,  
collyrio diarodō albo, & qđ à cinereo colore uocat σποδιακόν,  
cū lacte, uel oui aquato. Eodē uerò palpebras, tēpora & frōtē il-  
linere oportet, tū fomentis & cataplasmatibus lenib. uti cū autē  
remitit inflammatio, acriorib. quale est etiā uiride diarodon.

*De hyposphagmatis, & emphysematis.*

**H**yposphagma uenarum adnatæ membranæ ruptura dici-  
tur, ex ictu potissimum eueniens. Instillatur itaq; ipsis  
sanguis palumbi, uel columbæ, uel calido lacte muliebri thuris  
paululum conterens, uel muria, & præsertim ex sale cappado-  
cico: fotu utitor ex hyslopi decocto. Porro tumor mollis, œde-  
ma uocant, oculis ex ictu obortus, fomentis ex posca conti-  
nuis, & spongia ex eadem superdata discutitur. Recte huic spe-  
cularium combustum, & sterco columbæ æquis portionibus,  
uino aut aceto contrita illinunt. Iam caseus recens uel rapha-  
ni cortex, uel uua passa sine acinis, singulatim ex posca, uel  
mulsa applaudentur. Eadem faciunt ad Emphysemata.

*Ad emphysemata pruriginosa, & psorophthalmias.*

**E**mphysema palpebræ tumor est, œdemati similis: psoro-  
phthalmia autem pruriginosa eiisdē scabies, ex salso & ni-  
troso humore contracta. Conuenit ipsos fouere, posca, leni-  
culæ decocto & rosarum. Hygrocollyriū autem hoc æris drach-  
mæ sex, misyos tostis, myrrhæ singulorum drachmæ tres drach-  
ma una semis piperis drachma uini Chij & passi cretici singu-  
lorum cyathus unus, & dimidius: incoquantur quoad mellis  
spissitudinem habuerint. Hæc est Erasistrati compositio, quæ  
panchrysos uocatur: facit etiam ad anginam, ulcera oris, puderi-  
dorumq; & aurium dolores. Inungant & oleo palpebras, som-  
num inituri. Ab acidis, salis, & acris abstineant.

*De sclerophthalmia, & xerophthalmia.*

**S**CLEROPHTALMIA, durities oculi, & difficilis mo-  
tus est cum labore, ruboreq; citra humiditatem. foue-  
re igitur ipsos crebro, spongijs aqua calida imbutis ex usu  
est.



est. Item ouum palpebris in lecto imponitur, cum rosaceo: uel adeps anserinus. Frigida & quæ indurant uitanda: caput uelandum, unguendumq; alius ducenda. Xerophthalmia, quasi dicas arida lippitudo, pruriginosa oculorum est siue fluore dispositio. Curatur balneis, inunctionibus, & uictu prohi succi: utrisque uerò cōmuniter conueniunt medicamenta acria, ut uel lachrymas prouocent, per quæ & durities emollietur, & siccitas humectabitur. Talis est Erasistrati quoq; panchrysos, & quod dicitur Dicenteton, item cui nomen est Stratotionico.

*De ectropiis.*

**H**ic affectus palpebræ inuersio est, aut propter cicatricem, aut excrecentiam carnis nascens. In quibus igitur excrecentia inueterauerit, æruginem rasam torrefactam conterito & admocto, sive plumbo usto cum sulfure uiuo, & loto utitor, uel utrisq; paribus & æruginē & plumbo. Nam ex cicatrice proficiscens Ectropion, si in totum curare studueris, id manu faciendum est.

† Verior lectio est in antiq. ἡ περίβδω κεκαυμένω χρω μετὰ δέικτ' ἀπύρε καὶ πεπέρεω, id est, plumbo usto utere, cum sulphure ignem non experto & pipere.

*De ægilope, & anchilope.*

**A**egilops abscessus est, qui inter maiore oculi angulum, & nares fit: qui ruptus, si negligatur, usq; ad os in fistulā dehiscit. priusquam uero abscessus in ulcus erūpat, Anchilops uocatur. probe igitur faciunt glaucium & crocus una cū perditij herbæ succo imposita, crebro aut uariare oportet, & neq; in uomica eruptionem degenerabit. ALIUD. Halica cocta in aceto & probe trita, nō solum incipientes, sed etiam in uomica mutatos per sanat, rumpitq; & usq; ad os penetrat. Hocusus non solum ægilopas, sed etiam anchilopas curabit. ALIUD. Ruta satiuā una cum lixiuio, quod ex cinere & calce confectum est, contrita, cocta q; & imposita pulchrè admodum ægilopas emendat, & adusque os permeat, initio erodens, postea non ita: ac mirum est, qd ne cicatricem quidem indecoram hoc præsidium relinquat. ALIUD. Cochleas cum testis suis tritas imposito. interdum aloë, uel myrrha admista. Præsidium hoc antequam ægilops in pus degenerauerit, & postea cum ruptus fuerit abscessus, cum desiccet. ALIUD. Cum manus opera ægilopa & anchilopa



anchilopa aduris, hoc utere cataplasmate, lenticulas decoquito, & cum melle utitor ubi crusta exciderit, uuam passam excipiens liquida terebinthina, utitor in modum emplastri. Hoc enim & purgat, & carne replet, & cicatricem inducit.

*De trachomate.*

**T**rachoma internæ palpebrarum regionis asperitudo est: harum intensio, ut ueluti incisuras habeat, σὺκωσις à fici similitudine græcis appellatur. Cum inueterauerit uicium, callosq; contraxerit, tylosis uocatur. Collyriis igitur utendum est tum eo quod ex uino, tum quod ex duobus constat lapidibus, ipsoq; hæmatite lapide, ex aqua loto subiectis palpebræ abstergentur: Hermatioq; cum Cygnarii modico. Adhæc diacroc collyrium pariter p̄lorophthalmiis citra exulcerationem efficax est palpebræ inuersæ illitū. At si durior callus, his non cesserit remediis, palpebra inuersa pumice raditur, aut sepia testa, aut foliis fici, aut etiam instrumento, quod à palpebrarum rasura blepharoxiston græci appellant.

*De chalazijs.*

**C**halazion, otiosi humoris in palpebra colluuius est in qua ammoniacum aceto detritum simul cum galbano inungitur, facit etiam terebenthina pariter cum cerato excepta.

*De crithe tuberculo.*

**C**rithe, paruulum abscessus tuberculū, oblongum, palpebræ cilio obueniens Id cera alba foueri oportet: mulcæ capite abiecto reliquo corpore infricari, uel hordei diluto perfundi.

*Ad palpebrarum pediculos.*

**E**xpurgatis prius pediculis, marina tepida palpebras colluere oportet Deinde medicamento subscripto cilium attingere: aluminis scissi partibus duabus, herbæ pediculariæ parte una, tritis utitor.

*De madarosi, uel milphosi.*

**H**ic affectus palpebræ pilorum defluuium est. Ad quod cura prius uniuersi corporis habita, smegmatis utere, quibus ab honestandis palpebris nomen est calliblephara. Terræ ampe-  
litidis, croci gallicæ, ladani, singulorum pari portione contrita utitor. ALIUD Stimeos rosti lotiq; drachma, plumbi cōbusti & eloti drachmis quatuor, croci totidē nardi iudicæ drachmis tribus, in



bus, in puluerem redactis utitor. ALIVD. Palmarum ossium cōbustorum tribus drachmis, nardi gallicæ drachmis duabus: leuigatis utere. hoc etiam scabiosis oculis medetur. ALIVD. Neapolitæ ad palpebrarum defluuia, *μυλφώσεις* appellant, longosque palpebrarum affectus. Stimeos, cadmiæ, chalcitidis, mistyos xenici singulorum pares portiones. crassiuscule contundito, & melle respersa torreto: leuigatis utitor.

*De ptilloso.*

**P**tillosis, palpebrarum crassities est, callosa, rubicunda quibus accidit sæpe pilorum etiam defluuium. Præter prædicta igitur etiam hoc summe facit, Muscerdæ cōbustæ, & melle contitæ, inunguntur.

*Ad superciliorum defluuia quæ madarosis dicitur.*

**P**lumbum digitis oleo, uel adipe anserino unctis detritū illinitur. ALIVD. Hoc est subnigros reddit: nuces auellanz exustæ simul cū adipe caprillo, uel ursino infricantur. ALIVD. Hoc efficax est et barbæ alopeciiis. Alterci drachmæ duæ, muscerdæ drachma, polytrichi drachma irini unguenti cochlearia quatuor Tritis perbelle unguentum admiscetur. fotuq; prius adhibito illinitur. quod, si rasā pars ante fuerit, magis proficit.

*De palpebrarum pilis oculum irritantibus*  
*τερχιασιν appellant.*

**P**illis qui oculū pungunt prius euulsis, locus statim sanguine ranæ per se inungitur, uel cum cinere chamæleontis albi, uel sanguis cimicum, uel fumariz quæ in hordeo nascitur succus, cum gummi, uel tellinarum salsarum cinis cum cedria, uel loti cinis, uel alumen liquidum quod phorimon appellant, uel muscæ caninæ sanguis admodum in id efficax est.

*Pilorum glutinans medicamentum.*

**C**onglutinant pilos infractos bitumen, mastiche, colophonia, gummi, cochleæ par glutinosa.

*De encanthide & rhyade.*

**E**ncanthis naturalis in maiore angulo cariculæ excresecētia est. Rhyas aut huius imminutio. Enchātidis igit quæ aduersus ectropia dicta sunt, similibusq; urēdi nel exedēdi facultate præditis, hæc σκληρτικά illa καυστικά græci nōiant, absumes, sed nō totas, ne eius loco Rhyas sub nascat, uerū ad naturalē usq;

k 4 magnitu-



magnitudinē. Rhyadas, carnosā parte in totū, uel rudi manus opera, uel medicamentis absumpta, insanabiles existimato. Quod si pars ipsarum imminuta fuerit, iis quæ mediocriter astringunt, carnemq; creantibus reficitur: qualia sunt medicamenta ex croco, glaucio & aloe confecta. itē collyria diacrocū inscripta, necnon altercum prodest in uino coctum, impositūque, & aluminis ex uino pauxillon.

*De ulceribus.*

**U**lcerum in oculis genus quidem unū est, differentia uero speciales diuersæ etenim in cornea membrana quæ græcis ceratoides appellatur, ulcus cauum, angustum, & purum, à fossula botryon græcis dicitur: quod aut latius botryo est, sed minus altum, cæloma nuncupatur. Argemon in pupillæ circulo nascens, ambientia cōprehendit, ut etiā in exteriorē pupillæ parte rubicundū, in interiorē candidū appareat. Epicauma ulcus est sordidum, & crusta obductum, quo repurgato humores oculi sæpe effluunt. Iam uero aliæ plures ulcerum sunt differentia, de quibus dicemus cōmunius. Si igitur ulcus simul cū inflāmatione obortū fuerit, curationē ex iis quæ inflāmationem lenire possunt, & concoquere, moliemur, nō neglectis iis quæ ad ulcus propriē pertinet. Talia uerō sunt collyria, libanum, cygnus, & pelaria uocata, item aster & similia: insuper quæ ex amylo, terra samia quæ ἀμυλὴ dicitur & cerusa constāt: omnibus autem magis leniendo dolori esse Ilamonem nouimus, uerum diu ei insistendum non est, eo quod admodum stupefaciat. Laudatissimū uero & quod diazematōn a decoctione dicitur, ut quod stupefaciendi uim non habeat. At si cum fluxione ulcus infestari, collyrium aliquod illi admiscebimus, quale est diahydras, & Chiacum, præterea Cygnus fuluus & quæ repellendi sine rosione facultatem obtinent. Sin autē ulcera sordida fuerint, mulsā mediocriter aquata, & fœnugræci decocto utemur per se, & cum aliis ad id dicatis collyriis. † Si acriora sint albis, seberiano & fœnugræci diluto: si non acria, diasmirnes, & nardinis. Purgata uerō ulcera medicamentum Cleo probe potest cicatrice obducere, eamq; præterea concolorē reddere.

† Exemplar græcum typis expressum ita habet *δριμυτέρον τῶν ἁλίων*, id est, si acriora sint ulcera &c.

De



*De oculi procidentia quæ πρόπτωσης dicitur.*

**P**ropositis tuniculæ quæ græcis ab uux acino ξαγοειδής dicitur, procidentia est, quæ erosa ruptæue cornea tunicula accidit. Ea cum nondū creuit q̄ muscæ capiti similis sit, myocephalon nominatur. Cum uero amplius & eo usq; succreuerit, ut acinum uux repræsentet, staphiloma, quasi uuatio ducitur: ubi plurima facta est accessio, ut palpebras transiliat, melon, hoc est malū. Si uero obcalluerit, elos, id est, clauus tunc dicitur. Si igitur ad myocephalon ferè oculi procidentia degenerauerit, repellentibus cōstringentibusq; ipsum medicinis utendum est: Chio nimirum, Phæo, Nardino, & Theodotio. item eo quod dia thallias, & quod diaceratos uocatur. iam uero spōgiam leniter ipsis pōsca, aut uino adstringente, aut rosarū decocto imbutā, super dare cōmodū est, aut splenium. Principarum uero obtinet ad procidentias omniāq; ulcera, medicamentum cui nomen est Olympiacum, uel Olympus, cum succo oliuæ, uel polygonii, nel polij. Eadem hæc etiam clauis conueniunt & staphilomatis. priusquam inalbescāt Vbi uero alborem, aut callum contraxerint, bullus remediis locus est.

*De oculis pululentis.*

**A**liquando membrana à cornu dicta ceratodes, purulenta efficitur, nunc altius nūc in superficie, ita ut pus habeat unguis figurā, quæ causā est ut hoc etiā malū unguis oculi nominetur. Huc ergo spectat curationis ratio ut uel pus discutiat, medicamētis mediocriter in id efficacibus quale est aqua mulsa, & fœnugræci succus, ex eoq; collyria, similiter libanium, & quæ ex thure cōfiūt, dia libanu inscripta, uel rūpatur uomica, & uehemētioribus repurgetur, quod genus sunt diasmirnes, & hygidion. At si pus in oculis citra exulcerationē coierit, etiā hoc liquido collyrio utendum est. Atramenti sutorii, croci singulorum drachmis octo, myrrhæ drachmis quatuor, mellis libra. Cæterū phlyctæna cū sit ceratoidis mēbranæ excrescentia, ex humore quodā tunicas ipsius excoriante, purulentorum curationi subicitur. Hygra, hoc est liquidū medicamentum ad suppurantes oculos quos hypopios uocāt: Bassi croci, aloes, myrrhæ singulæ uncia, uini quadrans, mellis optimi selibra. Crocus ex uino modico teritur, deinde alo & myrrha. Vbi crassitudine acceperint, mel additur. Vnita in uitreo uase reponuntur: uti licet



uti licet bis quotidie, aut si necessitas urgeat, ter. Quando quidem oculum simul purgat, & carnem cicatricemq; inducit.

*De cicatricibus & albuginibus.*

**Q**Uæ per summa oculorum cicatrices fiunt, aliqui hoc nomine solo cicatrices dicunt, alij uerò nubeculas. Altius aut delitescentes, albugines, medicamentis abstergentibus, extergentibusq; discutiuntur. Nebulas igitur anemonæ succus abstergit, & minoris centaurij succus cum melle. Vetusiores autem cedria extenuat: & æs solum aqua tritū modo collyrii, ad hæc quæ detergent collyria: quale est quod cornu ceruino cōstat, dia ceratos elaphiu dictū: item Rhinariūm, Hecatombe similiaq;. Albugines uero nitrum cū oleo ueteri detritum diligenter, & inunctū probe, extergit. Item sepia testā cōbusta, cū melle leuigata. Inter collyria hoc bene, & leniter abstergit. Collyrium. Mamiæ, guttæ ammoniaci, myrrhæ trologdytidis, crocodilorum fimi, singulorum æqualia pondera, in collyrium coactis utitor, uel crocodili terrestris finū ex aqua leuigatum illinito, in collyria redigens. Rectè autem sal capadocum aqua soluitur, quo collyria albuginibus exterendis dicata dissoluens instillabis.

*Quomodo cicatrices tingantur.*

**G**ALLÆ, acaciæ, singulorum drachmæ quatuor, atramenti sutorii drachmæ duæ illinentur. Collyrium autē hoc proficit, floris mali punici, cytinorum, atramenti sutorij, acaciæ, gummi, singulorum drachmæ quatuor, stimmi, gallæ, singulorum drachmæ duæ. Aqua teruntur: si flos mali granati desideretur, interius membranofum quod grana intercedit, misceto.

*De ungui oculorum, quod pterigion græcis uocatur.*

**V**NGUIS quod pterigion græci uocant, neruosa membranæ adnatæ excreſcentia est, quæ ab angulo quidem oritur, sed aduſq; oculi coronā peruenit, ubi uerò supramodū fuerit adauſta, pupillā obtegit. Magni igitur & inueterati unguēs solā manū expostulant. Recentiores uero & magnitudine mediocres, præſidijs eliduntur abstergentibus, qualia aspretudini idonea sunt, & albuginibus. inter simplicia igitur æs combustum, uel atramentum sutorium simul cū porcino felle pulchrè faciunt. Efficacius autem hoc est quod sequitur: atramenti sutorii pars una, gummi pars se missis: uino leuigata illinūtur. uel etiam



etiam collyria formantur, nonnulli uero caprinum fel melle mistum inungunt.

*Ad ungues oculorum, suppurationum, & hebetudinem. Oribasij.*

**L**apidis magnetis, æruginis rasæ, minii sinopici, suffiminis ammoniaci singulorum drachmæ quatuor, croci drachmæ duæ, mellis attici cochlearij dimidium. Idem ualet aduersus albugines.

*De carbunculo & carcinomate.*

**C**arcinoma tunicæ ceratoidis affectus est: cui dolor adfit, distentio, rubor tunicarum, cruciatus punctorius ad usque tempore magisque; si moueantur, cibi torquet fastidium, acribus irritantur, & excandescunt. Hoc malo nulla medicina subtrahit. Nihilominus dolor leniri lactis potione debet, item cibis frumentarijs & alioquin probi succi, omni acrimonia liberis. Collyria lenia infundantur, ut spodiaceum, seberianum & consimilia. Cæterum bonæ totius, corporis temperaturæ prospiciendum est. Carbunculus autem, & ipse malignum ac contumax ulcus est, crustatum aliàs bulbo, aliàs palpebræ, quemadmodum reliquis pariter corporis particulis accidit. Itaque in bulbi carbunculis per initia quidem clystere primum, mox lacte discocto, mediocriter purgare conuenit. deinde spongia foto erui farinam, uel triticeam ex aquæ mulæ decocto obducere instar cataplasmatum, nonnunquam & iridem detritam applicare, & lacte oculum eluere. Si ulcera serpendo depascant, lenticula cum melle, uel malis cydoniis incoctis forma cataplasmatum obducuntur. Si latius depascendo penetrent, foliis oleæ decoctis, uel malicorio in uino cocto leuigatoque; ex melle. At si cessent proserpere, crustaque medicamento quod subiungitur, imposito, exciderit, & ulcera sint pura, lutea ouorum tosta, leuigataque; cum croco & melle cataplasmatum modo inducentur, quousque; ad cicatricem perueniant. Medicamentum autem est hoc, spodiæ drachmæ quatuor, myrrhæ non nimis torrefactæ drachmæ tres totidemque; oboli. Detritis in uino amineo quousque; inaruerint, passum creticum uetus miscetur. Vbi leuigata sunt inuicem, liquida, pixide fictili excipiuntur, subiungunturque. Ad palpebrarum uero carbunculos malum granatum acidum, totum frustum concisum aceto incoquito. Vbi intabuerit probe, in laeuoreque;



uorem; detritum, illinito in lintheolum ac utitor, bis tēue quotidie immutans, noctu semel.

Hic locus integrior est in nostris exemplaribus, in quibus ita descriptus est. προνοῖται δὲ καὶ τῆς τῷ ὅλου σώματος εὐκτασίας πρᾶναι δὲ τὰς οὐδυνας τῶν κινῶν ἀφέψιμα φακῶν ἐγχεματιζόμενοι ἢ χυλὸς πολυγόνου ἢ ἀρογλώσσου, ἢ ἀνδράχνης, ἢ δὲ ἀνδράκωσις, id est, bonæ totius corporis temperaturæ perspicendum est. Carcinomatis autem dolores lenit decoctum lentis impositum, uel succus polygoni, uel plantaginis, uel portulacæ. Quam ueram esse scripturā ex Aëtio faciliè intelligi pōt.

*De mydriasi.*

**C**Um pupilla colore quidem nihil magis euariat, sed multo est quàm naturalis status exigat latior. interim ex toto uisum impedit, interim permultū, & oīa quæ conspiciūtur ab ipsis minora quàm sint uidētur esse, Mydriasis quidē affectus est, causa autē ipsis humor quidā excrementitius, itaq; curationē ipsius sanguinis emissionē à cubito, uel purgatione tentabimus: sin minus, uenas in angulis oculorū diuidere oportet, deinde cucurbitulam occipitio admouere, & marina frontem, & oculos perfundere. si marina desideretur, muria, uel posca. Medicamentis autē ijs utendum est, quæ etiam ad pustulas conducunt.

*De phthisi & atrophia.*

**P**hthisis affectus est, quo pupilla sit angustior, obscurior, rigosiorq;. Res lumini obiectæ, in his maiores apparēt. causa uero est dēsatio, quæ siccitati potius fertur accepta. Sed phthisis ab atrophia hoc dignoscitur discrimine, qd illa angustio-rem pupillam, hæc totum oculum minorē, humilioremq; reddat. Mederi his conuenit exercitio, & studiosa capitis, faciei, & oculorum fricatione: Adhæc aquæ in faciem superfusione & unguine quodam calfaciēte in caput dato, oculos autem medicamento, quod rarefaciat, & acriore oblinito, quale est infrascriptum. Ammoniaci drachma, crocomagmatis drachmæ quatuor, croci drachmæ duæ, æruginis drachma. Tritis in aqua, formatisq; utitor.

*De nocturna cæcitudine quæ nyctalops dicitur.*

**N**octurna cæcitus, qui Græcis Nyctalops dicitur, uitium est quo per diem homo cernit, Sole dein occiduo obscurius, noctu omnino nihil. Curari debet sanguine ex cubito, & oculorum



& oculorum angulis uacuato, mox purgatione, uel per clysterem inanitione adhibita. Deinde apophlegmatismi indicentur, aut sternutamenta prouocare oportet. Ante cibum hyssopus potui, uel ruta dabitur. Si his remedijs morbus non cedit iterum purgationem moliemur ex scammonia, & castoreo; oculi uero melle despumato illinentur, claudenturq; premedando liquamenta, contiuen-doq;. Alumilis combusti partes duæ, salis fossitij pars una. Trita cum melle sublinuntur. **ALIUD.** Iecur hircinum assatur, aquosa inter assandum sanies inde emanans collectaq; inungitur. Quin & ipsum iecur comedendum exhibetur, coctique uapor oculis excipi apertis præcipitur.

*De glaucomate, & suffusione quod hypochyma dicitur ex commentarijs Ruffi.*

**G**laucoma, & hypochyma ueteres unum quoddam malignus esse existimarunt. Posteriores autem glaucomata quidem humoris, qui ob similitudinem crystallo *κρυσταλλοειδής* appellatur, uitia, præ humiditate in glaucium colorem transeuntis iudicarunt. Hypochymata humorum affusionem, qui inter tunicam ceratoidem, & crystalloidem concrescunt. Verum omnia glaucomata curationem non recipiunt: hypochymata autem curantur, sed non omnia, proinde suffusione tentatis succurremus, antequam malum radices egerit, consistatq; sanguinis ex cubito detractio, & purgatione. item iniectionibus acrioribus, ueluti ex centaurij, aut cucumeris amaræ decocto petitis, & alui solutione crebriore, cucurbitulisque occipitio cute incisa admotis. Cæterum aquæ potus toto uictus curriculo competit, cibusque uti qui extenuant. Proderit autem temporis spatium, & apophlegmatismis diebus aliquot uti. Quibus uerò ceu culices, oculis obuersari perperam uidentur, ex quadam humorum prauitate, uel biliosioribus uaporibus sursum distributis, medicamentum dialoes amarum exhibetur subinde uel inde sumetur purgatio. In oculis autem medicaminibus utendum est, primum simplicibus, puta melle, cum oleo, & feniculi succo. postea etiam compositis, quale est hoc. Sagapeni drachmæ duæ, liquoris cyrenaci, ueratri albi singulorum drachmæ sex. Alij addunt in mellis heminis octo. Nos autem tradit Oribasius, subscripto utemur, caucalidis succi, chamedryos, sanguinariæ singulorum æquis portionibus contritis.

Benefa.



Benefaciunt item collyria, & quod succo feniculi constat, & Protheus, & Thalasserus, & diaopobalsamu, & quæ ex his quæ parantur, præsidio esse solent. Insuper feniculi decoctum per initia superfusum adiuuat. item ex succis confectum, opobalsamo, melle, oleo ueteri, & similibus.

*De glaucomate & suffusione, ex commentarijs Demosthenis.*

**F**Loris æris oboli quinque, myrrhæ drachmæ tres, nardi indicæ drachma, lapidis hæmatididis drachma: aphronitri drachma, salis floris drachmæ duæ, opobalsami drachmæ nouem. melle attico excepta offeruntur.

*De obscuritate, & hebetudine.*

**O**bscuritas, quam amaurosim Græci uocant, est totius cernendi uisus plerunq; absq; manifesto oculi affectu impedimentum. Hebetudo (quæ amblyopia Græcorum lingua uocatur) obscuritas uisus est, ab occulta quadâ causa proueniens. Curatio communis sanè est ei quam in suffusius diximus Priuata uero est, ab angulis sanguinem mittere, hirudines admo- uere temporibus, inferiores partes perfricare. Procedente tem- pore etiam ijs quæ sternutamenta prouocant, utendû est, tum uomitu ante cibum, & inunctionibus, primum ex mellis, & olei æqua portione, deinde composito quod subiungitur. Croci obolis duobus, fellis hyenæ drachma, piperis communis gra- nis octogintaquinque feniculi succi drachmis sexdecim, guttæ ammoniaci drachma. Contritis ad læuorem aridis ex succo, mellis cochlearia quatuor adijciuntur. Præparata excipito ærea pyx de & utitor. priusquam uerò illinantur oculi, in mari- nam calidam demersi fouebuntur.

*De strabismo.*

**I**nfantès ab origine strabones curantur larua faciei circūposi- ta, ut in rectû uideant. Nam strabismus cōuulsiora musculo- rum qui bulbû mouent, dispositio est, & lucerna è regione po- sita, & non à latere elucète. Præterea cū ad nares cōueniunt ocu- lis floccos rubros agglutinare uincit angulis qui circa tempo- ra habentur: ut uisu ad hos incōniunter directo, oculos emēdēt.

*De oculorum expressione qui ἐπιστροφὴ appellatur.*

**E**xprimuntur oculi nonnunquam, ut exerti perseuerent. qui- bus sanè strangulatus, mali causa est, ex cubito uenam inci- dere



dere oportet: sin alio modo id acciderit, medicamento purgare ueratro nigro, uel scammonia. Ex doloribus autem contractas oculorum expressiones, quæ frequenter sanè etiã ex partu accidunt, uteri purgationes soluant: unde has promouere conuenit in uiris autem post sanguinis. detractionē. si non remiserit uitium, cucurbitulam occipitio defigere commodū est. Lanam melle imbutam imponere, aut panni floccos cū aqua, superq; duplicatum linteum illigare leniter. His prodest & marina frigida fronti superfusa, item sereos, & polygoni succus cum meconio illitus, tum alia quæ reprimere possunt, & contrahere.

*De confusione.*

**C**onfusiones ex ictu, curamus sanguinis detractione à cubito, totum oculum sanguine, potissimum quidem palumbi recens occisi, sin minus, etiam colombæ replemus: deinde lanam mollem in ouum cum uino, rosaceoque contusum demersam imponimus, illigamusque: sequenti die idem facimus, & tertio fomenta exhibemus, lac instillamus, applicamusque idonea, deinde sublinimus medicamentis quæ ad ueteres affectiones inscribuntur: quale est Chiacum.

*De myopia.*

**M**yopiæ dicuntur Græce, lusciosi nostris, qui prima natali die propinqua sanè uident, remota uero non item. Infabilis est huiusmodi dispositio ut quæ ab imbecillitate spiritus uisorijs proueniat. Cōtrario his modo senes afficiuntur. Cum enim propinqua non uideant, procul dissita assequuntur.

*Auricularia & primum de auriū dolore. Cap. XXIII.*

**A**urium dolorem ex frigiditate contractum, ubi ex anni tempore, præcedente uictu, uel ægrotantis quoque percuntatione: an ob exteriorem causam acciderit, didicerimus, inde quòd dolor alte citra grauitatem, uel distentionem, uel ardorem fixus sit, calefacientibus curabitur præidiis, nempe oleo rutaceo, calido uel nardino, uel laurino calido, uel amaracino, uel phuliato, uel spicato, uel communi, cum euphorbio, uel piperi, uel castoreo, uel commageno, dicto unguine, uel liquore balsami in meatum auditorium instillato. Iam uero oleum in quo allium decoctum sit, uel cepa, instillatum auxiliatur. At ex calida conceptum intempe-

rie



rie dolorem, in quo feruoris cuiusdam sine grauitate seu ten-  
 sione sensus est, contraria medicantur oui albumen subactum  
 in aurem demissum, quemadmodum oculis adhibemus, lac mu-  
 liebre cum quodam collyrio, quod dolorem lenit, uel succo  
 perditij herbae, cum modico rosaceo: ipsumque rosaceum, uel  
 oxyrhodium, uel succus solani, uel coriandri, uel hastulae re-  
 giae, uel oleum in quo lumbrici, uel aselli qui sub aquaris stabu-  
 lantur, incocti, uel oleum amygdalinum per se, uel buccina ui-  
 ua numero tria, in eo decocta naturaliter proficiunt. Quod si  
 glutinosi, crassique succi dolores fecerint, capitis, ipsiusque  
 auris grauitas, & praecedentis uictus ratio testatur. sola uero ci-  
 tra grauitatem distentio ipsius auris spiritum flatulentum, cui  
 exitus non patescit, indicat. Itaque in ambobus uitiis uetere  
 medicamentis, quae aperiunt, inciduntque, cuiusmodi est aphro-  
 nitrum cum aceto, & melle. Item fel ouillum cum oleo com-  
 muni, uel amygdalino: praeterea porri & cepae succus tepidus  
 cum melle, aut origanum tritum, cum melle & lacte mulie-  
 bri instillatur. Ad uehementiores aurium perfrictiones fel ca-  
 prillum cum succo porri inditur. Verum in iis quos multus  
 dolor, longusque urget: & grauis simul auditus existit, haec  
 quoque usurpari debent, cuiusmodi dracunculi succus est, ari-  
 brioniae, & similia. priuatim uero qui ob flatuosum indole-  
 scunt spiritum, cucurbita ex aqua calida fotu prius facto, circa  
 aurem fixa strenue auxiliatur. At si grauitas, distensio, simul-  
 que calor, & dolor pulsabilis, aut etiam febricula oboritur, in-  
 flammatione aurem laborare censeto. Atque ante omnia hic  
 sanguis emittendus est, † deinde fotu frequenti utendum ex  
 oleo dulci calente per specillum lana inuolutum, meatui ue-  
 ro adeps anserinus, uulpinusue, aut medicamen basilicum  
 cum rosaceo, uel cyprino, uel irino debet instillari: extrin-  
 secus ea quae dolorem lenire, & concoquere possunt, cata-  
 plasmatis modo superaccommodare. Si dolor uiolentus est,  
 iis utere, quae leuiter sensum stupefaciunt: non enim me-  
 diocre periculum est, quod cerebrum neruo per quem facul-  
 tas audiendi erogatur inflammato. uicinum sit. Probè igitur  
 hoc dolorem lenit, opii pars una, castorei partes duae, cum  
 lacte muliebri, uel oui albumine, aut uino dulci tepido in-  
 stillantur. Iam pastillus Crocodes, Aster, Philonis antidotum  
 frequenter his pro fuerunt. uerum conuenit crebro foun-  
 tem



rem aut oleo communi, aut ex quodam calido fomento lanā, hoc ipso imbutam in aurem conicere, sed ita ut partes inflammatione tentatæ quā fieri potest minime attingantur. At si dolor in uetustatem incidit, ac in pus degeneraturus est, medicamento utitor, quod ex lini seminis succo conficitur, una cū rosaceo, aut chamæmelino solutum, instillatis. Cum autem aqua medicata, meatu recepta auditorio dolorem parit, si quidem copiosa fuerit, ore, uel etiam arundine ipsam exugere ratio est. Sin autem pauca specillo auricularia lana inuoluto extergens, oleum quoddam instillabis quod sit partium tenuiū, aut rosaceū, aut oui album, aut lac muliebre. Calida uerò omnia mediocriter esse conuenit, quæ auribus adhibentur.

† Hic locus magis expressus in ueteri exemplari, in quo ita est descriptus. δὲ δὲ συχινῶς πυριῶντα, ἢ τῷ κόινῳ ἐλαίῳ, ἢ τινὶ τῶν θερμῶν μύρων χρῆσθαι, ἢ καὶ ἔριον ἐν αὐτοῖς τέτοις βαβρεγμένον ἐπιτιθέναι τῇ ἀκοῇ, id est, oportet autem assiduè fouere & oleo communi, uel aliquo medicamento uti, atque eo madefactam lanam auri imponere.

*Ad ulcera quæ simul cum inflammatione affligunt.*

**L**icium & meconium æquali portione trita cum melle iniiciuntur.

*Ad dolores maximos, pus & grauem auditum.*

**A**Mygdalinum quibus corticem detraxeris & aphronitri singulorum drachmæ tres, opij drachmæ tres, thuris drachmæ tres, croci drachmæ quatuor, galbani drachmæ duæ, myrrhæ drachma. Aceto læuigata instillantur. si dolor quidem exercet, rosaceo diluta: sin autem pus profluit, mulso, uel oxymelite: si grauius audiunt, aceto recentia ulcera glauciū solutū aceto, persanat: itē ex eo collyria, tū quæ appellātur diarodon, diacrocū, & diasmirnes quemadmodū rursus suppurantes citra dolorem ferri recrementum cum aceto diutius læuigatum.

*Ad sordium duritiem.*

**N**itro aceto diluto cum aqua auris illuitur, cumq; sordes deterse sunt nitrum aceto solutum cum rosaceo instillatur.

*Aliud ad sordes.*

**C**ardamomi & nitri exiguum, cum ficis pinguibus sine granis exceptum, & in collyrij formam redactum, auriculæ committitur. Tertio quoque die educitur. Copiosas enim

PAULI AEGIN.

I sordes



sordes extrahit, & abunde leuat. Proficit hoc etiam aduersus carnis excrescentias, longos dolores, exulcerationes, recipit aloes, thuris, myrrhæ, singulorū drachmam, myseos drachmas quatuor ex aceto in pastillos digeruntur, cū usus requirit aceto & rosaceo soluta instillantur, Item Andronis pastillus & Heræ, & musæ.

*Ad diuturna ulcera.*

**C**edria melli admista illinitur. **ALIVD.** Myi usum & in puluerē redactū inspiratur. Per clysterē uerò auricularium eluuntur aures posca, uel oxymelite, uel mulso, uel decocto quorundam repellentiū (uerbi causā) lenticulæ, uel rosarum.

*Ad aures cruorem fundentes.*

**L**entisci decocto auris illuitur, polygonij uerò succa cum paucissimo aceto instillatur, uel lycium, uel amurca, uel acacia, uel porri succus.

*Si caro excreuerit.*

**N**itro ex aqua calida, simul cum squama æris, & sandaracha pari modo auriculam illinito. Vbi crustam acceperint, mel le repurgato.

*Aduersus aurium uermes.*

**A**bsynthij decocto, uel centaurij, uel porri eluuntur: capparis autem foliorum uiridum, aut fructus succus instillatur, uel cedrinus liquor, uel urina humana uetus, uel album ueratrum cum melle, uel calaminthæ succus, uel scammonia cum aceto, uel succus absynthij oleum uerò meatui inditum usque ad superiora, exire ipsos compellit: potius autem est oxelæum. Eodem ad ea quæ auribus incidunt animalcula utitor.

*Ad calculos & similia quæ in aurem inciderunt extrahenda.*

**S**pecillum auriculariū lana inuolutum in resnam, aut gummi, aut aliud quoddā glutinans medicamentum intingendum, idq; in aurem inijciendum, ac quod in ea est protrahendum. Si hoc modo nihil efficitur, oleum calidum continue instillato. At si ne sic quidē exciderit, aut comprehensum fuerit: alijs quoque utitor modis: ut in parte chirurgica docebimus.

*Ad sonitum aurium intra seipsas.*

**S**i in febribus, aut harum crisi bus sonitus aurium euenerit: nullum



lum ei negotiū facessere oportet, quippe statim magna ex parte liniuntur. Sin aut post morbum perseverauerit, absynthij decocto ubi aures foueris accitū, rosaceumq; infundi debet, uel raphani succus cū rosaceo, aut ueratri nigri cū aceto. Ad ueteres aut sonitus, qui ex crassis glutinosissq; humoribus creatur, inde uerò illos cognoscet qđ nō subito, sed paulatim crescunt, nascuntq; aceto, nitro, & melle aurē illinito. ALIUD. Veratri albi drachmæ duæ, castorei rotidē, croci drachmæ tres, nitri drachmæ sedecim. ex aceto contrita, in pastillos digerito ac utitor.

*Ad ueteres sonitus, & tinnitus.*

**E**vphorbium cum cyprino oleo leuigatum, calefactumq; ne usurpato, in quibus autem ob multam sentiēdi facultatem uapores, & natus sursum distribui percipiuntur, castoreum, & cicutæ semen tritum cum aceto instillatur.

*Ad grauem auditum, & surditatem.*

**Q**uæ ab origine quidem, uel etiam post natalem diē, sed longissimæ, & absolutæ surditates constituuntur, nullo remedio illidi possunt. Quæ uerò nō absolutæ quidem, sed diuturnæ tamē, & ipsæ curationē non recipiūt, aut certe difficillimam. Quæ ob biliosum humorē sursum uergētem nascuntur, uacuationibus per medicamenta bilē ducentia ex facili aboleruntur quidā etiam sua sponte affectu liberantur, bile inferius descendente. At ex crudis crassissq; humoribus prognatas surditates, uel grauem auditum, uenæ incisione curato, aut omnino purgatione, ex Hiera, tum apophlegmatismis & errhinis item balneis sua sponte scaturientibus, uel ex aqua marina. Porro in meatum ubi facultas audiēdi est, conuenit instillare, quæ ad sonitus tradita sunt. Priuatim uerò hæc urinam & fel caprillū, aut seorsim fel, aut rutæ succum cum melle, aut castoreū, cum oleo anethino: & hyssopum medicamentum cum nardino unguine, uel caprillum fel cum galbano: uel quod recipit castorei drachmas duas, nitri, ueratri albi singulorum drachmam.

*Ad contusionem aurium qua θλάσις dicitur.*

**H**ippocrates quidem nihil ipsis adh bendum præcipit. Cum uerò sæpe ab ægrotis cogamur, utendum est his. Myrrhæ, aloes, thuris, acaciæ, pari singulorum modo: ex aceto inunguntur aut panis calidi pars interior cum melle in

1 2      pila



pila contusa obducitur: aut hoc: bituminis, thuris, aloes, cochlearum carnis, bulborum polentæ per modum, ex aceto leuigata imponuntur. Quod si inflammatio oborta est, sesamum leue factum applicatur, uel chondrus, cum aceto coctus, laxiora autem esto cataplasmata, & citra deligaturam aut leuiter deligentur. & lana oleo imbuta auris aufractui demittatur.

### *De parotidibus.*

**P**arotis glandularum iuxta ipsas aures affectus est, materia morbi illic eructante, alias à capite humoribus uidelicet in eo impactis: aliàs à reliquo corpore in febribus critico modo proueniens. Si igitur, alte adhuc delitescens parotis in tumorem non attollitur, natura debet adiutari præsidijs, quæ coactas sordes extrahant, uel etiam cucurbitula agglutinata, uel crebro fotuum usu. Nam si in altum recurrat colluies, periculum haud mediocre subsequiturum est. Sin autem inflammatione tentata in tumorem fastigatur, è contrario iis quæ leniunt, & concoquunt, utemur cataplasmatibus, quale est ex farina hordeacea, & aut triticea, aut semine lini cum mullâ, aut fœnugræci, aut althææ, aut chamæmelorum coctionem expertorum iure incoctum. item quod ex rumice, & axungia insulsa constat. at si exuperare sanguis tibi uideatur, prius ipsum uenæ sectione uacuabis: modo uires permittant. Tumore autem non discusso, medicamentis utere quæ puri mouendo sunt, nempe farina tricea cum pinguium ficorum decoctum, uel oleo, tum medicamento quod ex polline, & quod ex fermento confectum est. Vbi iam ascessus, ad suppurationem spectarit, nec cute ferro discissa pus excerneretur, uel acri medicamento rumpetur, cuiusmodi existit smidion appellatum, & diascorodon, hoc est ex aliis præparatum. Cæterum mitiores parotidas etiam foris ex muria discutit, item medicamentum diaperanu. Hoc sane etiam pus iam maturatum discutit, præter quod dolori leniendo sit efficacissimum. Ad inueteratas parotidas buccinorum, aut purpurarum combustarum cinerem cum melle, uel axungia imponemus, aut ficus marina incoctas, uel marrubium cum sale. Induratas autem iam emollit & medicamen Mnasei, & Ariobarbianos. optimum etiam quod ex succo lini seminis præparatur. ante hæc autem obducere ammoniacum conuenit, mista cum cataplasmatibus pice liquida, uel seuo taurino,



no, uel bdellio, uel styrace, uel medulla ceruina.

*De narium & olfactus uitij. Cap. XXIIII.*

**O**lfaciendi facultate oblata, si uox seruetur incolumis, ad priores cerebri uentriculos morbus refertur: qui aut ex intemperie sola noxam cōceperunt, aut etiam ex humorum copia. Sin autem uox quoq; mali contagium senserit laboriosior quodammodo reddita propter ossa quæ à colatu ethmoide græcè uocantur, obstructa, affectū rursus malis quibusdam succis contractum esse censeto. Itaq; cerebri intemperies, ubi ex notis sæpius à me dictis deprehensa fuerit, contrariis curatur remedijs. humores autem apophlegmatismis euacuare oportet: maximè uerò utitor medicamētis quæ per nares ualidè educunt, & quæ odore mouent tenuis substantiæ, quemadmodum in defluxionibus quas *καταρροὺς* græci uocant, adhibeto. Cum autē totius corporis humorū copię suspicio subest, hæc prius, aut sanguinis dimissione, aut purgatione ex Hiera uacuatur. Ita quoq; in polypode, & ozæna faciundū est, deinde loco ēt affecto inducuntur remedia. quin & Theriace pota sæpe magno fuit præsidio. Cæterū polypus, tumor præter naturā in naribus oritur, substantia respondens polypodis carunculæ: eiusdem uerò naturæ est & sarcoma. Ozæna uerò ulcus est, putridum ex humorum acrium illuie creatum.

*Ad polypodas & Sarcomata.*

**S**quamæ æris drachmæ octo, atramēti sutorii drachmæ duæ, sandarachæ drachmæ quatuor, ueratri nigri drachmæ duæ: naribus inspirantur. In usu hoc est laudatissimū, nam tredecim diebus, insignè affert præsidium. benefacit & atramentū sutorium cum aceto. ALIUD. Malicorij drachmæ duodecim, atramenti sutorii drachmæ decē: chalcitidis drachmæ octo, fellis taurini, amomi, myrrhæ, calaminthæ, marrubii, singulorū drachmæ quatuor, croci drachmæ duæ, ueratri albi drachmæ quatuor. sicco utitor. ALIUD. Diphrygi trito nares, linamentoq; ex ellychnijs contorto attinguntur, dilatanturq;.

*Ad ozænas.*

**M**isyos, chalcitidis, myrrhæ, singulorum drachmæ septem, atramenti sutorii drachmæ sex, aluminis scissilis, gallæ, squamæ æris, singulorum drachmæ quatuor, aluminis rotundi drachmæ duæ, thuris drachma una, aceti sextarius. totum in

1 3 nasc



uase aëreo coquitur. Vbi ad mellis spissitudinem uenerit, ex car-  
pris linamentis utitur ALIVD. Aeru cinem & æris squamam  
pari portione aridum medicamentum facito.

*Ad fœdum narium odorem.*

**M**Yrrhæ, acaciæ, amomi singulorum drachma. melle cocto  
excepta summo narium inter septo iubeto agglutinari  
ALIVD. Amomi, myrrhæ, rosarū siccarum partes æquales, nar-  
dino unguento exceptas illinito. Item benefacit aduersus fœ-  
ditatem odoris, & malagma hedychroë cum uino admotum.

*Ad narium ulcera.*

**C**ERUSÆ libra, argenti spumæ quadrans, recrementi plumbi  
tantūdem, uel plumbi combusti. omnia uerò lota esto, ex-  
cipianturq; uino, myrteoq; oleo.

*Ad ulcera quæ uocantur glycea.*

**A**RGENTI spumæ drach quatuor, rutæ nouellæ totidē, alumi-  
nis scissilis drach duæ. Myrteo oleo acetoq; excipiuntur.

*Quæ sternutamenta citent.*

**V**ERATRUM albū, uel castoreum, uel piper, uel struthium, uel  
simul omnia: non autem oportet inspirare, sed pinna, uel  
digito penitissimè, in nasum demittere ubi sternutamentū fre-  
quentius est, medicamento sedari debet. Infunditur nardinū,  
uel rosaceum, uel glycelæum. Iam quæ odore mouent, sternu-  
tamenta sedant, anisum, ocimi stipulæ contusæ: sed ante hæc  
omnia caput desiccandum est, smegmatis ex nitro & pumice  
factis, uel etiam asclepio uocato utendum, & Constantini sapo-  
ne, & sale cappadocico, similibusq;.

*Ad sanguinis eruptionem è naribus:*

**S**ANGUINIS è naribus profluuium, quod febribus superuenit,  
secūdo uolumina inter illas sum executus. De eo aut quod  
alia quacūq; de causa accidit nulloq; sisti pōt remedio, in præ-  
sentia tractabimus. Chalcitidē cōtritā linamēto ex ellychnijs  
cōtorro, aqua imbuto, uel eo quod à genitalis humani formæ  
priapiscon appellāt exceptā, naris foraminibus demittes. Vel  
restā ouī exustā admiscebis, & dimidiatā gallæ partē, uel lycio  
indico attinges. Vel fimi asini cinerem inspirabis. Vel eius  
expressi succū instillato, uel molaris lapidis aceto extincti, ua-  
por naribus attrahatur. Vel hoc quoq; medicamento obstruētū

utitor,



utitor, Mannæ, thuris, partē unā, aloes partem dimidiam. Can-  
dido oui liquore excipito: ac utitor, per linamentum ex elly-  
chniis contortū, extrinsecus leporis pilis unctioni impositis.  
Vel funiculū lucernarū in nares coniicito. Vel cucurbitulā le-  
uem directē, quā sanguis profluit præcordiis magnā affigito.  
præcordiis autē magnā, & perseveranter admoueto. Vel aures  
ualidē obstruatur, frons spōgiis ex aqua frigida foueāt. Vel cu-  
curbitula occipitio agglutinetur: cum sanguinis detractione:  
interim etiā uenā incidere, si nihil prohibet, & summas partes  
uinculis excipere. præsertim brachia, & femora, sicut in uenæ  
sectione fieri solet. Eadem motu cōcuti iubeto, manu uerò fri-  
catione, pedes autē obambulatione. Nam uenis indidem san-  
guine repletis, nariū uasa deplentur. Item spongia in poscam  
frigidā demersa, naribusq; profluentibus à foris strictim admo-  
ra: id quod requiritur, subinde perfecit: melius autē proficit  
longo ex linamentis intortis penicillo naribus prius subiecto.

*Ad faciei uitia.*

*Quomodo facies à rugis asseratur. Cap. XXV.*

**T**huris drachmæ quatuor, fuci quod φῦκος dicitur græ-  
cis, drachmæ tres, argenti spumæ, piperis, singulorū dra-  
chmæ octo, omnia ex ichthyocollæ contusæ diluto sol-  
uuntur, in pastillos redactis utitor. ALIUD. Eburnei scobis dra-  
chmæ octo, thuris masculi, ichthyocollæ pares portiones. Ut-  
tor, quemadmodum est prædictum.

*Ad faciei nigritias.*

**I**ridis, uel ptisanæ fresæ singulorum sesquiseptarius, salis am-  
moniaci, cornus ceruini combusti, thymiamatis ammoniaci,  
singulorū uncia duæ. Aqua dissoluta in pastillos coguntur, ac  
iterum aqua trita ante balneū illinuntur. ALIUD. Ptisanæ, erui,  
thuris, iridis illyricæ, aphronitri singulorum chœnices duo, co-  
sti, amygdalorum amarorum singulorum drachmæ uiginti.  
Quorum albumine. lacteq; asinino subigito, ac utitor ueluti  
prædiximus. Benefacit etiam pastillus Peponatos.

*Ad ephelidem & lenticulas.*

**T**erræ cimoliæ torrefactæ, semicōgius, aphronitri costi, dra-  
chmæ octo, erui farinæ elixatæ drachmæ quatuor, fellis  
raurini, eburnei scobis singulorū drachmæ octo. Leuigatis fa-  
cies defricat. ALIUD. Fecis drachmæ decē, erui farinæ drachmæ  
1 4 decem



decem, lomēti drachmæ decē ueratri albi drach. quinq;, aphrō  
nitri drachmæ decē, alcyonij drachmæ decē, tritis abstergito.

*Ad suggillata.*

**P**Er initia decocto fenugræci postea & meliloti oculi fouēs,  
Nilei collyriū diarodon aqua solutū illinito: deinde dias-  
mirnes. Et si nihil profecerit, id quod diasandicos inscribit, cō-  
bustū, perungito, uel hyssopum cū aqua applicato. Vel hyssopo  
in panniculum illigato & calida aqua respersa foueto: uel acri-  
muria. item raphani corticē cum melle detritū impones. hoc  
etiam ueteribus efficax est. Porro ad uetusta faciei suggillata,  
& liuores tordili partes duas, terræ sāmīæ partem unam cum  
melle admoueto, cura adhibita ne exulceretur.

*Aliud deterforium.*

**H**Yssopi, thapsiæ, casīæ singulorum drachmas duas, ceræ tan-  
tundem, terebinthinæ drachmam injicito, cauens ne exul-  
cerationem excites, eoq; frequenter tolles.

*De uaris.*

**E**Xigui sunt & duri in facie tumores. Oxymelite illinito, uel  
argēti spumā cū terebinthina, aut olei cādidi momēto tritā  
infricādo perūges: uel alumē fissile cū terebinthina, uel amygdā  
la amara aceto macerata infricant. In callū uero cōcretos ua-  
ros, saponis gallici drach. quatuor, thuris, thimiamatis ammo-  
niaci singulis drach. aq̄ dissolutis perūgito, & post horā eluito.

*Ad uaros, pilos, & aspredinem faciei.*

**C**Eræ drachmæ decem, terebinthinæ, drachma, uisci drach-  
mæ duæ. Liquato una oleum superinfundens atq; hoc me-  
dicamento faciem abstergito, tollit enim radicitus. ALIUD. Pa-  
pauer detritum, uel pulegium cum sale. acetoq; applicato.

*Ceratum thaidis quo facies rubescat.*

**C**Roci, erythrodani radicis, fuci, thuris, myrhæ sing. drachmæ  
duæ Adipe uitulino, oleoq; mastichino excipiūtur: deinde  
illinūtur. Interposito tēpore, sponsia ex calēte aqua facies ab-  
stergitur. Cæterū faciei remedia, ēt reliquo corpori cōueniūt.

*De oris affectibus, & primum de dentium  
dolore. Cap. XXVI.*

**D**Entium dolorem siue gingiuarum inflāmatione, interim  
in proprio ipsorum corpore, interim in neruo, qui ad ipsos  
pertinet,



pertinet, oriri contingit. quapropter ualentissimorum in hoc medicaminum usus est. Atq; inde plurima ipsorum quàm acerrimo aceto præparantur. At gingiuis propter inflammationē dolentibus, præsentissimum est remedium, oleum lentiscinū, calore temperatum, si in ore retineatur, esto autem id recens. nam uetus tanto recenti deterius, quanto calidius. Communis autem ratio etiam hic seruetur, ut humor qui in toto corpore superat, prius euacuetur.

*Ad dentium inflammationem.*

**O**S colluatur aceto, in quo decocta sit galla, uel halicacabi radix, alterci semen, foliā ue, uel pulegiū, uel solani succus, uel capparis radix, uel myrti folia, uel poliū, uel cucumis syluestris radix, uel rutæ folia cū oxymelite, uel cornu ceruinum, uel acetum scillites, uel pyrethrū, cū hyssopo. At erosionem ex parte denti, styracem cū opio imposito: uel sulfur uinum cū lycio: uel alterci seminis uaporem excipiat per infundibulum. Item Philonis antidotum denti circumlitum, dolorem sedat. Quod si defluxione laborēt dentes, myrti, lentisci, & gallæ decocto colluentur, uel rhus syriaci, balaustij, uel malicorij. applicantur aut salis partes duæ, aluminis usti, & aceto extincti triq; pars una: deinde uino perluuntur. porrò gingiuis cruentis alumen tenue inspergitur, uel aloë cum uino eluuntur: uel rubi radice uino decocta: uel rhu syriaco. cruentis autē & defluxione tentatis gingiuis crudum salsamentum in olla comburito, quoad in carbones redigatur. puluere attingito. At mobiles stabilit aloë inspersa, uel rhus syriacus, uel alumē scissile, uel galla, uel rubi radix per se, aut cum uino incocta.

*Aliud ad dentes.*

**N**Vcis uiridis corticē terito, eiusq; ius, cū habes, in id conijcito myrrham uerā, & alumen scissile, ubi omnia in unitatem coegeris, in usu infundito, ac in gingiuas qua parte dens indolet, demittito & persanabis. **ALIVD.** Allium, piper, herbam pediculariam quæ staphis agria dicitur, detrita, in linamento in globulos coges quos circa dentes uersans humorem in capite contentum elicies, dentemq; sanabis. **ALIVD.** Ad dentes mobiles, & gingiuas fluxione pressas omniaq; oris ulcera depascen-  
tia Chalcitidis tostæ drachmæ duodecim, cadmiæ drachmæ octo, utitor sicco, aut cum aceto, sine dolore dentes tollit, fa-  
rina



rina cum liquore tithymalli imponitur, & super hederæ foliū accommodatur, ac per horā finitur, sua. n. spōte dens conteretur. Dentū smegma, quod & parulidibus benefacit. Aluminis latercularij triēs, salis ammoniaci tantundē, myrrhæ, costi, pyrethri, singulorum drachmæ quatuor, piperis grana octoginta.

*Ad parulidas.*

**S**ulfuris uiui, piperis, aluminis scissi, æquales portiones. Ac parulis inflammatio quædam est in aliqua gingiuarum parte suscitata. quæ nisi discussa fuerit, in suppurationē cōuertitur, & cum suppurauerit, scapello incisa, linamentis insertis distendetur. Epulis autē carnis excreſcentia est, quæ ab inflammatione contracta ad intimos molares dentes pertinet: nonnunquam cum febris & dolore. Quoniā igitur reprimi debet, utendū est, ærugine rasa priuatim: uel cum pari galla, uel fori combusto, uel alumine quolibet cremato, uel galla per se uel squama æris cum aceto diebus sat multis leuigata desiccataq;.

*Smegma dentium.*

**A**ristolochiæ radix cōbusta, cerui cornu combustum cū mastiches momento, sal candidus melle respersus & fici foliis inuolutus exustusq; donec in carbones mutetur. ALIUD. Buccina sale respersa, uitaq;, cochleæ terrestres cum melle combustæ, lanæ succidæ crematæ cum modico sale. Singulis ipsorum grati odoris gratia misceatur iunci rotūdi flos, uel nardi spicæ, uel folium malabatri, uel iuncus odoratus angulosus, uel iris.

*Dentium candorem concilians, & oris suauitatem faciens gingiuasque reprimens.*

**P**vmicis, salis roſti, iridis singulorum drachmæ quatuor, iunci odorati angulosi drachmæ quinq;, spicæ nardi drachma, piperis drachmæ sex. Tritis utitor.

*Ad stuporem dentium.*

**S**tupori benefacit portulaca commāducata, uel oleum quod immaturæ oliuæ fuderunt infricatum, uel amurca in æreo uase cum oleo cocta, donec mellis spissitudinem habeat, atque uerusta si perungatur, magnum affert momentum.

*Ad dentes attritos.*

**D**entibus attritis, baccarum lauri, aluminis scissi, aristolochiæ



chiæ farmentorum quæ clematicis dicitur, singulorum pares portiones iniiciuntur.

*Ad gingiuas corrosas.*

**R**osarum floris drachmis octo, gallarû drachmis quatuor, myrihæ drachmis duabus, si gingiue erole, & humiditatis vicio haccidæ, colluantur, sanescunt. Idē præstat lac asininum, oliuæ foliorum decoctû, acetum scillites: arida uerò admota, ærugo ferri, cytini. Tumidas excreſcētesq; gingiuas portulacæ succus in ore retentus, muria ex colymbadibus oliuis, calidû, calidum, uel lentiscinum, uel melinum amurcâq; discutit: sicca autem, ærugo ferri, uel ar s, aristolochiæ radix, arnoglossi semen, dyphryges, atramentum sutorium totum, cytini.

*Ad disrupta labra.*

**A**murca cocta illinantur: uel hoc prodest adeps anserinus cum melle, terebinthina æquali portione, rosarum floris, hyssopi, rosacei, singulorum momentum.

*Aduersus linguæ morbum qui batrachus appellatur.*

**B**atrachus tumor est, ad inflammationis similitudinem, sub lingua erumpens, maximè in pueris: itaq; locus misyos, æruginis rasæ, pari pōdere sicco perfricatur. Mento autē adhiberi debet medicamentû. Anthera, uel spherion, uel ex ouis parygrum. In adultis remedium est uenas sub lingua diuidere.

ALIUD. Valet etiâ ad oris ulcera, quas Græci aphthas uocant, æruginis rasæ, gallæ, chalcitidis singulorû equale pondus cum passlo. os etiam his colluitur. ALIUD. Eruï farina cû melle prius absterſis, delinitur, galla leuis cum melle, uel rosarum flores similiter. Vel oliuæ foliorum decocto colluant.

*Ad tonsillorum inflammationem.*

**S**i in febrî tonsillæ, & columella inflammationem senserint, gargarezare cōuenit decocto furfurû, aut rosarum, aut palmarum, aut myxæ, aut lenticulæ. Cum uerò inflammatio remittit, consistitûe, mel ipsis adijciendû est, quod per initia facere nō oportet, nec in augmento, ne acrimonia fluxionē quandam cōcitent. Vbi in suppurationē conuersa eruperit, gargarizandum est, ex mulsâ uel lenticulæ decocto, uel rosarum: idq; faciundû est, donec in totum soluat: aut stomatica collutio ad gargarizandum etiam exhibebitur. At si pestifera tonsillis  
ulcera



ulcera oboriantur, utendū quidem & præscriptis, sed priuatiū exhiberi debet medicamē diamoron, ex aqua calida, uel aqua mulsa, quæ rosarū inspersum florē obtineat, uel costū, uel -hus sicca, uel decocta, uel glauci foliorum aridorum decoctū quod amarum est. optimè autē facit, si succū, ut ad collyria utimur, in mulsa dissoluis. ipsius autē fruticis sicci, si inspiretur, usus est laudatissimus, aut si digito admoueatur. cura uero habenda est ne prorsus attingatur, aut certē leniter admodū. Profuit & pastillus Andronius. Post hæc acria irritantia uē gargarizatur ex medicamento, quod ex dulci radícula quæ glycyrije dicitur, constat: aut eo quod croco, uino scybelite, terra chia, & myrra cōponitur. deinde amylo, & tragacanto. Vbi iam cōstiterit ulcerum depastio, gargarizandum medicamento ex lacte & samia terra confecto. ALIUD. Ad tonsillas quæ post inflātionem induruerunt, ἀντρίαιδες græci nominant. Ex malo punico dulci cum cortice tuso succus exprimitur, & eius partes sex, mellis uni mistæ coquuntur, donec eis mellis spissitudo sit & perunguntur ALIUD. Gallæ omphacitidis uncia duæ, aluminis scissilis uncia, salis ammoniaci tosti tantundem. Puluerē attingito. ALIUD. Gallæ drachmę octo, misyos drachmę duę, salis tosti drachmę quinq; utitor puluere. est autem Antias, tonsillarum tumor, schirrum præferens.

*De uua.*

**V**Va si inflammationem experitur, gargarizandum ex iisdem, quæ tonsillæ inflammatae postulant, & mediocriter astringentibus, qualis est mali punici succus per cochlear, uel instrumentum, quod ab uua attollenda staphileparton appellant, subiectus; tum per se, tum cum melle affatim cocto. uel dulcis radix, mali punici succo mista. proficit etiam succus dulcis radicis cum melle illitus. iam hæmatites lapis uuam reprimat, & phrygius combustus, & ageratus, item ex lapide phrygio medicamen ad pudenda inscriptum. His adduntur terra samia, erethrias, sinopis, lemnia, & omphacium, per se & cum horum aliquo. Item spinæ egyptia succus & alumen scissile. rosæ uero, & semen, & folia lenius operantur, adhuc lenius gummi, tragacantha, sarcocolla, amyllum: quibus utendum dum magis una prematur ab astringentibus constricta. ubi æqualiter crassa fuerit ipsa, quod

uitium



uitium iam uiam Latini, κινδρα Græci propriè dicunt, gargari-  
zationibus fidendum etiam ijs quæ ex myrrha, & croco, & iun-  
co anguloso fiunt. Contusiones autem cauendæ sunt, ob quod  
pinna potius perungere conuenit. compositum uero hoc uti-  
le est, rhus syriaci drachmæ octo, croci drachmæ quatuor, costi  
drachmæ octo, rosarum seminis drachmæ quatuor. Prætereà  
gingiuis benefacit, linum ex purpura marina, quod uiperæ col-  
lo circumdatum ipsam strangulauerit, deinde circumadigatur  
consillis, & colli uitijs, mirabili quodam modo opitulatur, ut  
Galenus author est.

*Ad sanguinis ex ore profluuium.*

**P**Orri folia contusa imponuntur, uel sponsia recens in picē  
crudam mersa comburitur, in puluerem coacta utitor, ac  
ualde utile est remedium, & collutiones oris ex rosis siccis, aut  
uiridibus. Ad hæc decoctum frigidum, uel pampinorum uitis,  
uel lentiscoli foliorum, uel rutæ, uel malorum cotoniorum, uel  
rosarum, uel uuæ acinorum, uel lenticularum.

*De angina, eiusque speciebus: ubi etiam de strangulatis:  
uel alio modo suffocatis agitur. Cap. XXVII.*

**I**Nterioribus faucium, pharynga Græci uocant, musculis in-  
flammati angina accidit, quæ synanche Græcis dicitur: ex  
terioribus, parasyanche. Eodem modo & in superiore gut-  
turis parte, λαρυγγα Græci nominant, habet: cuius si interiores  
musculi inflammatione confluentur, cynanchem: si exte-  
res, paracynanchem efficiunt. Hæc autem comitantur omnes:  
recta ceruice spiratio, dolor cum difficultate spirandi, nonnul-  
lis etiam febricula oritur, faciei rubor, ceruicisq; & tumor in  
quibusdam os egri apertum habent, & deuorare nequeunt. Cy-  
nanchicos uero strangulatus quoque interdum secutus est.  
Pueris raro talis affectus oboritur, cum scilicet ceruicis uerte-  
bræ affectæ loco suo excidunt. Verum illis ceu curationē non  
recipientibus, ac deploratis, manum admoliri non oportet. Re-  
liquis autem sanguis protinus è cubito mittendus est, sed non  
subito ac semel, uerum pluribus interpositis uicibus euacua-  
bitur. quippe cumulatæ, semelq; facta uacuatione, anima ipsis  
deficiente, suffocationis periculum superuenit, dum materia  
in affectam partem collectim prorumpit. Si per hæc non le-  
uantur, eas quoque uenas incidere conuenit, quæ sub lingua  
sunt,



sunt, uel ipsa quoque lingua scarificanda, si propensior foras cum tumore appareat. Alius acriore clystere subduci debet, pedes aqua calida foueri, extremæ partes ualide deligari, collum lanis succidis, uel etiam oleo imbutis contegi, crudaque farina ordeacea, quæ Græcis ὤμη λῶσις dicitur modo cataplasmatibus obduci. gargarizandum uerò per initia ex eis quæ in tonsillarum inflammatione dicta sunt, uel simplici diamoron, † cum rhus decocto. Potius autem est diamoron, quod syluestribus moris conficitur. Deinde & composito diamoron, uel eo quod diacaryen à nucibus uocetur perungantur. Cum autem morbus uiger, consistitque, & nitri momentum admiscendum est, aut etiam sulfuris uiui, nisi acrimonia quædam prohibeat. item sterqus caninum aridum contusum, & cum melle perunctum, præstantissimum & remedium: idque album maxime, item syluestrium hirundinum cinis similiter efficax est. Si malum longius prorogatur, etiam perunctione diabesasa, utemur, nunc uires ipsius remittentes, aliorum mistura, nunc iterum intendentes. Cucurbitula quoque, uel hirudo sub mento, & circa ceruicem admoueri debet. utendumque gargarismatis ex iride, hyssopo, melanthio, abrotano, dulci radice, ficis pinguibus in mulla decoctis, uel rutæ succo cum lacte, uel sinapi cum oxymelite. Sin autem ex his quædam acrimonia percipiatur, oleum ipsis quàm optimum calens exhibetur, aut rosaceum per se, aut cum cremore ptisanæ, aut fœnugræci gargarizandum. Cibus sit triduo aqua mulla, inde ptisanæ cremor cum dulci quadam portione, deinde & ouorum lutea per liquida, ac sorbitionibus utendū ex chondro, ubi deuorare melius cœperint, & cibus qui ægri uiribus respondeant. Cū morbus cœperit inclinare, ægri deambulationibus & balneo credentur: pars affecta cerato ex oleo rutaceo operietur, reliquaque uiriū recolligendarum ratio, ut par est, adhibebitur. Porro ex strangulatis, quibus spuma iam circa os emanat, manus ad moueri non debet: si Hippocratis cōsilio acquiescimus. Alij uerò uitæ restituuntur, aceti infusione & piperis, uel urticæ seminis in aceto triti acerrimi. Verum quia ægre magnoque negotio assumunt, compellere eos ratio est. Discussis autē colli ruboribus, statim sursum respiciunt, & ad se redeunt. similitudo in his qui naufragium passi sunt. Summatim in omnibus qui suffocantur. Nam ita horum calor recreatur, refocillaturque.

† In



† In nostro codice est συν ἀφελήματα ῥοιᾶς, id est, cum decocto mali punici.

*De grauedine, destillatione, raucitate, & tussi.* Cap. XXVIII.

**C**ommunis est hisce uitijis, excrementitij humoris ex capite in subiectas partes delensus: si in nares decumbit κόρυζα Græcis, grauedo Latinis appellatur: si in fauces, & palatum, simplici uocabulo κατάρχθος, nobis destillatio. si in guttur, & asperam arteriam defluerit, ut etiam membranam internam quæ hanc integit, exasperauerit, rauca uox efficitur, uocaturque malum Græce βρόγχος & ἀσθματικόν Latinis raucitas. In quibus non solum ex capite, sed etiam uehementi clamoris conatu, & spiritus inspiratu frigidi asperitas contrahitur inflammatoria. Si morbus perseueret, fluxioque in pectus, pulmonesque defertur, tussis oboritur ipsis maligna, ac contumax. Iam & propter intemperiem subinde tussis accidit, interim ob calidam, ut in febribus: interim ob frigidam, ut aquilonijs diebus, eaque magis sicca est. Iam uero alijs quoque morbis tussis nonnunquam symptoma efficitur: uerbi gratia, pleuriticis, iecorariis, phthisicis, pulmonariis: Galenus itaque in diuturna tussi grandines quasdam ex pectore educi memoriam mandauit. Alexander autem calculum quendam grauem, qualis in mearibus urinariis nascitur, post longam tussim expulsus: ac inde illam quoque cessasse prodidit. Porro nos in sanguinis reiectione calculos excerni uidimus, quemadmodum cum illuc peruentum erit, exactius commemorabimus. Qui igitur ex æstu grauedinem, uel destillationem concipiunt, his calor sensus oboritur circa partes affectas, acris, tenuisque humor destillat, tum per nares, tum per os, faciesque rubescit, & nasus. Qui ex frigore, iis caput undique & frons distenditur: meatusque ossium quæ à colo ethmoide uocant, clauduntur, ne uox deorsum per nares transmeet: si uero longius malum trahatur, tussis quoque affligit, pituita educitur, nunc cruda & liquida, nunc uiridis. Quibusdam & febris superuenit: quæ ob æstum laborantes nihil iuuat: frigore pressis, etiam concoctionem efficit.

**V** *Curatio destillationis, & grauedinis.*

Bi calida præpollet intemperies: iis pugnandum est præsidis



fidijis, quæ dolori capitis ex tali causa contracto conueniunt. balneo utendum est, caput aqua copiosiore calida perfundendum. Cibi uero his proderunt ad sorbitionem aprati, oua sorbilia, amyllum, liba dulciaria, quæ itria dicuntur, sesama, nec non amygdala item nux pinea, & quæ ex lacte sunt bellaria: uina dulcia, non uetera. medicamentum diacodion linctu assumptum, & quæ his congruunt composita auxilia. Quod si frigida intemperies afficiat, & morbus contumax sit, modico utendum cibo est, caput calefacientibus, tenuiq; substantia præditis nardino, rutaceoq; debet perungi. Irinum uero non solum illinitur, sed etiam naribus instillatur: intus nares thure, & myrrha cum oleo perunguntur, præsertim si perfrictio grauedinem crearit. Alios naribus odoranda adhibita iuuarunt, ut lacinae panniculorum combustæ, uel melanthium, uel cuminum ustū illigatumq; in panniculo. Iam cyphi silenacum, id est lunare olfaciant, fronti que illinatur, cui simul unum ex emplastris, quæ inflammationem arcent, agglutinabitur. Exempli gratia Icesium, uel Oxera, uel Barbarus, uel Athens. Ad stillationem uero ex frigore ortam, & cyphi potus utilis est. Thorax autem balsami liquore illinetur idemque per lanas succidas cum styrace, & irino, uel anethino circumfouebitur. Cibus calidioribus, & ad concoctionem promptis uti commodum est, ubi iam materia concoquitur medicamen quod pituita per os educat, idoneum erit, tum capitis smegmata, nempe Constantini sapo, atque eius generis consimilia.

### *Raucitatis curatio.*

**R**aucitau quæ arteriacum & branchum appellauimus, comperent quidē superius comprehensa, uerum priuatim ubi arteria, & caput eius quod larinx dicitur inflammatoriam quandam affectionē experiuntur, emplasticis, id est, obstruendi meatus facultate præditis per initia utemur, donec inflammatio remissior enaserit: talia uero sunt quæ ex passo cretensi, tragacantha, gummi & amylo constant. Item pinguium palmularum decoctum. & dulcis radiceis cum sapa, donec mellis spissitudinem conquirat. Item compositionem quas quod sub lingua teneantur, *ὑπογλωττίδας* appellant usus est. Ante omnia uinū hoc tempore circuncidendum: postquam inflammatio moderatior fuerit reddita, uinum dulce assumetur, tum confecta ex melle, lacte,



lacte, cū amylo, uel pane filigineo Adhæt sorbitiones ex amygdalis, butyrumq; utile. At si humor in particulas se receperit: transeundum est ad ea quæ ualentius abstergūt, cuiusmodi est ferculum ex faba fresa paratum, & quæ ex melle præparantur. His adde brassicam & porra probe cocta. medicamenta uero calidiora & ad tussim accommodata profunt, quæ constant sapa ex ficis pinguibus confecta, thura, iride, terebinthina, styrace, galbano, pipere, cinamomo, casia & his similibus.

*De tussi.*

**T**ussis quoq; eadem ratione curanda. hoc solum inspicitur num aliarum particularum consensu fiat ut gurgulionis distillantis, uel capitis, an alijs morbis coincidat. His ubi quàm fieri potest optime erit prospectum, quemadmodū à me cōprehensum est, diceturq; in posterum, tussis curationem molire. Compositorū uero prædiorum enumeratio hic subiecta est.

*Catapotia ad distillationem in fauces & tussim.*

**S**tyracis, myrrhæ, opij, galbani singulorum pares portiones. passō excipiuntur, uel priuatim in pila contunduntur, & ad magnitudinem erui terna, quaternā uel aut quina, noctu dormituro dantur: passumq; superbibitur. Hæc ad acrem tenuemque fluxionem ualent. **ALIVD.** Alterci seminis drachmæ duodecim, nucleorum pineorum drachmæ sex, croci drachmæ duæ. sapa, uel passō in usu excipiuntur.

*Eclegma.*

**M**ellis uncia, butyri semūtia, simul incocta exhibentur: itē ex hyssopo, ficibus, nucleis pineis, & iride decoctū sorbetur.

*Catapotia ad ueterem tussim accommodata.*

**S**tyracis drachmæ sex, myrrhæ drachmæ duæ semis, terebinthinæ, galbani, opopanacis, iridis singulorum drachmæ duæ, piperis albi, nitri, seminis alterci, lachrymæ papaueris, singulorum drachma, sine ullo liquore in pila tusa in catapotia rediguntur: utitur ut prædictum est.

*Ad aspredinem gutturis, tussim & sputū cruentum.*

**A**mygdala amara, quibus cortex sit detractus uiginti quinque, seminis lini torrefacti drachmæ quatuor, tragacanthæ drachmæ duæ, pini nuclei triginta, oui in adipe cocti luteum. Tragacanthum, aqua maceratur. Totum uero passō excipitur:

PAULI ÆGIN.

m si uerò



si uero & sonus uocis fuerit oblatus, mel miscetur in passi uice  
& praesertim in quibus educi ex gutture aliquid oportet.

*Arteriace quæ quod sub lingua teneatur hypoglossis ap-  
pellata, facit ad obcisionem uocis, raucitatē. item ad  
eos qui ægre reijciunt, anaphoricos græci nominant.*

**T**Ragacanthæ drachmæ sex, gūmi tantundē, myrrhæ drach-  
ma, thuris drachma una semis, piperis albi grana uiginti;  
croci drachma una, dulcis radicis succi drachmæ sex, palmula-  
rū triū caro, passi cretici, quantū sufficit. Atq; succus tragacan-  
thæ solus ipse sub lingua loco dulcis radicis succi retētus. Eius-  
dem decoctū spissitudinem habeat quadruplum inditur.

*Arteriace ad abscissum uocis sonum conuenit, &  
eos qui uocis exercitio utuntur.*

**P**orra sex coquito, usq; ad iertias, atq; ipsa proijcito, iuri ip-  
sorum succū alicæ admisceto, mel & ouorū prius decocto-  
rū lutea tria simul incoquito, circumagitās anethi ramusculo.

*Compositio ad tussim, græce bechicon appellatur.*

**P**Vulegij sextans, nucleorum pineorum, cnici seminis, lini se-  
minis singulorum uncia, piperis cocti triens, melle cocto ex-  
cipiuntur. **A L I V D.** Hyssopi pulegij, piperis singulorum un-  
cia, petroselini semuncia.

*Medicamentum tussim ueterem concoquens.*

**M**ellis drachmæ sedecim, terebinthinæ drachmæ duæ, galba-  
ni drachmæ quatuordecim. Vbi simul fuerint incocta, or-  
biculi finguntur, circa fabæ magnitudinis, nucis uel auellanæ atq;  
ex his de lingitur. **A L I V D.** Aridam tussim curant tum arte-  
riaca medicamenta, tum aquæ nonnunquam feruentis sorbi-  
tio. nam dū propter pituitæ crassitiem non excreant, reijciuntur  
que, humectantibus aliquantulum iuuantur, cæterum conue-  
nit ipsis etiam hyssopi, iridis, & pinei nuclei decoctum.

*Pastillus à fumo dictus capnistos ad tussim continuam.*

**S**Tyracis, piperis, mastiches, petroselini, singulorum unciam,  
sandarachæ scrupulos sex, baccas lauri duas. Melle excepta  
in carbones proijcito fumumque excitato, ut tussiens hunc  
per



per infundibilum aspiret . conuenit & qualemunque perfrictionem expertis .

*De orthopnœa , & suspirio , & spirandi difficultate .*

*Cap. XXIX.*

**Q**ui febris expertes , crebro ueluti à citatiore cursu respirant, ab accidenti quod superuenit nostris suspiriosi, Græcis ἀσπυρτικοί appellant, iidemque hinc quod omnem figuram totius thoracis rectam seruent, strâgulari metuens, orthopnœici dicuntur. creatur hoc mali cum fistulosæ pulmonum cartilagine crassis, glutinosisque humoribus fuerint infarctæ spirandi autem difficultas commune est symptoma, quod & his, & alijs compluribus affectibus superuenit . In curandis suspiriosis huc omnis cura dirigenda est , ut per extenuantia, abstergentiaq; medicamina, glutinosus humor, & crassus absumatur. Acetum igitur ipsis conueniet scillites & oxymelitis ex ipso præparati potio, ipsaq; scilla tosta læuigataque cum melle . Ex antidotis hiera, & purgatio continua ex ualidissimis medicamentis petita, à radícula uomitus, aristolochia rotunda, pota, cētaurii magni radix, spondylii semē, radixq; calaminthæ semē hyssopus, iris, melanthiū: asellorū qui sub aquariis uasis agūt sextarius in uas fictile coniectus, carbonibus subditis frigitur. Vbi candorē acquisierint, teruntur, & melle cocto excepta mystri mensura ante cibū secundumq; ipsum dantur. Quod si necessitas urgeat, etiā uena ante hæc omnia incidetur, & quantum uires patiuntur sanguinis detrahatur: aluus clysteriis sollicitatur, Thorax à foris, sicubus & lolij farina obducendus est, cui adiecta sit resina, cera & mel. Inspergatur autē ipsi iris & manna. Nō inutilis est & farina ordeï cruda, cum resina, cera, iride, & manna, unguētis aut utēdū calidioribus, irino, anethino, rutaceo. Sed quod subscribitur medicamētū, huic uitio, proprie dicatum est, pumicis pars una, fæculæ, quæ est uini fæx, combusta, partes quatuor, auripigmenti pars una, iunci rotundi floris partes duæ, alcyonii pars una, aphronitri partes duę. Contusa incernuntur, unguentisq; excepta, thoraci infricantur. Malagmatis utendū est quæ serosas superfluasq; sanguinis humiditates, græci ἰχθῆρας nominant, possunt extrahere .

*Potio suspiriosis apta .*

**P**OLII, abrotani, castorei, chamæpyteos, guttæ ammoniaci



niaci, singulorum par modus. Melle subacta exhibentur. **ALITER.** Nonnulli dederunt, aphronitri cochlearium cum tribus mulsæ cyathis. **ALIUD.** Aphronitri drachmæ nouem, piperis drachma, silphij drachma semis. Cochleariū ex aqua datur. **ALIUD.** Castorei, suffiminis ammoniaci, singulorū drachmæ sex, piperis grana uiginti, passo excipiuntur. Instar fabæ cū mulsā exhibetur. **ALIUD.** Sinapi drachma, nitri spumæ tres oboli, elaterij semiobolus. Totum in pastillos octo digeritur. Bini duobus diebus offeruntur, nam sine molestia supra purgant. His qui præfocantur, aphronitri drachmæ tres, cum tribus hydromelitis cyathis assumētur, ac cum cardamomo nonnunquam, subito auxiliatur. benefacit etiam coxendicibus.

*De peripneumonia.*

*Cap. XXX.*

**P**eripneumonia pulmonis est inflammatio, quæ plurimū ex ualentibus in eam partē distillationis, aut angina, aut suspirio, aut pleuritide alijs uel morbis contrahitur: Aliquando etiam ipsa inflammatio affectus origo est. Hæc subsequitur spiritus difficultas, febris acuta & ardens grauitas distensioque pectoris tumor & magna repletio faciem occupat, materia sursum ignis instar impetum faciente. Malæ itaque in his rubent, oculi intumescunt, supercilia deorsum nutant, tunica oculi ceratoides, ob cornus imaginem dicta, in pinguedinē lan-guescit. Cum uera signa ad æstum flagrantiorē declinare uidentur, pulmonis inflammatio Erysipelatis naturam relapsiens, subesse existimabitur. In ijs igitur qui ex alijs morbis huc decidunt, sanguinis detractio uitanda est, maxime si diu hoc in statu fuerint, uel si per initia sanguinem dimiserint. Verum alius in morbi remissione clystere ducenda est, si ægre respōdet, aut cucurbitulæ, ubi nihil obstat, pectori, & lateribus admo-uendæ sunt, eæque prægrādes, & multæ, cute incisæ. Sin autē peripneumoniæ affectus statim ab initio inuasit, sanguinem mitti suffragatibus qui huc requiruntur, numeris, ex usu est: sin minus, cucurbitulus certè desigere: quibus tantū elicietur sanguinis, quantum uires patiuntur. Quod ad cibū uero attinet, danda est sorbitio ex ptisanæ cremore & chondri cum melle, uel ex amaris amygdalis cum similagine, aut chondro, dulci quadam potione admixta, hydromalo, uel apomelite, uel hydrosafato. Rectè sumitur & recens butyrum, cochlearibus circa tribus,



bus. Propinatur autem ipsis ficuum cū hyssopo decoctum, uel iridis in mulla coctæ, uel leuigatæ instar duū cochleariū mulsæ inspersorū. Hoc iridē, ab inferioribus partibus expurgat. At uirtutis tuēdæ gratia, crebrius potui assūmetur, mulla per se & cū nucleis pineis, ac cucurbitulæ uniuerso thoraci laboribusq; agglutinabuntur. Ceratum uerò cyprinum quod contineat iridem inspersam, inponetur, uel ceratum ex rutaceo oleo, & iride sicca, uel epithema ex cera, resina medulla ceruina, butyro, æsypo medicamento, iride sicca, & nardina unguento.

*De cruentis sputis.**Cap. XXXI.*

**C**Ruentum sputum si disrupta uasorum commercia excitarint, multum sanguinis euacuabitur. Et quidē modo manifesta ex causa, ut alto delapsu, clamore, & cōsimilibus, modo ex occulta, ueluti plenitudine, aut frigore immodico, nam id uenis rumpendis esse habile scribit Hippocr.

Si uerò ex esa parte aliqua sputū cruentū æditur, nō conferim, sed paulatim sanguis reicitur, sic ut acres quidam prauiq; cibi, uel inedia, uel acris ex capite destillati o præcesserint. At si ex adapertione, ἀναπόρρωσι appellat, nullū quidē ex prædictis, præterquam plenitudo interdū præcedit, sed uictus humidior, calidiorq; balnei immoderati usus, calidi nimis loci inhabitatio morbū facere uidebitur, & neq; inflammationes, neq; febres, neq; dolores experientur: sicut in iis euenit qui exeso uasorum corpore, διάρρωσι appellāt, sanguinē reiciunt: Imo contra leuius faciliusq; agent (ut uerisimile est) euacuati. Quod si hæmorrhoides, aut mulierum menstrua nō respōderint, ēt particulis, erūpens sanguis subtrahet. Idē uerò hic pariter iis qui ex uase plenitudinis causa rupto uacuātur, satis ad ualeitudinem proderit, nisi ex ulcere, aut immodica uacuatio-  
ne noxam senserint. Quæ uerò exesis uasorū tunicis sanguinis fit euacuatio: nunquam commodē cadit, facitq; ualeitudini.

Quod si per uomitum excreetur, clarum est eū ex stomachi, aut uentriculi regionibus procedere. In quibus & per annum infra descendens nonnunquam uacuatur. Si cū tussi, ab instrumentis respirationi dicatis prodit. Iam uero spumans & subalbidus sit ex iterualloq; reicitur, ut dolor absit, & præsensio, ex pulmone ferri notum est. In quibus temporis spatio, febris sequeat continēs, præsertim iis quibus ex erosione profluit,



& non nihil ex pulmonis substantia, aut arteriæ asperæ circulus qui *βρόχιον* dicitur, aut uena egeratur. Notus certe quidam mihi est ex iis qui sanguinē ē pulmone reiciunt tēporis processu maxima cū tussi, & sanguinis copia, calculos quatuor, aut quinque; expuissē asperos tribulorum modo, ad magnitudinem siliquarum trium, aut quatuor, ac deinde dolore leuatus est. paulo post tabe cōsumptus interiit. Potrò si pituitosa cum tussi leuiore, uel sreatu quoque; ædatur, eaque; spumosa leuiaque, exaspera arteria prodire scito. Si uero ater sanguis & in grumū concretus fuerit doloremque; in loco testetur, ex thorace educi significat, per pulmonē arteriamue translatus. Qui uero sreatu, ex faucibus per palatū educit. Cæterū si quādo à capite destillet, cū irritatione quadā, & tussi æditur, ut qui ad asperæ arteriæ caput defluat: iterumque; sursum feratur, hæc acris plurima ex parte distillatio, uel capitis dolor, uel grauitas præcedit. Accidit autē nōnunquā per palatum sanguinem uacuari, & propter hirudinē deuoratum, & alicui indidem particulæ adhærescentem. Verum de hac in lib. de uenenis pertractabitur.

*Curatio ob distillationes humoris aeris.*

**Q**uibus destillatio truentū sputū cōcitauit, uena protinus debet incidi, nisi uehementer acris humor destillauerit, ac pro uirium modo sanguis detrahi. Extrema deligari, oleoque; ueteri calido, uel sycionio præter caput perfricari. cibis adhiberi frumētaceus cui succus alicuius austeri adiectus sit, ut mali granati, piroiū, malorū, uel illa eadē simul incoquat dormituro ex pastillo diaelectru dat tertio die mellis cocti momentum delingitur. Quod si morbus longior hæc uicerit, capiti raso medicamentū, quod ex fimo syluestriū colubarū cōstat, imponis, & post tres horas medicamēto deposito, balneo ægrum cōmittis, sic ut caput nequaquā inungat. Deinde ubi sorbitionibus alueris, somnū capturo. Theriace antidotū datur, iterumque; die insequēti, ubi dederis, similiter totum corpus, præter caput perfricato. huic autē ceratū ex thapsia, aut aliud quoddā iniicitur. & rursus utendū sorbitionibus. Quod si malū in ætatē incidit. cucurbitula occipitio defigenda est. At si acris admodum fuerit distillatio, sanguinis detractio cauēri debet: alimentis autem & præsidis iis tū quæ supra, ubi dedistillatione egimus cōprehenſa sunt, tum quæ mox dicentur, utendū. Qui ob frigoris



goris iniurias sanguinē expuūt, thorax illis fouēdus est remediis, quæ calfaciūt ipsum simul & deficcant, quod præstat medicamentū diadyopeperion, i. quod duplici pipere cōstat, una cū pastillo diaelectru, hoc est ex succino exhibitum. At qui ex respiratoriis sanguinē reiiciūt disruptis ortis uenarū, aut patefactis, uenā iis secare cōuenit, nisi sanguinis copia prorūpat. oēs aut quos hoc uirii premit locis aeri expositis decūbēt, lecto immobili, figura sublimi, cauētes ne uehemēter respirēt loquanturq; imponēda aut extrinsecus supra partes affectas, spongia ex tepente posca. A septimo die lana succida cum rosaceo, uel myrteo, uel lentiscino, cui interim acetū interim uinū austerū sit additū: si copiosē effert, farinæ pollinē, & mannā thuris cū aceto superaccōmodamus, uel alumen, uel acaciā, uel malicorium, uel gallā cū aceto, uel palmulas cū polētis, & malis cydoniis in uino austero decoctas. post hæc aut & emplastrū diaiteō hoc est ex salicibus iniiciendū, præsertim ubi moderatior sanguis fertur. Per os autem hæc sumpta proficiunt portulaca cōmanducata benefacit efficacior autem succus ipsius epotus, balauistiū, rubi fructus & flos, quercus mēbrana cortici subiecta, & quæ glandis putamini subest tunica, maximē uero cocta ipsa utūtur: fagi aut & ilicis mēbranæ præstātiores sunt, terra samia quæ aster dicitur, ad oēm sanguinis teiectionē. Itē lemnia sphragis, lapis hæmatites in tenuissimū pollinē detritus cū succo mali punici, uel polygonii, pondus aut lapidis erit scrupulus unus. Cōposita medicamenta hæc profunt, pastillus diaelectru, diacoralliu, & qui ex spina ægyptia conficitur, itē puluis confectus ex terra samia quæ ἀστυς dicitur, lemnia sphragide, corallio, simphyto, amylo, omnibus pari modo.

*Cum signis exesi uase reiscitur.*

**I**N his autem qui corrosis partibus expuunt sanguinem, idque potissimum, ut destillatio præcesserit & opii partē familiem adiicimus. Insuper medicamentum his facit, quod samii asteris, agerati lapidis, lemnia sphragidis, æquas portiones capit: duobus cochleariis potum ex duobus plantaginis succi cyathis. **ALIVD** Lemnia sphragidis drachmas sedecim, samia terre, quæ aster dicitur drachmas octodecim, amyli drachmas octo, sarcocollæ drachmas quatuor gummi drachmas duas, pulueris cochleare unum cum decocti palmu-

m 4 larum



larum cyathis duobus Superbibant autem etiam poscam frigidam, uel palmularum, uel malorum, uel pirorum, uel pampinorum uinis, uel eiusmodi cuiusdam decoctum. nutriuntur uero, si uires quidem requirant, ad secundam tertiamue horam, sin minus circiter quarta. Panis sit lotus ex aqua frigida, uel alica, uel chondrus. Et cum quodam succo refrigerante, puta mali granati, uel myrsi, uel omphacometitis, uel oua sorbilia, uel aliquod ex lacte bellariu, cum quodam astringente. Inter olera, seris, cichorium, plantago, cum oleo immiatur, acetoque incocta. Ex fructibus mala, pira, mespila, malum granatum, corni fructus potus erit si febris careat, uinum aquosum, modicum: si febris adest, ex praedictis quendam potio, uel hydromalum cibaticum. Porro qui uomunt sanguinem, iisdem sustentandi sunt, sola hac cura adhibita, ne crebro cibum sumant: quippe ex facili curantur: quandoquidem auxilia etiam quae bibuntur particulis ipsis sanguinem fundentibus palam appropinquant. At sanguine in uentriculo grumi instar coactro, coagulum potandum est maxime leporinum, aut lixiuium ex ficu cinere, cum aqua, uel thymum, uel satureia cum aceto, uel etiam ex lacte scissili uacuari debent, aut ex aloce. Rursus qui per palatum scretu sanguinem reijciunt, gargarizabunt ex astringentibus, fronti quoque & capiti admoenda sunt quae ex naribus sanguinem fundentibus accommodantur. Haec eorum qui sanguinem expuunt curatio est, quam summa obire cura conuenit propter imminens ex immodica uacuatione periculum: si quidem copiose uacuatus sanguis quemadmodum in his qui iugulantur, mortem infert praesentaneam, si affectus remanet, in tabem transire minatur. postquam igitur omnia, ut postulat ratio, peracta fuerint, & sanguinis fluor substiterit, uires ipsis recolligendae sunt, robor quoque adhibendum, ac recentium porculorum perunculi, ac cerebella huc faciunt: corpus perfricari debet. uitari autem, balnei frequens usus, & uini potio, ira & uenus.

† Scriptura quae est in ueteri codice est multo uerior, μετὰ τινος τῶν συφοίτων χιλῶν οἶον ῥοιᾶς ἢ μύρταν, &c. id est, cum aliquo succo adstringente.

*De purulentis & tabe quae phthisis dicitur.* Cap. XXXII.

**P**uris illuies quod ἐμπύημα graecis dicitur, in uacuis thoracis regionibus, uel membrana quae costas succingit, colligitur.



colligitur. interim propter sanguinis educationem, ulcere ad cicatricem non perducto, quod etiā tabes statim comitatur si ex pulmone fiat reiectio: Interim ex inflammatione suborta: quę deinde in abscessum conuersa, ruptaq; fuerit, quemadmodū & in laterū doloribus, quam pleuritidē uocant, nonnunquā accidit: uel propter confluxum ex capite manantem. notæ igitur empyematis adhuc cōsistentis erunt, grauitas thoracis, tussis ualida, siccaq; cum dolore, aliquando etiam cū humiditate, ob quā reſcuari quoq; uidentur, febriculæ per initia affligunt, languidæ, inordinatæ, & ad iudicandum difficiles. postquam uero abscessus ad uomicam inclinauerit, uehemētius cum quodam horrore febricitant, ac in sermonis proprietate conturbātur, spiritu molestati. Rupto abscessū, pus educitur, nunc purum, nunc sæculentum, & nonnunquam sursum abscessus erumpit: quando etiam periculosior est: nonnunquam infra. Ac ea quę inferius tendunt, partim in uentrem & intestinum transsumuntur, partim in uesicam traductione per uasā quædam administrata. semper autem febris hæctica laborant, quoad sursum omnia fuerint educta. In quibus, nisi summa adhibeatur diligētia, protinus purulēta illa collectio in tabem quam phthisin græci uocant transit, pulmone exulcerationem sustinente. In qua iam phthisi confirmata, genæ liuescunt, desudationes in frōte, ac ceruice fiunt, carnes colliquantur, ungues curuantur, pinguesq; & exalbidi uel pallidi apparent. Malo iam uincente, uenter turbatur, præcordia sursum conuelluntur, sitis ipsos magis conficit, cibi que fastidium urget, & id quod sursum uergit, uehementer fœdi odoris est.

### Curatio.

**P**rimum igitur puris collecti concoctio adiuuanda est fomentis per spongiās, & cataplasmatibus, ex hordei farinis cū fœcis pinguibus incoctis, resina modica, columbarū fimo, nitro, & hibisco. Rupturam uomicæ promouet etiam sani lateris incubitus. mulsæ autem sorbitio interposito tempore, & ptisanæ cremoris cum melle. Valentiores, bibant decoctum quoque hyssopi, & thimi cum melle. opituletur etiam rupturæ, & fassamentorum esus, & catapotia hieræ diacolyntidos dormituro data. At ubi pus excerni cœperit, iterum dabitur hyssopi, iridis, & dulcis radicis decoctorū in mulsâ potio, uel dulcis radi-



cis radícula cum sisamo detrita. Item pollen, mulla & oleo incoctus superaccommodatur. Quod si ulcus ægrè possit sursum repugnari, cōpositis utendū est, puta medicamento dia prassiu, hoc est ex marrubio, simplici & cōposito. item, dia orobon, id est, eo quod eruis cōstat, necnon dodecatheo & phyloxeno appellatis. Verū in tabem quæ phthisis dicitur prolapsis, porra capitata, quæ in chondri & prisanæ sorbitionibus contabuerint, exhibentur: quæ simul per se bis cocta offeruntur. Potus autē aqua cœlestis erit, atq; mulla inde confecta. Extrinsecus applicantur per initia quidem remissionū, cataplasma ex semine lini & polline ex decocto scœnugræci, uel maluæ, olei mellis & foliorū althææ. temporis aut processu, ad cerata ex butyro, cyprino, laurino, & iride transitus est. quin & emplastri Mnasei usus conducit. Verum si thorax fluxione infestetur, medicamentum diaiteon, hoc est, ex salicibus confectum rectè imponitur. atq; superius in purulentis simplicia dicta, nonnullaq; composita ipsis propinantur. Tussi uero grauiter affligente, thymum, hyssopum cū succo radiculae dulcis melle decocto excepta, formataq; sub lingua tenenda dantur. Cæterum cōueniet ipsis & antidotum Mythridatis, diebus intercedentibus: sic quod uiperis constat. Optimum uero auxilium est, & boli armeni portio. item Eldræ Antidotum, nihilo prædictis minus proficit.

*De laterali dolore, quæ pleuritis dicitur.*

*Cap. XXXIII.*

**P**leuritis, qui nobis lateralis dolor appellatur, propriè inflammatio est mēbranæ, quæ costas succingit: Huic simul accedit spirandi difficultas, tussis, febris continua, dolor usq; ad iugulum & præcordia pertinens. Sed pleuriticus morbus à iocinoris inflammatione, in qua èt omnia modo cōprehensa apparent, his notis discernetur, quod pleuriticis dolor punctorius adsit, tussis aliàs sicca, cum & crudus morbus significatur, aliàs cū sputo, quod humoris qui morbum facit index est. Rubrū siquidē & subcruentū æditur, cum sanguis superat. Flauum uero & subpallidū, cū flaua bilis: quemadmodū rursus album, & leuiter spumosum, cum pituita. Ob melancholicū uero succum: nigrius pulsumq; durum & ferræ modo inæquale obtinent. Iocinoris autem inflammationi, neq; punctorius dolor, neq; pulsus adeo durus superuenit, uerum tussis perpetuo sicca



ficca & quæ nihil emolitur, male habet: facies pallidior apparet. At quibus pleuritides ex musculorum exteriorum inflammatione creantur, quæ propriè pleuritides non sunt, iis cum eò quod sint sine tussi, sine sputo, ac sine pulsus duritie, ad manus tactum locus affectus indolescit: atque si tumor purulentus non fuerit discussus, extrinsecus incidi postulat, cum pleuritis quæ inflammationi membranæ costas integrentis fertur accepta, eo non feratur. Illa namque, nisi uel extra, uel intus, expurgetur, purulenta colluies empyema Græci uocant, multo citius in peripneumoniam degenerat.

*Curatio.*

**I**Taq; si dolor ad iugulum usque peruenit, remedium est sanguis dimissus. Sin autem ad præcordia descendat, purgatio. Recentiores autem omnibus uenam incidunt, ueriti, ut opinor, turbationem, quā purgatio solet accerfire. Quod si uires non patiantur, neutrum facere oportet. Clysteribus acribus utendum: & si quidem dolor fuerit mediocris, aqua mulsa, & ptisanæ, uel chondri cremor propinari post illos debet. Vbi morbus inclinauerit, porum cremoribus rectè inijcitur, uel calamintha, uel pulegium, & urticæ semen, cum melle delingitur. Porro uehementes dolores à corporis uacuatione leniendi sunt lana calente, aut sulfurata imposita, aut etiam fomentis ex milio, aut furfure per sacculos adhibitis, aut ex aqua calida, aut oleo in uesicula. Lanasque succidas imponere utile est cum oleo & uino ex marina præparato. Vel sal iniicere, uel cataplasma diaspermon, id est, quod seminibus constat ex decocto chamæmeli, althææ, uel ficorum pinguium, iridis, absynthii, mellis modico cum oleo nardino. Quarto die cibi erunt sorbitiones cum mellis momento à septimo autem linctus ex amygdalis. & urticæ semine, ex melle simul contritis dabitur, uel eclegma quod ex butyro, & melle coctum est, utendumque medicamento ex melle cocto, quod quia sub lingua tenetur, Græci uocant hypoglottida. Epithemata conuenient cum quod à graui odore dysôdes nuncupant, tum diasampsuchu, id est quod constat amaraco. Item emplastrum peganera dictum, locis dolentibus utiliter accommodatur. Præterea ad curationem bulbi cum axungia cocti frequenter fuerunt abunde. Aluo iniici debet ab inferioribus partibus butyrum & terebinthina. At efficacius eclegma est ex fructu piceæ,



piceæ, amygdalis amaris, lini semine, nucleo pineo, & amylo æquali portione cum melle. Quos torquent uigiliæ medicamen diacodyon delingere conueniet. Ex antidotis, & Athanasia, & alijs ad hoc compositis utemur. Post quartumdecimum diem, si malum remanet, cucurbitulæ ipsæ admoueri, tenuiorq; seruari uictus debet. Deinde morbo inclinante balneo æger credetur, frigus uitabit, solidiore utetur cibo. At si inflammatio membranæ costas integrentis non discussa, in pus transire uideatur, supra commemoratis utendum.

*Ad laterum dolores sine febris.*

**L**aterum doloribus sine febris, bdellium medetur, & costus, brassicæ caulium combustarum cineri adipiç; mixta. Nam id medicamenti affatim discutit.

*De cordis affectibus. Cap. XXXIII.*

**C**ordis affectus si quidem primario accidit, omni destitutus medicorum auxilio, in præsentaneam mortem præcipitat: nempe cū inflammationem, erysipelatam, & interperies ualidas in acutissimis febribus ipsum experitur, uel sanguinis profluuiū ex sinistri potissimum uentriculi uulnere. At si consortii lege afficiatur, cerebro, iocinore, ore uentriculi laborante, tum si ob tristitiam, metumq; & alias plerasq; causas, syncopen appellatam, quæ subitus est uiriū collapsus sustinebit, quæq; indicatur, animæ defectu, pulsuum paruitate, extremorum perfrictionibus, & sudore circumfluo. Quæ inquam syncope, si ualida est, medicinæ locus non est. Si uires adhuc tantillum constant, aliquando ad sanitatem recursus est. Itidē ualentes cordis palpitationes sæpe ex sanguinis in eo concepti copia, aut feruore contrahuntur. Idem uero cor si incaluerit, magnam crebramq; ædit respirationem, si perfrixerit, paruam & raram, quomodo autem cardiacæ syncopæ possint emēdari, secundo uolumine, inter ea quæ febribus superueniunt, sumus executi. Tantum uero hic adiiciendum est, si symptoma euincit, postquā extrema perfricata fuerint, inunctaq; & post puluerem ex pavimento iniectum aliaq; uirium recreationi apta, particulis sudore diffatis iniicere emplastri modo conuenit myrtum detritam, uel cimoliam cretam, uel succinum, uel malicorium cum manna, uel terram samiam cum gummi. Extremis autem frigentibus adusque inguina & alas sinapi uel



uel pyrethrum, uel adarce imponitur. Cibus erit panis ex aqua aut uino frigido temperato, suum per ūculi, articuli, rostra, alæ, omniaq; frigida. Capiti fronti q; omphacinum, aut astringens aliquod cum gummi, uel rosarum decocto imponetur. Præcordijs & stomacho cataplasma admovebitur ex palmulis, rosis, cenanthe, acacia, hypocistide & alumine.

*De palpitacione cordis.*

**N**Oui (Galenus inquit) qui annis singulis uerno tempore, cordis palpitacione affligeretur. Aduersus quam uenæ sectionem trienniū expertus cominodā, quarto anno sanguinē prius misit quā symptomate corripere, atque ita securus fuit, eōq; modo multis subsequētib; annis factitauit. & conuenienti uictus ratione usus est. attamen & hic ante senectutē, fato functus est, quemadmodum alii quoque omnes, nonnulli in febribus acutis subita syncope oppressi similiter interierunt alii ipsorum etiam citra syncopen, ueluti apoplexia tentati repente diem obierunt. Complures ita affectorum ætatem egerunt, minorē annis quinquaginta, maiorem uerò quadraginta.

*De mammillarum affectibus. Cap. XXXV.*

**L**Ac à partu sæpe casei modo coactum māmillis inflammationes parit. Utendum igitur per initia est hisce rebus. Spongia mollis posca tepente imbuta, expressaq; loco appositē superaccommodatur illigaturq; uel palmulæ cū pane ex posca in leuorē contrita, uel ouo toto utendū est cum rosaceo, & cerati momēto, uel alumen, psyllumq; cum coriandro, uel portulaca applicato. Vel lapis pyrites tritus cū cerato impositus illigetur. At distentione oborta, uel lacte in grumos concreto, panis ex hydrelæo, aut mulso instar cataplasmati inicitur. Aut panis cum perdicii herba uiridi simul cū cerato, bis quotidie, aut lomentū cum hydromelite, uel sapa applicatur. Quod si uero pondus ferre nō poterint, superfusione utendum est ex dulci oleo calēte, per lanas delicates. Fetus autē adhibendi ex uapore calidæ aquæ, uel decocto scēnugræci, uel altheæ, uel apii seminis. Delinere uero māmillas conuenit poline farinaceo cum seminis lini, aut scēnugræco cum hydromelite, aut sesamo quod cum melle aut butyro sit leuigatum. Ceterum ne lac exugatur cauendum est, nam maior per lactationem materies illuc citabitur. Inclinate autem inflammationes, cerata



cerata hæc recte induces, betam oleo incoctæ quo ad intabue-  
rit, ipsam quidē proiicito, oleo autem ceræ modicum iungito,  
ac utitor. **ALIVD.** Quorum crudorum lutea decē, cerato mi-  
scētur, qui uncia duæ & semis ceræ, rosacei uncia quatuor sint  
adiectæ. Postquam radícula agitaueris, muria quantum recipe-  
re potest indito, & rursus ubi permonueris, utitor. Porro ad mām-  
millarū durities, facit & medicamentū ex melle: tū omnia me-  
dicamēta molliendi facultate donata. Cū uero in abscessū uer-  
titur, iis utendū est, quæ in parotidibus cōprehensā, sunt item  
illis, quæ, ubi de ascessibus tractandum eris, enumerabimus.

*Archigenis de erosione māmillarum cum malignitate.*

**V**Inti Adriani boni sextarii uiginti, rhus quo coriarii, utun-  
tur libra, cupressi pilularum tantundem, gallæ omphacinæ  
nigræ selibra, casia tantundem. Contusa uino diebus decem  
commadescant, deinde coquuntur agitata cupressi rudicula, do-  
nec dimidia ferè pars fuerit absumpta. atq; tunc herbæ proii-  
ciuntur, succus coquitur dum mellis spissitudo fiat, deinde ui-  
treo uasē reconditur. In ulceribus depascentibus mero utitor.  
Sin autem crassius fuerit medicamen, uino liquari debet: ut ap-  
plicetur māmillis depastis, auribus suppuratis, gingiuis ex hu-  
miditate putridis, intestinorum torminibus. Idem uero dolo-  
res etiam lenit, lacte dilutum. Alæ mammaram exulceratio-  
nes communem reliquis ulceribus curationem recipient.

*Quomodo māmilla conseruentur.*

**C**Vminum cum aqua tritum māmillis obdunducitur, deinde  
spōgia extrinsecus imposita, ex posca pectus cinctura strin-  
gito, à tribus diebus cum ino deposito, māmillis florem bul-  
borum cum melle superaccommodato. Et deligatum rursus  
triduum finito, idque ter mense facito. **ALLVD.** Cicuta in  
pollinem detrita, ad nouem dies imponitur: spongiaque ex-  
trinsecus, sicut comprehensum est: pauculis diebus interposi-  
tis idem facito: Quin & Naxiæ cotis detrimentum, uirginum  
mamillas conseruat tueturque.

*Ad fædum axillarum odorem, sudationesque.*

**A**Luminis liquidi partes duæ, myrrhæ pars una. Vino disso-  
lutis utitor. **ALIVD.** Plumbaginem combustam, uino-  
que odorato extinctam, ex uino terito, myrrhæ momentum  
iniiciens quoad sordium fiat spissitudo, ac utitor. **ALIVD.**  
Argenti



Argenti spumæ drachmæ sedecim, myrrhæ drachmæ duæ, amomi drachma. uino excipiantur. ALIVD. Aluminis liquidæ drachmæ octo, amomi, myrrhæ, spicæ nardi, singulorum drachmæ quatuor. uino leuigatis utitor.

*De stomachi, præcordiorum & uentriculi affectibus.*  
Cap. XXXVII.

**D**E cibi fastidio quod febribus superuenit, grandi fame, quam Græci bulimon uocant, canino appetitu, stomachi imbecillitate, animi defectu, insuper siti, singultu, nausea, & syncope, libro superiore, ubi de febribus tractatū est, abunde disseruimus. quare de eisdē rursus dicere opportunum non est. At inflammationes oris uentriculi & iocinoris, astringentia misceri desiderant. Nā si sola relaxatoria medendi ratione curationem tentes, uitæ periculum intuleris. Ob quam causam, siue oleū fuerit quod superfunditur, siue cataplasma, recte adiicitur astringēs aliquod, uerbi causa, absynthiū, uel nardinū unguentum, uel melinum, uel & malū cotoneū incoctum. Ceratum uero eius notæ est quo subinde utimur, ceræ cādidae uncia, per æstatem drachmis septē, aloes, mastichæ, singulis drachmis, olei omphacini, uel melini, & nardini quantum ad spissitudinem in usu satis est. Sin maiorem requirat astrictionem, ubi tam fuerit imbecillis, ut ne cibus quidem sit retinendis, admisceatur etiam omphacii drachma, aut absynthii succi æqualis mensura, & tertio ad hæc hypocistidis, œnanchæ, & rhus succi. Augendus autem cerati modus, qui aliorum medicaminum numero proportionem respondeat. Quod si inueterascit inflammatio, indurescitque, uaria iam magis applicare oportet. tum ea quæ ex aromatis non nihil, & emollientibus, discutientibusque continent, cuiusmodi est quod ex meliloto præparatur. philagrianum, & quod ab odore grato *εὐωδὲς* dicitur, & uiridis iaspidis torques à collo suspensus, ut stomachum contingat magno est prælidio. In calida autem stomachi intemperie & ardore cum eius resolutione, uel animæ defectu, uel quodam cibi fastidio, ex quacunque tandem occasione, præterquam febris, aqua frigida cū uue acerbæ succo propinatur, uel malorū cotinorū decoctū, uel pampini uitis, uel semen cucumis leuigatū cum frigida. Verū stomacho uescam aqua frigida repletā, uel cucumeris



cucumeris ramenta imposito. Catapotia quę siti restinguendę sunt, danda, ut supra de siti à nobis dictū est. Porro medicamen quod stomachum ex humiditate superflua imbecillem, refrigere confirmetq; istud est. Rosarum uiridiū foliorum drachmę sex, dulcis radiculę succi drachmę quinq; uino dulci excipiuntur, & ut sub lingua teneri possint, formantur. Caterum in quibus crassior pituita calefieri incidiq; desiderat, hoc medicamentum proficit, & fœniculi radicis cortis uncia duę, aceti sextarius unus & dimidius, aloes quadrans, mellis librę quatuor. Radices cum aceto coctę exprimuntur, abiiciunturq; Mel autem inditum ad spissitudinem usq; coquitur, & tunc aloę trita inspergitur. Tria huius cochlearia cum aqua sumuntur. quidam uero sine aloę ipsum præparant. iam uero medicamentū diacalaminthes his idoneum est. Quibus autē cibus acescit, coriandri seminis drachma, polentę modo inspersa cōmode bibitur, uel mastichę cochlear, uel lactucę albę seminis cochlearia duo. Compositum autē hoc est, piperis drachma, anethi drachmę tres, cumini drachmę quatuor. trita cochleari uno noctu sub somnum ex uino temperato præbentur. Porro in quibus atra bile uiciosus est stomachus & inflatione laborat spongię in accessionibus oleo acerrimo imbutę applicentur. Deinde si malum remanserit, alumen cum ære læui, melle exceptum ad mouetur, sereos succus bibitur, uel menta potui inspergitur. Si flatibus turget stomachus, & distenditur, calaminthes decocto mediocris mellis piperisq; mensura mixta exhibetur. Ad stomachi peruersiones conueniunt mali granati acidi nucleorum succi partes tres, mentę succi pars una. Vbi coxeris quoad unitatem coierint, ante cibum, mystrum unum dato.

*Ad Stomachi saliuam.*

**A**Ceto scillite, aut sale conditarum oliuarum iure, aut summitatis oleę decocto os colluatur, aut etiam minimum ex ipso deuoratur. Inter omnia præsentissimum est, aloę aqua diluta. Ad eos autem qui cibum non continent, quos ueteres proprie stomachicos nominant, fœnugræci farina melli mixta, & maluę semen tritum aridum applicatur. certum uero ex cera, irini olei fæce & castoreo,

*De cibi fastidio quod Græci ἀνορεξία uocant.*

**F**ASTIDIUM, quod anorexia dicitur est, cum stomachus



chus, aut intemperie uiciosus, aut humorum redundantia pressus cibos auersatur. Calidam intemperiem testantur, sitis, nidorosi, oletosique ructus, si cibis quodammodo præter uoluntatem sit assumptus. item si frigidiora potius & elaboratu per uicacia, hac tetenti queant concoquere. Frigidam contraria indicant. neque enim in hac ægri sitiunt, neq; frigida sustinent, & acida nonnunquam eructant. Qui humorum uitio cibum respuunt, partim ob tenuitatem, ac rosionem illorum ita laborantes, uentriculi demorsu torquentur, nauseaque magis & siti conficiuntur. Quibus autem humores computruerint, interdum ij etiam febricitant. At quos crassi uiscosique succi male habent, ij plane nec rosionem uentriculi, nec sitim experiuntur. communiter autem omnibus superuenit nausea. porro si in uentriculi sinum humores se receperint, etiam hos ipsos euomunt. si uero, infarcti uel etiam imbibiti tunicis adhærescunt, nausea solum, non uomitu præmuntur, præterquam cū cibos assumpserit. Qui igitur ex calida intemperie fastidio laborant, refrigerante uictu curantur, præcipue qui ex aceto assumitur. Panis ergo posca imbutus esui, ipsaque posca potui datur. Item ozigala, & quam Romani melcam appellant, quod ex lacte quoddam est opsonium, intybi & portulaca, interim etiam aqua frigida, omniaq; mediocriter secundum eius quæ subest intemperiei contrarietatem. Nam immoderatus horum usus, non modo non iuuat, sed etiam sæpe insanabilem morbum efficit. Frigida intemperie laborantes, contrarijs medicari conuenit, uino ueteri & condito, hydrogaro, item anisi, rutæ & petroselini decocto: iam pipere ex aqua calida communi, uel etiā ipso medicamine, quod inscribitur diatrion pipereon, uel cui nomen est diacalaminthes. Dabis etiam nonnihil theriacæ ex uiperis confectæ, quæ nec ipsa, fastidio ob humorum copiam laborantibus inidonea est. insuper allia his & alimentis & medicaminis nomine conueniunt. Sin autem humorum abundantia fastidium excitarit, tenues, mordacesq; aut uomitu, aut per aluum euacuabis. facilem itaque uomitum reddit aqua temperata, uel mullâ dilutissima præbibita. Satius fuerit, si ante hæc humectantia exhibeas alimenta, ueluti prisanæ cremorem, uel ouorum lutea. Cæterum quomodo ex facili uomas, priori libro est expositum. At si difficilius æger uomat, præstat materiam ad aluum elicere copiosiore temperatoque

PAULI AEGIN.                      n                      alimento



alimento his prius humectatis. Purgans uero medicamentum esto, uel picta ex aloë, uel ex malis cotoneijs præparatum, cui adiectum sit aliquid scammonia, uel quod constat rhodomelite. Si uero citra scammoniam aloës potius copia ipsos euacuare liceat, melius feceris, eò quòd illa stomachum offendat. Quibus crassi humores uiscosiq; fastidij authores sunt medeberis extenuando ipsos incidendoque tum oxymelite, tum iis quæ ex hoc & muria componuntur, ut cappari, oliuis, sinapi & similibus. Non inepta sunt his, & quæ ex frigida intemperie fastidientibus consulimus, maximè post uacuationem, quæ nimirum fiet oxymelite Iuliano. Extrinsecus utendum quæ calfacere stomachum & corroborare queant, inunctionibus & malagmatis, qualia sunt potissimum quod dicitur diaomphacos, & Marciatum aliaque consueta unguina: insuper epithemata, Baïum & Euodës huiusq; notæ reliqua: his addentur exercitia & frictiones potissimum. Ad eos qui frigidi humidique humoris, uel talis intemperiei uitio difficulter concoquunt, cibumque respuunt, ea quæ ex malis cotoneijs consunt, pertinent. Dico autem quod uocant meloplacuntion, item quod ex malorum cotoneorum succo præparatur, tum quod ex carne eorum constat. præterea dia citriu, idest ex cytrio confectum. Malagmata uero, Marciatum & quod ex acerbæ uuæ succo componitur. item Baion, Polyarchion, atque his finitima. Sin ulcus fuerit in stomacho, aut uentre, omnibus acribus & cibis & potionibus abstinere oportet, uti uero medicamentis quæ leniunt, puta sorbitionibus ex oleo, tum iis quæ ex amylo, terra samia, lemnia spargide & lacte, uel melle paucissimo conficiuntur, ut etiam purgent citra rosionem. Epithema facies ex palmulis cotoneis, & polenta. Ceratum ex melino, uel rosaceo cum ammoniaco & thure. Ad hæc Nelei epithema conducit, & emplastra ex salicibus, & Icesion. Notæ ulceris sunt uomitus sanguinis, uel puris, uel etiam ramentorum.

Ad solutum imbecillemq; stomachum, & ob hoc cibum non concoquentem, ualet hoc, Aloës, masuche, mastiches, styracis singuli sextantes, absynthij triens, cœnanthe quadrans, gleucini selibra, melini quadrans uini quod satis est. Nonnulli etiã cypheos & rosarū singulos sextantes miscent. Hæc in leuorē redacta, purpura, uel lana, excipiuntur, ac stomacho imponuntur. Quidā ceræ selibrā adiungentes, epithema ipsum faciunt.

Ad



*Ad ileosas stomachi affectiones, hoc est uehementes & conuulsorios dolores.*

**O** Prime facit pastillus Amazonum: inuenies autem huius scripturam, tum aliorum ad stomachū compositorū materiam ad calcem libri de medicamentis compositis explicatam.

*De flatu uentriculi.*

*Cap. XXXVIII.*

**F**latu in uentriculo generantur, humoribus, uel cibis, exigua caliditate in uapores dissolutis. nam frigiditas hoc nomine quod extenuare ac dissoluere nō sit idonea, nullos flatus procreat. Vehemens caliditas cum non tantum extenuet, sed etiam discutiat, flatus generationem impedit. minor uero caliditas diffundit quidē & transmutat alimentū, uerū minus quam opus sit: unde flatus excitantur: quare calidis eos medicamentis extenuare conuenit, cumini semine, & apij, & spondylii, & dauci, in oleo decocto. Vbi uerò adfectioni adest frigiditas, ruta, bacca lauri, nigella, & feniculum oleo incoquantur, misceturq; bitumen & oleum laurinum: At si inflāmatiō dolores comitetur, in uicem calefacientium laxantibus uteris, acetū decoquens, cui gallinæ anserisq; adipem adicias. iam uero polij fasciculus, uel calaminthæ decoctū cui mellis pauxillum cum piperis drachma sit iunctum, flatibus infestatis auxiliatur. Hæc itaq; dum uehemens dolor inciderit, adhibenda consulo, dum mediocris, etiam fomenta ex milio sufficiunt. Cæterum cucurbita bonæ magnitudinis umbilicum undique comprehendens toto symptōmate frequenter subito liberat, castoreumq; ipsis prodest, tum ex posca potum, tum extrinsecus cum oleo sicyonio appositum, uel si cum tormine intestinorū flatus incidant, medetur. Itē talus suis cōbustus, potusq; tormina & flatus tollit. Idē facit aristolochia rotunda. Iam uerò aduersus dolores flatuosos ex uētris obstructione, uel crassitie, uel perfrictione obortos, uinum meracius, à cibo sumptum proficit. Vbi somnus accesserit, etiam ex toto leuat affectos,

*De cholera.*

*Cap. XXXIX.*

**C**holera est immodica uentris perturbatio suprā iniraq; ex continua ciborū cruditate proueniens quæ inquam cruditas nonnunquam ex magna alimentorum prauitate, interim ex uitiosorum humorum superfluo contrahitur. Si igitur nausæabundus æger est, & turbatur, cibis etiamnum

n 2 crudi



crudis in uentriculo manentibus, aqua tepida propinari debet, deinde uomere oportet, digito, uel pinna ori indita: item alui ductione adiuuandus est. Vbi uerò hæc exinanita est, con-  
 quiescere, & præcordia oleo dulci cum uini modico, uel masti-  
 chino, uel etiã nardino si hyems fuerit fouere conueniet, som-  
 numque permittere. Vbi iã exacta apparuerit concoctio, bal-  
 neis & probi succi cibo utendum est. At si inanitio fiat immo-  
 dica, sufficient quidem initio uel ea quæ secundo libro de uen-  
 tris perturbatione comprehensa sunt. Sin autem perseueret  
 euacuationis imperus, uenter concidat, pulsus minor creber-  
 que euadat, cataplasma adhibendum ex palmulis cum ænan-  
 the & acacia, item hypocistidis & malicorij succo. Adhæc offe-  
 rendus est ad sorbendum aquæ mediocriter frigidæ cyathus.  
 Præstitit rosarum, uel ænanthe, uel rhus, uel uitis capreolo-  
 rum decoctum, uel mali granati acido dulcis succus, cui mentæ  
 pauxillum sit inspersum. Porro si excrementa fuerint acriora,  
 uexerque ardor, & sitis, cucurbitæ semen cum aquæ cyathis tri-  
 bus, tum intybi, & portulacæ in posca coctæ alimenti nomine  
 exhibeantur. Verum si fluxio sisti nequeat, uinum quoddã au-  
 sterum, potui dandum est, si febris absit, palmatianum, uel ami-  
 næum, uel spathites, uel omphacomelites. Sin absit, rhoetes,  
 uel myrtinum, uel cibyriticum hydromalum & potui, & cum  
 mica, uel halica, uel chondro. At si respuant cibum frumenta-  
 ceum horarios seu fugaces fructus mandent, mespila scilicet,  
 uel pira, uel mala cydonia, uel punica: quod carnosum est & du-  
 rum expuant. Si ne his quidem auxiliis cibum retinent, ex-  
 trinsecus contra uentriculum ipsum, cucurbita leuis quam  
 maxima admouenda est. Dum autem ipsa adhæret cibo ali-  
 quo ex prædictis ali debent. Ad conuulsorias autem contra-  
 ctiones calida linimenta, oleo, imbuta, musculis circumpone-  
 re oportet, tum cerata liquida, quibus adiectum sit aliquid ca-  
 storei & sicyonij. Ante hæc artus aqua calida superfundet. At  
 si uigiliæ torquent, somnus, iis quæ aduersus illas prodidi-  
 mus, conciliabitur. Si uires autem non prohibent, etiam me-  
 dicamentum diacodion ipsis propinabitur: ubi morbus inclina-  
 uerit, ad balneum deducuntur, cibus ad refectionē, pulli galli-  
 nacei erūt, colūbæ, uel suū petunculi, similiæue. Alui profluuiū  
 διαρροια græcis uocatur: quod ciborū corruptela est, plerunq;  
 sua sponte cessat, ægris non citius alimentum sentientibus q̃  
 absoluta



absoluta facta fuerit concoctio, & corruptorum euacuatio: sin autem remaneat, iis quæ in cholera dicta sunt, utendum.

*De leuitate intestinorum quæ lienteria dicitur & cæliaco affectu. Cap. XL.*

**C**um lienteria duplex sit species, una sanè ex superficiali intestinorū exulceratione: secundū quosdam uerò etiam ex cicatrice, quam dysenteria magna ex parte, uel alia fluxiones excitant: altera ex facultatis cibum in uentre continentis imbecillitate, secundam opinor differentiam cum cæliaca dicta affectione cōmisceri confundiq; Etenim in hac cū uenter præ imbecillitate nequeat cibos & concoquere & distribuere, læuia, cruda & per liquida redduntur, taluo in omnibus fluida. Verum in lientericis celeriter, quæ assumpta sunt, egeruntur, tamq; intensa est cruditas, ut alimenti assumpti genus apertè cognoscatur, atq; hac nota potissimum à cæliacis discernuntur. Itaq; semen lini cū palmulis ipsis obducit. Summè autē facit lentiscus, rubus oxymelite incoctus: cū ad est in statio cuminū miscebitur, anethumq;, & rura: augescēte uerò profluuiō adiungemus mala cotonea, alumen liquidum, acaciam, hypocistidem, gallam, uel quædā, uel omnia. Cerata ex oleo myrteo cum uino quodā astringēte. Epithemata calidiora quidē ex baccis lauri, & quod ex feminibus cōstat. Astringunt autē magis diacēnanthes, & diagigarton, i ex acinis malorum punicorū: Itē quod ad Antyllū authorē refertur, & Erythrij mirificū: si uerò morbus in uetustatē incidat, etiā uentri rectè applicatur & ceratū ex sinapi, ipsumq; sinapi. Potiones cōueniunt, simplices quidē, plantaginis, uel rumicis, uel mali granati cortices, uel sorba arida, uel immatura, uel omphaciū siccum, ex uua aminæa, tribus obolis potum. Qui febricarent tū uini austeri cyathis sex: febricitantes autē cū aqua pluuiali sumunt. Porro aluus arida gallinarū potui inspersa, stomachū minus attingit, tū ea quæ urinā citant, exempli gratia, apium, adianthum, similiaq; epota deriuatiōē moluntur. Cōposita uerò sunt polyide sphragis, pastillus ex succino, item ex spina ægyptia cōfectus, insuper chidiū appellatus, & diaspermaton. Item hoc est præstantissimū quod sequitur, rumicis syluestris seminis fescuncia, plātiginis seminis uncia, ꝓ hypocistidis succi drachmæ sex, gummi uel acaciæ drachmæ tres. Excipiuntur

n 3 cotoneo-



coroneorum ad tertias decoctorum liquore. ALIVD. Cumini, piperis, rhus syriaci, balauftij singulorum fescuncia, malicorii uncia, laseris fescuncia: aut eius pulueris drachma potui inspergitur, aut oxymelite macerata dantur mane & uesperis. ALIVD Myrti nigrae cochleate, eiusq; dimidium, anisi, rosatum siccarum, cenanthes singulorum cochlearis dimidium, palmulas uiginti, in pastillos cogito, & drachmam unam cum aqua, aut diluta uini portione porrigito. iā Theriace ex piperis optimum his est praesidium. Cibus autem, si acris & biliosa sit deiectio, ex chondro, oriza, halica, & similibus erit: quibus cum astringens aliquod decoquetur. pirum, malum cotonium, mespilum, & id genus alia, item lac decoctum probe his proderit. Potus erit, aut uinum aquosum, tenue, aut dulcis quaedam portio. Sin autē pituitosiora excernunt, contrarius ipsis cibus exhibetur, nonnulla stomacho grata admiscuntur, anisum, cuminum, uel apii semen: Adhuc lenticula his cocta plerunq; ipsis profuit, cum aceto modico, uel oxymelite commanducata. Præterea brassica & ipsa bis coctione experta: praestat autem secundum ipsorum coctionem in posta fieri. Vinum assumetur uetustius calidusq;.

† Rectior est scriptura ueteris codicis *ῥευματισμοῦ ἐπὶ πᾶσι τῆς γαστρὸς*, i. uentre omnino fluxionem abunde accipiente.

† Veteres libri hoc loco hanc scripturam habent. *ὑποκυτίς, ὅς χυλῶ 3.6 κόμμεος ἢ ἀκακίας ἴσον*, id est, hypocystidis succi drachmae sex, gummi uel acaciae par modus.

### De tenesmo.

### Cap. XLI.

**T**enesmus interdum dysenteriam praecedit: saepe uerò & ipse solus paulatim generatus, desinit. Est autem affectus hic, implacabilis desidendi cupiditas, qua nihil præter modica cruenta, uel mucosa, egeritur, quæ totius prope mali causa est: factaq; in loganone inflammatio edematodes hoc est mollis & cedens hærentis illic stercoreis opinionem, & deliciendi ea desiderium mouet. Galenus memoriae prodit etiam calculum quendam in tenesmi affectione per anum fuisse excretum. Subinde uerò obstructionem stercoreis in tenui intestino coacti, tenesmus secutus est, qui astringentibus quidem obturantibusq; remediis magis increuerit: clysteribus autē acrioribus, nempe mulsa cum sale, uel medicamine quod emolliat, per



per os assumpto, ut damasceno, uel pinguibus siccis, rore marino sero lactis stercore excreto, confectum finitus est. Quod si igitur citra talem causam, tenesmus obortus sit, conuenit inflammationem, cruda ordeï farina calida & fotu ex uino, oleo myrteo, uel rosaceo, uel omphacino lumbis & inferiori uētris ab umbilico regioni adhibito lenire ad ea uero quę longanoni mucosa impacta sunt, mulsā indita aluo abstergendo muriaq; sæpe demissa auxilii fuit abundē. Sufficiunt autem salis drachmæ sex in aquæ calentis hemina. Porro dolores intentionesq; leniuntur in fessu fœnugræci, uel maluę, uel seminis lini. Alii autem frequenter hunc quoq; in fessum felicem sunt experti, rutæ, myrti, cytini, lauri, cupressi. æqua singulorum uiridiū portio in aqua coquitur: est autem Marcellium. Vbi altè affligit inflammatio, irritationesq; iniijci debent ab inferioribus partibus cremores frumentacei cum quodam astringēte decocto. oleum uero dulce inditum retentumq; dolorem soluit. Cum autem crebra desidendi est cupiditas, etiam Agatidem spissamētis calidis sedi apponent, aut furfures calidas in fasciā, aut spongiā, aut aliquid huiusmodi.

*De torminibus quæ dysenteria dicitur. Cap. XLII.*

**C**Uma intestina intus exulcerantur, latini tormina, græci dysenteriam appellant, quæ nunc ex tenesmi mutatione, uel quadam ex prædictis alui turbatione prouenit, nunc per se incipit, in qua excernuntur primum biliosa, uaria. deinde leuiter subcruēta, postremo saniei similia cuiusmodi à mortuorū cadaueribus solēt, pfluere. At quæ à bile nigra oriū, exitialis est, ut quæ cancrū cū exulceratione testet. Si igitur ab exulceratione, cruēta stercorei cōmixta deiici cū dolore & torminibus cernantur, ulcus tenuia intestina obsidere nota est, q̃ per os potissimū remedia desideret. Sin aut syncerum stercus descendat. crassā, quod enematibus magis cedit. Porro cum multū sanguinis seorsim excernitur: affectū cruentā dysenteria appellant: quanquā interim sanguis etiā nigrior, quam naturaliter esse debet, & splendescens deiiciatur, cum scilicet iecur alimentum distributum non probe conficit. Iam uero cū retentrix ipsius facultas, uel alteratrix imbecillis est, sæpe eiusmodi descendūt ut recēs in eis caro lota esse uideat. Atq; hāc iecorariā uocāt dysenteria, de qua in iocinoris affectu agemus



Itaq; utendum est communiter ijs quæ in cœliacis & aliis præter naturam excretionibus comprehensa sunt. Priuatim conueniunt, lemnia sphragia, quæ etiam depascētem modo dysenteriam per sanat, & pota & in aluum data, si intestinum malsa prius fuerit abster sum. Deinde muria & lactuæ succus potus conuenit dysentericis: ipsaq; lactuca in posca cocta esui idonea est, item plantago, rubi tum fructus, tum folia, & altheæ radicis decoctū, hippuris ex aqua, uel uino bibita, eiusq; succus, pdest. Mori succus immaturus exiccatus, atq; hoc magis batina mora similiter resiccata. siccant etiam uentris fluorem oua ex aceto cocta comestaq;. Sati us fuerit, si cōmista quibusdam ex iis quæ ad dysenteriam faciunt, frixaq; esui exhibeas. Vtilissimum his est omphacium, rhus rubrum, eiusq; succus, malicorium, galla, acini uuæ, mespila, myrra, corni, cochlearum integro tostorum cinis. Compositum hoc bene facit, cochlearum cineris partes quatuor, gallæ partes duas, piperis partem unā in puluerem redacta obsoniis inspergito, uel ex aqua, uel ex uino albo aquoso potui dato. Generose iuuat dysentericos quos nondum alvus putre occupauerit, & canum ossa uorantium sterqus aridum, cum lacte caseato, ex lapillis marinis iniectis potatum. composita uero ex ægyptia spina pastillus, itē Philippi, tum qui ex cornu ceruino constat, adhæc qui ex seminibus conficitur, quiq; ad Trigonem refertur. Iam catapotia ex macere admiranda. maximè autem commendatur & hoc: opii, croci, lycii indici, acaciæ, rhus, thuris, gallæ hypocistidis, malicorij, myrrhæ, aloes, æquales singulorum portiones, nempe tres obuli ex aqua propinantur. **ALTV D.** Rhus drachmæ octo, gallæ, malicorij, singulorum drachmæ quatuor cochleare unum ex uino datur. **ALTV D.** Rhus drachmæ octo, gallæ, acaciæ, gummi, singulorum drachmæ quæ opij drachma. Exhibetur drachma ex uino temperato Hoc autem eclegma ipsis conueniet. Myrtorum nigrorum, rhus syriaci singuli sextarii, palmularum thebaicarum duæ libræ, malorum cotoneorum carniū libra, mala granata acida cum ipsis corticibus decem, uini astringentis sextarij duodecim, ad tertias decoquantur. Percolatis libræ sex mellis iniiciuntur, & ad spissitudinē iam incocta linctu exhibeto. Notum uerò est cataplasmata quoq; ex astringentibus componenda, quorum materiam explicatam habes. Porro aluo indita, dysentericis propter tenellos



tenesmos infestantes, ex usu fuerint, cremor orizæ, uel chondri, uel huiusmodi alterius cum adipe caprillo, uel hircino, tū ea quæ capite de tenesmo diximus. Si autem sanguis profluit, ex inferioribus partibus infundere oportet succum polygoni, uel plantaginis cum acacia, uel hypocistide, uel id genus aliquo. Sin urgeat fluxus, etiam quod sanguinē cohibeat quoddā iniiciendum est, ut cinis lanæ succidæ, uel spongiæ inanis, pice liquida, uel sanguine bulbulo imbutæ uel alumine liquido, combustæ, uel asinini stercoreis succo. Huic & Andronis pastillus præstant est remedium. tum qui Musæ ascribitur, ac persimiles. Insuper subiecta collyria multo sunt in id efficacissima, in quibus potissimum etiam dolores circa deiectionem fiūt. Vbi uero ulcera intestina depascantur quæ tum fædo excrementorum odore, tum putredine, tum quod non statim per initia fiat, sed temporis interuallo, agnoscimus, enematibus quæ crustam inducunt utemur. cuiusmodi sunt pastilli nomine Faustiani, item diachartu, id est ex chartha inscriptus, ac Bitynius, Theoniusq; : Præterea qui ex suberibus constat, ex lenticule decocto, uel cuiusdam astringentis, iniecti. Atq; hoc enema est ex ijs quæ admodum expertus sum, glandis caliculi combusti (Est autem calyculus concuuum illud unde querna glans prodijt, quo coriarij utuntur) Auripigmenti consolidæ, rhus syriaci, æquales partes. his cōtusis, duo cochlearia ex cipito cremore orizæ & succo anchusæ quæ folium habet spinale, amplum nigrumque, quod chærospileton appellant. Item ouorū candidi liquoris similiter ad uncias duas ternasue immittito. Epithemata uero in cœliacis enumerata sunt. Item uentris inunctiones quæ astrictoria ac siccante constant materia, glutinatorio quodam adhibito, gummi, thuræ, taurocolla, polline, in similibus cataplasmatibus locum habeant. † Alimentum his erit per initia. pulicula ex ovo & lacte. † deinde sorbitiones fumentacæ per se, & cum lacte, item lac mediocriter coctum maximè commendatur. Holerum usus non est necessarius quidem, attamen gustandas exhibebis serim coctam, intybum, plantaginem, brassicam bis coctam, poma quæ ὀπωγὰ dicuntur astringentia, carnibus ipsorum reiectis, uel aliis quæ asperare intestina possunt. Verum si multa sit caloris intemperies, etiam intybus cruda esui danda est, & aqua potioni frigida. Alia uero potabilis aqua cœlestis esto : si uero laborauerit



rauerit stomachus, uinum quoq; propinandum est. Postea ex aucupio sicciora & concoctioni morigera sumantur; balineis dulcibus utentur, à quibus si fluxionem experiantur, spongiam magnam, uel panis filiginei micas uino ascalonite, uel quodā astringente calido imbutas, toti uentri imponere oportet, cōtra quem cum deligaueris, sic lauare iubeto.

† Hoc loco uetus cod. habet, τροφή δὲ τούτοις ὡς τὴν ἀρχὴν ἔστω, id est, alimentum per initia his sint oua. Sed uulgarē scripturam bonā esse ex Aëtio quiuis intelligere potest, apud quē uox ὡγάλα est, quam interpretes oua lacti mixta reddidit.

*De morbo intestini pleuioris, quem græci colicon appellant. Cap. XLIII.*

**C**olon, cum pars sit intestini crassi, à dextra ilium regione procedēs, ad finisteriorem cincturæ modo pertinet. Huic dolores grauissimi plures ob causas suboriuntur. uel enim ex crasso pituitosoq; humore intra tunicas ipsius recepto, uel ex spiritu crasso, & flatulento qui non habet exitū, uel propter inflammationē, intestini, uel ob acres mordacesq; humores. Qui ergo ex humore crasso, ac pituitoso dolorem cōcipiant, hi per totum abdomen in alto excruciantur, præsertim sensu, qua parte colon situm est, ceu terebra pertundatur. Hos torsiones quoq; affligunt, ructus, nausea, uomitio cuiuslibet humoris, potissimum pituitæ. Alius grauius impedita nihil reddit, ac ne spirituum quidem transmittit. Stercus autem quandoq; excretum, bouino simile uidetur, leue & flatus plenum, Præcedens horum causa est magna ex parte, continuus ciborum frigidiorum, crassi q; succi, usus, repletio, cruditas, otii & his finitima. Qui autem ex spiritu flatulento indolescunt, ijs tensionis magis sensus obuenit: qui autem ex inflammatione, ijs feruorem internum percipiunt, & febris non ignaua, urinæ retentio simul & stercoris pulsus in uētre molestat, sitis, ardor, nausea, bilis potius uomitiones quæ nihil leuant malum, summatim inter colicas affectiones hæc est grauissima, quæ in Ileum transitionem minatur. at quibus acres rodentesq; succi dolorē mouent, sicut etiam qui ob inflammationē dolent, hos ardor sitis & uigilia torquet, † febricitant aut oīno uel minus quam illi, urina redditur aeris, & biliosa per aluum descendit.

Sæpe



Sæpealui deiectione maiorē excitat cruciatū, grauiusq; irritant calidiores cibi potusq; assumpti: Itaq; doloribus quos frigidi & glutinosi ac crassi humores contraxerūt, medebimur sic ut nō uehementer calfaciamus, quippe huiusmodi humores iis quæ nimis excalfaciunt, præfidiis fundantur, ac in spiritalem potius substantiam rediguntur. Quapropter & incidi, & cōcoqui medicamentis debent, quæ non infient, sed extenuent desiccantq; nec per morbi initia ualde calefaciāt. Prius itaq; aluo stercore leuata, cōgrui clysteres ex oleo iniiciuntur in quo decoctum sit cuminum, uel ruta cū adipe anserino, uel gallinæ, aut cucumis syluestris radicum decocto, & myrrhæ drachma, melle & oleo, aut ex myrrha, melle, & oleo sicyoneo. Iam uero commune oleum iniectum, sæpe uitream simul pituitam expulit, ac dolorem subito finuit. At si ob doloris uehementiam etiam enema retinuerint, glans aluo demittenda est, ex melle, cumino, nitro, rutæ semine sicco, brassicæ caule probe polito & muria madefacto, uel cinere brassicæ melle consperso, uel cucurbita syluestri trita cum melle, nitro & cumino. Glandes autem digitorum sex erunt, ut strictiorem animum musculum quem σφιγκτηρ uocant, exuperent, sedemq; ungere oportet, ciclamini succo cum melle, & nitro, uel centaureo cum melle, & nitro. Si dolor non remittitur enema præter commemorata sit. Resinæ terebinthinæ uncia, uel opopanacis drachma, uel galbani drachmæ quatuor, bituminis tantundem, cum nitri drachma, & aquæ uncia, olei rutacei uncia quinque, aut amplius. fetus autem partibus indolentibus superaccommodandi sunt ex cumino, uel anethino, uel sicyonio oleo. Cataplasma ad mouendum, trisperrum appellatum, cum cumino, baccis lauri, apii semine. Epithemata uero conuenient, diaspermation, diadaphnidon, adde diameliloton, & Poliarchion. Insestus autem utilis ex decocto fœnugræci, althææ, chamæmeli, artemisiæ, anethi, lauri, & similium. Item in oleum calidum, aut hydrelæum descendere alienum non est, potui offertur absynthium, & cuminum æqua portione, uel panax cum aqua, uel castorei, anisi, piperis, singulæ drachmæ cum oxymelite. Quod si dolor non conquierit, propinatur ipsis medicamentum diatrion pipereon, uel theriaca. Iam sinapismo, & dropace in remissione doloris utendum est, ac balneis naturalibus: † à balneis



neis autem aquæ potabilis abstineant, nisi doloris circumstā-  
tia compellat. Vbi iam prædictorum aliquo medicamento fa-  
cta prius fuerit euacuatio, iubebis ut lauent, incalescantq; laco-  
nico intra ignitos parietes inspergendo nitrosa quædā smeg-  
mata. Cum dolor est uehemens, mediocriter lementibus uti  
conuenit, qualis est pastillus ex castoreo, tum aluo ab iuferio-  
ribus partibus inditus, tum potus, similiaq; his medicamina.  
Nam quæ ualenter stuporem inducunt, uitare oportet. quippe  
paulisper quidem leniunt, sed longiorem affectionem reddūt,  
dum materiam incrassant. meatusq; intestini condensant. Por-  
rò ubi iam pituita fuerit extenuata, purgabitur hiera amare-  
scente, uel his catapotijs: Aloes, euphorbij, cocci gnidii, scam-  
monia æquali singulorum modo. dantur duobus scrupulis. Vi-  
ctus utilis erit calidior sicciorq; per initia morbi, à cibo absti-  
nebitur. deinde acria assumētur. Porrò igitur ipsis exhiberi co-  
cta cum condyto debent, apium, asparagus palustris, cruda al-  
lia, & maximè ijs qui talibus non offenduntur, ipsumq; uero  
condytum bibant panem uero cum ipso assumant. Insecutis  
diebus etiam reliqua boni succi alimenta concoctuq; facilia  
dabuntur, sic ut repletio cruditasq; uitetur. At si flatulentus  
spiritus doloris author fuerit, secundum clysteres qui flatus di-  
scutiant, potionesq; etiam cucurbitæ quàm maximæ cū flama  
ac leues toti abdomini defixæ, frequenter abundè auxilii  
præstiterunt. Porrò cum inflammatio intestinum exercet, ue-  
na in cubito aperienda est sin urinæ difficultas distorqueat, et  
ex talo sanguis detrahi debet, & prædicta admoueri præsidia,  
\* præterquàm quæ acria sunt & ualenter purgant: utendum  
uerò iis quæ magis leniunt, enematis, cataplasmatibus & super-  
fusionibus, in oleumq; descendendum, ac cucurbitulas ipsis  
defigemus, ceratum abdomini applicabimus quod habeat ce-  
ræ quincuncem, olei chamæmelini uncias duas, rosacei tan-  
tundem, lementi semunciam, uirella ouorum quinq;. Hæc  
succo lini seminis soluuntur. Victus tenuis ac febricitantium  
proprius ipsis conuenit, quousq; inflammatio discutiat. At-  
qui si propter acreis rodentesq; succos dolitant, oleum ipsis ab  
inferioribus partibus iniicietur, in quo fœnugracū decoctum  
sit, uel althea cum tenera adipe recenti anseris, uel gallinæ uel  
etiam cremore ptisanæ cum rosaceo, uel succo quoq; lini semi-  
nis. Propinandumq; ipsis Antidotum picra dia alces, & balneis  
uten-



utendum ex dulci aqua, cibo sorbili ex chondro, uel ptisana, piscibus saxatilibus. In summa uniuersus uictus humidior erit, & frigidior. Abstinentum acribus omnibus, cum cibis, tum medicamentis, foruque ex asperginibus, & cataplasmatibus, uini portione & potissimum ueteris. Cum autem dolor præpollet, etiam iis utendum est quæ sensum obstupefaciunt. nam offendunt minus aliis huiusmodi affectiones medicamenta quæ tenues, mordacesq; humores incrassant, & mediocriter refrigerant. Puto autem colicam affectionem, quæ etiamnum regnat ex huiusmodi prouenisse humoribus, quæ ab Italiæ quidem regionibus incepit, in aliis autem multis Romanorum Reipublice locis pestiferæ cuiusdam suis modo sit grassata: ex qua plerique in morbum comitiale, alii in artuum resolutionem sensu incolumi, nonnulli in utraque sunt prolapsi: ac eorum qui in comitiale morbum inciderunt: plures interiire. Ex illis uero qui in resolutionem, plures euaserunt, tanquam in crisi, causa aliorum ex loco quem infestauerat, conuersa. Sic igitur laborantes, medicus quidam in Italia curauit uictus, quadam ratione infideli refrigerante & maxime temeraria. lactucas enim non coctas refrigeratasque ipsis porrigebat, intybumq; similiter supra satietatem comedendum. Item uuas, mala pisces dura carne præditos, omniaq; crustacea quæ uocant Græce ὀφθακόδεσμα, pedes bubulos, bulbs & similia, nō solum facultate, sed & tactu frigida. uinum raro præbebat, cum autē dabat frigida miscebat, ipsamq; frigidam uel etiam poscam frigidam exhibebat, ab omni alio calido, & medio cibo abstinēs. Atque plurimos sic præter omnium opinionem persanauit, imō nonnullos qui iam in morbum comitiale, uel resolutionem prolapsi erant, propemodum sanitati restituit.

† Veteris Cod. hæc est scriptura, πυρέττοι δὲ οὐδὲν ἥλως ἢ ἐκείνων ἦττον. Sed uulgarem lectionem, uel eam quam habet Codex Orosii πυρέττοι ὁμοίως, meliorē esse ex Alexan. Tral. intelligere licet, qui scribit, eorum qui colico dolore laborāt, ἢ ἀνδρὶ πυρέττῳ διατελεῖν τῆς πλείους id est plurimos non esse sine febre.

† Totus hic locus sic legitur in antiquis libris. τῶν δὲ δι' ὕδατος ποτίμεθ λέρων ἀπεχιοῦσαν, πλὴν εἰ μὴ διὰ τὴν περίτασιν τῆς οὐδύνης ἀναγκάζονται, ὅν τινα δὴ πρῶτως ἐκείνους αὐτὸς τινὶ τῶν ἐξημένων. φαρμάκον λαβεῖν καὶ πυρετῶν κελεύειν ἐν τοῖς διαπύροις



πύρρσις τίποις, id est, a balneis aquæ potabilis abstineant nisi doloris intensio compellat, ubi iam prædictorum aliquo medicamento facta leuiter fuerit euacuatio, iubebis ut lauent, incallescantque laconico in locis ignitis.

\* Hoc scriptura est in ueteri codice πλὴν τῶν δριμέων καὶ τῶν διεραυνόντων ἰσχυρῶς, id est, præterquam quæ acria sunt & multum calfaciunt. Quæ scriptura rectior est.

*De tenuioris intestini morbo, qui ileos dicitur:*

*Cap.*

*XLIIII.*

**I**leos cum affectus sit maxime acutus, & dolorificus, symptoma quoddam habet periculo grauior. Qui. n. hoc malo sunt oppressi, miserabili morte perunt, ad uitæ finem, sterminus per os reddentes. Contrahitur id uitij cruditatibus, & obstructo recrementorum itinere, iis nimirum retentis, quæ iam corruptionem experta sunt: ex letalibus medicamentis, cumque in scrotum prolabuntur intestina, & cum inflammatione sentiunt, colica affectione plerumque præcedente, causamque adferente. Pueros itaque superfusionibus, cataplasmatibus, enematis, glandibus & fomentis, sicut in capite de colicis comprehensum est, curare oportet. Adolescentibus autem & ætate floridis indubitato sanguinem detrahenda: sin minus, uincit multas ac leues cucurbitulas toti abdomini admouere: Loco autem dolenti, etiam cute incisa: item perfricare & deligare artus, & tunc efficacioribus clysteriis & iniectionibus uti. Ad hæc in oleum calidum descendere, antidota purgationesque assumere, breuiter omnia adhibere conuenit, quæ ad colicos scripta sunt, præter eos qui ex acris, rodentibusque succis indolescunt. Mirifice autem ipsis facit etiam si uomuerint, anethum coctum, porumque, a potu panis in calidam demersi frustula statim esse, dum incallescunt. Ad eos autem qui cibos non retinent, rhus & cuminum in eadem trita potui dato in senis oxymelitis cyathis. Qui ex medicamento in ileon inciderunt, ut uomant compellendi aquæ calidæ potu. Noxiorum autem medicamentorum nota, quinto libro habes expressas. Deinde oleum calens propinari debet, uel iura pingua ut denuo uomant. Diebus aliquot interpositis, theriace potui detur. At si obstructio perseveret, lacte scisso cum scammonia, uel aloes, uel cuiusdam purgantibus momento, aluum inanire confert. Si ex intestini prolapsu  
in



in scrotū affectus processerit figuratis statim ipsis sublimibus in inguina cōpelleretur delapsū intestinum, fasciaq; deligabitur.

*De renū & uesicæ affectibus, & primum de calculo.*

*Cap. XLV.*

**M**Orborum cognatio, ordinē disciplinæ transgredi nos compellit. nam cōmunis est Colicis, & lapidem in rene habentibus aluus initio astricta, uehemens dolor, fastidiū, cruditas, & tormina: Propria uero, colici habent omnia hæc magis intensa, nephritici minus. At colicis quidē in dexteriore potius ileū parte dolor excruciat, & usq; ad stomachum, iecur, & lienem peruenit, aluus omnino cohibetur, adeo ut ne spiritus, quidē infra trāsmittatur. Cum uerò necessitas stercus expellit, flatulentū bouili modo est. Interim etiam uitrea pituita excernitur, urina copiosior pituitosaq; redditur. uerū nephritici grauē in ipsis renibus in fixum dolorē impacti pali instar sentiunt, eiusdemq; lateris ac è directo subiectus testiculus indolet, femur eiusdē partis directē obstupefcit, excernitq; etiā sponte quidem raro, omnino autem clysteriis aluus citata, flatu, stercusq; e biliosius egerit. urinæ paucæ, & arenosæ magis prodeum: meatus per quem urina distillat, astringitur. hæc indicia calculos in renibus esse fatentur, quæ adultis potius oboriuntur. in uesica autē pueris magis calculus solet concrecere: notæ harum sunt cruda & subalbida urina cui subsideat arenosum. Pruriunt laborantes crebro, & contractant pudēda, intenduntq;, & continue ad urinā reddendam urgeantur, ac stillicidio uexantur. Materiam igitur calculis creandis suppeditat crassius, terreusq; humor. Effectrix ipsorum causa est ignea renū, aut uesicæ caliditas. At in renibus quidem medicamentis uti conuenit, quæ calculos cōfringunt diffecantq;, non autem manifesto calefaciunt. Talia habentur basilicorum asparagorū radices rubiq;, nitrum combustum, graminis radix, adianthū, bdellium, lauri, radice cortex, althææ semen, cicer nigrum arietinum spongiarum calculi, acetum scillites, phu, meon, asaron, carpesion, saxifraga. Non uerò, & esu, & potu prodest, cardui, radix, erysimion, & prionitis. balneis autem crebro utantur, & post lauacrum statim quædam ex prædictis bibant. Cæterum superfusiones, cataplasmata, fustus, infusus, reixantia & quæ leniunt, ex colicis huc transferre conuenit.

*Compositæ*



Compositae potiones sunt, rutæ sylvestris, malue sylvestris, apii radices. incoquantur uino, & liquor inde expressus temperatusq; aqua, duobus cochleariis porrigitur. Hoc inspergi potest. Balsami fructus, lapidis spongiarum, pulegii sicci, malue sylvestris seminis singulorum pares portiones. ubi contusa fuerint, † cochleare inde cum uini temperati cochleariis duobus exhibetur. Item sanguis hircinus inarefactus, cicadæ siccae sine pennis pedibusque, lapis iudaicus, qui tecolithos dicitur, ex mulso in calido balnei solio offertur. tum medicamenta composita, quæ ex ipsis præparantur. Insuper, Fusca nephritice, & ad hoc composita, condita. His accedit laudatissimum remedium troglodytes: est autem passerulus omnium auium minima, ea sola excepta, quæ Regulus appellatur. Hoc enim solo paulo maior est, eique similis colore inter cinerium & uiride, tenui rostro, in muris maxime & sepibus degens. Hic inquam totus sale conditus crudusque frequenter commanducatus, calculos iam creatos per urinam expellit, in postetumque gererari prohibet. Combusti integri cum pennis cinis uniuersus per se & cum pipere, phyllique momento ex mero & melle potius, idest potest efficare. Ad dolorum uero acumen & uigilias bona sunt remedia Sotira, & Philonis medicamen. iam sanguinis missio adhibita dolorem sæpe leuauit, celeriter calculum emoluit. Tuetur à calculis, ne fiant, primum sane cibus boni succi, & moderatus, dein exercitia, rarusque leguminum omnis generis, frumentaceorumque usus, item casei abstinentia, lactis, & quæ ex ipso præparantur, obsoniorum, uini nigri, carniū copiae, & omnium summam crassi succi, ac nimis calidorum acriumque, hydrogarorum dico, & conditorum & similium. Hæc enim si obseruentur, non solum lapides nondum creatos prohibent concreescere, sed etiam iam factos, confringere, uel excernere idonea sunt, bibant autem oxymelicum quodam simpliciore urinam citante, ueluti adiantho, apio, graminis decocto. A balneo ieiunus ante uinum aquam temperatam poter. ac in medio prandij frigidam superbibat, si nihil prohibet. † Vbi prauī humoris copiam persentiscunt, sanguine detracto, aut purgatione uacuentur. Omnium uero præsentissimum est ad calculos arcendos secundum balneum, aquam temperatam prius bibere, quam uinum, aut aliud alimentum assumas: ac uesicæ calculos in pueris,



pueris, ualentioribus emolire præsidij, delectu ex supra comprehensis habito. Quod si impendio excreuerint, aut ceruici uesicæ impeerint, iniectione recti syphonis, catheterismum uocant, per quassatum utendum, aut etiam calculi incisio adhibenda, ut in parte chirurgica dicetur.

*De inflammatione.*

**A**T si inflammatio renes, aut uesicam exerceat, quam hæc nota testantur, loci affecti ardor, dolorq; cum grauitate, febricula, mentis alienatio, uomitio bilis synceræ, urinæ reddendæ impotentia, & præsertim ubi uesica inflammationem experitur: sanguis statim detrahendus est, utendūq; superfusionibus, quibus leniendi potestas est, & cataplasmatibus ex ruta, anetho, fœnugræco, althææ radicæ, clysteriisq; mollibus, & iniectionibus ex oleo, papauere, adipe anserino. In uesicæ affectu etiam, opii semibolum cū myrrha, croco, & oleo, in aluum demitti, mulsaq; potui sumi debet, ab iis abstineri quæ ualde urinam citant, ac multa potio uitanda, nisi acris biliosusq; humor superet, tunc n potui quoq; liberaliori indulgendū est, ac una uice cumulatim, qui ex aliquo citra rosionē, urinā mouente, sumetur. Seminis lini partes duæ, amyli pars una, cochleare ex aqua datur, item cucumeris & peponis semen. Cum ardorem igneū renes sentiūt, linamēta ex uino & oleo rosaceo, uel aqua & oleo rosaceo, uel melino super accommodantur, aut ceratum ex cera & rosaceo chamæmelinoq; uel melino & luteis ouorū confectum cum aceti paululo, uel polygoni succo imponatur. Postea etiam emplastrum quod à succis diachylon dicitur, cum chamæmelino adhibeatur. calida aut nemiū uitanda, ne puris generationē suscitēt, itē quæ impendio refrigerant. quippe ab his renes facile in scirrū indurescūt. Ad hæc balneis. cū inflāmatio instat, abstinentiū: uictus qui in febribus dari solet, & ab inflammatione arcenda nomen aphlegmanton sortitur utilis est.

† Hic locus sic descriptus est in ueteribus codicib. διδως κοχλεάριον μετ' οίνου κεκραμένου κιάθων. β, id est, cum uini temperati duobus cyathis.

† Locus hic integrior est in uetustis codicibus πλεθρας δε και κακοχυμίας σκηνουσανόμενοι δια φλεβοτομίας η καθάρεως κενούθωσαν, id est, si sentiant plethoram & cacochymiam sanguine detracto aut purgatione uacuentur.

PAULI ÆGIN.

o De ab-



*De abscessu & exulceratione partium per quas  
urina descendit, græci uocant.*

**D**Olores circa ilia oborti, horror inæqualis, & febris inordinata, abscessum in renibus fatentur. In uesica autem præter commemorata, loci cruciatus testatur. Cæterum affectus renum, hac nota deprehenditur. si homo in sanum recumbens latus, in opposito percipiat dolorē ceu ē sublimi rene suspenso. In quibus utendum est incessu ex hydrelæo, item cataplasmatibus ex polline, oleo & resina, uel erui farina, cum melle, uel cardamomo, uel columbæ stercore, cū ficis pinguibus. Pus autem per urinas confarctum excretum, abscessum esse ruptū, & ulcus in particula ostendit. Quoniam uerò etiam sine abscessu, instrumenta per quæ urina fertur exulcerationi patent, uase, aut rupto, aut exeso ex materia acri uel lapide per radente, distinguenda est renum exulceratio, ab ea quæ uesicam exercet, uel meatus quos *νεφροί* uocant, hoc pacto, Renibus quidē exulceratis in lumbis dolor exercet cum grauitare & sine impedimento urina redditur, cui pus mixtū reperitur, carnosis particulis innatantibus. Vesica autē exulcerationem experta, totum uehemens in pectine imoq; uentre mouet, urinæ difficultas urget, pus ubi reddita urina est, subsidet, squamulæ fædi odoris, uel laminis similes in sunt furfuracea autem subsidentia uesicam scabie laborare notāt, si uerò meatus urinarij sint exulcerari, etiam puris mixtura medio quodam modo habet, & pilis similia potius in lotio feruntur, dolorque mediam inter renem & uesicam, regionem occupat. Si autem pus aut sanguis excernatur, idq; citra urinā, nullius particulæ ex prædictis, sed pudendorum exulceratio significatur. Itaq; cum uasa urinæ dicta exulcerationem sentiunt, aqua multa bibitur, aut scœnogræci decoctum cum melle, aut cucumeris semen cum passo. Pus reddentibus per urinam, bolus armenus datur, aut ferularum combustarum cinis, quantum tribus digitis comprehendi potest, ex passo, item lactis potio uehementer his auxiliatur. Composita autem hæc, seminis lini, seminis cucumeris, tragacanthæ, singulorum drachmæ duæ: pastilli finguntur. **ALIUD.** Nuces pineæ numero uiginti, cucumeris domestici seminis grana quadraginta, amyli drachma. Excipiuntur heminis duas decocti nardi apij seminis. Archigenes in epistola ad Articum



ticum iubet, cum urinæ difficultas urget, papaueris albi torridi seminis detriti drachmam unam capi, quæ decocto iunci rotundi, aut calami, aut dulcis radicis inspergatur. Dolores autem ex ulceribus contractos hoc lenit: cucumeris domestici purgati seminis grana numero triginta, nuces pinæ duodecim. amygdala amara corticibus exuta triginta quinque, croci quantum ad colorem satis est. Ieiunus quotidie assumet cum lacte, aut passo. Mitius erit si pro nucibus pineis maluæ seminis æqualem modum iniicias. Elidere autem potest (inquit) uesicæ exulcerationes etiam cyphi & antidota inde confecta. Ego uero in uetustioribus hoc usus, nunquam aliud magis uarium desideraui: chamædryos, chamæpyteos singulorum drachmæ uiginti quatuor, asari, piperis albi singulorum drachmæ septem, cinnamomi drachmæ: optime detriti cochlearia duo ex passo cretico, porrigo, si febris adsit, ex aquæ cyathis tribus, ubi uero mordax est exulceratio, etiam amyli duobus cochlearijs & cucumeris seminis granis quindecim adiectis, uoti compos euasit. Hæc quidem ex Archigenis scriptis sunt. Item medicamenta, diaphysalidon, id est ex halicacabo, & antidotum ex syluestris maluæ semine, necnon ex tragematis confectum benefacit. Regioni inter scrotum, & anum, necnon inferiori uentri cerata imponuntur ex œsypo lota, butyro adipe anserino, styrace. In uesicam autem infunditur clysterio mulla aquosissima, uel lac cum paululo mellis, uel cum cucumeris semine, uel candidus oui liquor cum pompholyge, uel dictorum medicaminum aliquo. Si ulcus pascendo serpit, pastillus ex carta iniiciendus est, aut Bithinius: & cataplasma ex palmulis & uuis passis cum galla, acacia, hypocistide, & alumine debet imponi.

*De sanguinis renum profluuio.*

**R**enes infirmi lotium subinde retinere nequeunt, sed patentes redditi sanguinis nonnihil ex uena laxant, aliasque crassities remittunt. Sæpe renes etiam iuxta circuitum quem admodum hæmorrhoides, sanguinis profluuio laborant. Inanti uero subleuantur, in quibus nihil subito tentandum est, si sanguinis cursus sistatur. At si fluxus eius perseveret, uena in cubito aperitur, ac medicamentis quæ ad sanguinis sputum, aliasque sanguinis eruptiones inscribuntur, in renibus ac uesica sanguinem fundenti, utendum est. Maxime uero dari debet symphyti

o 2 radix,



radix, & tragacanthum uino maceratum. Ad hæc polygoni & plantaginis succus, cum posca, aut amygdala amara cum passo. Vel hoc, aluminis scissi drachma tragacanthi drachmæ duæ, gummi oboli quinque: ex passo assumetur: item cataplasma ex orde farina cruda cum posca & rosaceo, aut ex palmulis & pane siligineo cum acacia, uel hypocistide, in uino astringenti, uel posca decoctis obducitur. Cum uesica sanguinem fundit, etiam cucurbitulas in illis & coxendicibus defigemus. Cæterum particula quæ sanguinem fundit, hisce notis agnoscitur, loci dolore, & quòd sanguis urinæ miscetur, aut è contrario, ueluti in pure comprehensum est. Concretus in uesica sanguinis inde adeo deprehenditur, quòd post illum urina subito cohibeatur, & fibræ quædam sanguineæ (ut uerisimile est) aut humiditates cruentæ emanent. Datur autem potui artemisise decoctum, heliochrysiq; , uel cunilæ, uel raphani semen, uel liquor laseris, uel cyrenaicus, uel apij succus, singula in aceto temperata: aut leporis coagulum, aut hinnuli, aut hœdi in oxymelite, aut lixiuium cum oleo: spongiaq; à foris ex muria, uel lixiuio calido accommodatur. Quod si uicium his non abigitur, secatur locus inter anum & penem, quemadmodum in calculosis: ablatisq; grumis commode curantur.

#### *De renum duritia.*

**Q**uæ durities in renibus contrahuntur, nullū sane dolorem mouent, sed uidentur renes ipsi tanquā ab alijs suspendi, coxæ stupent crura impotentia uacillant, urina modica egeritur: Totus deniq; habitus duricie renū laborantiū ijs potissimū qui aqua subter cutē laborāt, similis est. Hi ergo emollientur ceratis, malagmatis, frictionibus & fomentis. Ad hæc quæ urinam cient, assumuntur, aliusq; subduci clystere debet.

#### *De diabete.*

**C**um poculēta, statim qualia assumpta sunt per urinā transmittuntur, diabetes uitium appellatur. Qui igitur eo sunt occupati, immodica siti cōficiuntur, unde quoq; dyspœcon græci affectu nominant: qui ex retentricis sane renū facultatis impotentia contrahitur, attractricis autē maiore robore, ut totū corpus ob immodicum calorem exhauriat exugatq; . Itaque aduersus hunc pugnantes, cibum pleniorē, quiq; difficulter confici queat, nec liquidus sit, offeremur, ueluti alicam cum  
rosa



rosato, uel rhodomalo, uel hydromalo, uel uino non uetusto, uel aliàs quodam calido. Ex oleribus autem intybum, serim, lactucas inter pisces erunt saxatiles, suum petunculi, uulua, pira, mala, punica mala, & frigida porio. Item polygoni succus, heleniumq; rectè ipsis propinatur ex uino nigro, palmularumque & myrti dilutum, præcordiis & renibus obducitur polenta ex aceto & iofaceo, folia uitis cotyledonis, parietariæ, portulacæ sudores excitandi, uomitusque à potu frigido, omnibus quæ urinam mouent, abstinendum. At sanguinem per initia mittere non fuerit alienum.

*De stillicidio urinæ & eius difficultate.*

**C**um neq; inflammatio, neq; calculus, neq; aliud quippiam ex prædictis infestat, urina aut acris est, totusq; habitus, uel etiã reliqua signa, bilem testantur, ex hac uel urinæ difficultas, uel stillicidium contrahitur. Quare ex usu sunt quæ hanc inalterant contemperantq; ptisanæ cremor, pisces, balnea, uictusq; idoneus: acria uitanda sunt, uinũ, exercitia, ita & tarda comestio. Quod si urinæ tenuitas, alborq; & reliqua signa frigidam fateantur intemperiem, cõueniet uinum calidum, cõdita, rum quæ urinã cient & medicamina & cibi, adhæc infessus calidiores. At si præter alborẽ, etiã crassities in urina appareat, pituitosus humor cẽsendus est, qui ceruicem uesicæ obstruxerit ubi utendũ est oxymelite, tum iis quæ constant ex hyssopo, pulegio, uel thymio, uel silphio, aquæ mulsæ incoctis, item superfusionibus calidioribus. siue aut humor crassus, siue calculus, siue grumus, uel eius generis aliquid obstruẽs, urinæ transitum impediat, siphonẽ rectũ catheterẽ appellauit, indere ex usu est, nisi particulæ inflammatiõ prohibeat. Porro in febribus urinæ difficultati medemus, superfuso rutaceo, uel anethino, uel ueteri oleo. Si aluus astricta est, iniicietur ab inferiori parte decoctum fœnugræci, uel maluæ, uincitq; insidere ægrotãtes supra cõprehensos in hydrelæum, uel aliquod dictarũ specierum decoctum cum oleo. Ceratum hoc magnifice proficit, syluestris maluæ radices in sicyonio cum aqua modica decoctæ donec inarescant, ipsæ quidem proficiuntur, succus autem oleo miscetur, rutæ quarta pars, ceræ & castorii quantum sufficit.

*De uesicæ resoluta.*

**V**esicæ resolutionem nunc urinæ difficultas, nunc sponta-



nea ipsius emissio comitatur, ut in ipso capite de resolutione supra expositum est.

*De urinæ incontinentia.*

**M**Usculus, qui ceruicem uesicæ ambit, relaxatus, hoc mali generat. Quare pueris etiam maxima ex parte solet accidere. Communiter itaq; roborantibus potissimum uti conuenit, ut œnelæo calido & similibus: abstinendum iis quæ ualide refrigerant: calidis fouendi potius egri, quatenus fieri potest. Etenim frigiditas ueluti resolutionem repræsentat, naturaliter autem hæc opitulantur. Galli guttur combustum ieiuno bibendum in aqua tepida præbetur, uel leucanthemi flores similiter, uel leporis testiculus densus in uinum odoratum, contra hæc uitia bibitur. † uel calamintha myrrhæq; ante cœnam propinetur, uel rutæ syluestris semen torrefactum per triduum potui exhibeatur. Cæterum pudenda eius qui hoc detinetur uitio, cimolia cum succo herbæ perdicis perunguntur.

† Huius loci hæc est lectio i ueteri, ἡ καλαμίνθην ἢ σμύρναν δὲς πιεῖν, i. uel calamintha myrrhæq; in uino ante cenā detur.

*De iocinoris affectibus.*

*Cap. XLVI.*

**I**Ecur pluribus uitiiis oppottunum est. nam imbecillitate, inflammatione, erysipelate, scirro, abscessu, ulceribus, & obstructionibus corripitur. Primum de imbecillitate ipsius dicendum est, à qua propriè iocinorosos nominare agro tantes conueuerunt. Si ergo aluus in succum quidem conuersa uerum liquidiora deiiciat alimento minus probe, aut neutrquam in iecur distributo, sic tamen ut uenter à noxa sit immunis, attractricem uisceris facultatē infirmari suspicio est. Si uerò in eis recens caro lota esse uideatur, alteratricem, tum eam quæ sanguini creando est dicata. At si ex calida intēperie sit, imbecille, recrementum alui tēporis spatio fœculentius apparet, ualdeq; fœtidum, bilis insigniter colorata crassaq; descendit. Iam uerò etiā quando iecoris substantia cū ea colliquatur, & totū corpus cōsumitur & febris urget, cibiq; fastidiū, & biliosus uomitus. Cū aut frigida affligit intēperies, neq; frequens, neq; copiosa aluus est: quippe affectus lōgius prorogat, & certis diebus uēter cumulatius deiiciet, sed minus fœtida ceu sanguinis crassi



crassi faciem, ut propè atra bilis uideatur. Item plures & uarii deiectionum colores, frigidam notant intemperiem, in qua febris languida apparet, facies non collabitur, maior ciborum appetentia inest. Harum intemperierum alterutri si accedat siccitas, recrementa erunt sicciora & pauciora, magisq; ægri fient: si uero humida, liquidiora & copiosiora, tum sitis minus ex cruciat. At si inflammatio iecur infestat. omnibus quidē ex æquo dextra parte sub præcordiis dolor est: idemq; ad iugulum supra, ad usque costas spurias infra peruenit. Huic dolori accedit febris acuta, tussis sicca, sitis, cibi fastidium, spiritus difficultas, lingua primo rubra apparet, mox nigra: bilis euomitur, & aluus non respondet. Quum autem similia in pleuriticis signa existant, quo modo hos ab illis discernas, capite de pleuritide comperhensum est. Si uero Erysipelate iecur conflictetur, flammeus ardor gliscit, urunturq; ægri, & marcor sequitur, qui *μαρξος* græcis dicitur. Priuatim uero cum caua quidem iecoris inflammationem experiuntur, nausea adest, uomitus, cibi fastidium, & flammeus ardor intenditur, anima deficit, & sæpe membra perfrigescunt, ut aqua subter cutem transfundi inde incipiat. Rursus si gibbam ipsius regionem inflammatio exerceat, præter alia superius cōmemorata, tumor quoq; manifestius in superficie oculis & tactui conspicuus est. hæc quidē ualidam grandemq; inflammationem testantur. sin obscura quædam fuerit, iubebimus egro, magnam ædat respirationem. Et si dextra parte præcordia dolere dicat, moderata iecoris inflammatio censebitur. Quod si oblongus inflammationis tumor, qua parte musculi incumbunt, appareat, sed ita ut nulum ex prædictis adsit, illos ipsos eadem inflammatione occupari noscemus. Gravitas autem cū distentione, & doloris, dextra præcordiorū parte sensus, nullo substante tumore, nulla febris urgente, uenarū signatur obstructio, qua uenæ portas & cōcava iocinoris perreptantes iis quæ per gybba ipsius excurrūt, committuntur. Itaque si in abscessum degenerat: inflammatio, doior & distentio ipsis increfcit, rigores sine ratione accedunt, dolentesq; iocinore, in sinistrum magis latus decumbere nequeunt, rupto autem abscessu, uel per urinas, uel per aluū cumulata puris subluuies prorumpit. At si tumor in scirrhum affectionem deciderit, dolores quidem remittunt, sed tumor cū duritie est conspicuus, quæ ambiunt partes extenuant



& tempore procedente difficulter poterunt discerni. Quippe aqua inter cutem protinus comitatur, & tota prae cordia humiditate conteguntur. Itaque aduersus calidam iecoris intemperiem, refrigerantibus, tum is quae uiscus mediocriter confirmet, u. i. consilium est id autem praestat seris & cichorii, interim crudum, interim coctum cum coriandro assumptum, item decoctum ipsius, epotum, & succus non solum, uerum & puluis ipsius mulsae inspersus & calidis, & frigidis iociuoris uitiis opitulatur. Adhuc intybum troximum & sonchus eiusdem sunt generis. Benefacit etiam mali medici succi cyathus in aqua mulsam demissus, similiterque filicis succus. At si cum obstructione mediocris affligat intempesties, ea ex uino quodam tenui, & quod urinae mouendae est, porriguntur. Catapotium uero quod recipiet radices cichorii drachmas quatuor, chamæpyte os radicis drachmas quatuor trita cum melle cocto dantur ad nucis auellanae magnitudinem, quibus aquam calidam superbibere conuenit, iam ex opio & semine alterci confecta propinatur, ipsumque Philonis antidotum. In quibus calor intenditur, etiam rosaceum pruni meriti ipsis, uel melinum potui datur. Esui, ptisanæ cremor, uel chondri cum hydrosato, similiter panis ex aqua, cum quadam id genus dulci potione. Et summam cibi erunt, qui mediocriter refrigerant, non obstruunt: uinum omnino circunciditur, nisi alteram ob causam, nempe stomachi imbecillitatem, hoc requirant, tum enim ex tenuibus & iis quae graeci ὀλιγοπόρον uocant, aquosum aliquod exhibetur: Ac Erysipelas quoque in eum modum curabitur. Porro in frigida intemperie contrariis pugnandum est. Panis igitur recte cum uino assumitur, item brassica bis terue incocta, castaneasque esse confert & uuas passas tum ex gallinis quod satis est: uinumque bibant: sed prius ipsis eupatorium, uel asarum, uel medicamentum diapedereon propinari debet. Iam ex iis quae prius ad coeliacos & dysentericos inscripta sunt, idopea deligi debent: cyphoides autem appellatae compositiones, ad calidas intemperies neutiquam conueniunt. nisi modica quedam caliditas cum humiditate copiosiore oborta fuerit. ad frigidas autem optima sunt remedia, magisque si cum humiditate, aut iecoris obstructione euenerint. Si uero obstructio ex crassa glutinosaque contracta humoribus fuerit, corruda & praeterea huius semen datur, item lauri radices cortex eupatoriumque;



riumq; ex oxymelite, uel lupinorum amarorum decocto cum ruta & pipere. Ad hæc farina lupinorum pota, & capparis radicis partes duæ, costi pars una cum uino: & medicamentum diabacanu ad obstructions quas crassi uiscosiq; humores excitant salutariter sumitur: præterea iris & pistaciorum fructus cortexq; marrubium insuper & amygdalæ amaræ, & ex ipsis pastilli, dracunculi, ariq; radix, agaricum, acetum scillites, oxymel, iecur lupi, aridum tritum & cochleario datum, omnibus iecoris affectibus ex uino dulci succurrit, item antidotum Theodoretum efficacissimum est remedium iecori obstructo, scirrho indurato diuq; inflammato. Item colicis & ictericis, similiter etiam picra ex oxymelite. Cibi his dandi sunt calidiores & qui aperiendi facultatem habent, nēpe porra ex oxymelite, syluestris asparagus, & capparis, reliquaq; obsonia ex condimento aliquo calefaciente, quodq; meatus referat, incocta. Vinum tenue ac uetus utile. uitanda sunt alimenta crassi succi, balnea crebra, eaq; potissimum à cibo. Si morbus in uetustatem incidit, etiam uenæ sectio purgatioq; adhibenda, si nihil prohibet. Cum autem iecur inflammationem experitur, sanguis ex cnbito dextro intrepidè mittendus est, & copiosus si uires sufficient. Extrinsecus farina hordeacea & foenugræci, & semine lini cum palmulis, uel malis cotoniis, meliloti flore, absynthio, chamæmelino obducetur. Illud autem in summa præcipiendum est, ut astringentia emollientibus semper admisceantur. Epithemata uero iniici debent, tum quod ad Nileum authorem refertur, tum quod à grato odore euodes dicitur: item Philagrianum & Apollophanis, necnon ex melilotis confectum deniq; quod coptum appellatur. Porro ad maximas inflammationes hoc ualde experientia comprobatum est, absynthii comæ, nardi gallicæ, asari, croci, singulorum uncia, iridis, myrrhæ, styracis, bdellii, ammoniaci suffiminis quod thymiana appellant, singulorum uncia duæ, medullæ utulinæ uncia quatuor, cerati lentiscini libræ quatuor. Ad hæc oxymel ipsis dandum est, simpliciaq; auxilia, nempe, asarum, nardus gallica, uel indica, iuncusq; odoratus rotundus, petroselinum. Alius irritanda est, urticæ, uel mercurialis, coctorum esu. In declinatione morbi epithimum & polypodium ex mulla porriguntur, aliusq; inaniri postulat per clysterem, initio quidem ex aqua mulla cum sale, uel nitro, facta autem



tem inclinatione, miscetur hyssopum uel origanum, uel cnicum, uel centaureū & cucurbita syluestris. Summatim uero caua iecoris pars per aluū: gibba per urinas expurgatur. Alimentum his dabitur, cremor ptisanæ, in quo apiū decoctū sit. At inflammationis quæ Erysipelatis naturā referat, curationem superius sumus executi. Abscessū aut factō, ruptura adiuuanda cataplasmate trispermo, cū resina, manna pice, radicibus altheæ, columbæ fimo, caprillo stercore, præbabitur aut ius decoctorū ad tertias polij & fumarix quæ in ordeo nascitur, item decoctum thlaspis uel cichorij, & chamædryos radicis bibant: uomicaq; abscessus facta, mulla conuenit, & quæ in renibus exulceratis cōmemorata sunt. Extrinsicus imponitur medicamentum Mnasei, reliquaq; emollientia Item Icesion, uel quod salicibus constat. Si uero iecur scirrho induratum fuerit, parum in medicina spei est, affectu in aquam subter cutem transeunte. Attamen emollientibus admiscenda sunt, ammoniacum, bdellium, medullæ, adipēs, & quæ his similē potentiā obtinent. Potiones expediunt, quæ angustias uisceris recludunt absterguntq;. Huiusmodi sunt quæ urinam citant, & calculos cōfringunt. Adhæc quæ nuper ad iecoris obstructionem dicta nobis sunt: alimento nimirum decenter adhibito.

*De malo corporis habitu, qui Cachexia dicitur. Cap. XLVII.*

**P**incipia hydropicorū affectū uocare nostri malū corporis habitū, Græci καχεξία consuerunt. Auxiliū est, nisi aliquid impedit, in sanguinis detractione, quæ particulatim ac per uices adhibita ad tertium quartumue diem producit. Sed uacuandi sunt potissimū, qui hæmorrhoidibus, aut mēstruis nō respōdentibus in morbū inciderunt, quemadmodum iis qui copia uitiosorū humorum laborāt, uacuatio sanguinis per uenā uitāda est: purgādi aut sunt ex hiera, dia colocynthidos uictus erit tenuis, & desiccās. Aquarū naturalium usus adhibetur, primū aluminosarū, nittosarūq; magis, mox sulfurosarū: pluribus diebus iterpositis aliud balneū accommodabit, uarioq; exercitationis generi credetur ægrotātes, maximè aut ei quod per medicos alyptas, i. reuinctores administratur postea ueratrū assument mirificè quoq; iuuat ipsos & absynthij potio, & cotabismi. & dropaces Si affectus in hydropē deciderit, aquæ subter cu-



ter cutem curationi subiicietur, quemadmodum exponemus.

*De aqua inter cutem.*

*Cap. XLVIII.*

**C**um iecur uehementer perfrixi-  
rit, interim sanè prima-  
rio, aut inflammatione, aut scirr-  
ho, aut alio implicitū  
uitio, interim lege consortij quod cum aliis partibus  
habet sanguinis elaboratio non succedit, ac uitiū aquæ intercu-  
tis quod hydrops græcè dici-  
tur, inde cōtrahitur, in quo nōnun-  
quam spiritus copia cū humidi momento intra mēbranā, quæ  
peritonæos appellatur, & intestina colligitur, ut abdomē per-  
cussū tympani modo crepitū elidat: qua ratione ēt tympa-  
nias nūcupatur, qui stomachi, alui, & coli inflationibus, feбри-  
busq; longis superuenit. nōnunquā uero ex duritie peritonæi,  
aut uulux in mulieribus, aut ex scirrho generatur. Aliquando  
contra humorum abundantia cum paucissimo spiritu, in eisdē  
regionibus collecta tanquam in utre quodā cōseruatur, unde  
malum, ascites nominatur hydrops, & ipse ex causis quas com-  
prehendimus, contractus. Plurima uero ex parte, ex duritia &  
scirrho lienis, & iocinoris longisq; intestinorum profluuiis, in  
quibus fit ut uenter quidem intumescat, reliquum autem cor-  
pus quod alimentum non sentiat, cōsumatur. Nonnunquam  
etiam in tota corporis mole frigidior pituitosiorq; sanguis cō-  
tinetur, qualis partim à iecore descendit, partim ex tota car-  
ne corporis ueluti in aquam resoluta emanat, adeo ut corpus  
albido, & pituitæ colore emortui instar appareat, uocaturque  
hydrops leucophlegmatias hypofarcidios, uel anasarca. Quem  
lentæ febres, malus stomachi habitus, hæmorrhoides diu sup-  
pressæ fluxus muliebris, spiritus difficultas, uigiliæ sine ratione  
oborientes, causæq; his cōsimiles mouerunt. Curatio igitur  
communis ab euacuatione incipit. Verum ascites & tym-  
panias appellatus medicamenta requirit, quæ aquam educāt.  
Cui autem anasarca nomen est, sanguinis detractione succur-  
rimus, maximè si affectus origo ex hæmorrhoidibus, aut men-  
struis suppressis exiit, nisi prius cū malo habitu premebantur  
sanguinem emiserint. Et hic igitur ut in iis qui malā corporis  
habitudinē sortiti sunt, per uices tentāda est uacuatio. Deinde  
stercus bouis gregarii aridum exactè tritū, coctumq; in posca,  
uel oxymelite, sulfurisq; pars quarta superinspersa, toti uētris  
capacitati iniiciatur, uel stercora caprilla in pueri urina ad sor-  
dium



dium spissitudinem macerata, applicato, per uentrem summè ipsos purgat. Item cataplasmatibus utendum ex fermento, ficis pinguibus, calce, nitro, iride, cardamomo, sulfure uiuo, ammoniaco, baccis lauri, uua taminia, columbarum ruralium fimo, uel omnibus, uel quibusdam ex his cum oxymelite. Post quæ epithema spongium appellatum ex caprillo stercore mirificè humiditatem uacuat, tum per latètes meatus, tū per aluū. Insequentibus diebus emplastra persiccantia imponuntur, tū dia iteon, id est, quod ex salicibus est, tum quod icesum dicitur, uel quod Cureo ascribitur, uel diadaphnidon quod ex baccis lauri factum est, uel polyarchium, uel epithema diaspermation ex seminibus præparatum. Atq; hoc indubiè mirificos præstat effectus, quod sequitur. quippe humores ex alto eripit: lapidis pyritis, sulfuris uiui, guttæ ammoniaci, singulorum drachmæ duodecim. cumini drachmæ sedecim, nitri drachmæ duodecim. Excipiuntur cera modica, & terebinthina, pelliq; illita, toti uerò ab imponuntur. Tus radice sambuci decoctæ in uino potui datur, uel cucumer syluestris uino austero maceratus per triduum, cyatho uno propinatur. Accessio autem fit quotidie usq; ad cyathos tres: Hoc quod subiungitur, uaria constat mistura: balsami, nardi, casia, cumini, dulcis radiculæ, hyperici, iunci rotundi, asari, dauci, amomi, myrrhae petroselinii, calami aromatici, piperis, seselis, spondilij pares portiones, faciunt autem bene etiam singula per se, & omnia quæ urinæ ciendæ sunt similem facultatem obtinent. Cæterum scilla tostata, cū melle trita & linctus modo exhibita, sine grauitate urinam mouet: coqui autem possit etiam in aqua, iis qui bibere uelint. Iam hoc quod sequitur præcipuè bonum est: interioris scillæ libræ duæ, in uini austeri sextariis tribus adusque terrias incocta porrigito ex uino quotidie, orsus à mystro usq; ad unciam. Illud urinam optime prouocat, quod recipit aluminis liquidi circa fabæ magnitudinem: ubi aqua dissolueris, linteoq; percolaueris, ad tres dies propinato, uel uno interposito. Conuenit etiam his pitra ex oxymelite. Adhæc Theodoretus, & ex amaris amygdalis pastillus. Plura uero aquam educūt, sed hæc usus comprobauit, gnidia grana quadraginta, aut quinquaginta, uel lathyrides uiginti, aut triginta, uel euphorbii silique quinque, aut septem, uel squamæ æris drachmæ duæ, aut tres cū micis panis exceptæ, ac in orbiculos digestæ, uel sambuci



buci radice corticis succus epotus cum condito, uel chamelææ foliorum, æris combusti, anisi singulorum par modus datur in aqua, per initia quidem drachma una, diebus aliquot interpositis etiam duæ, & plures. Atque insequentia, mirifica sunt catapotia: aloes, euphorbij, cocci gnidij, singulorum uncia, rhei semuncia, excipiuntur succo brassicæ, fingunturque catapotia, dantur siliquæ septem, aut nouem. Antidotum ex gariophilo, aquam mirabiliter elicit, iam uinum quod aquæ educendæ est, dare tentabimus. Est autem hoc præstantissimum scillæ uncia tres, seminis apii, capparis radice corticis, piperis, singulorum drachmæ quatuor, cocci gnidij decorticati drachma, phylli drachma, malabathri galbuli duo, uini optimi heminæ duodecim, mellis crudi libræ sex. Contusa cibataque uino perfunduntur, scilla simul lenigatur, dantur cyathi tres: post humoris euacuationem, etiam theriaca utendum est, & stercoris bubuli cochlear ex uino porum quotidie strenuè auxiliatur. item clysteres adhibendi acres, nisi uenter sua sponte humescat: tunc enim exiccare ipsum magis conuenit. Porro in mulieribus quas aqua subter cutem male habet, etiam pessus hic utilis est. Anisi, cardamomi, cumini, nitri, aristolochiæ, fœnugræci, pulegii, ficuum interioris pares portiones susino excepta mulieribus subiiciuntur. Secundum hæc aquis naturalibus, uti continenter expedit: ad hæc in arena contexti desudent: aliis autem lauacris abstinebunt. Quod si uero interim lauent etiam, utentur in lauacro nitro, sale, sinapi, calce, & persimilibus inspersis. Hæc sanè uel citra lauationem utilia sunt, aridaque cum oleo uentri adfricata. At si id uicium est, cui ansarca nomen est, reliquas partes exerceri, quatenus licet, oportet & siccas ad solem perfricari. Reliqua uictus ratio ficcior assumetur. Cibus itaque erit salsamentum, sinapi, & allia: ex auibus syluestres, & sicæ magis. Inter olera asparagus, bisacurum, porrum, sinapi, caucabæ, reliquaque syluestria. Obsoniis miscebitur sal theriacus, uel iamblicus: uinum uetus, tenue, ad urinam mouendam efficax ebibitur. Sin autem facultas datur, ex marina confectum: omnis potio liberalis uitanda est, aquæ in totum. Quod si cum febris aqua subter cutem inuadat, calidioribus, acrioribusque cibis & auxiliis abstinendum, mixtim uero his utendum, ita ut ei quod magis urget, occurramus: si uero id morbi genus est quo uenter sonitum ædit, Tympanias uocatur, purgantia, & quæ



quæ uniuersum corpus emaciant colliquantq; releganda sunt item ex ijs quæ urinam mouent efficaciora. Illis autem quæ extenuare & discutere spiritus possunt, tum intrinsecus, tum à foris utendum est. aut cucurbitulæ leues crebro toti uentri suffiguntur. Sin id uitij male habet, in quo ueluti in utrè aqua contrahitur ascites uocatur, nisi prædictis cesserit remedijs, ad perforationem ueniendum est quæ παρακέντησις dicitur, quod nulli alij aquæ subter cutem generi conuenit.

## De Liene.

## Cap. XLIX.

**C**Um lien melancholicum humorem, qui ueluti limus sanguinis existat, à iocinore trahere soleat, si quidem facultas attractrix infirma fuerit, meatus uel obstructus per quem prius trahebatur, niger icterus constituitur, sanguine impuro per totum corpus disperso. At si lienem grauitas, & distentio, uel etiam dolor exerceat, obstructio indicatur: si nihil horum euenerit, attrahendi potentia imbecillitas. Quinetiam si atra bilis uomitus sine febre aliâue malignitate oboritur, re tetricem lienis uim laborare indicium est. Expultricis imbecillitas cibum fastidium efferet, dum non amplius melancholicum excrementum, ab liene ad uentriculi ostium deferretur, appetentiamque excitat sed in ipso liene obstruitur, primum sanè inflammatio huius, cuius notæ sunt, feruor, dolor, & distentio, excitatur. quæ paulopost in schirrum degenerat, sicut ut feruor quidem dolorq; finierit, tumor autem & duritia maneat, Hoc pressis uitio, os foetet, gingiuae exeduntur, ulcera in cruribus cicatricem non recipiunt, ob quæ simul affecto iocinore, cutem subeuntes aquæ colliguntur, sicut comprehensum est. Itaque intemperies ipsis eandem cum iocinore curationem postulat. si adest inflammatio, sanguis à cubito sinisteriore, uel ab extrema manu dimittendus est, eo quod reuulsio longioribus interuallis fieri debeat, uel etiam propter naturalem quandam cognationem: deinde cataplasma inducendum ex quæ citra euidentem calorem extenuant, admixtis quibusdam etiam nunc astringentibus: uidetur autem hanc facultatem habere suapte natura, qui uocatur flos salis. Porro est & hoc cataplasma mirificum, scænuigræci triens, farina hordeaciæ, nasturcij, singulorum uncia, si cum pinguium libra, uerbenacæ herbæ aridæ uncia,



da uncia, ficus, aceto quam acerrimo macerantur. Deinde cum alijs prius confusis incoquuntur, postea iterum coquuntur. Vel stercus caprillum cum cruda ordeï farina coctum ex posca inducitur: adhibeto, si placet, & salis florem, fouendo autem prius cyprino cum aceti momento, malagmatis utitor, primum simplicioribus, quale est hoc. Cerae sesquilibra, centaurei libra, nistri triens, terebinthinæ, seminis uiticis, capparis radicis corticis, singulorum quincunx. Coctis quæ liquari possunt, arida in sparguntur. iam quod ad Nileum autorem refertur præstantissimum est. Verum ubi inflammatio in scirrum degenerat, ualentioribus uti conuenit, ut etiam cutis summa exulceratur, quale est quod ex fimo caprillo constat, & citrinum. huc accedunt Macherionis, Curei, item ex baccis lauri confectum, & ex salicibus. Quod subsequetur, etiam ipse expertus sum, auri pigmenti uncia duæ, sandarachæ uncia duæ, cerae libra, terebinthinæ libra, picis aridæ tantundem, galbani uncia, opopanax uncia, capparis radicis corticis, glandis unguentariæ, singulorum uncie quatuor, lachrimæ ammoniaci scrupula sex, nardini, uel cyprini uncia quinque. Ammoniacum etiam cum aceto applicatum, leni sæpe profuit, item potum scrupulis tribus quaternisue cum uno castorei, si priusquam in lauacrum descendant, ficum siccatum comederint, sputoque eam reddiderint, uel ammoniaci pars una, castorii tantundem: datur drachma. hæc etiam ad induratos scirrhus, proficiunt, quemadmodum capparis quoque cortex ex aceto contritus, applicatusque. Idem bibitus aceto, uel oxymelite, crassos, glutinososque humores uacuat, interim sanguinem. Iam salicis cortex, consimiliter inungitur, & cinis ex officina fabrilis cum cruda ordeï farina ex oxymelite inductus. Item centaurei succus à foris impositus, epotusque, & lupinorum amarorum decoctum cum ruta & pipere potu assumptum, nec non farina ipsorum obducta, & aqua in qua candens ferrum subinde extinctum est, febricitantibus per se data cyathis tribus. febris carentibus autem cum uino & aceti cyatho uno, uel rumicis syluestris radicis cum scilla tres oboli, uel chamædryos, uel serpilli acetabulum totum cum oxymelite, uel anagallidis, quæ cœruleum florem obtinet, duo oboli, cum posca bibuntur, uel acetum scillites, uel oxymel. Cōposita autē hæc, panacis radicis, guttæ ammoniaci, capparis radicis corticis, herbæ lanariæ, scillæ



scillæ tostæ medullæ æquales portiones exhibentur drachmæ unius pondere. benefaciat etiam suspirosis, & hydropicis.

ALIVD. Myricæ fructus drachmæ quatuor, piperis tantundem, spicæ nardi drachmæ duæ, suffiminis ammoniaci totidem. Teruntur aceto scillino, instar drachmæ nnius dantur ex oxymelite.

*Ad lienem scirrho induratum.*

Cyclamini drachmæ uiginti, brioniae drachmæ tres, dictamni drachmæ duæ, scillæ tostæ drachmæ octo, herbæ lanariæ drachmæ sex, capparis radices drachmæ sex. pastillus triobolaris ex oxymelite porrigitur. & qui ex æruca præparatur, non in idoneus est: cibis competit tenuis, acris, siccus: potio paucissima adhibenda exercitationes frictionesq; & sinapismi, interim etiam cucurbitulæ cum scarificatu defigende.

*De morbo regio, qui icteros Græce dicitur. Cap. L.*

**R**Egius morbus, quem Græci icteron appellant, bilis est per totum corpus suffusio, modo atræ, de qua in lienosis à me dictum est, modo flauæ. Differentiis constat numerosis: quarum causæ & notæ hæ sunt. Si enim febricitante ægro repente superueniens febrem finierit, crîsim testatur, materia ex alto foras prorumpente, contractum. Medicina nõ indiget, ut quod balneis & moderata fritione subito discutiatur. Si autem cum febri & biliosis deiectionibus inuadat, & præcordiorum dextra parte grauitas adsit, ferues iocinoris inflammatio significatur: cuius ui sanguis in bilem mutatus, per uniuersum corpus defertur. Sin autem feruor citra grauitatem in ipso subest, ex sola iecoris calida intemperie, uitium gignitur. Si absque febri alba deiciantur, uelicæ fellis malum ostenditur, uel ipsius meatuum: si grauitas quidem præcordiorum dextram partem premit, obstructorum, sin autem citra illam, facultate imbecillum, uel attractrice, eius qui humorem ex iocinore eliciat, uel expultrice, illius qui ad intestina eundem protrudat. Quippè sanguis biliosus non expurgatus, in totum corpus diffunditur, quemadmodum in nigro arquato fieri dicebamus, statim uero his etiam urinæ biliosissimæ assatim excernuntur. Cæterum sic etiam arquatus, ex intemperie calida solidarum partium, dum id quod ratione alimenti, ipsis offertur, in bilem transmutant, quemadmodum in aquæ subter cutem genere,



genere, cui nomen anasarca, in pituitosam humiditatem, est mutatio. Verum talis arquatus dignoscitur hac nota, quod non subito, ac una uice, sed paulatim procreetur, sicut nullum ex commemoratis adsit. Iam uero noxii medicamenti potus, & uirus extrinsecus à uenenato animali illatum, regium morbum parit. Itaque calide iecoris intemperiei, & inflammationis uiriumque imbecillitatis, curationem supra sumus persecuti, ubi de ipso agebatur, quam etiam integram huc transferre oportet ne eadem mihi sint repetenda. At si meatus conceptaculi fellis utrique sint obstructi, uel alter duntaxat, uenam, in cubito dextro ipsis diuidi consilium est. Nonnulli uero, tum his, tum illis qui ex iecore inflammato, arquatum contraxerunt, uenam propter minimum dextræ manus digitum, incidunt. Cataplasmatibus quæ inflammationem arcent utendum est, & purgatione ex hiera, nec non clysteres idonei sunt, potui rectè datur arquaticis, ius apij, uel adianthi, uel rumicis, uel serpilli decoctorum ad tertias, uel absinthium potioni inspergitur. Præclare faciunt raphani succi cyathi duo, cum uini cyatho uno poti. Et cichorei succi cyathi bini, uel terni per se aut cum uino poti. Sed qui iecoris inflammationi arquatum fuerunt acceptum, mulsum bibent, uel decoctum tenuis aristolochiæ, uel hyperici, uel adianthi, uel herbæ lanariæ, uel erythrodani si militer, uel cornus ceruini scobis drachma, cum uino, uel pastinaci syluestris decoctum in uino, ut tertia pars supersit, uel sulphuris uiui drachma in ouis sorbetur. Hæc etiam propter obstructionem arquato laborantibus ualde auxiliantur, seminis autem attriplicis scrupuli octo, cum chrysattico, aut alio passo in solii ingressu poti, uacuationem magnam præstant. Rectè etiam picra datur, & sicca, & ex oxymelite, & Theodoretus. Iam ex amaris amygdalis pastillus datur, & cinamomi quantum tribus digitis comprehendi potest, in mulsi cyatho uno, uel aqua temperata, uel myrrhæ ad fabæ magnitudinem cum piperis granis quinque, tantundemque cinamomi. Qui uero ex calida solidarum partium intemperie in arquatum inciderunt, molli frictione, exercitiis moderatis, unctione & balneis tractandi sunt, cibo humido & mediocriter, refrigerante, cremore prisanæ, intybo, seri, cichoreo, piscibusque, uino tenui aquoso. Qui ex lethali potione, aut ex uirulentorum animalium moribus in hunc affectum sunt prolapsi, de iis quinto uolumine

PAULI AEG. N.

p

tracta-



tractabitur. Porro si bilis in oculos faciemq; se receperit, elaterij inflat erui cū lacte muliebri naribus in balneo instillato, & statim in soliu descendat, cauentes ne caput immergatur. Post balneū uictu, recreatis, rursus medicamentū errhinon in sole, naribus infundito. Bene facit etiā cyclamini succus, porri, & nigellæ. Acerū uero accerrimū naribus attrahat in folio desidēs, cōtineatq; ēt pressis naribus paulisper, & mirifice uacuabitur.

*De umbilico prominente.*

*Cap. LI.*

**C**ausam umbilici prominentis, & quomodo id uitij manu curetur, in parte chirurgica docebimus. Quoniam uerò nonnulli etiā medicanētis in naturalē statū redierunt, ipsa hoc loco dicemus. Aluminis scissilis drachmæ quinque, flocium uini drachmæ octo, rosacei decem, gallæ immaturæ drachmæ duæ. Vino diluta, & in mellis spissitudinem redacta loco affecto inducuntur. Extrinsecus spongia posca madens superiniicitur, & fasciola deligatur. *ALIVD.* Fabæ fredens superiniicitur, & fasciola deligatur. *ALIVD.* Fabæ fredens, corticū gallæ, balauſtij pares portiones, coquuntur in aqua: ubi dissoluta fuerint, tritaque diligenter, spongia, ut prædictum est, imponuntur. *ALIVD.* Plumbi scobis drachmæ sedecim, cicuta, mannæ, cerussæ, hypocistidis succi, singulorum drachma, uino dissolutis in modum prædictum utitor.

*Quomodo impuberes imberbesque diu maneant, & particulae naturales testesque conseruentur, ibidem etiam psilothra numerantur.*

*Cap. LII.*

**C**imoliæ cretæ, & cerussæ æquales partes, alterci succo excipiuntur ut sordium spissitudo fiat, deinde oleo lentiscino quantum sufficit adiecto contundito, ac utitor. *ALIVD.* Cicuta succum, solani, alterci, lupini foliorum tenerimorum, psillij æqualem modū. ubi contriueris, utitor, sed locum prius abstergito abluitoq;. Oportet autem pridie quàm usurpare uelis, aquam bibere. Medicamentum pilis abolendis dicarum, psilotrum appellatum. Asellorum domesticorū, quī tacti conduplicant sese in orbem, pilulæ rotundissimæ similem, græci κατοικιδίης ὀνίσκας uocant, drachmæ duæ, sandarachæ drachmæ quatuor, calcis drachmæ octo, aceti ueteris cyathus. Lixiuia ē ficu tantundē: coquito in fictili, ac in balneo utitor. *ALIVD.* Calcis uiuæ partibus duabus, auripigmenti rotidē, terræ



terræ cimoliæ parte una, in aqua coctis quemadmodum explicum est utitor. ALIVD. Simplex odorisque expers: calcis uiuæ utriusq; sextarium, sandarachæ unciam. Coquito ut dictum est, & utitor. Porro quæ pilus adimant, in ocularijs exposita sunt.

*De ramicum generibus.*

*Cap. LIII.*

**C**um intestina peritonæo rupto deuoluuntur, operosa nimium est curatio, cum uerò ob raritatem illius descendunt, faciliior sanandi ratio est: ac huic malo pueri potius, utpote humidioris naturæ, sunt opportuni, multiq; adeo citra manus operam medicaminibus impositis, & conuenienti deligatura persanati sunt. Utendum uerò est remediis infra comprehensis, ubi hoc solum addiderimus, affectus solo loco differre. Quando nanque intestinum etiam num suprà in inguinibus iacet, nostri inguinis ramicæ græci, *βενονικήλη* uocant. Cum in scrotum iam infrà delapsum est intestinorū ramex, græce *εντεροκήλη* dicitur. Malicorij igitur drachmæ, decæ gallæ imminaturæ drachmæ quinque, in uini austeri cyathis tribus incoctæ, & leuigatę imponantur, intestino prius confricato, & aqua frigida superfusa: decimo die soluuntur, sed ita, ut æger in lecto maneat diebus triginta, bibatq; cupressi decoctum cum uino, uel eius globulorum tres obolos, ex diluta uini potione. hoc medicamentum auxiliatur pueris.

*Aliud glutinatorium.*

**S**ymphyti radice, marrubii succi, amygdalarum amararum, gummi, pares portiones. ALIVD. Terebinthinæ fescuncia, ceræ, thuris, myrrhæ, ichthyocollæ, cochlearum cū suis testis, singulorū uncia, ichthyocolla in aceto diebus tribus ante maceratur. ALIVD. Cupressi, galbulorū uncia, gallæ tantundē, melicorii semūcia, taurocollæ uncia tres, mānæ thuris, semūcia symphyti tantundem, cochlearum cum testis uncia. Galbuli & malicorium uino astringenti diu incoquuntur. Et cum reliquis leuigatis excepta, in usum accommodato. ALIVD. Aloes, malicorii, thuris, hypocistidis succi, glutini fabrilis, picis, bituminis, singulorū fescuncia, uini dulcis qđ sufficit. ALIVD. Magis uarium, facit etiā adultis cum morbus uetustatē nondū senserit: chrysocollæ, taurocollæ, sarcocollę, ichthyocollæ, lapidis Gagatis, lapidis hæmatitis rhus, syriaci, & coriarii, acaciæ



singulorum fescuncia, lapidis pyritis ignem non experti, magnetis coerulei coloris, aluminis scissi, mannae thuris, singulorum uncia, picis brutiae unciae quinque, cochlearum cum testis uncia, argenti recrementi quod helcysina dicitur, unciae quatuor, gallae, squamae stomomatis, aeris singulorum uncia, bituminis unciae sex, Myrsinati quod satis est. Vino astringente arida excipiuntur, Medicamento tam spisso ut digitos non coinquinet, utitor. Quod si iacere non sustineant, triangula ipsos fasciā crassiore, quaeque intestina possit constringere, tuto deligabis. A cibis infantibus abstinendum, uino copiosiore, crebris balneis, ualido motu, nempe cursu, saltu, clamore, & id genus aliis.

*Ad aquosum ramicum qui hydrocele dicitur, ut humor collectus euacuetur.*

**P**iperis grana centum, lauri baccae octoginta, nitri drachmae uiginti, ceræ drachmae quadraginta, olei heminae dimidio exceptis utitor. **ALIVD.** praestantissimum. Lapidis asii floris drachmae sex, uuae passae acinis uacuae drachmae duae. cumini ethiopici drachmae octo, nitri rubri tantundem. Trita imponito, souens uesperis & mane: quidam uero adiiciunt etiam sulfuris drachmas octo. **ALIVD.** Calcem uiua balnei sordibus exceptam cum cerato impones, & paululum nitri calci miscebis. **ALIVD.** Radicis brassicae crematae cinis adipe suillo ueteri liquefacto exceptus inducitur: per triduum soluitur. † Ne autem humoris magna fiat colluies, hoc utere malagmate, Ceræ libris duabus & semisse, picis triente, guttae ammoniaci triente, aluminis liquidi fescuncia. Proficit etiam medicamentum digiton hoc est ex populo nigra & reliqua extrahentia.

† Antiquus codex, πρὸς δὲ τὸ μὴ πάλιν συλλογῇ ἔχει γένεσθαι, Ne autem rursus humor colligatur.

*De inflammatione testiculi scrotique & alijs ipsorum affectibus.* **Cap. LIIII.**

**S**croti inflammatio hisce agnoscetur notis. locus primo contactu indolescit, feruor, duritiesque intensa apparent. Testiculo autem inflammationem sentiente non ex leui tactu dolent affecti, sed innixis ualidius digitis rubor & durities ipsius per summa minor extare uidetur: impressis autem digitis durities in alto occurrit, & febris nonnunquam oritur. Itaque testiculorum inflammationibus proprie conuenit sanguis ex



ex talo dimissus: cōiter aut oībus cataplasmata & cerata. Imponi igit debēt ex lomēto diluta uini mixtione cocto cū uuis passis pinguibus acinorū expertibus cumini, uel hastulæ regiæ radix incocta, cōtritaq; miscet tenuissimæ parti polētæ æquali: uice cataplasmatidis adhibet uel lini semē ex diluto uino, uel fē nigræcū ex mulsa, uel lilij radix ex mulsa, aut recentibus uini flocibus cū polētæ polline. Vel senecion. & coriandrū uiride cū uuis passis quibus acini sunt exēpti. Sin multus infestat ardor, folijs alterci cū triticea farina, aut cicerū obducūtur, uel arundinis folijs, uel cucurbita cruda. Si uetustior est morbus cū duritie, cucumeris syluestris radix in mulsa cocta, leuigataq; cum lolij farina admouetur. Itē hoc efficax est auxiliū, uuarū passerum quibus acini sint exēpti, uncia quinque, cicerū subferuefactorū fescūcia, cumini uncia, sulfuris uncia nouē, nitri uncia, resinæ uncia tres & semissis cōtrita oīa cū melle in cataplasmatidis formā digerēs, utitor. cerata aut hæc sunt, olei cyathus, colophonix uncia sex plūbaginis, cumini, uuarū passerū, lomenti singulorū triens, ceræ sextans. Plumbago cū oleo adusq; alī quantulam spissitudinem incoquitur deinde cera resināq; inditur. Sublata ab igne semifrigida, uuis passis cōtritis, farinisq; superfundito. **ALIUD** Olei anechini & rosacei, ceræ, resinæ piceæ, singulorū quincunx, cumini uncia duæ & semissis, stercore asinini fescūcia cuminū teritur cum stercore asinino, cerarūq; refrigeratū miscetur unaq; leuigatur, deinde in panniculum illitū admouetur, lana superaccomodata. olei omphacini, uel butyri, uel resinæ æquali modo utitor. Quod si à sudoribus ulcerata scroto excitetur, gallā detritam, uel alumen inspargito, pingui aut hircino felli & perungito. Porro ad testes aphtæ ulcere pressos terram cimoliam cum aqua prius illitam, finito siccescere, calidaq; aqua abstergito, myrtum siccam, & smyrnij paulum in puluerem redactum applicato. Si caro in testiculis excreuerit, cinis sarmentaceus nitro & aqua maceratus curat inductus. Pruritu scrotum irritante, nitrum, pedicularia, Græci staphidagriam appellant, alumen liquidum, aceto contritum, rosaceoque, illinitur in balneo Vbi laueris, candidus oui liquor cum melle parti inungetur.

*De seminis profuio & ueneris insomnijs. Cap. LV.*

**S**eminis profuuium quod græcè γονόρροια appellatur, est sinuita, ac præter uoluntatem excretio, quæ continuè naturalibus



turalibus nō intensis, ex retentricis naturæ facultatis imbecillitate prouenit in qua ex usu est cōquiescere, lumbos pubemque hapso ex uino & melino uel œnanthino cōtegentes: mox cataplasmatibus obducere ex palmulis, malis cotoneis, œnante, acacia hypocistide, rhu, & similibus. Insidere oportet lentisci, rubi, & id genus aliorū in uino decoctionibus, uel etiam, aquis cibisq; uti siccantibus: post prima morbi tēpora ad exercitatoriam rationē deducere, qua totū corpus, partesq; affectæ confirmantur. Cæterū quō seminis pareretur fecunditas, libro primo, ubi de sanitate tuēda agitur, abundē tractauimus. Vbi etiā illorum qui uenerē exercere nequeunt, scripta est curatio, itē quæ ad ueneris insomnia proficiant. porrō iuuabit genituræ profluuiū laborātes, & lectus frigidior, & dextri lateris, uel sinistri incubitus, itē medicamēta frigida lumbis substrata, qualia sunt coriandrū, cicuta, cerussa, portulaca: omnia uero ex aceto.

*De satyriasi. Cap. LV I.*

**S**atyriasis est naturalium palpitatio, quæ cuidā seminis uasculorum inflammatoriæ affectioni cum intentione superuenit. Hæc palpitatio nisi finiatur, in seminariorū uasculorum resolutionē, aut conuulsionē delabi consuevit, ac qui conuulsi fuerint celeriter intereunt. obeuntes autē uentre inflantur, & frigidū sudorem emittunt, ac mulieribus quoq; sed raro hoc mali accidit. sanguinē igitur protinus dimittere conuenit, uictu uti tenui, & abstemio, eumq; assumere quotidie, ualenter nunquā, sed paulatim. Laudatissimum igitur est remedium, beta, malua, & mercurialis momentū, & ius esculentum cochlearū: nil mali fuerit etiam ex simplicibus clysterē ab inferiore parte iniicere. Quæ uerō urinā mouent, medicinæ cauendæ sunt, lumbis refrigerantia quoq; ad mouere oportet, ut solani succum, aut portulacæ, aut alterci, aut cicutæ. Necesse uero est, colem, & inter anum, scrotumq; locum refrigerantium, quibus leniendi uis inest, aliquo demulcere, nempe argēti spuma cimolia creta, cerussa, aceto dilutis, aut aqua, aut uino dulci, aut sapa sepino cubitu cōquiescere nocuum est. Rursum confert bibere nimphææ radicē, iridē, & adiantum. Rutæ uero succi potus profuerit, & seminis profluuiū laboranti, & cui naturalia sunt arrecta. Cibus datur frumentaceus modicus, sitis inducitur. At si prorogatur uitium, cucurbitulæ cute ferro incisa defigēdę sunt. Si plenitudo adsit ēt hirudinibus uacuare,



cuare, & uentrē cruda ordeī farina ob linere, alienum non est.

*De priapismo.*

*Cap. LVII.*

**P**riapismus est firmū genitalis incrementū, quod in lōgū latumq; intumescit, citra ueneris appetentiā flatulentus nimirū est spiritus qui particulā in tumorē attollit, ex humoribus crassīs, & uiscosis modici caloris opera procreatus. Notū uero est cuilibet, particulas nō esse calfaciēdas, sed leniter refrigerādas cerato rosaceo, cū aqua cōtuso, itē chamæmelino cerato in genitali & lūbis imposito, uictus & medicamēta exhibent, quæ extenuare citra manifestū calorē possunt. Appli cabuntur ēt quæ naturali modo operātur, experimētis ac usu probatā. Nymphaea igit potui dab ē, uiticis semē: rutæq; uiridis obsonijs mixtū. Sed p initia id nō assūmi debet, ut quod uehemēter calefaciat: uerū post aliorū extenuatiū usum. Si uacuatione uti libeat p uomitū id facies. Nā per aluū factæ, uicinas particulas sæpe fluxioni oportunas efficiūt. Exercitiū fricatioque flatib. discutiēdis rectē adhibētur. Nulli p̄dictorū uenus pdest, nisi quibus ex huius abstinentia semē abūdare conicimus.

*De particulis inefficacibus.*

*Cap. LVIII.*

**Q**ui hoc uitio laborant, non ruunt in uenerem eoq; pusillanimes fiunt. Causa horū est, particularū resolutio, uel seminis inopia. Cū igitur ea quæ semini gerando sunt, libro primo inter præcepta salubria exposuerim, tum quæ simplici uirtute ad uenerē incitant, nunc ualentiora adijcere oportet. Cōmuniter igitur medicamētis quæ à lassitudinibus reficiēdis, acopa dicūtur, ad resolutionē inscriptis, hic quoq; utendū est. Priuatim stellio cōcrematus, in pulueremq; redactus cū oleo magno dextri pedis digito, illinitur, & uenus exercetur: ubi cessare uoles, digitus abluatur. Iā medicamentū ex stellionibus uaria constans mistura efficax est. Potui uerò dantur quæ incitant, quale hoc primū est, piperis, baccarum pini, petroselini, ceruini genitalis ramenti, terebinthinæ pares portiones, melle excipiuntur. ALIUD. Cicerum crudorū, baccarum pini, singulorum uncia duæ, seminis erucæ, piperis, singulorum uncia, mellis datur quod drachmas duas impleat cū uino. Item satyriacæ d. cta ex multis composita congruet, atq; id genus alia. Inspicere præterea oportet reliquas morbi causas, & conuenientem ipsis correctionem accommodare.



*Pudendorum & ani remedia. Cap. LIX.*

**N**aturalium aniq; ulcera circa inflammationem oborta, medicamentis indigent, quæ uehementer resiccant. cuiusmodi sunt ex charta cõbusta, anethũ ustum aridum, cucurbita cõcremata. At siccis recētibusq; ulceribus, etiã aloë præsens est remedium, si arida in puluerẽ redacta applicetur. Porro omniũ leuissimũ est, & nihilominus efficax pōpholyx. At si humidiora euenerint ulcera, picæ cortex per se lapis hæmatites. an etiã altè descenderint, manna prædictis miscabitur. Si pascendo serpant, lenticula cum malicoriis inducitur, utendumq; est Coraco ex phymelite appellato, & bithyno, adhæc, eo quod ex charta usta cõponitur. Rimas autẽ naturaliũ sedisq; Græci uocant rhagadas, iuuat resina fricta, cum rosaceo cõtrita, ut sordiũ fiat spissitudo, adiecto etiã luteo oui, opioq; uel hederæ foliorũ cõbustorũ cinis cũ rosaceo in plumbea pila tritus admouetur. Iã pastillus ex œnelæo, & lapis phrygius admodum probata sunt remedia ad rimas, tũ sordida circa ani orbẽ ulcera, præsertim quæ elidi nequeunt. Aliud simplex quod ẽt acrimoniã obtundit. Cadmiæ combustæ, elotæq; uncia duæ, rosarũ ungue ex foliis defecto, uncia sex. puluis inspergitur parti uino prius austeræ. Ad condylomata uerò faciunt chalcitidis, œsypi, medullæ ceruinæ, rubi foliorũ æquales portiones cũ cerato, idẽ præstāt pastilli ex œnæleo. Quod si in cole intra genitalis foramẽ ulcus delituerit, pus, uel sanguis citra urinã redditus fatebitur. Curatur primũ aquosa mullâ collutum, mox lacte, postea collyrio Asteri lacti mixto, aut pastillo Lenco, aut is qui uocatur dialotarion in plumbea pila subactus demittitur, uel etiam penna tincta perlinitur, inde tenue linamentum tortile unctum imponitur. Præstantissimum uero est etiam quod capit gallæ, pompholygis, amyli, & aloes pares modos, rosaceo, & plantaginis succo leuigatos.

*Ad naturalium dolores.*

**B**Vtyri, resinæ, paribus portionibus pulchrè liquatis obducto, uel ex seminis linis succo, æquum myrrhæ & resinæ frictæ pondus leuigatum imponito.

*Ad intumescencia pudenda.*

**V**itis foliorum tenerorum triginta numero, cerussæ drachmæ quatuor trita applicantur. Cæterum fotu ex aqua marina



rina frigida coles utitor & quiete, penemq; deligato. Carnosas naturalium excrecentias, quas Græci thymos uocant, compefcit, nec finit rursus augescere cinis palmitum cum aceto cataplasmatis modo illitus, item salicis corticis combusti cinis. In uniuersum & thymus, & myrmecia, & uerruca pensilis quæ dicitur acrochordon per medicamenta ualenter exulcerantia eliduntur: ijs autem quæ exedunt, emoriuntur. Propriè contra hæc uitia proficit, elaterium cum sale impositum, grossi cū aceto, nitro & farina. Liqueor fici illitus, smaridis caput salsum crematum in cinerem, ærugo cum sulfure uino combusta, tithymalli liqueor illitus, ocymi folia cum atramento sutorio, uel heliotropii maioris semen cum uino cataplasmatibus modo applicatum.

*Ad ani inflammationem.*

**C**erussæ uncia quatuor, pompolygis uncia, uel cadmiæ teneræ, thuris, singulorum uncia: sereos succi hemina diluuntur, succus autem paulatim affunditur, donec absumatur. Deinde ceratum ex uncijs duabus ceræ, & rosacei libra confectum: ubi deraferis miscetur, ualideq; emollitur. Demittitur autem instrumento quod à pure trahendo πυελικον Græci nominant, & superdeligatur, facit autem & ad ani fissam cum inflammationem sentiunt, item aduersus sedis exulcerationes, cum ardore, aut rosione infestantes.

*Ad sedis erysipelata.*

**M**edicamenti, quod ab herbarum succis diachylon appellatur, libra, rosacei quantum satis est, panis puri libra, croci uncia, opij uncia. crocus & opiū passio macerantur, panis aqua. Deinde leuigatis ipsis, medicamen diachylon, & rosaceum admiscetur, emolliturq;: Vtile est etiam ad podagras calidissimas ALIVD. Arcet etiam ani inflammationem cerussa cum uino rosaceoq; in pila plumbea, & cochleari plumbeo trita inunctaq;, uel cerussam & oui candidum rosaceumq; in eadem pila leuigata, dum sordium spissitudinem habeant, perungito.

*Hedricum ad ani dolores.*

**A**lterci folia tenera, portulacæ folia tenera, micas panis in uino tinctas, ouorum tollorum lutea pari pondere, rosacei quod satis est, ubi locum rosarum & meliloti decocto foveris, cataplasma imposito.

Hedricum



*Hedricum optimum ad ani inflammationes,  
eiusdemque excrescentias.*

**C**erussæ, spumæ argenti, suffiminis ammoniaci, bdellij, singulorum scrupula sex, terebinthinæ uncia, cetæ semuncia. Arida succo solani, alterci, uel portulacæ conteruntur. Quæ liquatur, ubi illis adiuncta fuerint, excipito. Et emolitis rosaceo, utitor. Iam medicamē phicotyche. & dia molibdenes ad hæc diatolarion. Præterea pastillus dia halicabu & dia rodon ad ani inflammationes genitaliumq; laudata sunt remedia.

*Ad excrescentias ani.*

**E**x crescentijs si inflammatio adest, ut edum generatim iam commemoratas, & propriè hoc pastillo, cerussæ quadrans, pompholygis uncia, argenti spumæ sextans, mastichæ scrupula sex, alterci succo excipiuntur. Si careant inflammatione, cupressi galbulorum combustorum cinis loco dolenti, uino prius absterfo inspargitur, uel cucurbitæ aridæ corticis combusti, uel palmularum nucleorum cinis similiter, uel testarū ouorum, & sceniculi cinis, uel succi mali punici foliorum, æqualis modus. Vino albo deterfa pars diebus septem eluitur. callosa autem tubercula calce & auripigmento cum aceto acri trito rectè etiam in sole perungis.

*De hæmorrhoidibus.*

**O**ris uenarum, quæ quod sanguinem fundere solita sint grecis αἱμορροΐδες appellant, iustò largius inanitis, habitum in aquam subter cutem resolui contingit, & affecto, infelicitè contabescere: periculum uero est, etiam ne largum sanguinis profluvium accidat, quemadmodum ne idem in totum supprimatur: unde laboriosa est curatio. Quare cum plures sint hæmorrhoides, unā purgationis gratia relinquere oportet. Quædam uero superius existunt, non apparentes, eoq; difficilem curationem recipiunt. Cæce autem nihil quidem excernunt, sed dolorem mouent acriorem, hæ itaq; succo cyclamini illico adaperiuntur. Contra eas uero quæ immodicè fundunt sanguinem, spinæ ægyptiæ, foliorum sambuci, artemisæ, singulorum uncia quinque, sideritidis uncia quatuor, coquantur in aquæ heminis octo ad dimidias, inde herbæ proiciuntur. aqua uero miscetur pulvis hie cretæ sutoriæ, aluminis rotundi, singulorum



lorum drachmæ octo, argenti spumæ drachmæ quatuor, gallæ drachmæ tres, misyos drachmæ duæ, sereos tantundem. ubi puluerem decocto solueris, septies quotidie irrorato. in secundo die pari modo aliâ confectionem mensura æqualem superfundito: sic tertio. Et si reliquæ aliquæ remaneant, quarto die acucompunges: si sentiat æger, aut cruor emanet, decoctum similiter facit, pulueris uero partem dimidiam miscebis. Cum foueris, puluere attingito, ut exactè adurantur panis ob inflammationem instar cataplasmati inducetur. ALIVD. Panis purus in garum primæ notæ tinctus, ustusq; in nouo fictili, & pertrituss applicatur, ano prius uino abluta. Facit etiam ad excrescētias. ALIVD. Sereos drachmæ duæ, chalcitidis drachma, misyos tantundem, atramenti sutorij quod chalcantum dicitur drachmæ tres, aluminis scissi drachmæ nouem, æris combusti drachma, cretæ sutoriæ drachma sicco utitor. Cibi erunt ijs qui supramodum inaniantur, pauci sanguinis efficaces, & minimè recrementitij, quiq; siccant, & astringunt, cuiusmodi est chondrus ex posca lotus: oryza & alica. Ex oleribus conueniunt intybus, cichoreū, portulaca: inter uina, quæ astringunt. In hæmorrhoidibus autem obocæcatis, his contrarius uictus proderit: potissimum uero loliginum, sepïarum, multipedarum, torpedinis, selachiorumq; elus probè conueniet hæc enim sanguinem commouent, item quæ mensibus ciendis sunt, hisce congruunt.

*Ad procidentem anum.*

**E**Ruca fructus, gallarum cerussæ, acaciæ, hypocistidis succi, piceæ corticis, thuris, myrrhæ mineæ, paria pondera. Sicca admoueto, ano uino prius austero deterfa. ALIVD. Recrementi plumbi, rhus syriaci, singulorum drachmæ octo, rosarū floris drachmæ quatuor, myrrhæ mineæ drachmæ duæ. Utitor sicut priore. ALIVD. Piceæ corticis, mannæ, spumæ argenti, singulorum drachmæ octo, cupressi orbiculorum siccorum, plumbaginis singulorum drachmæ duæ, utitor quemadmodum præceptum est. itē urina ipsius ægri calens adhuc superfusa adiuuat.

*De uteri affectibus & primum de mensium purgatione.*

*Cap. LX:*

**M**ulierum plurimis menses quartodecimo anno fluere incipiunt, paucis uero ante tertiumdecimū, aut duodecimum,



decimum, plerisq; autem post quartumdecimum erumpunt. Tēpus cuiq; purgationi præfinitum nō est, ordinatumq; , multis ad duos trēsue dies , haud paucis usq; ad quintum profluit, aliis etiam ad usq; septimū : raro ad duodecimū purgatæ sunt. Porro desinunt menstrua aliis anno quinquagesimo, paucis autem usq; ad sexagesimum durant. Nonnullis à triginta quinq; annis, præsertim obesis, menses cessare incipiunt morata igitur purgatione, lauandum est circa statum menstruale tempus, ac præsumetur potui, aut sesamū, aut capitatum porrum cum pipere, & ruta simul incocta. Potio autem ex passo cretico erit, cuius heminæ mensura pota ambulationibus menstrua dimoueantur, Cibus sit, lolligines, sepia, polypodes, & quæ eiusdem sunt generis: quippe sanguinem propriè commouent.

*De mensium suppressione.*

**S**Vpprimitur menstrualis purgatio, interim toto corpore male affecto, nonnunquam uero locis peculiari uitio constantibus ex frigidityate insita, aut ictu, aut intemperie ab origine, seu acquisita malignitate magna uero parte ex abortu: uel principaliore quadam parte primario affecta, nempe iocinore, aut uentriculo, aut thorace, aut id genus aliqua, longo morbo uitiata. At suppressio complures affectus, & longos solet procreare. Cum igitur propter aliquod interaneorum affectum primarium purgatio circunciditur, aut moratur, ex usu maximè fuerit, id quod primario afficitur curare, inde uteri habere rationem. Notæ uero quibus hæc deprehenduntur, in superioribus sunt expositæ. Cum uerò nihil illorum adfuerit, constat palam primario affectu uterum occupari. Itaq; si ætas non prohibet, aut habitus, aut aliud quippiam, uenā oportet incidere, idq; non ante statum mensium tempus: sed ubi iam præterierit, decem dies superadijciantur. Detrahetur autem sanguinis, neque plus duabus libris & dimidia, neq; minus una, si quidem uenam diuiserimus. Sin autem non, niēra diacolocynthidos purgari debent, duarum drachmarum pondere, in sex mulsæ cyathis. Si febris adsit, hiera quidem uti non expedit, uerum sanguinem mittere in primis febriculæ diebus est opportunum. A purgatione reficiendæ sunt mulieres diebus pauculis: in sequentibus autē, exercēdæ obambulationibus, inferiorum frictio, & balneo. Cibi congruunt distribui



diſtribui faciles, & liquidi, olera, dulcia omnia, piſces ſaxatiles, ex auiſus teneriores, lactis potio, ex melle confectiones, μελιτρώματα uocant, uinum tenue, album, non adeo uetuſtum. carnes inidoneæ his ſunt, & legumina, præter pſiſanam. Vbi ſtatum menſium tempus propinquum eſt, dantur ex marinis ſelachia, & malachia, ut dictum eſt, item oſtracoderma, hoc eſt reſſaceam cutem ſortita, capitata porra, cum ruta & pipere cocta, eorumque ius potui datur: infernæ partes uinculis, tribus quatuorue diebus conſtringuntur. Cum inſtat tempus purgationis, tollitur deligatura, myrrhæ obolus bibitur, aut fabæ inſtar, uel caſtorium ex paſſo, aut muſſa, uel decoctum artemiſiæ, aut ſaluia poſt balneum ex paſſo, & abſynthii. A hſynthites autem uinum per totius curationis decurſum potatur. Vbi acceſſerit iam menſtruale tempus, ſi nihil, aut nulla mentione digi-  
gitum fuerit excretum, ex talo ſanguis detrahendus eſt. Poſt ſeptimum, aut octauum diem, purgatione ex hiera utendum eſt, ſecundum quartum diem, dropax inferiori uentris regioni lumbis & feminibus applicetur, atque aquæ potu triduum uſa ſinapi cuni aqua panis macerati portione aduſque æquinoctium admoueat, deinde lauet, in ſecuto menſe ficus ſiccata in uicem panis miſceantur decocto ſcœnugræci, maluæ, pulegij, rutæ, & artemiſiæ. In ſinum uero demittetur, ſuſinum, aut amaracinum, peſſusque inferatur ennepharmacus, aut libaninus. Eſt autem peſſus lana concerpta, & in rotundam, digiti humani formam redacta qua medicamenta cõtineantur. Hæc igitur curatio plerisque ad purgationem abunde fuit. ſi autem uehementioribus indiguerit medicamentis, hæc ſunt, iris illyrica cum uino pota, iunci anguloſi, ariq; radix, caſſia, iunci rotundi flos, & nardus, helenii radicis decoctum, myrrhæ ad fabæ Græce magnitudinem cum paſſo ex dimidio muſſæ cyathopotat, atque dictamni decocti cyathi duo, item ammoniacum, & ſagapenum. Quæ minus ſtomachi uitiiſ ſunt opportuna, etiam opopanacis paululum in globulos redactum per decocto melli intinctum, aſſument. Iam uerò conſueta nobis ſemina menſes mouere poſſunt, ſed minus: ſcœniculum, cuminum, apium, daucum creticum, ſeſeli, amiſiſon, cicer, fructus cedri, ac omnia quæ urinam prouocant. Commode etiam ſinni muliebrium imponuntur myrrha, abſynthii, aut lupinorum decocto trita, aut rutæ ſucco leuigata, bdelliumque ſimiliter, ſtyrax, Tylictris.



syluestris oleæ gummi, aut rutæ succi itidem, aut longa aristolochia, in collyrii formam concinnata. Per similitur etiam magnicentaurei radix, aut ueratri, aut liquor scammoniae, & cucurbitæ syluestris medulla per se, & artemisia applicata cum ruta, insuper & galbanum suffumigatum. Eadem uero & foetus solent educere.

*De immoderata purgatione uteri & sanguinis  
profluuiio. Cap. LXII.*

**I**mmodice purgationes mulieribus oboriuntur, interim mensibus adactis confarctimque; ac concitatus erumpentibus, interim ob legitimum partum quæ plerumque etiam sponte sua cessant: Crebro autem abortus causa, uehementi laborant profluuiio, ut subinde periculum accedat. Imprimis igitur extremi artus ab alis & inguinibus, uinculis excipiuntur. Posca non frigida potui datur, muliebria ex eadem fouentur, & iniiciuntur locis multæ lanæ, ex uino, oleo, uel rosaceo, uel melino, uel myrteo expressæ. Cibus dabitur chondrus lotus ex posca: uel oryza, uel alica: uino autem abstinebitur, & hydromalum austerum, aut omphacomeli, aut huiusmodi quippiam ipsis exhiberi debet. Balaustrum in posca propinari, uel hypocistidis, uel acaciæ succus, uel lycium, uel samius aster, uel succus immaturæ uue siccus, uel rheon, uel lenticulæ ex Italico fictili combustæ cinis: aut sesamum editur in posca maceratū, quoad molle delicatumque euaserit: insinuati uero pessi per naturalia, sanguinis fluorem sistunt, hypocistidis succus, aut acaciæ cum manna in aceto contritæ. Mirifice auxiliatur sponsia in uino, aut liquida pice demersa, pessarii modo adhibita, uel combustæ ipsius cinis cum aceto, uel posca eodem modo insinuatus. Similiter etiam suberis in Italico fictili concremati cinis. A foris autem imposita iuuant astringentia epithemata, & cataplasmata ex palmulis, & cotoneis: quæ malicoria receperint, aut fageam glandem, aut rubi surculos, aut lentisci folia, balaustrum, acaciam, hypocistidem, gallæ modicum, alumen. Maxime uero hoc, taurocolla madescit posca, quousque soluatur de inde in linteolum ualidum illinitur, lumbisque agglutinetur. Efficacia ad hoc sunt, & glutinantia emplastra, ueluti Armonia, Icesios, Athene, Meline, Indica, & similia. Pessulis quoque ad sanguinis profluuium uti oportet. Gallæ interius leuigatū, & thuris



& thuris lachryma aqua diluta naturalibus inseritur, uel cytini, uel mala punica dulcia similiter, uel polygonū tritum. Composito autem, aluminis scissi, gallarum interioris, acaciæ succi, mannæ, singulorum uncia quatuor, ouorum tostorum lutea quatuor: arida leuigantur succo plantaginis, miscenturq;. Cū usus exigit, excipiuntur in pessum ex lana, & in rosaceum intinguntur, insinuantq; naturalibus. Iam cucurbitulæ leues magnæ frequenter subrer māmillas affixæ abundè retrahunt. Infessus autem profluuius sanguinis laborantibus cōuenit, ex marino iunco, Græci uocant oxyechœnum, capitibus myrti, rosis, rhamni folijs, rutæ furculis, æquali pondere in aqua coctis insidere iubeto. **ALIVD.** Mali punici dulcis radices corticis, myrti, cupressi corticis singulorū tres partes, gallæ pars una, aquæ quod satis est. Infundito autem per uterinum clysterem succū plantaginis, aut sereos, aut polygoni, aut solani, aut perdicij herbæ, aut psyllij, aut hypocistidis, aut acaciæ, eaq; lana aut digito, aut specillo, aut pinna in longitudinem figurata, adusque orificium imponatur. Insuper pastillus Andronis per uterinū clysterem infusus cum quodam ex succis commemoratis, aut uino astringente efficax est remedium.

*De fluore muliebri.**Cap. LXIII.*

**V**lva fluor, totius corporis quod expurgatur est distillatio: Talē uerò speciem id quod euacuatur, repræsentat, qualem etiam humor in corpore superans obtinet. aliud rubrū, ueluti sanguinis sanies, aliud candidum, piritæ solum est, pallidum aliud, quod bilem testatur, aliud uero aquosum, at si sanguis purus, sicut in uenarum sectione, effertur, attendendū est accuratè, ne quædam in uulua erosio sit excitata. his notis fluor deprehenditur, loci continuè madent humoribus, colore uariantibus, laborans decolor est, cibum non sentit, eumq; fastidit, in obambulatione difficulter, spirat, oculos habet prætumidos, nunc cū dolore, nūc citra illū, aut cū exulceratione, aut sine illa, aut inflammata, aut sordida, aut pura. Torigitur corpori auxiliatur quæ citra manifestū calorē exiccant, cū affectus sit humidus, frictio totius corporis, & unctio ex melle abunde cocto, medicamina dantur urinam cientia, utpote aqua, cui asarum & apium sit incoctum: uacuatur etiā totum corpus per aluum: præterea portulaca commanducata, succusque



cusque ipsius potus praesidio est. Item balaustium, rubi fructus & flos, quercus liber qui cortici ligni subiacer, & tunica glandis putamini subiecta. Equisetum maximè sistit rubrum fluorem, potum ex aqua, aut uino. Vel hypocistis, lentisci fructus torrefactus, cum uino sumptus, samius aster, lemnia sphragis, coagulum leporis, aut hœdi, aut ovis, aut uituli, aut cerui, uinacea trita, myrti, uua immatura sicca, piceæ correx. & quæ ad uulnam sanguinis profluuium laborantem dicta sunt, non admodum efficacia. Vbi uero cum labore fertur, per siphonem uteri, clysterem uel alicui succum, aut tragi, aut oryzae demittes cum aliquo medicamentorum quæ dolorem sopiunt, αἰσδυα Græci uocant: & in accessionibus quidem lenire oportet: cum autem remittit, circuitum enim nonnunquam habet, habitum corporis mutare noxium humorem euocando expedit uariis gestationibus, obambulationibus, uociferatu, inunctionibus, cucurbitulis, dropacibus ad partes superpositas uinculorum iniectionibus, frictionibus, psilothris, smegmatis, sinapismis, uomitibus à radícula uictus ratione uiribus recolligendis dicata, balneis, uino, uario ciborum genere.

*De inflammatione uteri, & declinatione. Cap. LXIII.*

**I**nflammatiō uulvæ, pluribus ex causis oboritur. nempe ex ictu, mensium retentione, frigore, & inflatione: adeoque ex abortu, & ob sinistram partus æditionem. Comes inflammationis uulvæ est febris acuta, dolor capitis, tēdinis basis oculorū, brachialis, digitorū, & colli deorsum retractio, declinatio ad opposita stomachi ex consortio dolor, oris uulvæ conuiuentia, pulsus exigui, crebriq;. Et si languida fuerit inflammatio, haud ualido ipsius uteri dolore torquentur. Sin uehemens, & ipse totus pulsatile cruciatum percipit, undiquaq; inflammatione obsessus. si pars ipsius illā sentit, in ea magis dolor intenditur, nam si posteriora ipsius solum laborent inflammatione, dolor lumbos inuadit, stercus longanone cōpresso, retinetur. si priora dolor inferiorem ab umbelico uentris regionem occupat, & stillicidiū, aut urinæ difficultas uesica pressa excitatur, lateribus inflammationem expertis inguina tenduntur & crura grauantur. Extrema ad fundum uteri parte inflammata, in umbilico dolor potissimum cum tumore infestat. Cum uero os uulvæ inflammatio affligit, in abdomine dolor est, digitorūque



toque immisso os occurrit durum rigidumque. Itaque in curatione primum usui uenit fortis ex uino & oleo, uel uino & oleo rosaceo super infernam uentris regionem & lumbos per hapsum ex lana puriore eitra deligaturam adhibitus. Cibo astinetur triduum, secundum quod sanguis ex cubito mittendus est, si nihil prohibet. alendæ sunt chondro ex aqua, mulsæ, uel pane, uel ouo scorbili, uno die interposito. Post quintum, cataplasma superaccommodatur, polline farinaceo, semine lini, fœnugræco, ex mulsæ, in qua papauerû capita decocta, reiciantur, & oleo. at si inflammatio erysipelatis naturâ sortita excandescat, meliloto in passo cocto tritoque; ouorum tostorû lutea adiecto cum rosaceo, uel melino, uel crocino, & cataplasmatibus modo adhibeto aut palmulas uino temperato feruefactas, cum polentarum polline, & quoddam ex enumeratis unguentis leuigato, applicatoque; in morbi declaratione ceratum nardinum, aut cyprium iniiciendum est. Per totum uero morbi decursum, etiam in sessus utiles sunt ex decocto fœnugræci uel seminis lini, maluæ, artemisæ, & oleo. In iis autem quæ non sustinent calorem, ex aqua calida rosaceo super fuso, pessos autem in unctionesque adhibere conuenit ex œsypo, butyro, medulla ceruina, adipe anserino unguento susino, & cera chyrrenica. in quibus autem calorem ferunt, etiam pessus qui ab aureo colore chrysus nuncupatur, ipsi conueniet, item enneapharmacus, rursus in quibus non tolerat, ex ouo rosaceo, adipe anserino, uel gallinaceo adaptabitur. Porro ad inflammationes magis furibundas emplastro dia chylon quod est ex herbarum succis in uase fictili cum rosaceo liquefacto. miscetur succus plantaginis, uel fereos, uel cichorii, uel intybi. Aut hoc utere, adipis anserini, uel suilli recentis drach. quatuor cerati rosacei, uel susini sextantes, ouorum tostorû luteorum unc. croci drach. myrrhæ tribus obolis, opii obolis duobus, uel loco opii, papauerum capitum decocto, si dolor multus ex cruciat, lachrymæ papaueris instar lenticulæ cum lacte muliebri, & succo fœnugræci in pello subiciendum exhibeto. At si inflammatio cum duritia infestat, tetrapharmacum rosaceo solutum, applicatur, uel iufunditur. Si a naturali sede uulua declinauerit, per accessiones simile inflammationibus curationem recipiet. ubi uero remittitur dolor, & declinat, leuioribus utendum. Quod si malum inuenerit, noxia ex alto euocantibus utendum, quæ metasycritica dicunt. Exrinsecus autem duritiæ oborta, malagmatis pugnandum,

PAULI AEGIN.

q

nempe



nempedia melilotu, hoc est ex sertula campana confecto, item Mnafai, celi, melinæ Serapionis, aut pyrinæ, uictus aut per initia tenuis adhibetur. Vbi paulū declinauerit malū, ægrotantes ad balneū ducentur, uarioq; magis cibo & pleniore nurriendi.

*De uulue abscessu.*

*Cap. LXV.*

**I**Nflammatione in abscessum transeunte, dictæ quidem notæ intēsiore erunt. Præterea uero inordinatæ febriū cum horrore accessiones obuenerint primis quidem temporibus intensæ, cum doloribus ad ultimum, ubi suppurauerit, aliquantulum remittūt. Postquā uero erumpit uomica, dolores aciores subinde uisi sunt ceu lancinantes & punctus modo incidere, febriculæ uehementius infestant. Atq; urina nonnunquā retinetur, nonnunquā stercus, impedimento ab affecta uteri parte facto. Alias tumor in pube eminet, & ueluti exundationis sensus cum abscessus maior fuerit. At quod in expositis locis est, etiam instrumeto ad perspicendum iniecto, aut digitorū tactu deprehenditur præterquā quod dolores ob neruosam oris uulue membranam aciores urgeant, sicut infundo sinuq; minus doloris percipitur, & digitis quidem tumor non occurrit, os autem gracilius ostenditur. Suppuratio itaq; celerius ad iuuāda est cataplasmatibus ex fœnugræco, semine lini farina hordeacea, ut frumentacea, cui ficus coctæ adiciantur interim & stercus columbinum. In scellibus etiam ad inflammationem aptis frequentius utendum. Item pessulis ex terebinthina, myrrha, æsype, butyro conuenit. Abscessus autē rupto, si ad uescicam pus euaserit, lactis & cucumeris seminis potu utendum est, si ad longanone ruptus sit, lenticulæ & malicorii decoctum indetur aluo. At si in sinum pudēdi eruperit, mundum quidē a pure, rosaceum infundetur, aut cādidum oleum, aut tetrapharmacum regale, aut butyrum recens. Si autem offeratur sanies tenuis, fœtida, ceu ab ulceribus depascētibz, magis astringēs erit enema ex myrto, palmulis, & lenticula. Si uero humoribus etiam ex cietis, inflammatio diuexet, persistere iu cataplasmatibus, & in scellibus, ratio est. Cœterum si in uulue ostiolo abscessus sit obortus, neque rumpatur, partibus, quæ puri incumbunt, extenuatis, ad puris excretionem, quæ manu administratur



tur, diuertere consiliū est, ut in chirurgica pertractabimus.

## De ueri exulceratione.

## Cap. LXVI.

**E**Xulceratur subinde unlua ex infelici partu, aut fœtus extractione, aut eius corruptela, uel ex medicamentis acribus uel fluore, uel abscessibus diruptis, si igit̃ prompta in conspectum uenerit exulceratio, instrumento locis inspiciendis idoneo deprehenditur. Sin alte defederit, ex iis quæ excernuntur. Humor enim diuersus excernitur, ex inflammato quidem ulcere, paucus, cruentus, aut fœculentus cū magno dolore, ex sordido autem copiosior, & sanes cum minore cruciatu, depascente, fœtidus niger cum doloribus uehementioribus, aliisq; inflammationis signis, iam quæ laxant medicamina irritant, contraria leuant. Cum purum ulcus est, humor paucus, equalis, odoris expers, crassus candidus, cum sentiendi facilitate habetur. Si inflammationem experitur ulcus, iis quæ ad illam scripta sunt, utendum est. Sordidum, ptisanæ cremore cum melle illuendum est, aut terra pharmacum iniciendum, cum susino, uel mulsâ, in qua fœnugræcum sit decoctum, aut malua, aut furfures, aut lenticula cui cortex sit detractus. Porro quo magis expurgeretur, etiam marrubium, aut eruum, uel melli adiuncta erui farina uel iris, uel alumen rotundum, uel aliquid simile inspergatur. Hæc ipsa etiam extrinsecus, ex mulsâ macerata, instar cataplasmat̃ illinuntur. Peculiaris prodest hoc medicamentum. Crocus primæ notæ leuigatur cum lacte muliebri, deinde exceptus cerato rosaceo, cum adipe anserino inungitur linteolo, uerum quod infra ponitur, isto quoque efficacius dolores discutit. Capita papaueris in passo temperato madescunt diebus tribus, deinde incoquatur, donec intabescant, postea feruntur una cum rosæ foliorum drachmis quinque, croci drachmis tribus, iure capitū papaueris admisto, inde ceræ cum rosaceo liquatæ drachmæ duæ ipsis superfunduntur, ac in pessulo subiiciuntur rosaceo perunctis. Salutare est etiam medicamen ex ouis, croco, rosaceo, apipe anserino, cerui medulla præparatum. Item Aegyptia citra æruginem mirifice ad exulcerationes conducit † ubi autem pascendo serpunt ulcera cum inflammatione quidem obducitur panis tepida maceratus, ex hydromelite, oleo, althææ fœ-

q 2      nigræco,



nugræco, palmulis pinguibus. Iniicitur autem plantaginis succus, solani, polygoni, & fereos primum per se, mox cum uino austero aut aceto. At citra inflammationem, si urgeat depastio ualentiora iniicientur, ueluti decoctum malicorii, rosarum, summitatis oleæ, cupressi, malorum cotoneorum, rubi, myrti, lentisci, rhammi, rhus, coriarii ex uino astringente, postea uero aluminis, acaciæ, lycii, hypocistidis, ex eisdem uero decoctis parabitur etiam infellus. Si nihil proficitur non alienum fuerit medicamen ex charta cum posca primum demittere, deinde cum aceto, aut Antheram, aut chalcitidem, aut attramentum sutorium, ex eisdem liquoribus, & quæ dysentericis congruunt, cibus dandus boni succi, modicus. Purgato ulcere, ægrotans balneorum ciborumque uarietate sollicitari, uinoque refici debet, quo caro statim procreetur. Pessili loco subiicitur medicamentum diamoron, hoc est ex moris, remissum cadmia, uel ladano uel plumbagine. A foris autem emplastrum, quod cicatrici ducendæ est, abdomini coxisque imponitur. Quæ admodum enim cataplasmatum, ita etiam emplastrorum facultas per latentes meatus traducetur.

† Hic locus sic legitur in antiquis codicibus. *νεμῆς δὲ οὐσῆς συν φλεμονῇ μὲν καταπλαττέον ἄρτω καθαρῷ πεφυραμένῳ δὲ ὑδρομέλιτος*, ubi autem est nomē cum inflammatione induce re cataplasma oportet ex pane puro subactō ex hydromelite.

*De cancro*

*Cap. LXVII.*

**C**ancrorum uulux alii cum exulceratione, alii citra ulcus inuadunt ubi igitur exulceratio non est, tumor in uulux ostiolo reperitur durus, inæqualis, prætumidus, colore sæculentus, subruber, interim subliuidus, ac uehemens dolor exercet inguina, abdomen, imum uentrem, & lumbos ad manus contactam, uariamque medicinam excandescunt. Eryulcerato autem cancro, præter dolores, durities, tumoremque, ulcera erosa ac inæqualia conspiciuntur, plurima ex parte, fordidā, labris prætumidis, albicantiā, turpem humorum colluuiem concretam habentia. Quæ uero puta dicuntur, sæculenta, liuida, subrubra, & cruenta apparent, sanies inde manat continuo tenuis, aquosa, nigra, aut ruffa, grauiter olens. Interdum uero sanguis defertur. aliaque notæ in uulua inflammata expositæ. Itaque affectus nulla medicina sanatur. Quemadmodum



modum etiam Hippocrates pronuntiauit, lenire tamen est in  
fessibus ex fœnugræco, malua, ac cataplasmatibus similibus. Infi-  
gniter autem leniunt, solanturque in accessionibus malua, aut  
althæa in mulsâ intabescens, & rosacei paululo leuigata, & ap-  
plicata. Ad hæc cataplasma ex ficis siccatis melilotis, ruta, thu-  
re, buniade herba diligenter cum oleo contusa. Item quod con-  
stat palmulis in passo coctis, cui adiecta sint ouorum lutea, po-  
lentaque, uel ex papauere cum coriandro, aut polygonio, aut  
seri. Hæc in doloribus usui sunt, Postea ceratum iniiciatur  
ex rosaceo, aut mirteo, aut œnanthino, aut melino, cum pal-  
mulis in passo coctis, proprie uero conuenit præparatum ex  
amurca in uasæ æneo collecta, quæ torrefacta leuigatur, & ro-  
saceo, cerato, adusque emplastri spissitudinem excipitur, hæc  
quidem extrinsecus conferunt, intus autem oleum quoque le-  
nit, ubi fuerint exulcerati, item lac muliebri infusum. Pars mo-  
do succus plantaginis tepidus. Sin cruentum sit, succus poly-  
goni cum thuris modico dolorem sopit. Ad hæc pessuli ex cro-  
co, muliebri lacte, lachryma papaueris, & œsypo. Omnibus au-  
tem efficacius est etiam ad sedis affectus medicamentum quod  
recipit, Argenti spumæ Italicæ lotæ selibram, thuris masculi,  
œsypi, adipis suilli recentis, butyri recentis, ceræ thyrrenicæ,  
singulorum sextantem, rosacei trientem. Argenti spuma ex  
sereos succo trita, liquatis iniicitur. Cibus dabitur qui facile  
in corporis membra queat distribui, bonique succi, pinum pau-  
cissimum, aquosum, acrium esus, & alimenti copia uitanda est,  
ut quibus cibi prompte corrumpantur.

*De scirrho & duritie.**Cap. LXVIII.*

**S**cirrhum contrahit uulua, alias repente, ut nulla causa eui-  
dens præcesserit. plerunque uero eundem inflammatio mo-  
uet, quæ nec soluta nec in abscessum mutata fuerit. At scir-  
rhorum, genere comprehenditur etiam durities, quam

Græci uocant, circa uulvæ cervicem potissimum obue-  
niens, tumorem quidem pari modo repræsentans, sed minus  
actui renitentem & cum mediocri dolore. Comitatur autem  
hos quoque uteri in opposita declinatio † & tumor qui ratio-  
ne deprellionis ut uehementer remittitur, cum gravitate, mo-  
tuque difficili, non crurum modo, sed totius etiam corporis, at-  
que obcundis actionibus pigrizia. sequitur non probe curatas,



malus corporis habitus, aquam inter cutem representans. Per initia igitur sanguis educi, aut purgatio ex hiera Archigenis, assumi debet. Deinde cataplasmata ex caricis, æsypo, nitro, absynthio, & cucurbitulas cute ferramento incisa admoovere consilium est. Malagmata uero hæc, Polyarchion, & diaspermaton hoc est ex seminibus confectum, & quod baccis lauri constat. Infessus ex caricarum decocto, artemisiæ, pulegi, althææ, pessulos ex terebinthina, galbano, myrrha, iride, æsypo, dropace, aquas naturales sulfurosas, bituminosasq; usurpare commodum fuerit, si uires constant, etiam helleborismus conuenit.

† Vetus liber. ὁ γὰρ πρὸς λόγον τοῦ πλῆσεως ἰσχυρῶς ἀντίτυπος, idest, tumor ratione plenitudinis uehementer resistens.

*Pessulus emolliens.*

**C**eræ ponticæ nardini unguenti, singulorum quadrans, irini, gleucini, cyprini singulorū uncia duæ, adipis ursini asferiniquæ, botyri, æsypi, medullæ ceruinæ, terebinthinæ, singulorum uncia. A L I V D. Polii drachmæ duæ, myrrhæ drachmæ quatuor cum uino Mendefio tritum irinoque imbrum subiicitur. A L I V D. Ceræ thyrenicæ, adipis uitulini, terebinthinæ, medullæ ceruinæ, mellis attici, olei ueteris pares modos. Medicamentū noxia euocans quod Græci dicunt meta syncreticon, & ad inflationes, uuæ passæ candidæ sine asinis, uncia tres, rutæ uiridis foliorum uncia duæ, aquæ marinæ fescuncia, cymini drachmæ quatuor, mellis quod sufficit. Inunctum uero pessulū cyprino oleo immergito, & suabiicito. Præterea Chrysis ab auro sic dictus pessulus Libaniusq;, & Enneapharmacus affectui sunt utiles uerum Titianus his magis accommodatur.

*De mola.*

*Cap. LXIX.*

**M**ola quoque induratus est tumor, interim in uulua ostiolo, interim etiam per totam ipsam prominet, tactu lapidis duriciem refert, ita ut ea & quæ superiacet deorsum trahantur, corpus emacietur, color prauus appareat cibi fastidium urgeat, menses supprimantur Mamillæ inturgescant, ut in quibusdam per initia, de fœtu concepto sit suspicio. Insecuto autem tempore discernuntur, nonnullæ uero aquæ inter cutem præbent opinionē, sed hoc intercedit discriminis



minis, quod tumor durus sit, nec sonus fiat cum digiti iniiciuntur, quemadmodum in morbo hydropico. Cum autem intenditur, in aquam subter cutem reuerta degenerat. Nonnunquam etiam insanabilis magna ex parte affectus redditur, quibusdam & sanguis erumpit. Itaque decumbere in domuncula angustiore minus luci exposita, modice frigida cubili immobili, omnibus ex æquo confert, sed ita ut pedes habeant clariores quiesque. Nam motum quamlibet fluxionem concitat. Ac tumores duritiasque iis remediis quæ in scirrhis & duritiis, uulvæ dicta sunt, persanabimus. Porro hydropicas suffusiones, illis quæ in capite de aqua intercute comprehensa nobis sunt sanguinisque eruptionem, ut etiam fluorem muliebrem curabimus. Ceterum sunt qui molam carnem asserant informem, ipsis uulvæ tunicis adhærescentem, foetus modo in lucem edi. Atque hæc morbi species uictus ratione laxante tractabitur, quo citius excutiat.

*De inflatione uulvæ.**Cap. LXX.*

**I**Nflatur uulva ex frigore, uel corruptione foetus, uel ex ægro partu ostiolo conniiente, uel sanguine in grumum intus coacto. Alias spiritibus in concauo ipsius spatio conceptis, alias in raritatibus uulvæ corporis, quas tumor pubis & imi ventris comitatur cum duricie & dolore punctorio, qui ad septum transversum usque & stomachum inguinaque pertingit, ac sonitus digitorum impulsu tympani modo redditur. Auxiliatur ergo primum sanguis demissus, si nihil obstat, mox in accessionibus inedia, fomentaque ex oleo rutaceo adhibentur, infusus ex rutæ pulegii, artemisii, cassiæ decocto, similibusque, cataplasmata ex semine apii, cumini, anisi, ameos, farina lolii. Adhæc cucurbitulæ, tum leues, tum cute incisa affixæ. At si diutius uitium se prorogauerit, purgatio ex hiera picra utilis est, dropaces sinapismi, & aquæ naturales. Obstetrix autem prius digito peruncto inserto grumum incumbens si contingat, auferet, leniter ipsum dissipans, rursusque admovebit cataplasma, ex ficu, nitro, & absinthio. At epithemata molentia erunt, Polyarchion, dia spermaton quod est ex seminibus, & diadaphnidon, ex baccis lauri præparatum. Præterea pelli ex ruta, melle, & nitro. Maxime uero hic conducet,

9 4 ficuum



ficuum pinguium contusarū drachma, cumini drachmæ duæ,  
aphronitri drachma at acrimoniæ causa, in lac prius immer-  
gatur. Iam emollientes pessuli sunt huic uitio accommodati.

*De uulua strangulatu*

*Cap. LXXI.*

**S**Trangulatus uulua ad superiora recursus est, quæ princi-  
palissimas partes in doloris consortium perducit, utpote  
arterias quas uocant carotidas, cor, cerebrique membra-  
nas. Comitatur affectus, cum accessio propinqua est, torpor  
mentis, pigritia, crurum imbécillitas, pallida facies, aspectus  
oleosus. Cum iam instat strangulatus, grauis sopos premit,  
quæ cataphora dicitur, mens desipit, sensuum instrumenta de-  
prehenduntur, impediunturque, uox obmutescit, crura contra-  
huntur. deinde maxilla rubere incipiunt, faciesque repletur.  
Cum remittet, humiditas quædam ad tactum ex locis mulieri-  
bus præcedit, uentrisque strepitus, ac aliquod ex interaneis pro-  
progreditur, ipsaque uulua paulatim laxatur, atque sic mens ip-  
sis, & sensus redit. Cæterum morbus iuxta circuitum moue-  
tur, sicuti comitialis, idque nimirum uulua repleta, aut seminali,  
aut alia materia, qua intus cõputruerit, ac multæ rursus a mor-  
bo sese recolligunt, nonnullæ uero in ipsis accessionibus perie-  
runt subito, quibus pulsus quidem crebriores, & inordinate in-  
tercidunt, deinde etiam in totum abolentur. Modicus uero hu-  
mor superficiem irrorat, respiratio primum languida est, mox  
in totum abscinditur. Porro uitium hoc hyeme & per autum-  
num magis infestat iuuenulas ad uenerem proclues, steriles  
& potissimum si ex medicina sumpta fuerint infœcundæ, item  
alias perfrictiones expertas. In accessionibus igitur summa de-  
ligare, conuenit, crura tota, corpusque totum perfricare, ut ani-  
mo destitutæ sese recipiant, item quæ fœdioris sunt odoris, na-  
ribus oportet admouere. Exempli gratia linamentum ex lu-  
cerna extinctam, castorium, picem liquidam, cedriam, lanas &  
lacinia combustas. Quidam uero & matulam naribus admo-  
uerunt cum urina ueteri, uel deiectione cucurbitulas adgluti-  
nare uincit inguinibus & imo uentri cum multa flamma, & le-  
ues & cute incisa. Quod si longius accessio se produxerit, etiã  
quæ flatibus educendis sunt, proficiunt, ut quæ colica dicun-  
tur, ano subiecta nempe cuminum, nitrum tum melle. Item  
stercus



stercus clystere subducere profuerit, ne illorum appositu sedes prematur. In uulnam uero unguenta odoratissima iniusa, ipsam solent detrahere, sicut amaracinum, malabathrinum, ac sinapi, partim naribus offeratur, partim applicetur pedibus. Deinde inclamabit aliquis ipsas uoce asperiuscula, excitabitque, & ea admovebit, quæ per sternutamenta euocant, ex castorio, stuthio, & pipere. ubi accessio conquirit, uomitum cogere, cibum nullum aut paucum præbere oportet. A septimo die, purgatio ex hiera diacolocynthidos dabitur, post triduum cucurbitulæ defigentur lumbis & illis. Mox castorei portione utemur, nunc artemisæ decocto, nunc ex mulsæ, in quibusdam enim hoc uel solum ad integram morbi curationem abunde fuit. In scissus porro & pessus molientes his adiunguntur. Atque hæc ad accessiones prochiunt, uerum ut totum corpus reficias, a sanguinis dimissione auspicatus, ad purgationem ex hiera transgrederis. Inde picran ex aloe factam exhibes drachmæ pondere cum tribus aquæ mulsæ cyathis, diebus continuatis, uel interpositis mensura duarum drachmarum, cum senis aquæ mulsæ cyathis. Iam dropacismos, cucurbitulas, & sinapismos utiliter applicas, nec non acopa ex euphorbio. Postea exercitiis uti, frictione & uocis exercitio prodest, denique & aquis naturalibus.

*De uulvæ procidentia.**Cap. LXXII.*

**V**ulva procidit raro quidem, sed multis occasionibus, uel enim ab alto delapsa, & in coxas firmata, membranis, quæ interaneum id continent, ruptis, aut extractione secundarum simul ipsam extrahentium, ut quæ eidem adhærescant quemadmodum in partu difficili, uel indiligentius imperitusque; extracto fœtu, uel ex uulnere, uel aliqua animi perturbatione, scilicet nunciato filiorum interitu, aut hostium insultu, aut periculosa nauigatione, aut eiusmodi quadam causa. Ut cum tota corporis mole soluta, uulva simul sit deuoluta uel ob resolutionem, imbecillitatemque particularum, ut in declinantibus ætate potissimum accidit. Procidit autem iuxta os ipsius. Quidam uero & totam uulnam prolabi memoriæ produnt, quod a uero longe abest. Qua enim ratione sursum redacta queat affirmari? Conuenit igitur fœcibus clystere prius euacuatis, urinæque; excreta, quo uulva undiquaque



quaque sit libera, laborantem figurare supinam, ut coxas habeat sublimiores poplitesque flexos cruribus diuaticatis. Deinde hapsum capere ex lana, figura & crassitudine sinu muliebri proportionem, tenuisque linteo circū dare, & in succum acaciae, uel hypocistidis uino dilutum demergere, tum uuluae inferre, & citra uiolentiam totum quod procidit sursum agere, quoad tota moles in sinu factus subsederit. inferna ab umbilico regio spongia in posca expressa extrinsecus contegenda est. Mulier iacebit extensis adaptatisque inuicem cruribus, ut alterum alteri incumbat. Inde cucurbitulae agglutinabuntur cum flamma copiosiore umbilico & utrisque aliis, naribus odorata admouebuntur olfactanda. Tercio die lana sinui iniecta, mulier infideat in uino nigro austero modice tepido, uel in decocto myrti lentisci & malicorii. His probe peractis, lana ingesta tollitur. Altera inuicem prioris eodem humecta medicamento inseritur. Cataplasmata a foris imo uentri superiniunguntur ex palmulis, polenta, uel lenticula & malicorio cum oxymelite, ac tribus diebus interpositis rursus haec fient, quoad perfecte curationem absolueris. At si processu temporis id quod prolapsum est, putredinem fuerit expertum, id ipsum auferetur, nullius metu pericula. Etenim uulua uniuersim ablata ubi computruerit, mulierem superuixisse commemorant.

*De muliebrium locorum clausura, quam phimon appellant. Cap. LXXIII.*

**L**Oci muliebres circa ipsorum os clauduntur, uel ex praecedente exulceratione, uel in schirrum durata inflammatione. Curabuntur in fessibus qui emolliant, ex hydretho & fenugraeci decocto, consimilibusque cataplasmatibus & pessulis. Porro si malum inueterauerit, suffimentis uaporibusque iis qui ex aromatibus confiunt utendum erit. Iam uero soluit etiam hoc uitium cum nihil aliud sit quam uuluae ostioli contractio, pessulus ex aëtypo, nitro, resina, & terebinthina.

*Vt sterilis mulier concipiat. Cap. LXXIIII.*

**C**ommuniter itaque ambobus congruit, & uiro & mulieri uniuersum corpus conseruare probe temperatum laboris, cibi, balnei & reliquorum omnium mediocritate,



tate, & quod inter ea maximum est, curare ne habitu sint obe-  
 fiore. Neque enim pingues liberis procreandis sunt idonei,  
 eo quod genitalibus mutuose contingere haud possint com-  
 mode, tum quod momentū seminis emittant. Neq; tamen ni-  
 mis extenuati, liberis operā dare feliciter queunt, lauabunt au-  
 tem ipsos omnia calefacientia & leniter infantia, uinum ita-  
 que calidum modice sumptū. Et ex oleribus, eruca, hominū,  
 erysimum & cōsimilia, ruta uero & calamintha omnino uitan-  
 da sunt. At si humorum quodam uitio fœmina non concipiat,  
 hos expurgare, aut proba uictus ratione emēdare expedit. Pro-  
 prie uero mulieribus conueniet, curam locorū genitaliū quā  
 fieri potest maximam habere, & menses sine ullo impedimen-  
 to emanare. Cum igitur propinqua est purgatio, cibi potusq;  
 quam maxime licet, mediocritatem, curæ habebunt, & ex iis  
 quæ purgationi irritandæ sunt, aliquid assument, cuiusmodi  
 sunt odorata olera & acria, utpote scandix, erithmon, fœnicu-  
 lum, apiū, smyrniū. Porro uulūq; intemperiem corrigere oportet,  
 frigidiore itaq; notat menstruorum retentio, uictus frigi-  
 dior, & crassi succi, stupidum quid in uentris parte inferna lum-  
 bis, & cruribus oboriens. Quæ uero penitus refrixerunt, ne ue-  
 nerem quidē apperunt. Quare conuenit cū aliis remediis, tum  
 fomentis omnibus & iis quæ constat suffitibus, calorē reuoca-  
 re. Nec abs re fuerit, castoreum bibere, & ex seminibus odora-  
 tis, cuminum, anisum pulegij comam iuniperi fructum, pipere  
 singulis adiectio, at fomenta ipsarum uuluarū, partim uapores  
 erunt qui inferius per sellam assumentur, partim a qua calida  
 ad collutionē iniecta, in qua decocta sit saluia, artemisia, ruta,  
 iuncus odoratus angulosis, pulegiū, acorum, seminaq; odorife-  
 ra, hæc singulatim etiā inferiori uentris regioni ab umbilico  
 applicantur. Præsidio est, & polyarchi epithema. Item inferio-  
 ris uentris coxarumq; fricationes nihilominus condicunt. In-  
 super in pessis subiiciuntur ex myrrha, ruta, galbano & casto-  
 reo, ubi prius aqua mulsæ, aut marina uulū foueris. proficit ē  
 adhæc pessulus gone appellatus. Calidiores locos fatet corpus  
 totū calidi⁹, menses pauci & laboriosi, genitaliaq; mulieris exul-  
 cerātes, corrigūnt modice humectis & frigidis, cuiusmodi sūt ole-  
 ra qdē lactuca, maluq; blitū, cucurbita, cucumis, pepō, triplex,  
 portulaca, aliq; cibi cōsimiles, uesicæ abdomini & lūbis frigida  
 applicant cataplasmata, succiq; illinūtur. At humiditatis uitio  
 fœcunditatem



fœcunditatē frustrari indicat in coitu, uulua humescēs, tenuius & copiosum menstruum. His uictus utilis est siccior, labores, superiorū perfricationes, uomitus, cibi sicci & mediocres. Pro fuerit & uuluam acerbis medicaminibus cōtinere, quale est lentisci decoctū, myrtorū rosarū, rhus, item mali granati floris, rubi ramusculorū teneriorū, & gallæ. Sicciorē uero uterū contrariis curare oportet, balineis dico, inunctione, & alimēto humido, olerosoq; , mediocri uino & nō nimis ueteri. Quod si a crasioribus succi cōcipere impediātur, siquidē rodens aliqui fuerit mulierē probe purgare cōuenit medicamēto quod cuilibet humori propriū est, maxime autem picra ex aloe, mox sero lactis aluum ducere, & uictū probiorē deligere. Pituitosos autem humores laboribus uacuare, sudoribus, & uomitu, uel per inferiora. Cæterū ex medicamētis epithymū quoq; euphorbiū, piper, dauci semen, petroselinū semen, omnia cōtrita drachmarū duarum pondere potui recte dantur. Hoc & uentrē probe ducit, ac uuluā calefacit, quemadmodū sæpe iam menses eruperunt etiā iis quæ purgationē nō sunt expertæ, Postquā uero uterū emendatum esse cōstitit, mensuris bene respondentibus, tunc uenus est inennda, purgatione desinente. Iam uero qm̄ spiritus similiter in uulua inclusi cōceptionē impediūt, notas ipsorum ex capite de uulua inflatione sumemus. Medemur aut̄ parciore primū uictus, mox cuminū, anethū, apii semen, rutæ, anisi & pleraq; aromata præstamus, partim potāda subiiciēda. Conniuentes locos aperiemus iniectis clysteriis odoriferis, fomentisq; ex malua, semine lini, & fœnugræco, & oleo. Nonnunquā etiam melle, ualidioribusq; , artemisia, cunila, calamintha, pulgio, & anthemide. Præter hæc cōuenit uti terebinthina, nitro, cucumere agresti, elaterio, casia, picis sero. quibus autē os hiat, uictus, fomenta, medicamina sicciora astringentiaq; , grana mali pouici, leotiscus, rubi radices, myrra, & quæ humidiori uulue congrua sunt adaptantur. Peruersiones autem fomentis instaurare ac dirigere oportet, item iis quæ molliunt, iniectionis. uenus aut̄ a tergo exercita, ad concipiēdū uidetur cōducere.

*De uulua scissuris, condylomatis, & hæmorrhoidibus. Cap. LXXV.*

**I**N uulua ostio rimæ, quas Græci rhagadas uocāt, ex enixu uiolento fiunt. Primum sane latent cū recentes adhuc ex partu



partu sunt dolores, postea uero paulatim percipiuntur, alias manus tactu alias in coitu. qñ & propter affricationē cruorē redeunt, deprehenduntur autem sinu adaperto. etenim disruptiones scissuræq; in ostioli circuitu oculis patent. In quibus manuum operationem rodentiaq; medicamina uitantes, simplicioribus infestibus, pessulisq; utemur, prodest etiam tetrapharmacum dilutum. At si callum contaxerit, medicamento quod charta constat, ex rosaceo utendum. Sin autē ipsius uim non rulerint, iridem illicā terebinthina exceptam imposito. ulceribus iam cicatrice obductis, conueniet ex cadmia præparatum, aut aliquod ex iis quæ sedi consecrata sunt, ueluti quod dia lythargyru, hoc est argēti spuma inscribitur. Cum uero scissuras ueteres in condylomata degenerare cōtigerit, similibus excindi, atque cicatricē duci debent. Cæterū hæmorrhoides uulua os, & ceruicē infestant, quæ in partibus instrumento ad perspicuendā uulua accommodato exploratis, deprehenduntur, inde quod excrementia in accessionibus appareat dolorifica, cruenta & subrubra. At ubi remiserint, fluxio citatur citra dolorē subliuida & fœculenta. In his igitur cum morbus remittit, uolsella modo fieri queat, præhensas amputare oportet, sin minus, certe medicamentis ipsas destingere, partim attingentes sicco malicorio cum galla aut huiusmodi aliquo, partim iis quæ in uulua sanguinem fundente exposita sunt utentes, † quæ etiā profluuiis, & hæmorrhoidibus conducent, eo potissimum distinctis, quod uulua continuo cruore manet per remissionem non solum in menstrualis purgationis tempore.

† In antiquo lib. hæc est scriptum, ἀ καὶ ταῖς δι' ἀρρώστιας αἰμορροαγούσαις, idest quæ ob imbecillitatem sanguinem fundentibus, &c.

## De partu difficili.

## Cap. LXXVI.

**D**ifficilis partus accidit, aut uitio pariētis, aut fœtus, aut secundarum aut foris aduenientium. parturientis quidem, si crassa obesaq; sit, aut uulua tota exigua, aut dolorum imperita, aut timidiuſcula, aut inflammationem in locis genitalibus aliave particula experta, aut alio quodam modo laborans, aut natura imbecillis ut fœtum nequeat propellere, aut si ante tempus pariat. At fœtus uitio, si uel inuitate magnitudinis existat, uel exiguus & modicę grauitatis, uel ma  
gni



gni capitis, uel monstruosus, ut, biceps, uel mortuus, uel uiuus quidem sed imbecillis, ut foras non possit procedere, uel si plures foetus, sint. Nam Herophilus, quinque ædidiſſe mulierē, memoriae prodidit. Vel si figurā naturae contrariam obtineat. Naturalis siquidem figura est foetui, prima quidem, qua manus femoribus porrectae sunt, & caput nusquam inclinans ad os uuluae recta dirigitur. Proxima huic, ubi in pedes conuersus est. Aliae omnes praeter has a natura abhorrent. Ob secundas, quod uelamentum intus est, partus redditur difficilis, si aut non auellatur ob crassitiem, aut priusquam ouus est propter subtilitatem abrumptur, humore siquidem euacuato, infans praeter siccitatem egrediuoluitur. Ab externis difficultas oritur, aut frigore, quod uuluum densauerit, aut calore immodico, qui uires dissoluerit, aut ex quodam fortuito accidente. Si igitur ex astrictione, aut ueluti foetu adfirmata pariendi oriatur difficultas, laxatione prius opitulandum, infundendo largiter oleum dulce, & calidum, cum decocto, foenugraeci, aut maluae, aut seminis lini, aut etiam oua quod leniendi facultate praedita sint. Deinde & pubem cum ab domine & lumbis cataplasmate obducere, quod semine lini constat, aut aqua mulsae, aut hydrelæo, infellibusque similibus prodest. Insuper laxationes balineis moliri, nisi febris, aut alia quaedam occasio impedierit, mouereque parientem sella in aere calido mediocriter, Nonnulli etiam coquassationes ualidas, sterutamentisque ciendis idonea adhibuerunt. Timidae, mentis robur ad mouendum, imperita dolorum docebitur, ut ualidissime spiritum comprimat, & ad inguina depellat. Animo deficiens iis quae deliquio abigendo sunt, naribus ad motis recreabitur. Alleniata mediocriter, cibo modico refocillabitur. Obesam mulierem in lectulo resupinam figurare oportet, ut ad femina genua succubet, inflectatque, quo uulua ad abdomen tendens, e directo ostioli habeatur, quod ceratis, aut pinguitudine delinire digito oportet, & sensim aperire. Atque si morbus aliquis particulas male habeat, etiam huic prospicere. Ad haec stercois detentum molli clystere emoliri, & secundas clausas diuidere, aut digitis, aut feramento quod πολυκόπανι uocant, in ipsis occultato sinistra manu praecedente, ac humorem quandam oleosum in uuluae spatium interius clysterio indere. Verum ubi foetus praeter naturam figuratus fuerit, naturalem reddere figuram decet, partim pellendo, partim adducendo, partim flectendo, partim



tim in rectum agendo Et si quidem manum pedemve præmi-  
serit, non attrahere membro prehensum oportet magis enim  
affirmatur, uel luxatur, uel etiam abrumpitur, uerū digitis hu-  
mero infantis, uel coxæ affixis iussus in conuenientem locum  
id quod præmissum est, diducere. Porro si cū firma adhæsione,  
totius infantis indecora fuerit figura, sursum prius ipsum ab  
uteriore sublimē detrudere cōsiliū est. deinde præhensum rur-  
sus ad os dirigere. Postremo si plures uno infantes deferantur  
iterum a superiore, infernaq; parte referes. sicut omnia sensim  
& citra contusionem fiant, oleo locis perunctis. Tempus quo  
in sellam collocabitur parturiens est, cum uulua os dehiscens  
digito occurrit, & quod præruptum est, procumbit. Verū si non  
procedat, quod infans mortuus sit, aut alia de causa, ad extra-  
ctionē quā Græci ἐμβρυοελίξις appellant ueniendum est.

## De coxarum morbis

## Cap. LXVII.

**C**Oxarum dolor ab articulari morbo nihil differt nisi  
quod ipsius causa, nempe crassus pituitosusque humor  
in sola coxarum compage, articuloque concretus in-  
sudet. Dolor ipsis gibba in natibus regione inguinibusque ad  
genua usque, in plurimis autem ad summum usque pedem  
pertinet. Per initia igitur ægro nobis oblato, facibus clystere  
uacuatis, uena in cubito secanda, cum sanguinis detractione,  
si autem uetustas uitium occupauerit, ex talo partis affectæ im-  
minutionem sanguinis moliemur. In accessionibus fotu hoc  
utendum, Cyprini cyathis octo, aceti cyathis quatuor, nitri  
cyathis duobus, cachryos cyatho uno. Succidis lanis calida ad-  
mouentur. Deinde applicabitur ipsis farina lupinorum ama-  
rorum cum oxymelite, aut farina lolii cum resina, cucumeris  
syluestris radice, ni tro, calamintha, cachry, baccis lauri. Iam  
calamintha sola utiliter ex oxymelite, aut aqua mulsa admo-  
uetur. Emplastro uero hoc quod leniendi facultatem obti-  
net, utendum est. Cere drachmæ cētum, terebinthinæ drach-  
mæ uiginti quinque, eruginis drachmæ sex, myrrhæ, galba-  
ni, iridis, singulorum drachmæ sex, ceditiæ drachmæ quin-  
que. Propinabitur ipsis liquoris cyrenaici quantum etuus im-  
plet, aut castorij drachma cum opopanax tribus obolis.  
Porro radicis capparis cortex potui datus, & cataplasmatibus  
admixtus est remedio. Cum autem dolor multus excruciat,  
etiam



etiam medicamenta a dolore leniendo ἀνόδυνα dicta locū habent, utpote quod ad Philonem refertur, & quod duplici pipere constat. Hoc autē enema inferetur, mellis cyathus unus & semis, olei tantundē, aquæ cyathi duo, nitri drachmæ octo, terbinthinæ drachmæ quatuor. His calidis iniectis, anus debet foueri, ut longiori tempore ea retineantur, mucosa uacuat, nō nunquam & sanguinem, quando etiam magis opitulatur. At si malū perseueret, quod ratū est, iterū frequentius eo utendum est, in uicē aquæ, centaurii decoctū admiscendo. Sanguinē uero trahit & thlipsis semen per inferiora inditū, succus elaterii, & medicamentū ex ipso factū, uel quod ipsius radicibus cōstat. Item oleum sicyoniū, salforū pisciū muria, & oliuarū colymbadum probe per anum ingeretur. Cucurbitulæ coxendici multa cursilāma, cute prius incisa desigendæ, interim quoq; hirundines. Quod si his malū non finitur, ad purgationē eundū est, aut ex hiera, aut colocynthidos partis internæ pbe cōtritæ drachma offertur in aquæ mulsæ cyathis duobus, aut paulo amplius aut minus, pro laborantis uirtute, & alui facilitate dabitur. In aqua uero mulsæ ruta decoquatur. Puls etiam ex cucurbita syluestri confecta recte hos expurgat: In quibusdā uero & uomitus a radiculis citatus per initia profuit. Cū morbus se remiserit, dropaces ipsis applicantur, acopaq; ex euphorbio sunt utilia. præsertim quod a uarietate uocatur pœcilon, item balineæ naturales his accommodæ. Si desiderant, in aliis lauabūt balneis cōmemoratisq; utēdū est acopis, & cōpositis nitris, medicamento Asclepio, & eo qđ ex euphorbio, adarce, nigro ueratro, castoreo, pyretro, pipere, pedicularia, quā staphda agriā uocā, simili pōdere confit. Scđm balineas inspergētur picis aride unc. tres, sulfuris ignē nō experti unc. duæ, cuti adhuc calidæ, quæ charta etiā conteget. At si ne hæc quidē pfecerint, uel reliquis morbi remanētibus, cōgruū erit & sinapi cū caricis, uel ēt per se illitū. In totū uero hos restituit sanitati, iberidis herbe usus quæ lepidon quoq; alii agrio cardamō hoc est, syluestre nasturciū appellāt. Quæ uerò apud nos fruticosa nascit similib<sup>9</sup> laurii foliis & multo ampliorib<sup>9</sup>, respōdere, multa experimēta testāt, nō solū in coxarū, sed in aliis quoq; diuturnis affectibus, p̄gstatē uero lōge sūt efficaciora. Atq; si folia tūc nō pduxerit, corex ipsius radicis contūdit cū adipe suillo, ut emplastri spēm repræsentet inde linteolo defiori illitū locis maxime dolētib<sup>9</sup> imponit, nepe toti



pe toti in natibus gibbo & femoribus, finesq; tam diu quoad cuticula superior nigrescat, aut ex toto lueat. Postea ipsum auferes, lotoq; ægrotanti ceratū impones, opopanacis drachmas quatuor, quæ aceti cyathis duobus dissoluantur, excipiunturque cerato cyprino: Quod si taliū adurentium usus abominetur, emplastris uti rectorijs oportet, è quorum numero hoc quoq; est, ceræ, resinæ pityine singulorum drachmæ duodecim, terebinthinæ, columbarum sylvestrium stercoreis, fæculæ uini combustæ recētis, singulorū drachmæ sex, galbani, sesquidrachma. Atq; ex reficientibus est quod læna appellatur. utilia uerò sunt quæ ex lixiuio & nitro præparantur. Iam nonnulli ijs usi sunt potionibus quæ ad annum continuantur, in quorū genere habetur medicamentum diateffaron uocatū: chamædryos pondo, gentianæ deunx, aristolochiæ rotundæ deunx, rutæ seminis sicci sextarius. hæc tusa creataque dantur quotidie cochlearij mensura ieiuno & probè concoctione obita, ex duobus aquæ frigidæ cyathis ad annū, donec morbus finiatur. Eadem promittit medicamentum dia hepta, id est ex septē confectum, & quod ad Proclum auctorē refertur. Exercitia absoluntur, in ambulatione, cōtinuis, flexionibus, saltatu, & cursu. Cibus mediocriter tenuis & concoctu facilis, conuenit. porrò si malum nulli ex commemoratis cedit, aliàs in suppurationem conuertitur, aliàs neruis qui artus conuincunt, laxatis, membrum luxatur. Quare cū uitiū longius se prorogat, articum tribus quatuorve locis urere oportet, ut in chirurgica dicetur, ac complusculi diebus ulcera adaperita, sine cicatrice seruare.

*De podagra & articularijs morbis. Cap. LXXVIII.*

**N**on sola particularum corporis imbecillitas, podagricos articulariosq; cruciatus excitat, quoniam accessiones, sine ullo temporis interuallo urgerent, quatenus infirmitas imbecillibus articulis semper incumbit. item ne humor quidē solus hos dolores creat, quandoquidē non solis uitiū articulis insidet: sed utrunq; , & humor à natura alienus, & particularū imbecillitas morbū adfert articulum. quoties enim alitrix particularū facultas, imbecillior, ciborum grauatur copia, ex qua cruditates enascuntur, humor superans, in quodcunq; articulamentum, quod antea imbecillius euaserit, se confert, & artubus sese insinuans, colligantes neruos disten-

PAULI ÆGIN.

r dit,



dit, dolorem excitat: neq; enim nervos, per quos motus dispen-  
satur arbitrarius, affectu primario inflammatio infestat, quo-  
niam oporteret etiam medios internodiorum locos ipsam oc-  
cupare, utpote tibias medias aut fœmora aut cubitos, aut bra-  
chia. attamen afficiuntur iidem nerui lege consortij, quod cū  
articulis ineunt. Quousque igitur & solus humor pedum arti-  
culamenta molestat, podagra vitium nuncupatur. Vbi uerò  
causa in omnes corporis articulos compulsâ fuerit, *ἄρθριον*  
Græci, nos articularibus morbos appellare consueuimus. Quo  
uitij nomine, uertebras, humeros & maxillas cōprehendimus,  
omnemque articulum, quicumque morbo implicatur. Nonnul-  
li uerò aures, dentes, guttur, & nonnunquam iecur, lienemq;  
articularijs doloribus conflictari pronuntiant. A quibus nisi  
de subito vitium in artus sese recipiat eructetque, periculum  
breui tempore laborantes occupauerit. Sed humor superans  
qui iuncturis sese inserit, nunc biliosus est, nunc sanguineus,  
alias atra bile uitiosus, plerunq; etiam pituitosus, crudusq; co-  
pia alimentij, aut cruditate, aut otio congestus, uerum uetusta-  
te in articulis crassescit, & glutinosior euadit: sic ut in duritiem  
contumacissimam, quam Latini tophum, Græci poron appel-  
lant, occallescat. Interim uerò diuersa humorum colluie, ui-  
tium contrahitur, ob quod ægrè dignosci, & difficulter medi-  
camentis elidi potest, uel etiam penè nullo remedio sanescit.  
Cæterum hoc mali frequenter antecedit improbus labor, ue-  
hemens ambulatio, equitatus creber, usus ueneris intempesti-  
uus, insueta frigida potio, frigidorumq; uel multorum noxio-  
rum uel ciborum esus, multus uini usus. Iam aliqui prolapsu,  
uel deturbatione, uel propulsu, uel distorsione, uel id genus a-  
lijs, prima morbi fundamenta iecerunt, t materia quidem præ-  
cedente in corpore, quæ antea conquiescebat, nunc autem à  
causa primaria est commota. Mœrores autem, curæ, peruigi-  
lia, & reliqui animi affectus, non modò mouent, sed ipsi quo-  
que noxios succos, siue primario, siue ex accidenti procrearūt.  
Variæ igitur, ut à me dictum est, affectus causæ habentur. Sed  
deprehendi tamen faciliè humorum noxam inferentium discri-  
mina possunt, tum suis coloribus, tum ijs quæ superueniunt de-  
notata. Siquidem biliosa defluxio præter colorem pallidum  
& rubidum, caloris sensum doloremq; acriorem efficit & pro-  
tinus in cutem sine magno tumore erumpit, incandescitque  
calidis



calidis impositis, sicut è contrario ijs quæ refrigerant remittitur. Hoc sanè cum aliis omnibus magna ex parte, tum maxime ijs qui à bilioso humore originem habent euenire consuevit. Subinde febris in ipso accessionum statu accedit, quando & sitis conficit. Pari modo in melancholicis, color partis nigrior reddetur in pituitosis, ex albidus & aquæ subter cutem similis apparebit, ubi dolor altius delitescit, & tardius in tumorem sese attollit, quemadmodum si sanguineus humor redundet, cruentus color emergit. Verùm ut singula exactius dinoscas, superior uictus ratio reliquaq; consulenda tibi ueniunt.

† Rectior est hæc scriptura ueteris codicis προσκηγμένης μὲν ἐν τῷ σώματι καὶ τέως ἡρεμένης τῆς ὕλης, id est, materia antè coaceruata in corpore, &c.

*Curatio biliosæ defluxionis articulis conceptæ.*

**I**nitium curationis si flaua bilis articulos exerceat, magisq; ipsius qualitas, uacuatione noxii humoris tentabitur per medicamenta purgantia. quale est maxime quod ex rhodomelite temperatur, tum quod malis cotoniis constat, item antidotum ex hiera picra, & aloe cataportia. Per accessiones uerò à foris utendum rosaceo cum oui luteo, & uini momento, particulam semini infricando, herbæ autem admouentur quæ refrigerant, ut solanum, portulaca, altercum, semperuium, palustris lenticula, feris, papauer, polygonium, rosarum folia, & consimilia: Et nunc per se illinuntur, nunc cum micis panis posca imbutis adhibentur, uel hordeacea farina cum rosaceo instar cataplasmatum superaccommodatur. At in Erysipelacea inflammatione articulorum manifestò lenietur cucurbitæ recentis cortice imposito, aut peponis, aut cucumeris carne, & per se, & cum pane. Item perdicium foliis & hederæ cum pane uel tenuiore parte polentæ. Ad hæc psyllium farinæ hordiaceæ incoctum, ardentes inflammationes mirandum in modum solatur. simili modo & rosaceum ceratum cum quibusdam refrigerantibus succis illitum, & quod ex fabarum lomento componitur. habet aut hoc pacto: ceræ uncia quinque, chamemælini, rosacei, singulorum uncia duæ & S. fabacei lomenti semuncia, ouorum lutea quinque. **A L I V D.** cataplasma uirentes maluæ coctæ teruntur, psyllium priuatim in uiscum redactum, admisceat: deinde ouorum luteis admixtis, oleoq; chamemælino applicant. Si uerò tantus urgeat dolor, ut laboras par esse ferendo nequeat, medica-

r 2 mento



mēto ex croco, glaucio & opio uti conueniet, quæ in posca trita sublinentur, uel cū micis forma cataplasmatibus obducuntur. Galenus autem, huius meminit, lachrymæ papaueris drachmas quatuor, croci drachmam cum bulo lacte, uel caprillo trita, uel panis micam inijcito, & emolliens rosaceo excipito, ac utitor cataplasmate, aut opium crocumque pariter trita in lacte, cerato rosaceo excipito: Contulerit etiam eadem parte in accessionibus ceratum ex turpene pisce confectum, item oleum ex eodem expressum. Persimilis est hoc efficaciam, micarum panis aqua, uel posca maceratarum & semperuiui, uel portulacæ, uel solani uel palmularum carnis & papaueris capitum seminis, pari portione, ouorum tostorum luteorum & rosacei quod sufficit, accommodato in cataplasmate. Verum his quæ membris torporem inducunt narcotica Græci uocant, diutius non erit insistendum, quàm ut doloris uehementiam solum lenierint, siquidem largior ipsorum usus, sic insertum constringit humorem, ut in tophaceam duritiem quos Græci πώγους appellant occalescat, ac diuturnas motus difficultates pariat. Ab eorum igitur usu quæ dolorem arcent uel medicamento è succis herbarum factis, diachylon uocant, ex chamæmelino resolutum utendum erit, uel eo quod dialtheas appellant, uel huius generis alio. Posteaquàm uerò partem affectam quæ refrigerit recalfeceris, roboranda erit palmulato medicamine quod diaphanice dicunt, cum oxyrhodino, uel uino & rosaceo soluto. At si emplastra detrectent grauenturque, acaciæ succum ex posca, uel lycium adiecto croco & glaucio, & succo perditii ex posca, delinere conuenit. Victus autem ratio refrigerans humidaque erit, ut hordei cremor, ex chondro sorbitiones: ex oleribus, malua, lactuca, intybus: auium cohortalium maximè pulli, piscium saxatiles, erinacius pectines & eius notæ reliqui. Vitanda omnia calfacientia, & quæ pallidam, aut flauam bilem generant, uinum uetus, fuluum, & nigellum, & cibi repletio. balineis utendum aqua potulenta factis, si nihil prohibet, etiam cum defluxiones ipsæ infestant, & cum absunt quantum ad causam pertinet. Temperandum ab iracundia, inedia, acrimonia esu, temulentia, immodico labore, & ueneris usu.

† Vetus codex, ἡ τὰ προσημεία τῶν τὰ λουκὰ, id est, deinde albo ouorum admixto, quæ lectio huic loco magis conuenit.

Curatio



*Curatio si sanguis artus infestet.*

**I**N quibus sanguineus humor redūdat, protinus sanguis mit-  
 ti debet: ac non in his solum, sed etiam in pituitosioribus,  
 aut melancholicis. Siquidem in his quoq; succus uenis pluri-  
 ma parte continetur, qui copia sua potius quàm qualitate of-  
 fendit, statim igitur cum quis morbum experiri primum cepe-  
 rit, sanguinis missio erit tentanda: nam quos iam fluxio fre-  
 quenter infestaret, ij plus inde noxæ, quàm auxilij sentiunt. præ-  
 fertim quibus corpus est natura frigidius, aut etiā imbecillius.  
 Post sanguinem detractum, nisi solus ille superauerit, monien-  
 to temporis interposito, etiam purgationem ex hiera antido-  
 to moliemur, aut Iuliani oxymelite, quippe hæc magna com-  
 moditate purgant: qui uerò ab huiusmodi medicamentis ua-  
 cuantibus abhorrent, catapotia quæ sequuntur deuorabunt:  
 aloes, colocynthidis, id est, cucurbitæ syluestris, ueratri nigri,  
 scammonia, singulorum unciam, euphorbii, nitri, singulorum  
 semunciam, succi brassicæ, quod ad ea capienda satis sit. Dantur  
 singulis pro uirium ratione: melius proficiet, si cotoniorum  
 succo excipiantur. Aliud catapotium quod & in accessionibus, &  
 remissionibus exhibetur podagricis, qualiscunq; etiam humor  
 articulos affligat. Recipit aloes selibræ, agarici, croci, singulorū  
 semunciam, costi, spicæ nardi, iunci odorati rotundi, floris, opo-  
 balsami, calia, singulorum unciam, scammonia sextantē, epi-  
 thymi quadrantē cum semisse. Modus mediocris instar duorū  
 scrupulorū, summus quaterni scrupuli. Iam uerò ex armenia-  
 co lapide catapotia, mirificè purgant, ac propriè articulariis do-  
 loribus cōgruunt, tū inter fluxionū principia, tum in decremē-  
 to, tum in remissionibus, sed quoniā nōnulli scammoniam ceu  
 stomacho noxiam fugiunt, dabūtur ipsis præsertim cū pitui-  
 tosa subluues torquet, hæc catapotia, colocynthidis medullæ,  
 ueratri nigri, bdellii, gummi, aloes, singulorum uncia, nitri ale-  
 xandrini, euphorbii, singulorū semuncia, dantur quaternis scru-  
 pulis. Ego in uicem gummi epithimum adiciebam. Sunt qui  
 in omnibus articulariorum uiciorū accessionibus, purgatione  
 ex hermodactylis ipsis aluum sollicitauerint, sed attendendū  
 est, quoniam hermodactylus stomacho fecessit negotium: an-  
 xietatem & cibi fastidium mouet. Quapropter in his uti cōsi-  
 lium est, qui obeundarum actionum necessitatē habēt. etenim

r 3 breui



breui post duos plurimum dies defluxionem ex toto finiunt, sic ut consuetis munijs obeundis sint idonei. Notus mihi est qui non hermodactyli substantiam, neq; aliquod ex ea compositum medicamentum, sed herbæ ipsius decoctum cum aliquo consueto medicamine, utpote aniso, uel apio decoquens ipsum, potui exhibuerit, ac mirum est quàm resoluta sæpe alio defluxionem sedaret: uerùm quia, ut nuper retuli, stomacho inimicum est, ijs postea quæ stomachum confirmant uiresque eius recolligunt, mediocri calfactione os uentriculi corrigere oportet, ijs autem quæ ex hermodactylis fiunt, multo laudatius esse medicamentum Alexander prodidit, quod ex coronopodio temperaretur, quod & eandem uacuationem præstet, & dolores sopiat præterquàm quòd stomacho noxam non inferat. Cæterum loco inducentur cataplasmatibus modo in pituitosis, si mediocris dolor afficiat, uiridis brassica, apium, cunyla, uerbenaca recta, sin acris dolor affligat, farinæ fœnugræci parteis treis, pollinis loliacei, farinæ cicerum, singulorum partem unam, ex aqua mulsa, aut uino tenui cum modico cypri-  
no, uel nardino conuenit applicare, maximè per hyemem, item cinis crematæ radicis brassicæ, eiusq; caulicorum cum axungia inductus, multis fuit præsidio. Sed sopiendis doloribus recens adhibenda axungia, discutiendo autem humori uetus salsa auxiliatur: bubulum etiam stercus cum hordeacea farina in aqua mulsa coctam prodest: uel per se recens & liquidum, uel cum foliis brassicæ. Similiter caprillus fimus per se, uel cum hordeacea farina coctus in posca. Quoniam uerò nonnulli ex ijs quæ contraria esse uidetur remedium sentierunt (etenim diuersorum humorum mistura dignotionem postulat) commemoranda iam harum materia est promiscua, Itaque iuuat syluestris atriplex & satiua cum pane applicata, aut uerbasci folia cum bulbis & pane trita, uel cum polenta, uel cataplasma ex hordeacea farina cruda. At in quibus obscura morbi est origo, hæc semel experiri abundè facit, modò ad consimilia transgrediendum est: modò contrariis pugnandum. Neque tamen eisdem diutius immorari consilium est, si nullum ex eis solatium perceperint. Hæc quotidie in artis operibus fieri uidemus, ut idem medicamentum uni articulo profuerit, alteri in eodem ægotante similiter inflammato non modò non opituletur eodem tempore,



pore, sed aliquando (quod maximè est mirum) offenderit. Quippe unus idemq; sæpe articulus, ex eodem remedio nunc iuuabitur, paulo post eiusdem appositu, inflammationem concipiet. Nunquam igitur aliquis cum glutinosus crassusq; humor superat, calidioribus leuabitur auxiliis. Verùm cum acris aut feruida humoris qualitas præcellit, tum refrigerantibus solatium inflammationis paratur. Nec miraculum est si materies natura frigidior inflammationis tempore, & feruore æstuet & incandescat, ut bilis, si ita contingat, admistionem omittam. Porro tophos in artubus impedit coalescere lupinorum farina cum oxymelite, uel posca, uel laserpitio, aut brionix radice cum pane. Iam hoc quod sequitur citra noxam mitigat, & mediocriter discutit, lycii, ammoniaci, thymiamatis, singulæ uncix cum uino ueterrimo & oleo omphacino, tritæ coquantur, & è lomento fabarum, quod sufficit, adiicitur, coctæ mediocriter modo cataplasmatibus applicantur. Post inflammationis statum, tumore relicto applicandi bulbi per se, uel cum polline polentæ, ad ruborem usque, hoc enim modo efficacem usum exhibent. Quod si nihil hisce cataplasmatibus leniuntur, fortibus & superfusionibus erit certandum, maximè si tumor extrema occupet, chamæmeli & meliloti, aut centaurei decoctis. Nonnullis etiam cappari decoctum abundè fuit auxilii, hoc tamen quod infra scribitur, omnibus præstat efficacia. Thymus, origanum, satireia, & calamintha, in aceto quàm acerrimo cocta: eiusdem aceti imbre affectæ partes, non semel, aut iterum, sed frequenter in die fouentur cum fiducia. Hoc præsidio permulti pristinam ualitudinem recuperarunt, quibus non pituita solum, sed flaua etiam bilis fuit intesta. Non desunt qui & subsequens medicamentum salutare sint experti, illicis glandes in farinam redigunt ac diu coquant, hoc decocto extremos artus per fluxionum initia longo tempore aspergunt. At quæ interius partes habentur, spongiis fouent & per hæc materiæ impetum repellunt. Idem & bile uitiosis artubus conuenit, quemadmodum ex calida aqua sine aliquo decocto superfusio. Porro doloribus qui intenso frigore, aut humoribus inter articulorum ossa impactis contrahuntur, ualens hoc est remedium Olei ueteris sesquilibra, natri alexandrini, resinæ terebinthinæ singulorum libra, euphorbiæ uncia, iris sextās, fœnugræci farinæ sextarius unus & dimidius.



his autem ea quoq; quæ aduersos coxendicum cruciatus scripta sunt, pulchrè nimirum opitulantur. multi siquidem aduersus huiusmodi perfrictiones cum morbus declinauerit, sinapi cum siccatis ficis usi sunt, tum aliis quæ extrinsecus ruborè excitant. Alii uerò medicamētum ex cintharidibus admouēt, uerum hæc in posterum officiunt, nisi aliquo etiam moliente utantur, ut, dialstrutheon & pyxide, & basilio, aut diaclates, aut dia ægiru, aut bromio, aut lysiponio, aut ualentioribus acopis, in quibus etiam nerui consensus, potissimum & infarctus humorum eue niūt. At ex mulæ lotio, in morbo statu præsertim, & in frigidis defluxionibus fouere commodum est. Pariter cōuenit etiam ex utroq; ueratro pastillus cum mollis & fungosus tumor articulos implicat, & fomentum ex sale torrido, aut etiam aliter è marina calida per spongas artus perfudisse uincit. item emplastra ex sale præparata, uel ex lixiuia, & nitro, hisq; consimilia cataplasmata, post uigorè morbi auxilio sunt, uictus ratio siccior minimeq; excrementitia competit, item inedia, uel parciores cibi. frequentibus balneis abstinendum. At si lauent, nitro aliisq; pulueribus utentur deterforiis. Vbi dolor declinauerit, exercitiis se credent: & frictionibus maxime articulorum, in naturales balineas descendēt, aut ēt arena cōtecti incalescēt. Vomitus à radícula cibisq; assumptis mouebitur. Qui ad hoc se cōmodè habent, etiā ueratro nigro uacuetur per uomitum, uel etiam per aluum inferiorem purgētur.

*Quomodo sanguine infestati artus curentur.*

**Q**ui ex sanguine dolorem articularium conceperunt, post sanguinis initio morbi detractionem, remedia cōmemorata loco dolenti sunt inducenda, si biliosior quidem acriorq; sanguis redundet, eisdem quæ in flaua bile diximus, certandum, si frigidior, pituitosiorq; aut melancholicus humor coaluerit, iis quæ post illa subdidimus præter nimis acriā, curationem tentabimus. at si uitium in uetustatem incidit, his quoq; locus erit. iam hoc cataplasma in principio proficiet. Malicoria, & rhus cū polenta ex uino detrita obducuntur. ALIUD. Brassicæ folia cocta accuratè conteruntur, aceti floces cum duobus coëtorum ouorum luteis, & rosacei momento, adiiciuntur, leuigataq; simul loco iniiciuntur subinde ea mutādo. Cibi assumentur



assumentur qui extenuant & parum nutriunt : carne igitur & leguminibus & uino copiosiore nigro abstinendum, si autem fieri possit, etiam ex toto uinum circuncidendum. Plurimos siquidem ne ui, qui prorsus abstemii omnes sanitatem consecuti sint. Alii siquidem per morbi initia omnino liberati sunt. alii in posterum rarius & minori dolore accessiones perceperunt Quapropter nisi contrarium hinc accidat, aut futurum inde aliquid metuant, perpetuò uitam agent abstemiam. † At qui per imbecillitatem, aut perfrictionem aliquid subsecuturū opinentur, ad biennium usq; abstemii, inde ad pristinam cōsuetudinem reuersi, modicum dilutumq; continēter bibēt. Oportet autem abstemios in uicem uini decocto anisi, aut alicuius conſimilis seminis uti : fructibus pomaceis reliquisq; refrigeratoriis abstinere, tum ueneris usu. Qui uerò per medicamenta, quæ per annum bibuntur, morbum prorsus tollere uoluerunt, multis sanè quibus pituitosus & excrementitius humor articulis incubuerit, opitulati sunt. uerū qui calidioribus siccioribusq; constarent naturis, hos in subitam mortem præcipitarunt, quòd materia ad intestinum, aut renes, aut costas, aut pulmonem, aut principem quandam partem se contulerit. Satiū itaq; est biliosiore præditis habitu, aut copioso sanguine refertis, uini usu interdicare : quod nullus ex eius abstinentia, in commemorata uitæ pericula inciderit : frigidiores autem & recrementis pleni, ex uiperis theriaca uti debent, hyeme frequentius, cōcoctione bene obita, per æstatem rarius, uel enim morbo liberabit, uel certè leuiorem reddet, nulli ex prædictis particulis officiens : quoniam uerò nonnulli nos etiam commemoratis uti antidotis cogunt, non te lateat id quod ex damafonio constat & quod ad Agaperum, refertur, item quod atacton & octoidon dicitur, & quod Proclo inscribitur, item quod ex scordio, aut corallio componi solitum est, alia pleraque non mediocriter proficere, omnium uerò securissimum est iōngoq; usu probatissimum, diaacorallii, siquidem concretas iam in tophum duritias discutit. horum omnium uires & modum usus, & quid in his caueri debeat uolumine, quod compositis medicaminibus dicatum est, reperiēs similiter aduersus articulares dolores, medicaminum quæ psilothra uocant misuram usumq; in eodem habitu, nèpe pituitosiore. Alii uerò qui à toto se morbo uindicare uolunt, integras uulpes oleo incoquant,



incoquunt, quo articulariis morbis medentur. Nō desunt qui niuas lebetibus magnis iniiciunt, alii tantum emortuas. Pari modo etiam hyenas percoquunt, oleum hinc conficientes, quod discutiendi uim habeat. deinde eo balnei solia complēt: in quæ postquam descenderunt, immorari ibidem diutius præcipiunt, unde sæpe factum, ut non modò artuum tumores, sed etiam uniuersum corpus euacuaretur.

† Vetus liber, τοῖς ἐπ' ἐκέναν, i. iis quæ in illis dicta sunt.

† Veteres libri habent hoc loco ὅσοι δ' ἐδ' ἄδένειαν ἢ κατὰ-  
 ἰσχυρὸν ὑποπτύσσοντες τι φάνοιτο, ac qui per imbecillitatem, aut perfrictionem expuere aliquid uidentur.

*De tophis, quos græci poros uocant.*

**Q**uoniam & tophi subinde in articulis creantur modo ob humoris qui ad eos decubuit crassitiem, terrestrē-  
 que duritiā, modo propter immoderatos discutientium re-  
 siccantiumq; medicinarum usus, siue earum mistura quæ emol-  
 liendi uirtute pollent, sciendum uenit ea esse conuenientio-  
 ra, quæ mollientem simul & discutientem naturam sortiuntur.  
 itaq; emolliunt adipēs uetuli, medullæ, ammoniacum, bdel-  
 lium, oleum bene uetustum & styrax. Discutiant autem & re-  
 siccant, nitrum, sal, lixiuium, adarce, euphorbium, & consimi-  
 lia uerū ad concretos in articulis tophos propriè facit uetu-  
 tissimus accerrimusq; cæsus cum suillæ carnis præpinguis ac  
 ueteris decocto contritus & superimpositus siquidem sua spō-  
 te topho dehiscēte quotidie humor qui intus coierat, eructa-  
 tur. Valet etiam medicamentum diapernes, usu probatum,  
 quod duplici modo præparatur. item quæ dia stactes dicuntur.  
 iam hoc peculiariter facit quod recipit spumæ nitri, resinæ te-  
 rebinthinæ, lixiuii quod calcem adiectam habet, propolis, sin-  
 gulorū triens, ceræ bes, colophonix libra, olei fescuncia: mix-  
 tis utitor, tum in tophis, tum in abscessibus: iam quod ex cy-  
 nabari temperatur, mirificum est ad tophaceos tumores, alia-  
 que complura: sed ægrè paratur. Quod uerò dia leptocaryon  
 dicitur, præterquam quod probatum, etiam facilè cōquiritur,  
 non solum ualentioribus, sed teneris quoq; corporibus accō-  
 modatum, si assumat medicamenti ex melle, uel ex anemone  
 confecti



confecti partes duas ad illius partem unam: quæ si desiderentur, et eius quod cerusa constat, subinde æqualis modus ipsi miscetur. ALIUD. Ad tophos, sandaracham contritam querneoisco excipito, & utitor. ALIUD. Proficet etiam ad fistulas, & ægilopas, olei sextarius, spumæ argenti uncia octo & semis, auripigmenti uncia. Argenti spuma, oleumq; tantisper incoquitur dum manus non inquinet, postea tritum auripigmentum aspergitur, & priusquam ustionem senserit medicamentum ab igne tollito, ac utitor. Ex alii lapidis flore confecta, ubi morbus intermiserit imponuntur, quæ ad omnium articulorum nodos concretos accommodata toto morbo liberare, nonnulli veterum testatum nobis reliquerunt. Et ex salis flore præparatum medicamentum si in morbi declinatione similiter imponatur, tumorum reliquias discutere experimenta fidem fecerunt.

*Quomodo quis à podagra se tueatur asseratque.*

**P**odagram quæ iam constiterit, articularium uero dolorem, sine prædicta medendi ratione aboleri longè difficillimum est. At eam quæ nondum creata est præcauere, facilius, si quis cibis demat, & eis utatur quæ promptè in membra digeruntur, excrementisq; uacant, item uino moderatiore & exercitationibus satis se committant. Quod ad præsidii partem attinet, sal minutim in oleo tritus & articulis affricus, omnes qui se ab hoc uitio uindicare uolunt, magnificè iuuat, nisi præter modum sicca intemperie sint præditi, eoq; illitu, & mane, & uesperis per totum uitæ curriculum, & ubi inflammationes inclinauerint, utendum est.

*Ad portiones qui tum pedum plantas tum calces infestant.* Cap. LXXIX.

**P**erniones ulcera sunt, quæ ex frigore hyberno in digitis manuum pedumq; contrahuntur, Græci chimethla nuncupant. Itaq; tepidâ aquâ marinâ superfundere oportet, uel bere decoctum, uel lenticulæ, uel erui, uel hastulæ regie radices. A superfusione, lenticulæ coctæ uinoq; detrita admoventur, uel ficus ex oleo leuigata imponitur, uel alume & farina pari modo, in uino pertrita applicantur, aut floeces uini subaridæ, aut bulbus recēs uino tritus adglutinat, aut allia in oleo fricta, proiectaq; & cera oleo mediocri liquefacta imponit, aut malicorium incoctum uino, & in tenuē redactum puluerē, cerato rosaceo exceptum inducito



inducito, prius locum decocto lupinorū irrorans, aut mannā, sulphurq; ignem non expertum, cum melle cocto imponitur, at alterci succus continenter illitus, ab inflammatione & doloribus uindicat.

*Marcellium ad perniones.*

**R**apæ satiuæ radice excauata, conijcitur in capacitatem ipsius ceræ sextans, olei lentiscini quantum sufficit: cocta in duplici uase ex marina aqua, aut muria, aut lupinorum decocto, hoc quidem superfundito, ceratum uero in rapa liquefactū frigidum imposito. At in exulceratis pernionibus, thuris, aluminis scissi, minii, resinæ terebinthinæ singulorum par modus: adipe suillo diluta inducuntur. Verum si inflammatio exulceratos perniones malè habeat, medicamento utendum hexapharmaco quod recipit olei uncias nouem, taurini adipis & fellis, singulorum libram, argenti spumæ uncias sex, colophonix, uncias quatuor, mellis uncias sex.

*Ad digitorum rimas totorumq; pedum quæ rhagades dicuntur.*

**P**ice liquida delinuntur, aut cancro fluuiatili, aut marino super carbones cremato, testa abraditur, & cum oleo trita uel mellis spissitudo sit, abstergis prius scissuris instillatur. Proficiet etiā scillæ medulla oleo feruefacta, item cū terebinthina leuigata, necnō cornu caprillum ustum, exceptumq; adipe caprillo, sed callos circumpurgare oportet, & sic medicamentis uti.

*Ad scissuras calcaneorum & plani pedum, anthera.*

**C**alcis uiuidæ drachmæ decem, cerusæ drachmæ uiginti, ceræ tantundem, aut triginta, porcina pinguedinis recentis uncia septem, colophonix uncia nouē, succi lini seminis cyathus, olei dulcis uncia quadraginta: teneram plantam efficit ut aliud nullum. **ALIVD.** Adipis caprilli, ceræ, olei singulorum pari mensura utitor. **ALIVD.** Malicorium aceto incubatum diebus quinq; applicatur, deinde loco undiquaq; purgato calx una cum oleo, aut sordibus imponitur. **ALIVD.** Scilla cocta oleo, ipsa quidem fricta proijcitur, oleo uerò in quo tamen terebinthina liquefacta sit utitor.

*Ad attritus calcanei ex longo decubitu.*

**C**eræ, olei, argenti spumæ, mellis, pares modi, proficiunt in omni



in omni exulceratione, plantæ pedū, calcanei, supernæ patris, & internæ digitorum, magisq; si ulcus ungui sit propinquum.

*Ad sordida plantæ ulcera emmoton, facit etiam genitali exlucrato.*

**A** Murcæ cyathus, aceri cyathus, cocta uasæ æreo donec mel leam spissitudinem habeant, & trita separatim, profunt. Item squamæ aris drachmas duas, mannæ tantundem, lanarū uccidarum mollium, quantum manu comprehendi potest, in uolutarum tedæ, ustarumq; cinerem totum excipito, & utitor, in uulneribus quidem uino diluens. in naturalibus autem & pedum plantis passio. **ALIVD.** Amurcæ, mellis dispumati, paria pondera, hoc etiam cicatrices tollit.

*Ad intertrigines, ex calceamentis.*

**P**vlmo agnus, suillus & caprillus benefacit, uerum coriæ ex ueteribus calceamentis combusta, si inflāmatio urget, nihil quidem adferunt præsidii, sed illa finita, multum: uel cepa cum gallinæ adipe copiosior adiicitur, uel galla combusta inpergitur, uel acacia aceto diluta illinitur.

*Ad clauos callosque.*

*Cap. LXXX.*

**C**lauis prius undiquaq; purgatis, inducitur medicamentum quoddam ex edentibus, quæ septica Græci uocāt, aut ærugo rasilis, aut sandaracha, aut syringiacus puluis aut collyrium syringiacū loco gummi, ammoniaco exceptū. Est autem clauus teres figura callus, candidus, clauorum capiti similis, qui in omnibus corporis partibus, sed pedum plantis, digitisq; præcipuè nascitur. Tollitur autem longiori tempore, etiam si quis excedentem clauī partem continuè abra-dat scalpello, aut pumice affricet, similiter etiam callos. Proficat lupinorum crudorum concrematorum cinis cum melle, aut nōsy, liquida pice exceptum, melanthion cum urina pueri uenerem non experti, uel oui luteum, fabarum lomento cum aceto incoctum. At hoc subinde expertum est, cantharidum, arramenti sutorii, castorei, par modus singulorum, excipitur terbinrhina, ut emplastri fiat spissitudo, clauoq; prius circunciso, imponitur. **ALIVD.** Feculæ, calcis uiuæ, uisci, singulorum pares portiones, cum stillaticia lixiua, uel urina pueri uenerem non experti.

Ad



*Ad unguinū uitia, et primū de reduuijs. Cap. LXXXI.*

**R** Eduuia, Græci paronychiam appellāt, abscessū est qui ad radices unguum cōit, cum parua adhuc est, & prima habet rudimenta, galla cum melle eā reprimat, & confirmari prohibet, uel Musæ pastillus, uel Heræ, ex aqua. At ubi caro iam præter naturam excreuerit, eò curatio dirigenda est, ut per rodentia medicamenta absumatur, rumpaturq; , ualet autem ad reduuias, tum aurium sordes, tum lycium suppuras autem reduuias, acu adacta humorem emittere, spongiamque aqua imbutā imponere oportet, uel lenticulam applicare ex aqua tritam, aut palmulatū cum uino, uel rosas uirides, uel siccas, aqua maceratas tritasq; , uel polentā cum aqua: efficax est reduuis etiā lupinorum farina melle, uel mulso macerata. Exulceratis reduuijs opitulatur hoc medicamentum. Aeruginis, argenti spumæ singulorum drachmæ quatuor, sarcocollæ tantundem, super linamentum ex uino & spongia imponitur. Conuenit autem carnem undiquaque ab ungue diducere.

*De pterygijs.*

**P**terygion carnis incrementum est, aliquam unguis partem operiens, ex reduuia, aut alia huiusmodi causa proueniens, aduersus quam auripigmentum & manna pari pondere inspargitur, super autē, linamentum ex uino & spongia imponitur. **ALIUD** Chalcitidis squamæ, malicorij æquales partes. Excipiuntur fico tolla & melle, parte affecta, lupinorum decocto prius aspersa. Quod autem siccum est in ungue circuncidito.

*Ad digitorum pterygia putrida, item ad pudendorum ulcera.*

**L**achrimæ thuris drachma, squamæ drachma, æruginis rasæ drachmæ quatuor, mellis cyathus, teruntur in sole donec subflauescant. Et loco uino prius irrorato per splenium inducuntur.

*Medicamentū quod subito pterygia desiccat persanatq; .*

**S**oryos combusti drachmæ duæ, thuris tantundem, æruginis rasæ drachma cum melle contrita, ipsi pterygio inducuntur. Valet etiam ad reliqua maligna horum locorum ulcera, & nigritias & putredines. **ALIUD**. Squama æris, palmularum carne excepta, aut ficorum utitor. **ALIUD**. Columbæ stercus polentæ polline ex passo coctum pertritumq; calens imponitur,



etur, item squama per se inspersa, pterygia deficcant. Oportet autem crebro, angulum unguis pterygion pungentem, ne incre scat, scalpello superimmissio, adimere.

*Ad unguēs contusos.*

**M**Yrti, & mali punici folijs teneris unguēs obducito.

*Ad cruentos unguēs.*

**F**arina pice mista imponitur.

*Vt unguēs qui laborauerunt abscedant.*


**S**ulfur tritum adipe suillo exceptum iniicitur.

*Vt scabri unguēs abscedant.*


**V**Isqi quercini, sandarachæ, fœnugræci singulorum pondos sextans, cantharidum, thapsiæ singulorū uncia, aceti quod satis est. **A L I V D.** Propolis atticæ, ceræ, bituminis, singulorum drachmæ duæ, sulfuris ignem non experti drachma, oleo non inquinat, in usu calefactū unguibus applicatur. **A L I V D.** Picis liquidæ, ceræ, colophonix, terebinthinæ, guttæ ammoniaci, sulfuris uiui, aphronitri pares portiones, ne manus inquinent. **A L I V D.** quod separat scabros unguēs sine exulceratione. Bituminis, auripigmenti, sandarachæ, sulfuris uiui singulorum drachmas quatuor resina excipito, & utitor, dissoluēs per dies septenos. **A L I V D.** Erui farina, felle ouillo, uel urina ouilla imbuta utitor, uel calce uiua cum oleo, uel chia cum opobalsamo, uel uisco, atramentum sutorium, suffurq; uinum quod satis est, exceptum, pelli illitum superinducito, uel herba pedicularia, cum aceto trita utitor, uel resinæ terebinthinæ drachma, sandarachæ duplicata portio simul radici unguis imponitur, diligentiq; fascia illigatur. Cum autem unguis exciderit, ceratum myrteum cui medicamenti ex resina paululum adiectum sit, superaccommodatur.

FINIS LIBRI TERTII IOANNE

GVINTERIO ANDERNACO MEDICO INTERPRETE.








## PAULI AEGINETAE

LIBER QVARTVS,

IOANNE GVINTERIO

*Andernaco Medico Interprete.*

De elephantia.

Cap. I.



ECCE mea sententia † Cappadox  
 Aetius memoriae prodidit, auxiliorū  
 uim morbis fortiolem esse oportere,  
 eoq; elephantiam nunquam curari, ut  
 qua nulla potentior medicina reperia-  
 tur. Si enim cancer ueluti elephantia  
 sis quēdam uni obortus particulæ in-  
 ter morbos insanabiles uel ab ipso  
 Hippocrate relatus est, quanto magis  
 elephantia, seu totius corporis cancer aliquis, ab omni abhor-  
 rebit remedio. Cūm. n. atra bilis, ex qua huic affectui origo est,  
 duplici modo generetur, (uel. n. ex melancholico sanguine, sæ-  
 culentiolemq; & ueluti eius limo: uel bile flaua, utrisq; nimirū  
 uitis, nascitur) subrubicundam quidē elephantiasim mitiorem  
 quodammodo, ut autē uerius dixeris, minus malignam, prima  
 ipsius differentia procreat, reliquam uero, & maligniorē in qua  
 totum corpus fœdatur ulceribus, & extrema decidunt, altera  
 flauæ bilis supra naturæ modū adustæ soboles, producit. Qua-  
 propter morbo iam uictis manus admouenda nō est. At si re-  
 cens adhuc malū est, ut nihil ex summis deciderit, nulla autē  
 infestaret exulceratio, neq; tamen eminentiæ tuberosæ pluri-  
 mum exurgant, sola autē facies aspectū ingrator, deformiorq;  
 sit quodāmodo, eaq; non admodū indecora appareat, curatio-  
 nem experiemur. Nonnulli siquidem haud pauci, sola capitis  
 adustione



adustione multos qui hoc inceperāt uitio corripī, ne uincerentur, inhibuerūt. Protinus ergo inter initia sanguis mitti debet, & magis uere, in quo potissimum hæc lues, & nascitur, & intenditur paucis diebus interpositis, nouem decēve, pulcē diacolocynthidos ipsos purgabimus, non semel, uerū subinde, ex ratione uirium quantitatē medicaminis adaucturi. Item ex hiera purgatio his est idonea. Rursus interpositis circiter decem diebus, lactis fissilis serum dabitur, neq; minus tribus heminis, neq; amplius quinq;. Insequenti tempore nō fissō, aut recens multo lacte nutrientur. Ob quæ si morbus remittat, eodem uti cibo debent: si remanet, lacte abstinebunt: acribus autem assumptis uomitus cietur, à radícula, aut cibus. Proficit & ex albo ueratro post hæc purgatio: bis quidē, si fieri potest, uere, semel per autumnum adhibita. Malo uictis neq; sanguis mitti, neq; ueratrum exhiberi debet, cum materia neq; ex cute in altum deriuari, neq; hinc etiamnum minui possit sed ea quidē ad uentrem, & intestina deducenda est. Medicamenti autē noxia euocantibus utendū, metasyncritica dicunt, & summam cutē deficcare, & astringere oportet. Leues igitur cucurbitulæ uentriculi ori & præcordijs agglutinabuntur, eadem membra etiā dropace delinentur. Modico temporis processu rursus ad superiora reuertendum est, à purgatione quam præstat hiera, incipiendo, præmissa sanguinis detractio, ut quæ plus noxæ, quàm præsidij esset allatura. Atq; hoc circuitu ad ternas uices quaternas uel per annum uti expedit, uere potissimū & autumno. potare his prodest aceti cyathum, cū cedrini liquoris cyatho, & brassicæ crudæ succi cyathis duobus. mista dantur manè & uesperī. Vel syderitidis herbæ folia torrida denarij pondere in uini cyatho, uel cornu cernui drachma, & scillitici aceti quantum cyathus implet, quotidie post matutinā obambulationē potui exhibetur. reliqua uerò pro ratione tēporis his offeruntur, uel scillæ lotæ drachmæ quinq; in mulsā, uel melle eclegmatis modo: uel liquoris cyrenaici ad erui magnitudinem, melle & butyro subacti, uel eboris ramenti drachma semissis cum uini cyathis duobus, uel cumini æthiopici drachmæ tres cum melle, instar eclegmatis. His amplius iuuat theriacorum pastillorum drachma in uini primæ notæ cyatho leuigata epotāque. Similiter etiam scilliticorum pastillorum drachma bibitur. Et calaminthæ succum ceum efficacissimū potu auxilium

PAULI AEGIN.

f. commen-



commendat. incipiendū dicunt à cyathis ternis adusq; senos. Cæterū omnibus his efficacior est theriace ex uiperis, tum potui data, tum extrinsecus illita. Cū autem uiperarū copia datur, nihil æque proficit, ac uiperarū carnes comestæ, albo iure ex copiosiore aqua, sale, porro, & anetho decoctæ, usq; dum spiritus dissoluantur, sed capitibus ipsorū caudisq; digitos quatuor prius amputatis, interaneisq; ipsorum ablatis & cute. Item theriaci sales eadem per se promittunt, cum obsoniis assumpti. Tali enim ipsorū usu accidit, nonnunquam squamas,† uel ceu uulpis pellem quandam ex cute elephantiorum decidere.

† Aldinum exemplar habet καππαδοκην ἀρετῶν, Cappadocem Aretæum. quæ lectio rectior mihi uidetur.

‡ Vetus codex, συμβάλει ποτὲ λεπίδας ἢ οἶόν τινα λοπὴν, quo loco legendum arbitror, ἢ οἶόν τινα λοπὸν: est autem λοπὸς τῆς κεφαλῆς ἐλέφαντος, id est, cepæ tunica, ut sit sensus, ueluti cepæ tunicam & tenuem illam pellem.

*Virtus ratio talis erit.*

**A** Somno manu molliter permulceatur, aluoque deiecta gestetur, uocem exerceat: deinde perfricetur & uario exercitationum genere utatur, nunc saltu, nunc magis, alteribus, & folle. Postea sudore, quē illinc contraxit, absterfo delinetur adipe ursina, aut uulpina, aut hircina, aut auis alicuius, aut butyro recenti pauxillo temporis interposito in lauacro perungeretur succo fœnugræci, aut ptisanæ cremore, aut ammoniaci momēto, quod aceto subegeris. A balneo deterfus perungeretur oleo lentiscino aut cœnanthino, aut myrteo. Vinoq; modico cum alumine, uel ammoniaco, ut sordium sit spissitudo. Rursus teneris panuiculis abterfus dimidia hora conquiescat. Inde potui aquæ ad uomitū sollecitetur, digitis in os, aut pinnis demissis, post uomitū detur potui uinum absinthites, aut origanites. Cibus erit panis hordeaceus, uel maza ex polentis. Inter olera, beta, lactuca, raphanus, porra, brassica aquis binis edulcata, & capparis. Ex marinis ostrea sumuntur, pelorides, erinacei, pettines, tellinæ simul cum betis incoctæ: salsamentum uetus ceu in medicamento uicem adhibetur. Vino autem per totum morbi curriculum & uenere similiter abstinendum. At cū uires ex purgationibus lassitæ recreantur, pauxillum duntaxat uini



uini tenuis & aquosi assumitur, quando & acria circuncidi debent, exceptis condimentis. Recte quoque ipsis datur ptisana, oua, chondrus elorus, lac, mel cum pane, malua, rumex & fisanum: piscis molli praeditus carne: Ex ijs quae uolatu fidunt, probis donata succis: Inter fructus, ficus, uua, & uuae passae: ex dulciarijs mellitis conferunt, quae pini nucleis, aut amygdalis frictis, & cnico, constant, ijs qui bis quotidie cibum capere solent: graue autem his est molestumque, semel duntaxat cum assumere. Interiorum cura habita, smegmatis in balneo utendum ex decocto betae, aut fenugreci cum aphronitra, aut sapone, aut myrobolano: inrerim & psilothris. Abstergit itidem portulaca cum aceto detrita, tenue semperuiuum, rumicis radices aceto incocta, alumen cum sale. Item sandarachae par modus ex uino, & oleo lentisci. Huc spectat medicamentum, ad utiliginis speciem quae alphas dicitur, accommodum, ex alcyonio, nitro, myrto, sulfure, fici agrestis folijs siccis, cum aceto tritum, illitumque: idem praestat quod ex sepiae testa concremata sit pumice, nitro, terra cimolia extorrefacta, gummi, galla omphacitide pari pondere siccum inspersum, aut ex aceto infricatum. Hoc autem mirabiles habet effectus: rumicis radicum fasciculus qui manu comprehendi possit, nitri drachmae quadraginta, thuris uiginti quinque, sulfuris tantunden, ex aceto Aegyptio illinitur. Similiter hoc efficax est, quod recipit auripigmenti drachmas decem, sulfuris ignem non experti drachmas octo, costi drachmas duodecim, calcis uiuae drachmas quatuor, cerae totidem, baccarum lauri aridarum drachmas duodecim. Haec macerantur populi albae foliorum succo, aut crasso decocto. Vbi mellis spissitudo est facta, illinuntur, **ALIVD.** Radicum rumicis fasciculi duo, aceto incoquantur, & in pilam coniecti conteruntur laeuiganturque. Deinde alcyonii libra, aphronitri unciae octo, sulfuris ignem non experti libra, cochleae testarum combustarum triens, & chamaeleonis cum radice triens. Omnia simul laeuigantur, donec foridum fiat crassitudo. Deinde illinuntur per aestatem in sole frequenter, hyeme in balneo usque ad desudationem. Item Aesculapij aridum smegma pulchre his conueniet, ac omnia quae communitur dicuntur smegmata, imo etiam ea quae alphis dicata sunt proprie huc pertinent. quemadmodum & quae nunc aduersus illa prodidimus. At tumidas eminentias si inflammatione tenentur, aut exulcerata sint, delinuntur lycio indico, uel glaucio,



uel aloe, uel Andronij pastillo, aut polyidæ sphragidei. Cataplasma ipsis aptabitur ex chondro cum succo polygonij, uel plantaginis, uel parietaria trita. Insuper melissæ herbæ uiridis folia cum axungia tinsa, applicataque mirabiliter proficiunt. Etenim rubor in partibus excitatur, sed ex facili remittitur pane applicato, aut cerato ex amygdalino atque color naturalis redit. Exulceratis rectè accommodantur emplastra, tum ex diaphryge præparatum, tum ex uino melinum. Adde Coracion, quòdque constat ex oxymelite, & pastillum Andronij, pompholigem, & cadmiarn. indicium uerò est totum morbum mitescere. si prima ulcera cicatricem recipiant. Ad spirandi uerò difficultatem eorum qui elephantia laborant, aselli sub aquarijs degentes, quinque, aut sex, ex aquæ mulsæ cyathis tribus potantur. Iam uerò quædam ex ijs quæ ad ægrè spirantes inscribuntur, ipsis quoque communiter competunt. Aquarum naturalium usus adhiberi debet, ceu maximè necessarius, præsertim aluminosarum, ferrumque resipientium. & si fieri potest, frigidarum. Conferunt ipsis si etiam bibantur, nec non marinæ arenæ usus. Eandem habent efficaciam omnia quæ de sudationes mouent. Quoniam uerò affectus hic, uon minus ac pestilentia contagiosus est, quàm longissimè ab urbibus remoti ægri, in locis mediterraneis, frigidis & ubi sit hominum si fieri possit, infrequentia habitabunt, inde uerò ad confinia migrabunt, † tum ipsorum causa, tum illorum potius qui, ut uerò simile est, ipsis incident. Quippe & aere fruuntur commodiore, & alios hac lue non inficient.

† Vetus liber habet, χαμαιλέοντος μέλανος τῆς ῥίζης, id est, chamæleontis nigri radice uncie tres.

† Hic locus sic legitur in ueteribus libris. διὰ τε αὐτὸς καὶ τὸς ὡς οἶκός ἐν τὸν ὁρμήνους συχνότερον, id est, tum ipsorum causa, tum illorū potius qui (ut uero simile est) frequētius incidēt.

*De lepra, & scabie, quæ psora dicitur. Cap. II.*

**V**Terque affectus, cutis aspritudo est cum pruritu, in qua corpus absumitur colliquaturque: originem ex melancholico humore trahens: sed lepra altam cutem orbiculatim depascitur & pisciū modo squamulas ex se remittit. Scabies uerò summa infestat potius uariè figurata, furfuracea-que remittit: in quibus sanguinis dimissio adhibenda est, si corpus



pus magis plethoricum uideatur. sin minus, purgatio certè ex  
ijs quæ atræ bili uacuandæ sunt. Extrinsecus autem uterè com-  
muniter utroq; ueratro, calcemq; habe elotam & siccam: in  
ipso autem usu, aqua diluens ad sordium spissitudinem illinito.  
ALIVD. Saluiæ, oleæ æthiopicæ lachrymæ, singulorum drach-  
mæ octo, capparis radice corticis, gummi, singulorum drach-  
mæ quindecim. Inunguntur ex aceto ad solem, propriè uerò  
lepras disijciunt anemone applicatæ, item uitis albæ radix. Cō-  
posita uerò hæc, lolij farinæ chœnix, cardamomi albi drachmæ  
quatuor, nitri spumæ drachma, atramēti sutorii drachmæ octo  
hastulæ regiæ radice mediæ drachmæ quatuor. Aceto pertri-  
ta, & in cerati spissitudinem coacta illinuntur, parti prius nitro  
deterfæ: ubi solueris (solues autem tertia die) & frigida aqua  
elueris, rursus inungentur. ALIVD. Hastulæ regiæ radice succi  
unciæ sex, sulfuris ignem non experti, mannæ, singulorum dra-  
chmæ decem, nitri drachmæ octo, aceto subacta illinuntur. Ad  
scabiē peculiariter facit, ex simplicibus herba pedicularia, sta-  
phis agria dicitur, lupini amari, cardamomum cum aceto, lili  
radix cum melle, resina terebinthina, sulfur, cicer, caprillū ster-  
cus Inter composita, misy & chalcitis pari modo ex uino humi-  
diores scabies delinuntur. ALIVD. Rhododaphnæ tenera folia  
in olei sextario simul incoquito, donec arecant. Ac ubi proie-  
ceris, oleo adiunge ceræ dealbatæ uncias tres, postquàm solu-  
ta refrigerataq; fuerint, sulfuris uiui unciam inspergito. ad so-  
lem, uel in balneo perungito. nonnulli simul cum rhododaph-  
næ etiam scillam coquunt. ALIVD. Medicamenti δίαχυλῶν,  
hoc est ex succis herbarum confecti uncia duæ, ceræ tantundē  
rosacei uncia argenti spumæ uncia tres, cerusæ totidem, liqui-  
dæ picis uncia sex, stercoris argenti uncia duæ, sirici tantundē,  
aceti quod siccis læuigandis sufficit. ALIVD. Cerusæ semuncia,  
amyli tantundem, plumbi uncia, lotariorum rubrorum uel an-  
chusæ, uncia duæ, ceræ uncia sex. rosacei uncia nouem. An-  
chula probè cum rosaceo coquitur, deinde reliqua adiciuntur.  
ALIVD. Oua decem, uel quot ad usum opus est, aceto quam-  
acerrimo macerantur, quousq; putamen ipsorum tenerescat,  
lutea in eodem aceto coquuntur, læuiganturq; rosaceo, & re-  
liquo aceto etiam argenti spumæ modicum ad sordium spif-  
situdinē coactum illitur. ALIVD. Quorum quæ in aceto com-  
maduerint, lutea tria, rosacei uncia sex, sulfuris uiui uncia  
f 3 tres,



tres, leuigatis prius cum aceto luteis & sulfure, ceratū adijcito. Argenti spuma uerò oxyrodino detrita, ut emplastri crassitudo fiat, acriores scabies exerit. Iam uerò ex lapathio sinegmatata, & ex iis quæ elephanticis faciūt, plura communiter tum ad lepras, tum ad psoras conueniunt.

*De impetiginibus.*

*Cap. III.*

**I**mpetigines ex serosis tenuibus, acribusq; humoribus, crassioribus aliis mistis contrahuntur, celerrimè in scabiem, & lepram transeuntes, quapropter remedia ualidè siccantia requirunt. Corpore igitur toto, si opus fuerit, euacuato, simplicia quidem ipsis cōferent, cicer, ueratrum, erinaceus saxatilis, pix cerato, resinæq; mista, crocodili terrestres stercus, atq; sturnorum, cum oryzam solam ederint. Pleriq; hoc solo impetigines mentum infestantes, aliā nue particulam, aboleuerunt. Tritici multum capitur, incudiq; ignitæ cuiuspiam imponitur, & quicquid inde humoris defluit, calens adhuc impetiginibus illinitur. Puerorum impetigines, hominis salua continuè defricantur. His opitulantur pruni gummi illitum. In uetustatem incidentibus uiticis folia cū aceto detrita applicantur, uel capparis folia similiter. Composita uerò hæc sulfur cū thuris lachryma, aut cum ammoniaco, subactum aceto illinitur.

*Pastillus ad impetigines.*

**G**lutinis fabrilis drachmæ quatuor, thuris drachmæ tres, acetæ cyathi dimidium, aceto soluta illinuntur. **ALIVD.** Chalcitidis, gummi, singulorum drachmæ octo, sulfuris ignem non experti, misyos, singulorū drachmæ sex, squamæ æris, acaciæ, singulorum drachmæ duæ, aceto delinuntur. **ALIVD.** Sulfuris. uiui, nitri spumæ, singulorū drachmæ quatuor, cachrys grana sexaginta, læuigantur ex aceto. Sola uerò pars uitiatā inungitur, sed ita, ut quæ integra est, non coinquinetur: exarefacta, aqua frigida eluitur. **ALIVD.** Veratri albi drachmæ octo, iarinæ lupini, buccinorum cōbustorum, nitri, singulorum chenix. Arido medicamine defricent. Porro impetigines, quas *αγξίς*, id est, feras appellant, mediocriter siccantibus remedijs nō discutiuntur, acrioribus autem irritantur. Adhibere igitur oportet medicamenta abundè quidem efficacia, sed quæ nō ualenter erodunt, quæ est istud, Glaucii, thuris, alcyonii, bituminis, sulfuris,



sulfuris, gummi, singulorum uncia, aceto inungitur. ALIVD. Picem aphricanam cū aceto coctā liquatamq; illinito. ALIVD ad impetigines & pruritus. Atramenti sutorii, sulfuris uiui, nitri, thuris pari modo, in impetiginibus quidem, aceto adiecto, in pruritu autem, uino utitor. ALIVD. Leichenicon, ab impetiginibus curandis nuncupatum. Guttæ amoniaci, erui farinæ, lupini farinæ æquales portiones aceto illinuntur.

*De Pruritu.**Cap. IIII.*

**P** Ruritus qui senibus accidit, ex toto nunquam consanescit, uerum lenitur infra positis remediis. in reliquis ætate, si ex prauo humore contrahitur, qui nimirum biliosus, aut pituitosus putris uel etiam salsus est, per ipsius uacuationem tollitur. Porro cognoscitur ab ætate, temperamento, uictus ratione, anni tempore, regione, & reliquis his consimilibus. Si igitur in uenis simul cum sanguine redundare uideatur, à sanguinis dimissione auspicandum est. Sin autem qualitate magis peccet, congruis eo medicamentis uacuato, ad externam curationem diuertemur. Lauandum itaq; prorsus ieiuno est, nonnunquam & modico cibo sumpto, iterum lauandum: quippe uitium uix inhumescit, derergitur autem fœnugræci decocto, aut betarum, aut fursurum, aut maluæ agrestis, & satiuæ, aut prisanæ. Præter hæc, farinæ etiam fabaceæ, uel lupini, uel myrobalani, uel sinigmati ex pepone præparati, quod *πεπόναντον* appellant, si inueterauerit, lauatio similiter quidem cōuenit. forus autem ex saluæ decocto, myricæ, mercurialis, origani, pulegii, baccarum lauri, cucumis syluestris radicis, capparis, lixiuio, & oxalme. Deinde respergunt arido nitro, uel cū fœcula aceti, uel quod recipit nitri spumæ sextariū, thuris, sulfuris uiui singulorū librā, cimoliæ libram semissem. Vel hoc, Aphronitri, sulfuris uiui, alcyonii combusti, pari modo. siccis utitor, uel cū quodam ex suprā dictis decocto. Si antē placet, etiam ueratrum siccum inspergito, sine pingui addito. Illinitur autem cum oxelæo herba pedicularia contrita, uel sulfur, uel sandaracha, uel omnia, uel sinapi cum myrobalani expresso, & oxelæo, uel utere cochleis combustis leuigatisq; melle, uel rumicis radicibus, uel sinigmati inde cōfectis, ut in capite de elephantia comprehensum est, aut quibusdā ad scabiē efficacibus. Si autē exulceratio partes excreuerit. parygro, uel



diapompholygos appellato medicamine utendum, uel ceræ uncia liquefacta in cyprini cyatho, cui sulfuris adiecta sit uncia. *ALIUD* ad pruritus. Nucum agnarum raucidarum uncia, sulfuris tantundem, apij succo leuigatis utitur in balneo, membra assatim defricans. Hoc solum multis tum scabiosis, tum alio pruritu retentis, abundè fuit. Item apium per se uiride tusum infricatumq; in balneo uehementer auxiliatur. Similis effectus est perdicion, & acerna resina cum rosaceo soluta, illitaq;. *ALIUD*. Oryzæ puræ & nimius candidæ, uncia tres, tusa cretæq; aceto quàm acerrimo læuigantur, donec sordium fiat spissitudo, adijciaturq; priuatim sulfuris uiui detriti uncia. mixtis perbellè in balneo utitur, diutius defricās. At in iis qui superfluitatibus magis redundant, pari portione illorum temperata, præstantius remedium reddetur.

*De Leuca.**Cap. V.*

**L**euca, cutis quædam ad albidius mutatio est, quæ uiscosa, glutinosaq; pituita contrahitur. Quoniam uerò non quælibet leuce curationem recipit, notas ipsius tales habeto. Ac uer summa leucem pungito, sed cute non penitus: & siquidè sanguis emanauerit, sanabilis est: sin lactea humiditas, desperata est. Vel panniculo laneo asperiore infricata cutis, si quidem rubicundior euaserit, medicinæ locus est: sin idem color remanet, non consanescit. Et quæ plura corporis loca obsidet, leuce, difficilior tollitur, quàm quæ pauca deturparit, item uetustior, quàm recens minus in medicina spei habere cēsenda est. Nonnulli igitur adustionem quæ ferramento candente administratur, in leuca probarunt, sed ita, ut hæc uel sola ualitudini sufficeret. Alii uerò dolorem inde cicatricemq; secuturam ueriti, ut quæ non minus ac leuce indecora sit, medicamentis crustam inducentibus, qualia & cicatricem aiunt concolorem efficere, usi sunt. Alii, & horum inefficaciam repudiantes, tincturis uti maluerunt, imposturæ potius quàm auxilii rationē habentes, quæ sanè omnium maximè uitari debent, q̃ affectus celeriter renascatur. Itaq; subiectis uti medicinis consiliū est, ad arcæ seminis roris marini, sulfuris uiui, singulorum paria pōdera, tusa & in cerniculo priuatim creta, deinde simul cum aceto in puluerem sat multis diebus detrita, in sole illinuntur, nō cumulatè, ne cutis exulceretur. Procedente autem tempore  
tueratri



†ueratri & gallæ similiter momentum adiicitur. **ALIVD.** Fici nigrae surculis, aceto maceratis, contritisq; misceto, aphronitri, sulfuris ignem non experti, myricæ fructus, parem singulorum modum, ubi nitro cutem defricaueris, perungito: solique exponito, animum attendens ne exulceretur. Archigenes autem fici foliis, calcis uiuæ eo quod satis est mixto, similiter usus est, uel infricatas (inquit) leucas, albo ueratro, donec sudore diffuentes reliquo corpori concolores fiant, illinito synopide, uel mediade, uel acu transfixa punctas quoad cruor emanet, illinito synopide, cum aceto, uel prius absterfis, ut est comprehensum, perungito, fici liquore recenti, & folio eiusdem affatim infricato

† In ueteri lib. hæc est scriptura, λευκὴ ἐλλεβορέα, ueratri albi.

*De alphi albo, & nigro.*

*Cap. VI.*

**A**Lphi cognato leucis modo generantur, sed illæ quidem altius cutē mutant ut pilos quoq; sibi similes procreēt. Alphi aut summam cutem infestant, quanquam & ipsi cum uetustatem sentiunt, penitus recedunt: ut etiam albos pilos producant, idq; humoris qui subest ratione. Etenim ex pituitoso humore albi ducunt originem, nigri autem ex melancholico, utrisq; igitur commune prodest auxilium, eloracalx aqua soluta, aut dracūculi radix, cū aceto applicata, simili modo utrunq; ueratrum eisdem efficax est, item lupinorum amarorum decoctio superfusa, eorumq; farina, ex aceto, uel oxyme lite inducā, iam capparis radice cortex cum aceto, liliq; radix cū melle, capra ex aceto in sole illita, crododili terrestres finus idem præstat, pari efficacia & sturni excrementū, cum oryzam duntaxat ederit, sepīæq; testa cōcremata. Compositum uerò hoc præstans est, Alcyonii, nitri, singulorum sextans, ueratri albi, sulfuris uiui, singulorum uncia. Nonnulli uero & floces uini combustas adiiciunt. **ALIVD.** Sulfuris ignem non experti, nitri spumæ, singulorum drachmæ quatuor, seminis roris marini grana septem, teruntur cum aceto. solum uerò alphi perungito, sed ita ut integram partem nō attingas. siccatum medicamen aqua frigida eluitur. **ALIVD.** Farinæ lupini, buccinorum, & nitri singulorum choenix, ueratri albi, drachmæ octo. Arido pars defricatur. **ALIVD.** Erui farinæ librae duæ, crucæ seminis, anygdalarum amara: um, cucumis syluestris



uestris radicis, singulorum libra : mulso simul leuigata delinuntur, & hora interposita per spongiam abluuntur. facit etiam ad ephelidas, uaros, & cutis sordes.

*Ad Alphas albos experta.*

**S**ulfuris ignem non experti, sextarii duo, calcis uiuæ candidæ, Sunci quatuor, albumina ouorum quinque, olei nardini, & aceti momentum. Sulfur primum in puluerem cogitur, mox oleum nardinum ei superinfunditur, rursusque leuigatur, deinde acetum instillatur, & iterum teritur, calcem uero priuatim lotam semel, bis, tertio, sulfur adijcimus, una cum ouorum aquato, & denuo coterimus. collectus humor effunditur. paucillum uero relinquens, ut unguentum queat illini, in hunc modum utimur. **ALIUD** probatum. Sulfure uiuo, fici foliis aridis, aphronitro, alcyonio, terra cimolia, myrto, ex aceto utitur. **ALIUD** Archigenis. Fici foliorum quæ in umbra exaruetur, sulfuris, aluminis singulorum aqua portio cum aceto inungitur, aut foliorum fici drachma quatuor, nitri drachmae duae, alcyonii combusti tantundem, aceto in balneis illinuntur. Priuatim nigros exterit efficaciter sandaracha, cum sulfuris dimidio, sed cute nitro prius defricata, in sole perungitur. albos uero tollit atramenti sutorii, æruginis, æqualis modus, nitri duplicatus, sine pingui infricatur, illiniturque, uel cachryos, sulfuris uiui adarcæ aquæ portiones, ex aceto pertritæ infricatur, illinunturque, cum inaruerint abluito, locum perfri-cans. Idem facit & leucis.

*Ad Stigmata, ex commentarijs Archigenis. Cap. VII.*

**S**tigmata curabis, si quod matulae adhærescit, cum aceto quam acerrimo illinas, uel calcis uiuæ partem unam, nitri tostifului dimidiam, cum aqua in sole illinit. At ubi exulcerationem fuerint experta, cicatricem tanquam ulceri inducito. Crito uero iubet confricatae nitro prius cuti terebinthinam illini resinam, linamentisque ligatam sex diebus relinqui, septima deinde solui, & acu pungi stigmata, & sanguinem qui flueret spogia detergi, interiectoque breui temporis spatio, tenui sale confricare locum. Tum imponi, ad dies quinque medicamentum quod recipit, thuris, nitri, calcis uiuæ, cærx singulorum drachmas quatuor, mellis octo. Quum. n. a parte medicamentum deposueris, nigrum in eo offendes. **ALIUD** unguentum Piperis drach. duae, rutæ drachma qua-



ma quatuor, sandarachæ drach quatuor, auripigmenti drachma mellis quod satis est, cuti prius nitro infricata illinitur, itē aliis priori cōsimiliter peractis, per triduum soluitur, & nigræ absterfa, rursus inungit. Exerit. n (inquit) diebus uiginti, tam integrē, ut nec exulcerationē, nec cicatricē relinquat. ALIVD. quod Criticon dicitur. Thuris drachmæ quatuor, nitri drachmæ dūa, atramenti sutorii drachmæ quatuor, ceræ drachmæ sex, piperis drachmæ tres, calcis drachmæ tres, thapsiæ totidē, auripigmenti drachma una & semis, sandarachæ drachmæ tres, mellis quod sufficit, utere quemadmodū superiore Oribasius tradit ranunculū applicatum, uel capparis folia stigmata extere. At si altius fixa non discutiantur, modicam uero cutem attingant, crusta ferramento frigido excitata tolluntur.

*De exanthematis.**Cap. VIII.*

**E**Xanthemata generantur, ex crassis in cute impactis humoribus, magisq; adhuc in superiore pellicula cū densa est. In quibus igitur, si ēt in alto humorū copia subliterit, primū purgatio tentāda est. Nā si hoc neglecto, prius discutere aggrediari, obstrues ipsos potius q̄ per cutē euacubis. Sin aut nullæ in alto deliteāt humorū colluies, p cutē uacuare oportet, nec procul attrahere, si aluo, aut uomitu uacuationem moliri uelis, sed humorum qui curi impacti sunt, curationē medicamētis experire, quæ exurūt, calfaciūtq; maximē quū lata sunt exanthemata, siquidē ex frigido admodū, crassoq; humore, talia sunt procreata. Lauri igitur tenerorū foliorum, rutæ & manna, æqualē singulorū portionē detritā, & lachrymā thuris oleo subactā delinito, uel betā tenerā incoctā, tritāque inducito, aut ceræ drachmas octo, sulfuris tantundem, salis drachmas sex. Arida in pollinē coacta, & olei cyatho dimidio superfusa, oīa simul incoquito, factōq; emplastro utitor. Sed curationi sedulò assistendū est, uehementer bonū remediū existit.

*Ad epinyctidas.**Cap. IX.*

**E**Pinyctides ulcuscula sunt, sua sponte erumpentia, pustularum specie, & subrubra, quibus diruptis, cruenta sanies defluit, per diemq; non magnopere excruciant: per noctem uero, graui magis quā pro ratione ulceris, dolore torquent. Itaq; liquor laseris aqua solutus imponitur. nam citra rofionem desiccat, aut cicuta in leuorem detrita inducitur, aut brassica



brassica cruda cum aqua, aut apium cum polenta trita applicatur, aut alterci folia, cum melle pertrita admoventur, aut solanum per se, & cum coriandro uiridi, aut oliuæ foliis utitur cum aqua coctis: aut uuas acinis exemptis, leues, splenio illitas imposito, uel adianthū ex melle tritū. Vitari debet acriū, acidorum, & salforum esus, fomenta, balneum & insolatus.

*De pustulis, quæ Græcè phlyctenæ dicuntur. Cap. X.*

**P**ustulæ quæ non sua sponte rumpuntur, sed graui dolore excruciant, acuta perforari acu debent, ut humoris colluies habeat emissarinum. Deinde humore leuiter expresso cutis præposita finitur, donec impleatur. At si uulnus continet, denuo pustula perforanda est similiter & exprimenda, tum cutis astricta, seruanda quandiu id quod sub ea exulceratum est, ad cicatricem peruenerit. Priusquā igitur pustulæ aperiantur, cocta lenticula cum aqua leuigata inducitur, uel mali granati uirgulta, cinere calido tepefacta imponuntur, & loci attinguntur. Quod si ruptæ fuerint, & ulcus excitatum, adeps suillus liquefactus & argenti spumæ detritæ mistus, in linteum quæ illitus admouetur, uel lilij radix in aqua cocta tritaque cum cerato imponitur.

*Ad epinyctidas, & phlyctenas.*

**A**rgenti spuma & sulfur ignem non expertū pari portione cum aceto applicantur, item myrtus in laeuorem redacta, sordium illitione cum oleo & uino, benefacit, tum his, tum calidis eruptionibus, & papulis feruentibus, gliscentibus capitis ulceribus, furunculis incipientibus & adustis medicamentum, & quod molybdena, & quod ouis præparatur.

*Ad ambusta. Cap. XI.*

**A**mbusta medicamentis indigent quæ modicè abstergāt, non euidenter calefaciant, aut refrigerent: Itaque terra chia, cimolia, cretica, omnisque leuis terra illita cum aceto non admodū acri, uel aqua, præclare facit, prohibetque pustulas excitari. itē oui albumen crudū statim impositū, lana mollī exceptū. etenim refrigerat leuiter & citra rofionē desiccatur. idē efficit aramentū scriptoriū illicitum, uel lachryma thuris aqua diluta, uel lenticula cocta tritaque, uel eruus applicatur. At ex aqua calēte ustiones priusquā pustulæ oriātur, oliuarū salfarū aqua



aqua cōtinuē superfunduntur, ipsæque oliuæ falsæ cum polenta contritæ inducuntur, aut alumen scissile, pertritum cū aceto illinitur, aut fel taurinum cum aqua copiosiore liquatum inungitur, aut lixiuium superfunditur, garo, aut muria fauetur, aut bulbi liliorum, aut hyacinthi, aut narcissi cum rosaceo triti, & in sordium spissitudinē coacti delinuntur. Marcellus autē hoc compositū tradit. Panniculi melle imbuti & hordei farina inuoluti, cōbustiq; cineris mittuntur drachmæ octo, cerusæ drachmæ quatuor, butyri drachmæ octo, ceræ, seui caprilli, rosacei, singulorum drachmæ sedecim. At pustulis iam excitatis, rhus cum polenta tritum aceto applicatur, aut calcem uiuam cerato mixtam, illitamq; linteolo imponitur, iam quod spherion dicitur medicamentum, ambustis utile est, partes exulceratæ porris cōtritis obducuntur, aut portulaca contrita cum polentis, aut columbæ fimi linteolo inuoluti combusti q; & oleo diluti cinere utitor: Mirificè proficit pini aut piceæ cortex, aut adianthum aridum, læuigatumq;: aut myrti, folia combusta, pertritaq; insparguntur. efficax autem unumquodq; horū est, & si cum cerato componitur, item quod rubræ anchusæ radicis siccæ, & in læuorem contusæ trientem recipit, ceræ albæ drantem, rosacei uncias duodeuiginti, iam quod cerusa constat cum modica cerui medulla, laudatum est remedium.

*Ad eos qui flagris cæsi sunt. Cap. XII.*

**C**erusæ argenti spumæ æqualis portio, ceræ quadrupla cum susino, aut rosaceo, emplastri modo inducitur, primo die priuatim susino solo utitor, uel croci drachma, tragacanthi tantundem, ouum integrum, sine putamine, unita cælis imponuntur, item pellis ouis recens excoriatæ calens adhuc circūdata, quolibet efficacius die uno, & nocte persanat.

*Quomodo pili adustis renascantur. Cap. XIII.*

**P**ili ambustis nascuntur, si fici folia in fictili tosta, cum cerato in emplastri modum imponas, aut caricæ drachmis octo, sampuci drachma, tritis cum oleo donec cerati fiat spissitudo, utitor, uel detrimenti lapidis drachmas centū, eris squamæ drachmas decem cum aqua subactas in pastillos cogito, in usu partem unam cerati partibus octo diluito.

Ad



*Ad abrasa, quæ aposyrmata Græci dicunt. Ca. XIII.*

**A**brasæ & superficiē infestantia ulcera, primū aut uino, aut aceto, aut muria aceto mixta quæ oxalmæ dicitur astringes. Deinde medicamētis, ad cicatricē ducēdam utere, tum liparis, tū ex albis emplastris trypheris. Sūmē autē facit qđ cerusæ partē unā recipit, ammoniaci dimidiā, myrtei quod satis est. Ammoniaco ex aqua in læuorem trito cerusā miscetur, myrteumq̃ue superfunditur: utitor lapata. Vel lapidis detrimento, squamam æris admisceto, & myrteo in læuorem coactis utitor, aut cimolia, & argenti spuma, ex uino, resininoq̃ue & myrteo tritis utitor.

*Ad abrasa, intertrigines, inueterata ulcera, senilem teneramq̃ue cutem.*

**A**rgenti spumæ chrysidis drachmæ quinquaginta, ceræ drachmæ uiginti, resinæ siccæ ex picea drachmæ duodecim olei sesquicyathus. Argenti spumæ oleo incoctæ reliqua adii-ciuntur: rudicula agitatis, uel etiam in pila emollicis utitor, sed cutem abrasam ab ulceribus non oportet amputare, sed medicamentum ei inducere: sic enim glutinabitur, uel nigrescens, At ulceri, quod eroditur, sordidumq̃; est, si carne nudum hiat, uix cicatrix obducitur. Cæterum abrasa tuetur ab inflammatione, thū rubrum, si illinatur læuigatum, cum melle, aut lentisci coma cremata, & cum melle imposita.

*Ad abrasa, flagris cæsa, & articulorum contusiones medicamētum, quod dolorem leuet anodynon appellatū.*

**A**rgenti spumæ, cerusæ, singulorū uncia decem, ceræ uncia sex, olei puri, aut rosacei sesquilibra, amyli uncia duæ. Ad eadem ualet Pelarion quoq̃; ex helcysmate, id est, recremento argenti paratur, item medicamentum quod ouis conficit.

*De formica & uerruca.*

*Cap. XV.*

**V**Trunque uitium, cutis ex crescentia est exigua, callosa, & plerunq̃; figura teres: sed formica, quæ Græcè myrmecion dicitur, latiore basi, † similem si quis non trectet mordētis formicæ sensum inducit. Verruca autem, quæ Græcis uocatur acrochordon, angustiore, ut chordæ summo assimilata, pēdere uideatur. Hos igitur tumores, elateriū cum sale infri-catū tollit, thuris lachryma cū aceto, grossi cū aceto, farina, & nitro,



& nitro, liquor fici illitus similiter facit: tithymalli, smaridis caput salsum concrematum, ærugo cum sulfure ignem non experto combusta, ocymi foliacum atramento sutorio, sarmentorum adhuc uiridium ustorum quod distillat, simus ouillus cum aceto, hircinum fel illitum, heliotropii magni semen, cum uino applicatum, ruta cum nitro & pipere, nitrum cum urina pueri uenerem non experti, stercus bouis gregarii in aceto.

† Huius loci duplex est scriptura, una in uulgatis codicibus, καὶ πρὸς τὰς ἀποφύξεις ὁμοίαν αἰδοῦσιν, id est, si quis deradat sensum mordentis formice similem inducit: altera est, πρὸς τὰς ἀποφύξεις, id est, si quis constringat.

De Ganglio.

Cap. XVI.

**G**anglium neruorum concretio est, ex ictu, aut lassitudine oboriens, in pluribus quidem corporis partibus, præcipue uero motui dicatis, nepe manu summa, & pedibus. Quo in uitio Archigenes calcem uuam unam cum adipe anserino, & terebinthina, imponendam censet. Doles uero medicamento, quod lapidem achatem recipit, utitur. At Oribasius, eo quod subsequitur, cerusæ, resinæ, e pinu, olei ueteris, singulorum uncia, ammoniaci suffiminis, galbani, singulorum tantundem, ceræ unciam quatuor, aut pilam plumbeam (inquit) crassiorem uertebrae modo ganglio ampliorem imposito, deligatoque: pondere siquidem longiori temporis spatio ipsum dissoluit, atque hoc nos utimur.

De inflammatione.

Cap. XVII.

**O**mnes ex æquo tumores calidos, quibus dolor, feruorque adest, nostri inflammationes, Græci phlegmonas appellare consueuerunt. Verum pro diuersa quæ ipsos facit, materia, hi quoque euariant. Cum enim sanguis probus, & crassitie mediocris, in particulam aliquam subito confluxerit, ac propter copiam impactus inhæserit, inflammatio proprie appellata nascitur. Cum uero flaua bilis in parte aliqua substiterit, herpetes: ubi & sanguis, & bilis flaua simul incubuerint, erysipelas excitatur. At cum sanguis, qui influit, calidus impense, & crassius fuerit, carbunculos mouere solet. Itaque ab inflammatione quæ peculiariter phlegmone dicitur, & multis semper accidit, incipiendum esse iudico. Tumor rubens, dolorificus tangenti renitens, & calidus ex sanguine, ut à me dictum, est probò originem trahit: qui, sanguinem dico, nunc ex toto fer-

tus



tur corpore, nunc in aliquam particulam copiosius incumbit, sic ut à uasis nequeat contineri, exciditque aliquid roris modo in ampla partium quæ intercedunt, spatia. Sæpe uero uirium hoc uulneribus, fracturis, ulceribus, alijsque pluribus externis causis superuenit. Cum itaque inflammatio repente euestigio particulam quampiam sine manifesta causa præcedente obderit, totum uero corpus, parti contagium transmittat, uniuersum quidem id, sanguinis dimissione, uacuari oportet. quod autem inflammationem experitur, superfundere ac obducere medicamentis, quæ non calefaciant, humectentque, sed illuuiem humoris repellere sint idonea. At quod iam in affectam partem se receperit, euacuatur. Itaque illinitur cataplasma quod constat semper uiuo, mali punici corticibus, uino incoctis, rhu & polenta. hoc & similibus cum dolor uehemens non urget utendum est. Vbi uero particula fluxionem cum dolore ampliore senserit, ne sic quidem calens aqua oleum uel adhiberi debet, aut ex farinis cataplasmata, ut quæ fluxionum uitis omnia sint inimica, doloris tamen uehementia leniri eo quod constat passo, rosaceo, ceraque modica, & lanis sordidis quæ æsypi multum contineant. Per æstatem quidem frigida, hyeme tepida excipiuntur, applicanturque, sed ita ut superiores quoque affectis partibus loci, spongia uino austero imbuta, aut posca frigida comprehendantur. cæterum miscentur cum cataplasmatibus utiliter etiam herbæ. Parietaria igitur ad omnem inflammationem accommodata est, tum per initia, tum in augmento, consimiliter glaucium, atriplex, malua, lactuca, cucurbita, calidis illitæ, benefaciunt & tribuli utrique inflammationibus ex influxu concitatis. brassica uero durefcentibus ualet. At ubi immutatio his oboritur, nec pus subsidet, curationem tentabis emplastro, quod ex chalcitide conficitur, aut quodam persimili fluxionibus dicato, lanam uero putam uino austero imbutam extrinsecus medicamento superaccommodabis. Atque hac ratione inflammationibus ex humoris defluxu contractis medeberis. Eas autem quæ occasione cuidam feruntur acceptæ, si calefacias, humectesque, non offenderis, ac si usus quandoque postulauerit, scarificare ipsas, conueniens erit. At si ob defluxionem ortas inflammationes scarificatione diuiseris, præsertim per initia, malum quoddam haud mediocre ægroranti accerfes.

De



**Q**Uòd si fieri non posse tibi uideatur, ut suppuracionem impedias, panem hydrelæo incoctum delines, aut farinam hordeaceam consimili præparatam modo. par-  
 ticulâ iure radicis althææ incoctæ fouebis. At si tumor ad sup-  
 puracionem contumax est, aut egrè discutitur, cataplasmate ex  
 ficis siccatis utere: oportet autem ficus dulces pinguesque in-  
 coctas aqua eliquescere, ac ius ipsarû in tenuis mellis speciem  
 cogi, farinamque hordeaceam adijci, & si quidem tumor discu-  
 titur minus autem ac conuenit, cû ficis siccatis incoques hyssô-  
 pum, oryganum: si uoles magis intendere, salê decocto inij-  
 cies, diligenter animum aduertens, ne siccando nimium pars  
 in scirrhum occalescat. Tale si quando uideris, cucumis sylue-  
 stris radicem, aut althææ, aut bryoniæ aqua simul decoques,  
 ualentior autem & discutiendo promptior, dracunculi radix  
 est, ipsumque medicamentum, quod dracunculo constat, ualidè  
 huiusmodi uitia dissicit. Nonnunquam igitur solum hunc, de-  
 coques, nonnunquam & ficus siccatas admiscebis, farinamque  
 simul cum adipe. Iam anethinum oleum crudos humores, in-  
 coctosque tumores, & concoquit, & discutit. Item pix duros  
 ac crudos tumores uniuersos cataplasmatibus indita concoquit,  
 magisque liquida. **MEDICAMENTVM** compositum quod  
 abscessus iam coctos expellit. ut subinde pus in splenio repe-  
 riatur. nondum uerò coctos in totum discutit. Lapidis pyri-  
 tis drachmæ duodecim, ammoniaci triti tantundem, lomenti  
 drachmæ sex, exceptum pice, liquida, pelli que illitum imponi-  
 tur. Splenium uerò non prius aufertur quam sua sponte deci-  
 derit sed medicamentum non multo antè præparari debet, ut  
 quod confestim siccescat. In his autem si tumor non dissipatus  
 fuerit, & pus sub eo delitescat, parte scalpello diuisa, idip-  
 sum uacuabitur, cura deinceps adhibita ne oleum, aut aqua ad-  
 moueatur, uerum si uulnus abluere interim oportet, aqua mul-  
 sa, posca, uino & mulso utendum est. Si uerò inflammatione  
 confictetur, ex lenticula cataplasma inducitur. ubi inflamma-  
 tio abest, alio quodam emplastro medicamento in huiusmo-  
 di sectionibus utemur. quinetiam eo quod constat chalcitide.  
 Cæterum super ipsis inicitur spongia lauata uino austero im-  
 buta, uulneri autem nullum pingue medicamentum accom-  
 modatur,

PAULI ÆGIN.

t

modatur,



modatur, quale est tetrpharmacum. nam uehementer postulat succellore.

† Hic locus est expressus in ueteribus lib. τὰ μὲν ἔδῃ πεπεμμένα τῶν ἀποδιδυμμάτων ἀπόνως ἐξήκτος δύναντον, id est, quod abscessus iam coctos nullo negotio expellit.

*Quæ abscessus rumpant.*

**Q**uoniam nonnulli abscessus ferramento diuidi non possunt, tentanda sunt & medicamenta, quæ ab extrahendo dicta sunt epispastica: narcisci radix in pollinē detrita, ex mulsā cū irino cocta applicatur, uel tenera arundinis radix, minutim detrita cum melle quod si dura fuerit, mulsæ prius incoquetur: uel aristolochiam cū melle applicato, rumpit autem picis aridæ & propolis creticæ par modus, cicatricemq; inducit.

*Dyonisia ad abscessus mirabilis, item ad mammas & inguina, epispastice, quæ per latētes meatus discutit.*

**O**lei ueteris, aquæ singulorum libra, hydrelæum incoquitur paulatim mox, aphronitri uncia sex adijciuntur, misyos uncia una uel duæ, incoquantur donec manus non inquinent. Deinde miscentur mannæ thuris, ceræ, terebinthinæ, singulorum uncia sex.

*Ad uernicos abscessus.*

**C**eræ, colophonæ, butyri singulorum libra, picis ariæ, mel lis, singulorum libræ duæ, uncia sex, æruginis uncia tres, uisci quod sacis est. **A L I V D.** epispasticum. Suffiminis ammoniaci selibra, ceræ, terebinthinæ, singulorum triens, sulphuris uiui quadrans: nitri quadrans. Similium autem medicamentum appellatum, & quod porris constat, ualidè tumores iam mutatos rumpit. Quod lini seminis succum recipit, per cōmodè discutit, mutat, rumpitq; At mitioribus abscessibus medicamenta congruent etiā ad parotidas inscripta. Atq; hæc de abscessu, qui ab inflammatione emanat. Galenus autē memoriæ tradidit abscessum nulla præcedente inflammatione constitui, quæ ex probo sanguine habet originem. Statim siquidem ab initio (inquit) humor aliquis aliàs specie alius, in parte quadā collectus, uicina illi corpora excoriat tēpore, & à subiectis dirimit. Sanè inueniuntur in huiusmodi abscessibus cū scalpello sunt diuisi, omnigenæ, tum humorū, tum solidorum quorundā corporum



porum species. Etenim stercore, urina, grumo, humori mel re-  
ferenti, mucosq; : ad hæc ossibus, unguibus & pilis, consimilia  
corpora reperiuntur, imò & animalcula subinde inuenta omni-  
bus propè quæ ex putredine subnascuntur simillima. Præte-  
rea in abscessibus potissimum inueteratis, qui humorum ex lo-  
co in locum decubitu prouenerint, colligi tradit, quæ lapides,  
arenas, testas, ligna, carbones, lutum, sordes, amurcam & facem  
repræsentent. Quare absolutior exteriorum maximè corpo-  
ris abscessum significatio compendiosè tradenda est, tum eorū  
qui medicamentis discuti non possunt. Abscessus itaq; est car-  
nium seu partium carnosorum, nempe musculorum, uenarū,  
arteriarum corruptio, mutatioq;. In genere abscessuum non-  
nulli tunica comprehenduntur, ut atheromata, stratomata, me-  
licerides. Alij sine tunica constituuntur, quæ generis uocabu-  
lum usurpant, unde sermo hic noster procedit. Porro absces-  
sum generationem plurima parte inflammatio præcedit, de  
qua disceptatum est. Interim protinus ab initio, quemadmo-  
dum nuper dicebamus enascuntur. Comites abscessuum sunt,  
igneus loci feruor, tumor eminens, ruberq; magis ac antea, du-  
rusq; cum dolore punctorio, pulsu & gravitate, ut aliquid ex  
particula suspensum esse uideatur. Quòd si uerò locus in si-  
gnis extiterit, febris accedit & rigor inordinatus. noctu potissi-  
mum dolor fatigat, & febricula. Est cū inguinis inflammatio,  
proximis in glandulis excitetur. Vbi uerò abscessus in torū fue-  
rit absolutus magna parte decrescit, punctus obueniunt pruri-  
ginosi, & leuiter stupidi, tumor in mucronem acutū magis fasti-  
giatur, tactu lenis, cedensq;, superficies in uertice auellitur. Di-  
co autē hæc de his qui foras rūpuntur. Si igitur uel medicamē-  
tis, uel sua spōte rupti fuerint emmoto medicamine, curatio-  
nem tētabis, parte iam purè uacuata: sin aliter accidat, aperi e  
ipsum in eū modū oportet, quē in chirurgica explicabimus.

*De Gangræna, & Sphacello. Cap. XIX.*

**C**um inflammatio, neq; discutitur, neq; in pus mutatur,  
sæpè in gangrænam, & siderationem, quæ Græcis dici-  
tur sphacellos, incidit, de quibus iam sermonem insti-  
tuimus. Gangrænas, enim appellant, cū membrū aliquod ob  
inflammationis, qua cōsistatur, magnitudinē emoritur: neq;  
iam confirmatas sic dicunt, sed quæ etiam nū sunt. Eius mali-



uis est, ut nisi celerrimè succurras, facilè affecta pars, quatenus uicina comprehendit, mortis habitum repræsentet, & hominè iugulet. Vbi uerò membra sic uitiata in totum sensu fuerint destituta, affectum non amplius gangrænā, sed iam sphacelū nuncupant. Quin & ossibus hoc mali accidit, cum caro ipsis circumdata, praua scatens sanie, ipsa hac imbuerit, ac putredine consumpserit. Cum itaq; membrum ex toto, uita, sensu motuq; priuatum est, confestim præcidi oportet quàm proximè sanæ parti. Gangrænā uerò curamus, sanguine ex parte uitiata affatim emisso, uel enim uena incisa sanguis corruptus, cum uena amplior in ipso membro appareat, detrahendus, uel cute totius corporis diuisa, multis altisq; plagis. ubi uerò sanguinem emanare permiserimus, medicamentum aliquod putridis consecratum induci debet, quale est, farina erui, aut lolij aut lomentum, ex oxymelite. Quod si ualentius imponere cogites, salē adijcito, aut pastillū Andronis, aut eius generis aliquem. Faciunt ad gangrænas, & uetustæ nuces: cortex autem ipsas expurgat: item liquor cithymalli tempestiuè & mediocriter adhibitus. Opitulatur ipsis & lupinorū amarorum decoctius superfusum. Nonnulli uerò ubi putridam partem præciderint, quo securius mali radicē euellant, candens ferramentum adigunt. in quibus sale cū porro utendū est. Vt autē crustæ citius decidant, cataplasma deinde accommodatur ex pane, uel hordeacea farina, uel triticea ex hydrelæo incocta. Idē medicamenti cephalici puluis ex melle, tetrapharmacū, & Macedonici cum ut appellāt, utiliter imponitur. Iam panis cū apio tritus, aut ocymo, sic iris uel panax, uel aristolochia, uel acorū cum melle, uel thus, crustas probè separat. Idē præstat Macherionis medicamentum, & Iliis linamento illita ex melle. In teneris autem corporibus abundè est etiam erui farina ex melle.

*Ex Oribasii commentarijs ad Gangrænas.*

**A** Eruginis rase, minij, aluminis scissilis, singulorum par modus, aqua detritus gangrænis illinitur, scalpello undique exasperatis. Item lolij farina cum raphano & sale, nonnquam etiam aceto. uua passa acinis uacuata, cum cortice ex sale & oxymelite. Ad hæc nucum inglandium medulla, myrti folia uino incocta, tritaque ex melle: raphanus cum aceto, crustas etiam ad ossa usque rumpit.

De



## De Herpete.

## Cap. XX.

**C**Um bilis flaua nullo mista humori excreta in particulam quampiam decumbit, malum herpes nuncupatur. Si quidem substantia crassior sit, acriorq; totam cutem adusq; carnem subiectam exulcerat, uocaturq; herpes exedēs. Si uerò tenuior & minus acris calidaque, pustulas exiguas, per summam cutem milio similes excitat, ob quam similitudinē, herpes miliaris dicitur. At Oribasio authore, pituita cum flaua bile mista, miliarē herpetem creat. Corpore igitur toto medicamine quod ducendæ bili est, euacuato, loco affecto refrigerantia siccantiaq; inducuntur, principio capreoli uitis, rubi, & plantaginis applicantur. postea uerò, lēticula his miscetur, interim & mel & polenta. Item cataplasma, quod ad inflammationes ex confluxu inscriptū est exempto semper uiuo. Verū exulcerata pastillis inunguntur, passō, aut uino tenui & austero non ueteri, aut posca aquosa solutis inducitur & glaucium, eiq; con similia ex aqua. Cum autem nihil proficit acetum admiscetur. †succo autē plantaginis, aut solani, aut uino diluta magnificē auxiliantur: aut lini semen torridū oleo uinoq; incoctum, inq; lauiorem redactum imponitur: aut terra cimolia, solani subacta succo perungitur, & argēti spumæ uncia quatuor, porri succi cyathi dimidiū, betæ succi tantundē, lauiata illinuntur: at in ueteratis iam hmōi ulceribus, Musæ pastillus & Andronius effi cax est. ALIUD ad herpetem pustulosum. Recrementū plumbi ex uino austero lauiatū illinitur, superiniiciuntur betæ folia uino incocta, uel ceræ triens, myrtei uncia sex, stercoris plū bi triens, uino diluta illinūtur: at ubi id quod serpit repressum fuerit, cerato ex recremēto utitor, aut lente cocta cum melle partem obducito. Ad herpetem uerò qui sub cute affligit, retrimentum plumbi, rutæ lauiatæ succo excipitur, aut ceratum myrteum in uicem rutæ ALIUD Lanæ ueteris illotæ, circa tedam combustæ drachmæ duodecim & semissis, ceræ drachmæ uiginti quinq; recrementi plumbi uncia una. S. seui caprilli curati lotiq; ex aqua drachmæ uiginti quinq; myrtei uncie quinque. ALIUD ad herpetas acutē depascentes, corii mali punici dulcis drachmæ sex, argenti spumæ tantundem, lanæ illotæ circa tedam combustæ drachmæ tres, ceræ drachmæ duodecim, cerusæ drachmæ octo, thuris, aluminis scissi, singulorum drachma, uino aut myrteo excipiuntur.

c 3

†Hic



†Hic locus sic legitur in ueteribus καὶ χυλῶ δὲ ἀριολώσσε  
ἢ πρὸς χιτῶνις, καὶ ἐφ' ἧς αὖς δίνω μέγανως ὀνήσεις, id est, & succo  
plantaginis aut solani, & ubi ex uino coxeris multum iuuabis.

## De erysipellate.

## Cap. XXI.

**C** Alenus tumorē ex feruente & tenui sanguine conflātū  
priuatim quidē & propriē erysipelas, appellauit: cū ue-  
rō ex ambobus, sanguine & bile constat. utiq; ab eo qđ  
in mistura superat nomen uitio indidit. Etenim ubi sanguis  
excelebatur, inflāmationē erysipelaceā, ubi bilis flaua præpol-  
let, erysipelas inflammatoriū dixit. Verū cōmunius tumorē  
ex sanguine & bile calidioribus factis conflātū. Erysipelas ap-  
pellauit. Vtro autem modo dicas, nihil adeo ad præsidiorum  
usum interest. id uerō scire oportet erysipelata quæ capiti po-  
tissimū oboriūtur, plus facessere negotii, adeoq; esse periculo-  
sa, ut nisi efficax cōsequantur auxilium, interim quoq; affectos  
strangulent. Quod simul ac fuerit deprehensum, protinus ab  
initio uena in cubito præsertim humeraria debet incidi sin au-  
tem hæc non appareat, eā quæ se conspectui obijcit. At si quid  
sanguinis dimissionē impediat, purgatione utendū ex medica-  
mento quod bili ducēdæ est. Hæc sanē & in aliarū partiū erysi-  
pelatis uti, uel clysterijs efficacioribus oportet, tū ipsis illinere  
quæ influentē materiā refrigerātium uirtute repellunt, colle-  
ctam uerō, calefacientīū mediocriter & humectantiū discutiāt  
priusquā particula liueat, aut nigrescat, adhibita semper cura  
ut perliquida inungantur, ita ut frequētius immutētur, primis  
per spongas molles ablotis, siquidē multus particulæ feruor  
celeriter in uaporē erūpens, hæc desiccat. Cæterum requirūt  
erysipelata per initia, ut dixi, quæ refrigerent cū humiditate,  
nō astringant: quale est semper uiuum, portulaca, psyllion, len-  
ticula palustris, seris, cucubita, solauum, altercū, lactuca, glau-  
cium, item apiū, & rhamni folia per se uel cū pane inducta, itē  
ceratum ex aqua admodū frigida. His miscetur ēt opii aliquid,  
lachrymæ papaueris, cicutæ & mandragoræ. Iam cōposita me-  
dicamenta inducūtur, fietq; ceratū, cera dealbata rosacei qua-  
druplo admixto ex oleo omphacino sine sale confecto: his in  
pila emollitis, aquæ frigidæ superfunditur, quantū potest re-  
cipi. Si uerō aceti tenuis & pellucidi momentū temperes, præ-  
stantius



stantius medicamentū habiturus es. Item polenta cum herba quadam frigidiore ex iis quas enumerauimus affatim membrum refrigerat. Idē efficiūt palmulæ pingues cū horū aliquo mixtæ. Ad hæc pars ēt delinetur cerusa, uel terra cimolia, aut figulari cū solano, aut argenti spuma cū rosaceo, aut chalcitide cū oleo passoq; aut cerusa cū aceto & lycio, uel acacia cum aceto. Cū feruor remittit utendū simplicibus quidem, sulfure uiuo & menta cū oxyrhodino, aut ruta cū absinthio, aceto & oleo, aut argēti spuma cū porri & betæ succo, cōpositis aut, priuatim in capite hoc pastillo. Argēti spuma, cerula, croco, sulfure ignē nō experto, opioq; cū passo. Cōiter aut omnibus, minio sinopico, chalcitide, misy tosto, erugine rasa, atramēto sutorio, alumine scissili pari pondere ex aceto uritor. ALIUD. Sulfuris uiui, cerusæ, opii, acaciæ paribus singulorū portionibus ex aceto. Cataplasma ad erysipelata, herpetas, abscessus, varicidas & ambusta. Althææ nouellæ soliorū tenerorū libra cocta in hydrelæo perbellè teruntur. adiectoq; rosacei triēte, argenti spumæ, cerusæ singulorū uncijis duabus & semisse, iterū læuigātur cū succo coriandri, aut semperuiui, aut solani deinde micis panis adiunctis ut emplastri formā induat, illinitur. Hoc aut emplastro utitor quod recipit recinini pondo, myrtei pondo, unguēti quincuncē, argenti spumæ trientē, æruginis rasæ sextantē. Aerugo & argenti spuma aceto læuigātur. Ceratū ad erysipelata & ambusta. Ceræ albæ triens, rosacei quadrans, oua sex, perdicij herbæ triens. Vbi uero inflammatio nēbri conquieuerit, aut uetustatē experiatur, cataplasma illi, priusquā lueat, ex cruda farina ordeī est imponendū. Quod si liuor iam occuparit, cute scarificatu incisa, cataplasma induci, locusq; perfundi ex aqua calida dulci debet, sed & marina & muria interim conducet, quinetiā ipsi cataplasmati talis aqua, uel acetum, uel muria cum aceto misceatur. Deinde cōmemoratis medicamentis cōpositis cura adhibita uti licet. Nam si inflammatio remaneat, aut in pus, aut in putredinem conuertitur.

*De phymate, bubone & phygethlo.*

*Cap.*

*XXII.*

**A** Vtore Galeno, bubo, phyma, & phygethlon, glandularum affectus sunt: bubo quidem inflammatio, phyma

c 4 autem



autem glandulae inflammatio ad suppurationem spectans. Aliorum uero quorundam sententia cōter omnes, qui à natura abhorrent, ceu abscessorii tumores quacumque corporis partē obfidant, phymata appellantur. Siquidem Hippocrates in hunc modum scribit, Quibus phymata urinarium meatum exercēt, hi abscessū in uomicā erumpente liberantur. At bubones qui prolapsu, aut aliis ulceribus, aut doloribus cōtrahuntur, periculo uacant: febribus aut superuenientes, qui plurima parte ex pestilētiā lue solent incidere, deterrimi sunt siue femora, siue alas, aut ceruicem inuaserint. Verū priores initio, quēadmodū inflammatio, quaelibet, auxiliis repelluntur, quae refrigerant astringuntque, uel spongiis ex posca impositis, uel lanis oleo crudo uinoque imbutis, uel rosaceo, uel melino, uel lentiscino, uel myrtheo, deinde iis quae digerunt utendum. At si corpus uniuersum succis aequabiliter redundet, prius ipsum uacuari conuenit. ubi iam inanitum est, ulceris in quo id prouenerit, cura haberi debet, sicuti in capite de ulceribus explicabitur. Glandula si inflammatione tentetur, lanis oleo quodam laxante, irriguis, recte lenitur, totumque ipsis membrum inuoluitur. Cum tumor ad suppurationem spectauerit, non prompte diuidere, sed medicamentis quae cerati specie referunt, discutere nitimur, cuiusmodi potissimum est ex perano confectum. Item quod ab herbis dicitur botanicon, si per haec non discutitur rumpere adgrediemur, aliorum abscessuum modo, similiterque illis mederi. In iis autem qui ob febres aut omnino humorum abundantiam procreantur, caueri debent repellentia, ne materies penitus detrusa cursum repetat, sed ab iis quae discutiunt, statim curationem incipere consilium est. Si aurem nihil prohibet, nempe aut aetas aut uirtus, sanguis prius est cubito dimittetur. deinde loco fomenta inducentur ex decocto chamæmeli aut anethi, aut eius generis alicuius. Reliqua medicamentorum sylua, maxime ex iis quae tertio uolumine ad parotidas dicta sunt, transferenda est. Item ex illis quae nuper contra inflammationes prodidimus, quemadmodum etiam phygethli curatio, tum hinc tum ex remediis erysipelati accommodatis petetur. Aster atticus herba quam & bubonion, quasi dicas inguinariam, ea ipsa de causa uocant, non solum illitus, sed etiam contactus, bubonibus auxiliari creditur. Phymata autem priuatim discutit adianthum si illinatur, atriplex, parietaria, altheae radix uino incocta, ammoniacum cum



cum melle emollitum inductumq; uiscus cum resina, cerato-  
que. Rumpit autem abscessum propolis, lupini amari ex aceto  
illiti, cucumis syluestris radix, terebinthina excepta, capparidis  
radix similiter, nitrum cum fermento, aut ficis.

† In antiq. codicibus quædam leguntur quæ in uulgatis exē  
plaribus desunt. Phygethlon enim ita describitur, φύγεθλον δὲ  
τὸ φλεγμονῶδες ἐρυσιπέλας, ἢ ἐρυσιπέλατῶδης φλεγμονὴ τῆς  
ἀδένος ἰ. Phygethlon autem est erysipelas phlegmonodes, uel  
erysipelatodes phlegmone glandulæ.

*De furunculo, qui dothien appellatur.*

*Cap. XXIII.*

**F**urunculus, tumor est abscessum præ se ferens, qui ex  
crassis humoribus in carnosissimis partibus conci-  
pitur, mitis quidem, cum in sola cute coijt: peruicax au-  
tem, malignusq; ubi subter actis radicibus in superficiem erū-  
pit. Dissipat autem furunculū, triticum mansum & imposi-  
tum: mastichæ ægyptia, uua passæ quibus acini sint exempti  
cum sale trita, ac admotæ hunc aut dissoluiunt aut rumpunt, uel  
siccæ fici hydromelite incoctæ imponuntur, uel resina ficis mi-  
sta inducitur, uel ipsæ ficus siccatae cum fuerint pingues dissē-  
ctæ, uel fermentum cum nitro, uel lini semen cum melle, uel  
alterci folia, trita cum butyro. Composita uero hæc proficiūt,  
quod ex fermento, quod polline farinaceo constat, & quod pri-  
uatim à furunculo græcè dicitur dothienicon, fomenta autem  
adhibentur ex spongiis mollibus continuè calenti aquæ intin-  
ctis, deinde sic medicamenta iniiciuntur.

*De terebintho.*

*Cap. XXIIII.*

**O**Ribasius terebinthum sanè phymatis speciem esse af-  
firmat, in cuius extima parte pustula nigra incumbit:  
hac rupta id quod subiacet abrafo simile apparet. ubi  
scalpello diuiseris, pus inuenitur Dioscorides autem Alexan-  
dræ literis mandauit terebinthos cutis esse excrescentias, ro-  
tundas, nigrouirides, terebinthi fructum referentes, atque has  
aliis phymatum tumoribus similiter curari censet: auxilia ex  
supra comprehensis huc transferenda.

*De carbunculo.*

*Cap. XXV.*

**C**um sanguis magis melancholicus effectus inferuescēs-  
que aliqua se parte receperit, carbunculus fieri solet,  
quod



quod ulcus est crusta ceum plerunq; à pustula ambustis confimili, interim uerò & sine hac incipiens. Caterum inter initia, quibus hoc malum instat, in particula omnino pruritus sentiunt, deinde pustula, nunc una, nunc plures tenues exoriuntur, miliorum quorundam instar: quibus perruptis, similiter crustaceum ulcus prouenit, quale ferramenta candentia excitant, modò crusta ipsa cinereum colorem, modò nigrum præferente, sic ut inferiori carni cōtinua adhærescat, & quodam modo affixa sit depascaturq; Reliqua autem caro circumposita, feruidam refert inflammationem, quam Græci phlogosim appellant, & colore nigrescit, splendetq; bituminis & picis modotalis autē est bilis exactē atra. Verum carbunculi, qui carnem inuaserint, confestim circūscribuntur: qui mēbranas, neruoq; occupant, diutius remanent, luemq; subiectis corporibus impartiant, ut etiā inflammationes quæ erysipelatis naturā respiciant, in ipsis excitentur, plerisq; iidem in suppurationem cōuerfi sunt. multis febres simul accedunt. Iam uerò carbunculi ex causis populatum grassantibus excitantur. Curatio ipsorū, nisi admodum fuerint exigui, à uacuatione sanguinis è uena ad animæ defectionē usq; dimissi, tentanda est: mox scarificatus rectē accommodatur, plagis ob succi crassitiem alioribus: particulæ laboranti inducuntur, quæ modicē reprimunt dissipantq;, tale est cataplasma, quod ex plantagine & cocta lente cōstat, quod recipit panis furnacei micam. Est autē panis, nec omnino à furfure purus, nec nimium eius habens, super ipsum uerò ulcus ualens aliquod medicamentum imponitur, cuiusmodi est Andronis, Pasionis, & Polyidæ, diluiq; id uino aliquo dulci, ad sordium spissitudinē debebit. Item massalioticum aridum, uel & ipsum similiter dilutum. Item radix dracunculi, uel aristolochiæ, uel liquor silphij, uel cirenaici, singula ex acetopro bē delinentur. At quæ erysipelatis naturam referunt, supra comprehensis ad id uitii remediis perungentur. Quæ uerò partes consortii lege affici putantur, succidis lanis ex fenelæo madefaciendæ sunt. Vbi iam ardor acq̃ueuerit, carbunculis injiciuntur cerata cephalica, diluta, illitaq; in linteolis. generosissimum est quod herbis, tum illud quod nitro constat, rem arida ulceribus depascentibus dicata, per se, & cum rosaceo. Cum autem durities remanet, utemur melino Serapionis, operam adhibentes, ut quàm celerrimē carbunculi suppurent.

Quod



Quod quidem fiet, si die bis noctu semel tum cataplasmata tū  
medicamenta mutes. At quò radicitus carbunculos diuellas,  
dirimasq; ab adiacentium commercio, malum punicum acidū,  
minutatim concisum in aceto coques: ubi intabuerit, in læ-  
uorem deteres, linteoq; illitum induces: cum successit, aceto  
humectabis. Item nucis auellanae ueteris uel etiam non uete-  
ris medulla carbunculos maturat rumpitq;. Hoc præstant &  
cupressi folia, tum germina, nouelli & molles galbuli cum po-  
lenta, uua acinis uacua, ficus siccata uino incoctæ, papaueris  
ceratidis flores, liquor silphij, cum ruta & mellis momento,  
pix liquida cum uuis passis, & suilio adipe.

*Ad carbunculos uehementer efficax.*

**A**rgenti spumæ libra, olei ueteris libra & semissis, auripig-  
menti uncia. Oleo cum argenti spumadum manus nō in-  
quinet incocto, sublatoque ab igne, auripigmentum adiicitur,  
rursusq; medicamentū coquitur donec nigrescat, tritis in pila  
utitor in linamenta filatim carpta illitis.

*Ad gangrænas, ulcera uetera, chironia, strumas, po-  
dagram: priuatim uerò ad carbunculos,  
præsertim eos qui palpebras  
infestant.*

**O** Pij, acaciæ, misyos tosti, squamæ æris, singulorū drachmæ  
duæ, atramenti sutorij drachma, alterci seminis drachma,  
tritis ex aqua utitor, probè facit & tetrapharmacū quod quin-  
tam thuris partem contineat. Aduersus naturalium carbuncu-  
los, chalcitidis, atramenti sutorij, singulorum drachmis octo,  
aphronitri drachmis duabus, ex aqua tritis utitor. Valet stercus  
quoq; ouillum, torridum cum melle. In Alexandria Serapiade  
quæ orchis & triorchis dicitur uiridi, cum micis panis, cataplas-  
matis modo utuntur ad carbunculos, omniaq; crustosa. Vbi ue-  
rò crusta exciderit, communis ulceris modo curabis.

*De cancro.*

*Cap. XXXVI.*

**C**ancer in qualibet corporis parte oriri consueuit, siqui-  
dem in oculis, & uulua, quemadmodum in ipsorum ca-  
pitibus expositū est, aliisq; pluribus particulis, sed præ-  
cipuè in feminarū mammis accidit, quoniā natura fungosæ &  
inanes, crassissimam atræ bilis, unde hoc uitiū cōtrahit, materiā  
promptè



promptè possunt excipere. ex eo. n. humore cū referbuit, cācrī proueniūt, atq; si acrior illa fuerit, cū exulceratione. Quapropter colore magis q̄ inflāmatione nigricāt, sed ita ut tantam caliditatē nō experiātur. Venæ aut̄ quæ circa sunt intumescūt, intēdunturq; , cancrī animātis pedū modo, unde & appellationem hanc uitiū est sortitum. Nonnulli uerò inde sic nuncuparunt, q̄ difficillimè ab his partibus quas obsederit, euellatur, quemadmodū cancer aquaticus animās. Hoc malū planè propter succi crassitiē nō consanescit, utpote quod nec repelli, nec discuti queat, nec totius corporis purgatione cedat, uel quod etiam mitiora negligat remedia, uehementioribus autē irritetur, excandescatq; . Prima sanè cancrī initia prohibere, ne augeant, licet si melācholicus humor prius uacuetur, quā in affecta particula radices subter egerit, impactusq; sit. uacuatio quidem primum tentāda est, sanguinis dimissione, si nihil prohibet, mox purgatione, per initia quidē ex simplicioribus petita, quale est epithymon, quatuor drachmis, & S. in sero lactis, aut mulsā exhibitum. Deinde ex hiera, quæ nigrum ueratrum recipit. Loco autem dolenti inductum subsequens remedium, sine dolore facit exulceratis: solani succus linteo molli duplici in eum tincto imponitur. Extrinsecus autem lana molliuscula, & ipsa succo imbuta circumdatur, cura adhibita, ne hæc ficescant secco, cōtinentius superfuso. Iam uti diutius poteris in cancris exulceratis medicamento quod pōpholyge cōstat. Nec inepta sūt, q̄ tertio uolumine de uulū cācris p̄didimus.

*Ad carcinode, malignaq; tum ad sedis tuberosa ulcera, item ad naturalium uel testiculorum, uel mammarum inflammationes.*

**I**N plumbea pila pistillo plumbeo lemniam sphragidem exposita, & mulsā, uel lacte conterito, ut nigrescat: uel rosaceo, uel immaturo oleo, succūe semper uiui, uel cotyledonis, uel lactucæ, uel psylli, uel uinæ acerbæ tritam similiter inungito. Crebrior uictus ægro dabitur, ptisanæ cremor, lactisq; serum, ex oleribus malua, atriplex, bletum, cucurbita, piscium saxatiles, omnis generis aues præterquam palustres.

*Archigenis ad carcinode, & maligna ulcera.*

**C**ancrorum fluuiatilium crematorum, & cadmiæ par modus in pollinem coactus inspergitur, aut cancrorum cinis unā cum



unā cum cerato inducitur, item erysimi semen detritum cum melle accommodatur.

*De molli & laxo tumore, qui œdema Græcis dicitur.* Cap. XXXVII.

**C**Um de tumoribus qui succis calidioribus contrahuntur, disputatū sit, iterū de cōtrarijs agemus, ab eo quod Græcis œdema dicitur, exorſi. Quemadmodum. n. ex biliosa fluxione, erysipelas, ita ex pituitosa, œdema laxus quidam atq; indolens tumor excitatur. Equidē scimus aliter quoque œdemata prouenire, nempe in pedibus, in aquæ subter cutem affectibus, habitu corporis contabescēte, qui phthoe Græcè dicitur, & malo, qui cachexia. Atq; in illis quidē tumor hic affectus qui hominem premit accidens est, nullā seorsum, curationem propriā postulans. Satis. n. est, si quidem curatione egebit ipsa tum crura perfricare oleo cum sale, aut etiam oxyrodi no sal habente. At si ex pituitoso humore in particulam influente œdema constitit, abundē quandoq; est spongia posca imbuta, cum ligamento leuiter stringente imposita, quæ ab inferiori parte incipiens, suprā finiat. Esto autem spongia, modò conductura sit, recens, si huius copia non est, eam, cuius erit facultas, detergebis, expurgabisq; nitro, magisq; aphronitro, & lixiuio. Quòd si per hæc tumor non subsideat, paululū aluminis iniicies, commodum autē est tenerrimū ellychnion, posca madens impositum: bonū est, & glaucium. Quòd si in uetustatē œdema inciderit, parti oleo prius inunctæ spongia ex lixiuio imponitur, eiusq; uiolentiorē cōstrictione curatur. discutit autem, ac comprimit tumores laxos cedentesq; quælibet terra illuta, magisq; Aegyptia, tum isatis domestica.

*De inflatione.* Cap. XXXVIII.

**I**nflatio ex flatuoso spiritu nunc sub cute, nunc sub membranis, quæ ossibus circundantur, & musculis, collecto, nascitur. Porro is colligitur aliquando in uentre & intestinis, itemque in medio horum spatio & membranæ, quæ peritonæos dicitur, ut in aquæ subter cutem genere, cui nomen est tympanias. Differt quoque hæc ab œdemate, quòd pressa digitis, fossulam nō repræsentet, & sonitum tympani modo ædat, Membrorum autem densitas, tum spiritus simul crassities efficit, ut idem spiritus non dissipetur. Vnde curandi ratio huic dirigenda



rigenda est, ut membra rarefacias, crassioresq; spiritum extenuas, quod medicamenta tenuissima & potestate calida praestant: atq; in uentre quidem & uisceribus oleum tenuis quod rutam habet incoctam, aut aliquod ex calidis seminibus, qualia sunt, cumini, apij. Interim uero & cucurbira iustae magnitudinis citra cutis incisionem umbilico bis, ter uel defixa, inflatio nem discussit. Masculis autem ex contusione, quemadmodum propulsu inflatis particulas calidis nimium, & acribus excandescere contingit. Quare per initia medicamenta quae magis leniant adhibenda. Vbi facta est inclinatio, ea quae discutiant, Utendum igitur sapa, cum olei momento, ac ex lanis succidis calida excipiantur, uel etiam ceratum ex œsypo admiscetur, cura adhibita ut caliditas permaneat, frigus enim non conducit. Vbi iam aeger lenitus, sopirusque est, acetum admiscetur, & nitrum, aut aphronitrum, deinde & lixium. Postremo emplastris utendum quae discutiendi uim habet, quo inflatio subfidat, quale est quod sequitur. Sordes balnearum subferuefactae percolantur primum, ut purae euadant, & rursus lebeti iniiciuntur, tritaq; calx restincta farinae modo etiam inspergitur, dum luti fiat spissitudo, ac utitor. Hoc efficacius est medicamentum ex sycomoro compositum.

*De intortis & contusis. Cap. XXIX.*

**A**rticulis intortis, contusisque faciunt lanæ succidæ, aut spongia oxelæo imbuta impositaq; ite bulborum elixorum pars tenerior cum melle, uiticisq; folia, sal nitrû tostû, læuigata cû cerato inducuntur. Iam superfusio aque dulcis, aut marinæ calentis utiliter adhibetur. Vbi uero inflammatio, & dolores cōquierint, intortæ partes etiã rectè perfricantur.

*De carne contusa, & sanguinis subter cutem coitu quod Græce ecchymoma dicitur. Cap. XXX.*

**C**arne à graui quodam corpore, quod extrinsecus super inciderit contusa, uenisq; exiguis indidem diuortium expertis. sanguis profunditur per subsultum, quod Græci κατὰ διαπύρσιον appellant, unde sub cute collectus, chymoma dictum efficit. Cute inquam, non diuisa, tanquam tumor tactu mollis & cedens, comitatur, liuidus, & magna ex parte indolens. Eò igitur animum tendimus ut sanguinem qui continetur dissipemus, idque confestim priusquam nigruerit.



rit. Per initia sanè nonnihil ex astringentibus, iis quæ discutiant, admiscere oportet, eò quòd tunicæ uenularum contusæ densationem requirant: inde etiã solis discutientibus sine attritione utemur, ac scarificatis initio ecchymomatis, ita subsequenter curationem accommodabimus. Ad inueterata autè ecchymomata, raphanus applicatus prodest. Quippe discutit ea ubi erodere inceperit, aut raphani succus, cum micis panis inductus. Cæterum ecchymomatis species sunt, suggillata, & liuores ex ictu, hyposphagmata dicuntur. Item sanguinis inter ungues concursus ex percussu proueniens, de quibus priuatim tertio uolumine dictum est. Verum de unguium uitiis, in parte chirurgica disseremus.

*De ruptis & auulsis.*

*Cap. XXXI.*

**R**uptio cum ecchymomate prorsus accidit: curatur autè medicamentis mediocriter calefacientibus, quale est ex nigris populis acopon, aliàq; huic cõsimilia. At altioribus rupturis magis acria, magisq; incidètia accommodantur. Talibus sanè & cucurbitulæ usus proficit. Ergo si euocatũ celeriter per halitũ ecchymoma totum est, facilè dehiscens ipsa caro coalescat. Sin longiore spatio sordes copiosa succreuerit, ruptum deinceps coire nõ potest, sed tantũ prope ipsius labra admoventur. quo fit ut leui momento ea facilè separentur, & medius inter ipsa locus superuacuo humore repleatur, nihilq; aliud, quàm assiduè nouũ quodãmodo ecchymoma creetur, primo persimile, nisi quod citius quàm illud dissipetur, utpote extenui magis sanie nunc cõstans, cũ per initia è sanguine ecchymoma esset. Conuulsum autè fibris quibuldã laceflitis distractisq; leniri tantũ desiderat, quoad dolor sopiatur, quippe conglutinari nequeunt. Itaq; Aristolochia rotunda ruptis conuulsiq; si quid aliud, idonea est: similiter centaurei maioris radix eiusq; succus, rheum, costus, bdelliũ cum oxymelite pota.

*De scirrhus.*

*Cap. XXXII.*

**E**xactus quidem scirrhus, tumor est præter naturam sensus expers, & durus: non exactus autem uix sensibilis est. ac qui sensu uacat sanari non potest. qui ægrè sentitur, uix sanescit, si quidem humor unde huiusmodi uicium contrahitur glutinosus crassusq; est, qui particulis quæ scirrhus obducuntur impactus solui contumaciter repugnat. Est cum  
statim



statim ab initio constituitur, augeturq; , plerunq; uero à medicis qui erysipelata & inflammationes uehementer refrigerauerint, astrinxerintq; , originem sortitur. Quòd si quis ea quæ ualenter discutiunt medicamenta, partibus scirrho obductis admoveat, huic paucis primis diebus, manifestò scirrhus decreuisse uidebitur. Cæterum quod de affectu restat, id reddit insanabile, siquidem toto quod in eo subtilissimum erat dissipato, quod reliquum est desiccatum, ceu lapidosa concretio relinquetur. Quapropter conuenit discussorium aliquod medicamentum, & emolliens habere, quod non ualidè calefaciat atque desiccet. Huius autem generis sunt medullæ omnes, magisq; ceruina, & uitulina. Ex adipibus commendatur, leonina, pardalis, ursina, deinde taurina. Inter aues anserina, & gallinacea & phasianica, sicciorq; caprilla, & hircina. Ad hæc ammoniacum suffimen, bdellium maximè scythicum, styrax qui humentior est & pinguis: ac Aegyptiaca mastiche. In aliis sanè particulis scirrhum expertis his seorsum utendum est, tum iis quæ inde componuntur. uerum in tendonibus & ligamentis, lapis ignis candens, aceto acerrimo extinguatur, & siquidem haberi potest, pyrites: sin eius copia non est, molaris, in quo pars affecta commoueri debet, ut uaporem ascendentem recipiat, atq; inde rursus medicamen quod emolliat imponitur, oleo tamen tenui non aqua quotidie ab initio per totum morbi curriculum pars affecta perfunditur: interim oleo in quo althææ radix ac syluestris cucumeris sit incocta. A balneo autem in totum ægri abstinebunt, uel certe frequèri, sed posteaquàm scirrhus emollitus fuerit, ammoniacum pinguiissimum aceto quàm acerrimo maceratum, particulæ sat multis diebus inungitur. Deinde rursus emollienti medicamine utendum, quod receperit galbanum, & opopanaxem, eaque pinguiissima eiusmodi uero sunt potissimum, ex petasone confectum, & quod ad Amythaonem refertur, & strumus dicata medicamenta.

*De Strumis.*

*Cap. XXXIII.*

**S**trumæ glandulæ sunt scirrho induratæ, quæ in ceruice, alis & inguinibus maximè nascuntur. Curatio earum, cum illa quam in scirrhis tradidimus cõmunis est. Priuatim uero lupinorû amarorû farina ex oxymelite cocta applicatur, ea quoque phymatis proficit: uel bouillâ stercus aceto inco-



incoctum inducito, id etiam tumores scirrosos omnes dissipat probe autem discutit strumax calx uiua melle, uel gymnastiorū sordibus excepta, uel oleo, uel adipe suillo: aut calcis nitrique par modus, nasturtij, & fœnugræci quadruplum cū melle, malagmatis modo imposita duritias dissipant, in pus conuersas rumpit loliacea farina cum fimo columbæ & semine lini uino incocta, grossi syluestres, & satiui, aut nasturtium album detritum cum pice liquida malagmatis forma applicatur, aut cucumeris syluestris radicis siccæ, lauri foliorum siccorum cōcrematorum cinis cum terebinthina inducitur, aut pediculariæ herbæ, & nitri æquale pondus, erucæ duplum cum resina inijcitur, aut stercus caprillum bouillumve aceto incoctum, aut erui farina in urina pueri uenerem non experti macerata excepta; pice, cera, & oleo liquefactis, aut anguem mortuum in ollam coniectum gypsoq; oblitam in fornacem mittito, concremati cinerem æquali fœnugræci pondere misceto, melle excepto utitor, item quod aspidibus constat medicamentum, mirificæ uirtutis est, tum quod ex struthio conficitur, tum quod cucumeri syluestri, tum quod cedrio liquore confit: strumas ad suppurationem perducit, aut diffundit hoc, myrrhæ drachmæ decē, ammoniaci thymiamatis drachmæ septē, uisci quercini drachmæ octo, galbani drachmæ quatuor, propolis drachma, in pila contunduntur. Ad strumas mammarum duritiasque proficit subscriptum medicamentum, uisci elaborati, resinæ siccæ, ceræ, singulorum pondo, galbani quadrans.

*Ad strumas exulceratas, & sine ulcere.*

**C**eræ, resinæ pityinæ, adipis suilli insulsi, marrubij, æruginis rasæ, singulorum selibra.

*Medicamentum ad strumas, quod dicitur cheradicum.*

**O**lei ueteris pondo dua, ceræ pondo, colophonix triens, nitri, tantundē, alia duodecim membranis detractis in oleo per induum macerantur. deinde cocta cum fricta fuerit, proijciuntur, eliquatis oleo postquam ab igne amoueris, nitrum tenuissimum inspergitur: rumpit etiam abscessus. **ALIVD.** Cineris è ficu uncia dua, aluminis scissi uncia, aphronitri tantundem, picis liquidæ uncia septem.

*Exedens cheradicum.*

**A**luminis scissilis, sandarachæ, singulorum drachmæ quatuor  
PAULI AEGIN. u tuor



tuor, squamæ eris drachma, auripigmenti tantundem, arido strumas conspergito, at si canceri naturam induerint, rosaceo maceratis bis de utitor.

*De stratomate, atheromate, & meliceride.*

*Cap.*

*XXXIIII.*

**C**VM hæc quoq; inter abscessus, quemadmodū in illis dicebamus, habeantur, singula propriam appellationem à similitudine rerū quæ in tumoribus continentur, sortita sunt. Alij liquidē ipsoꝝ ueluti pingue quiddā seu adeps subest, alij melli simile quippiā, alij quasi tenuis pulicula. Consilium igitur curationis est cōmune, ut quod tunica illa contineat, discutiatur, aut medicamētis totū exedatur, aut sectione auferatur. Quidā. n. ex iis tumoribus triplici hac ratione curantur, ij nimirū qui liquidiorē humorē continent, qualis est meliceris: aliqui duplici tantum ut atheroma, quod & sectione auertur, & medicamentis exeditur, stratoma uerò nec discuti, nec exedi potest, sed manu duntaxat curatur. Quomodo autem unumquodq; horū agnoscas, in parte chirurgica edocebere. At medicaminū, quæ dissipandi uim habēt, materiā, ubi actū est de strumis, reperiēs. Priuatim uerò meliceridas hoc dissipat uix passæ acinis exemptis octo, squamæ drachmæ tres, parte fomentis prius lenita imponitur. *ALIVD.* Ladani, bdellii, galbani, ammoniaci thymamatis, propolis, terebinthinæ, singulorum æqualis portio in pila contonditur: facit etiā strumis, parotidibus, furunculis, phymatis. Ad Archigenes contra meliceridas cōmendat aphronitrū & ueratri partē duplam, cū cerato duriore impositā, exedentibus autem in cute circūdata, uti non licet. Hac igitur prius meliceridas, atheromata, uel etiam strumas medicamentis adurentibus detegere oportet, simplicius illorū est quod recipit calcē uiuam, saponem & lixiuiū, Variū autē magis, quodq; reconditū seruari potest, capit calcis uiuæ drachmas quatuor, sæculæ quæ est fex uini combustæ, nitrī liquidi tostī singulorum drachmas duas, minij drachma, lixiuiō teruntur ubi mellis liquidioris crassitudo facta est, ter seruifacito, ut mediocrem spissitudinem habeat, pixide plumbea reponito, lixiuiā super distillans ne subito exarescat. ualeat quoque ad uerrucas, myrmecias, pterygia, clauos, callos, cicatrices supercrescentes, sæcula bimeltri non ue. ustiore cutem delinito: ubi



to: ubi arefcere inceperit, ſpongia elotā rurfum perungito: ubi nigruerit denuò ablues medicamentis cruſtam inducentibus: poſtquam autem cruſta deciderit, exedentia adhibentur. Medicamentum exedens ualide citra roſionem, ſquamæ æris drachmæ quatuor, ſandarachæ drachmæ duæ, ueratri nigri tantundem, cum roſaceo utitor. *ALIVD.* Squamæ, ſandarachæ, urricæ ſeminis torrefacti pari menſura cū roſaceo utitor. *ALIVD.* Erynaceorum combuſtorum, ſepiæ teſtæ, auripigmenti æquale pondus ex roſaceo: quæ ambiunt partes orbiculatim omnes prius delinito ceruſa cum oleo. Item efficax eſt compoſitio ex calcis uiuæ partibus duabus, chalcitis parte una, auripigmenti parte una.

*De ſauis.*

*Cap. XXXV.*

**F**auus qui Græcis cerion dicitur, tumor eſt, qui in cute foramina habet, per quæ humor craſſitudinem mellis reſrens excernitur: rectè igitur ipſi imponuntur uuæ paſſæ cū ruta, aut fici folia molliſſima cū melle, aut naſturtium cū lini ſemine ex melle, aut cucumis domeſtici radix cum melle, aut ſulphur uinū cū cerato, uel terebinthina. Cæterū uariam magis fauorum curationē molire, ſi quæ tertio uolumine de manantibus capitis ulceribus dicta ſunt, in hunc locum transferas.

*De ſimplici ulcere.*

*Cap. XXXVI.*

**Q**uoniam ſimplex ulceris cōtinui ſolū eſt diuiſio, ſi quis partes diductas ſcizia orbiculatim circumdata cōmittat, utiq; citra aliquam aliam molitionem coaleſcēt. Cum uerò alterum ulceris os in obliquū ſpectauerit, inde deligaturam tentare & in contrariū ducere oportet: cum utraq; illius labra eò uergant, à duobus principijs incipiendum eſt, & ora ſic adducenda. Nam cū nihil intra oras inciderit, nempe pilus aut arena, aut oleum, aut ſordes, aut id genus aliud, omnino ulceris concreſcet. quod ſi magnum ſit, adeò ut diductæ partes in totum prædicta deligatura committi nequeant, futuris ipſæ prius adducentur, deinde ſic deligatæ, glutinatoriis, ut uocant, præſidiis utemur, quæ collectam humorum ſubluuiem deſiccare & conſumere queant: aliam, ne inſuat, prohibere.

*Quæ ulcera glutinare poſſint. Cap. XXXVII.*

**Q**uercus folia applicata ulceribus glutinādis ſunt. Itē ſalicis, braſſicæ, oleaginis fruticis quæ chamaæla dicitur



citur & fructus & folia & cortex, succusq; austerioris plantagi-  
 nis papyrus, posca aut uino imbuta & in orbē circumdata. Re-  
 centia ulcera glutinant pini & piceæ folia, cortexq; recens liga-  
 menti modo circumdatus cū aqua aut posca, aut uino caseus re-  
 cens læuigatus: extrinsecus imponuntur, folia rumicis aut uitis  
 aut betæ, aut lactuæ. At ex acido lacte caseus qui oxygalacti-  
 nus dicitur, uulnera quoq; ampliora committit pira syluestria  
 quæ achrades dicuntur, fluxionem reprimunt. equisetum si ap-  
 plicetur, etiam si nerui fuerint præcisi, isatis satiuæ in duris cor-  
 poribus ulcera etiam si musculorum capita affligant, idem præ-  
 stat, cupressi folia, germinaq; & nouelli galbuli mollesq; etiā  
 duris corporibus proficiunt, sed miscēdus est pollen farinae, qui  
 à pariete propinquo molæ assumitur, myrrha cū aqua illita,  
 uel lachryma thuris, terræq; lumbrici etiam neruorū præcisio-  
 nes glutinant, pentaphylli folia cū melle, allia cōbusta applica-  
 ta. Inueteratis ulceribus anagallis prodest cū cerato. hordeū  
 combustū, & cerusa cū myrtei cerati triplicato pondere. Ad ca-  
 pitis ulcera ualet, myrrham aridā inspergere non madefactā,  
 quippe celeriter contrahit, uel aloen aridā, uel aristolochiam  
 tritam & melli ex uino incoctam dum mediocris fuerit spissi-  
 tudo, in lintheum illinens applicato. Composita autē ad gluti-  
 nandum sunt Barbara, Chryse, Nicolai. item dia iteon quod sa-  
 licibus, diadictamni quod dictamno constat, atq; alia his consi-  
 milia quæ magnis potissimum uulneribus glutinandis sunt.

*Si dolor & inflammatio ulcera exerceat.*

*Cap.*

*XXXVIII.*

**S**I dolor & inflammatio uulnera obsideat, usus est medica-  
 mentorum quæ desiccant, atque inflammationem arcēt.  
 Ex liquidis igitur laudatissimum est uinum, deinde posca.  
 Si uerò etiam cum sordibus inflammatio infestet, mulsa aquo-  
 sa conuenit. Ex ijs autem medicamentis quæ siccandi pote-  
 state prædita sunt, communiter quidem conferent, inflamma-  
 tionibus dicata, si oleosa acriaque excipias: priuatim hoc pro-  
 ficat, malum punicum dulce uino incoctum tritumque appli-  
 catur, mirabile nimirum & multiplici usu commendatum est  
 remedium, facit enim tum ad capitis, tum naturalium ulcera,  
 tum ea quæ toto corpore excruciant, oculorumque inflamma-  
 tiones. At si erysipelas, aut eiusmodi quippiam ulceri accessie-  
 rit,



rit, ijs utendum præfidiis, quæ aduersus illa inscripta sunt.

*Si maturari, & ad suppurationem perduciqueant.* Cap. XXXIX.

**R**ecentia quidem ulcera, & quæ inflammatio ne adhuc occupentur, non suppurantia, cōcoquit maturatq; ex simplicibus, aqua temperata superfusa, farina triticea, uel chondrus, uel panis, uel glutinū librariū, cū terebinthina obducta, item cera, crocus, lachryma thuris, uix, rosaceū, adeps suillus, uitulinusq; Inter cōposita uerò tetrapharmacū quod linteolis illinitur, rosaceo subactum. Vetera autē & callosa maturant, simplicia quidem uua passa domestica, styrax, galbanum, myrrha, ladanum, pix, resina, butyrum, mastiche, ægyptiaca, & celsypum. Composita uerò ex recinino, dictum aceron, i. absq; cera, quod ad Galenum authorē refertur, si linteolis illinitur, oleo ueteri aut recinino solutum. item quod à duplici colore dichromon dicitur, pari modo & basilicum, similiaq;.

*De canis ulceribus.*

Cap. XL.

**C**anum ulcus carnē quæ periit restitui postulat. cuius generandæ materies sanguis moderatus est, & probus. Huius igitur mediocritatē ex alimēto sufficienti cōciliabimus, tēperie uerò probam ex bonis ciborū succis, & proba particula in quo ulcus est tēperatura. At in recremento quod euacuatur, tenuē quidē, humidū ulcus reddit: crassum uerò, sordes, circum ipsum coalescentes, eoq; medica mētis æger quæ modicē siccāt purgantq;. Eiusmodi sunt lachryma thuris, hordeacea farina, eruorumq;, fabarū lomentum, iris, aristolochia, cadmia, panax, & pompholyx. Quod si nihil medicamentum ad creandā carnē inductū proficit, ad aliud sic digredientū est. At si plusculū sordis sit, humidiusq; ulcus, sciendū uenit medicamentum intra modum desiccasse, intendendumq; esse ipsum mellis mixtura: si purū & absq; humore cernitur, ultra, ac conuenit desiccāuit, ac oleo pleniore dilutū ceratum inducere oportet. Accidit nōnunquā carnē à medicamento ualētiorē colliquari, ut sordidū humidumq; ulcus appareat, quemadmodum ab ijs quæ minus ac par est, desiccant. Verū hoc ulcus dum consumitur, cauū magis euadet, labris prætumidum, rubens præterea & inflammationis particeps sæpe uerò æger manifestā erosionē percipit. Alterū illud quod à parū siccantibus remediis hume-

u 3 scit, nihil



scit, nihil horū succidaneum habet. Putrilago igitur lignorum, & potillimum eorum quæ moderata astringendi abstergendi-  
que uirtute donata sunt, quemadmodum & ulmus, purgāt ul-  
cera, puraq; iam facta carne replent, uel anemonæ appositæ,  
item piceæ cortex deraſus, tritusq; cū cerato & linteolis illi-  
tus cauis ulceribus auxiliatur, & præſertim recentibus, ut quæ  
carne destituta reficiat, repleatq;. Cōposita uerò, ubi pura qui-  
dem sunt ulcera, accommodantur, quod ostreis constat, quod  
Manathonī adſcribitur ex uini fæcula, & quod ex aloe confici-  
tur, quod Melitera appellatur aridum, & quod amyli, mannæ,  
thuris, alicæ, erui, pares portiones recipit. ſimiliter quod è thu-  
re confit, & aphroditarium. Sin autem ſordibus magis ſcateāt,  
cephalica appellata arida conueniunt, & quæ linteis illinūtur,  
ut Trophos dictum, Iſis Athene, ex atractilide præparatum,  
Italicumq;, & quæ experientia comprobauit.

*Quæ ſordida ulcera purgent. Cap. XLI.*

**S**ordida ulcera ſiue caua, ſiue plana fuerint, probè purgat  
ariſtolochia cum melle, terebinthina cum pari roſaceo &  
melle, uel loco roſacei butyro, iris illyrica ex melle, oliuę  
colymbades applicatæ. Adea uerò quę neruoſis obueniunt, te-  
rebinthina cū butyro liquefacta: ſordidis nimium & depaſcēti-  
bus benefacit marrubiū cum melle. hoc etiā cruſtas deſicit. Cō-  
poſita aut remedia hæc ſunt, amurcæ coctæ, mellis deſpumati,  
aluminis phorimi, hoc eſt liquidi, paria pondera. ALIVD. Sera-  
piadis herbæ, quæ & triorchis dicitur, ſiccæ, iridis illyricæ, mar-  
rubij ſicci, ariſtolochiæ, ſingulorum drachmæ octo, erui farinæ  
drachmæ decē, arido utitor & cū melle. Inſuper ad ſordida ul-  
cera facit tum Aegyptia, tum ex ſale cerata liquefacta, tū In-  
dice, tum Athene, tum uiridia diluta. Ad hæc, quod pumice  
conſtet, & ex eruo, ſicca, patillusq; melanchlorus, hoc eſt, ni-  
gro uiridis, ſimiliter etiam Criogenes appellatus.

*Ad ulcerum uermes. Cap. XLII.*

**A**D uermes qui in ulceribus procreantur arcendos, pri-  
mum quidem eſt, ut humiditatem putredinemq; eorū  
opificem tollas. Cæterum necant uermes communi-  
ter quidem omnia quæ ad aurium uermes inſcripta ſunt. Ad  
eos autem qui ulcera infeſtant, Archigenes commendat ceru-  
ſam, pollumq;, pari modo cum pice liquida illitum.

Quomodo



*Quomodo caro ulceribus supercrescens exedatur. Cap. XLIII.*

**S**Vpercrescens ulceribus caro medicamentis quæ ualenter exiccât tollitur, cuiusmodi est diphryges inspersum squama æris, omniaq; testacea cōbusta, & erinacei cōcremati utriq; cū toto corpore. Verū hæc modicè purgant, & supercrescentia cōtinent. Aliæ uero petrae flos, ualidior est, hoc magis fori, chrysocolla, chalcitis, misy: cōbusta minus rodunt: item æris flos. similiter ærugo oībus est ualentior, sales aut cōcremati, humentes, & flaccidas carnes cōsumunt, sic ēt linamenta carpta ē panniculo, muria acriori imbuta & reficata, quæ si imponatur, mediocres carniū supercrescentias exedunt. Aerugo, cum æris squama interea refertur quæ ualidè excrecētia supprimunt. Cōposita Rhodia (ut dicitur) arida, psaron, ad hæc, xanthon, sine morfu retinēt. At maximas carniū excrecētias, adusq; penitiora crustis obducūt, pastilli Faustiani, triti inspersiq; & medicamētū, quod à solis æstu heliocaes dicitur, aridū. Adde his quod recipit calcis uiuæ, squamæ æris, & mannæ thuris, pares modos. Idem ea quæ nimium excreuerunt, fungisq; respondent, cum melle, purgat: cum cerato, carne replet.

*Arida compositio ad carnem compescendam.*

**A**Rgenti spumæ, chalcitidis, æruginis, plumbaginis, singulorum æqualis portio. ALIUD uehementer reprimens citra rofionem, ualet quoq; ad pascentia ulcera, & præsertim gingiuarum uicia, quas epulidas uocant, necnon ad dentium candorem. Calcis uiuæ pondo, auripigmenti sēlibra, hoc auripigmentum ficcū, inquā, ex aqua detritū calci uiuæ, cadmiæ modo lotæ adicitur: in puluerē radaetis ficcis utitor, ex pastillis autē, tum qui Pantolmius dicitur, tum qui ad polypū inscripti sunt, pulchrè coercent, sic emplastra uiridia & præcipuè id quod ex sale Cappadocico præparatur, similiter, & isis summè carnem supercrescentem in ulceribus continet.

*De ulceribus serpentibus, & putridis, & phagedæna. Cap. XLIIII.*

**S**Vperfusiones utiles sunt ulceribus depastis, putridisq;, ex aceto, poscæ, aut uino alitringente, aut aqua frigida, aut marina, aut decocto lenticulæ, malicorij, balauftij, lentisci,

u 4 myrti,



myrti, spinæ ægyptiæ, aut aliquo ex ijs quæ astringunt, & sic-  
cant. Cataplasma his ipsis exhibetur ex farina erui, alumine li-  
quido, panis filiginei mica, gobio ueteri, aut alio fassamento  
ueteri carnis illotæ, terebinthina liquida pari pondere detritū,  
uel aristolochia, uel reciminorū foliorū succus æqualis, ærugi-  
nis pars dimidia, ex aqua ut mellis sit spissitudo illinitur: si cru-  
sta nō deciderit, elaterii parē modū ærugini admisceto putri-  
dis efficax est fori si tritū inspergat. Et sup linamēta carpta ari-  
da, uel aristolochia rotūda, uel gallæ, æquo pōdere cū oleo illi-  
nuntur, uel cucumis syluestris radix, uel braslicæ, uel betæ, uel  
cucumeris folia, illigata calidis cineribus recōdūtur. Vbi uerō  
emollita fuerint, cū sale trita imponūtur, ualēterq; repurgant:  
uel oleæ summitates in uino decoctæ cū melle inducūtur: uel  
chalcitis applicat, uel apii semē cōtritū, uel lini semē læuiga-  
tum, cū atramēto sutorio inducit, uel thymū, uua passa, & ficus  
incoctæ applicātur, aut fici folia in læuorē trita cū melle, aut  
nitrū, cuminū & farina ex melle, aut cucumeris syluestis radix  
aut scilla cocta ex melle, aut foreos drachmæ duodecim, chal-  
citidis drachmæ decē, misyos drachmæ quatuor, cum dimidia  
aceri acerrimi hemina, læuigātur donec arefiant: exceptis ute-  
ris, specillū intingens, ac ulceri circūadigens, superq; duplex lin-  
teolum ex œnelæo imponis: sin inflammatione sint occupa-  
ta, altercum cum polenta. aut braslicam cum melle obducito.

*Ad putredines quamlibet partem occupantes,  
& ulcera quæ depascunt.*

**C**alcis uiuæ, chalcitidis, singulorū drach. duæ, auripigmenti  
drachma: hoc quoq; ad digitorū pterygia & phagedænas  
efficax est. Itē naturalīū carbūculis cū melle utiliter adhibet.  
In reliquis uitiis arido utitor, su p spleniū ex resina inducito.

*Ad omnia quæ depascunt ulcera, quæque os infestant,  
item ad sanguinis profluum, & carnem excreſcen-  
tem, aridum, compescens, longè utilissimum.*

**C**halcitidis, misyos, utriusq; crudi, drachmæ uiginti, squamæ  
ferri drachmæ sex, gallæ omphacitidis drachmæ octo:

*Ad serpentia ulcera & putredines.*

**S**alis drachmæ duodecim, aluminis qualiscunq; combusti  
drachma, squammæ, pumicis combusti, singulorum par mo-  
dus:



dus: ualet & ærugo rasa cum misy combusto, pice liquida excepta, squamaq; ferri cum oleo.

*Ad ulcera pudendorum depascentia.*

**H**Aec & meleterion dictum nomis proficiet. Item dia oxymyrsmes, hoc est ex acuta myrto, item ex charta medicamen aridum omnibus nomis efficax est. Accedit huc coracion ex oxymelite, pastillus Andronis, & qui huic respondent. Eadē uero hæc medicamenta phagedænis quoq; congruunt, nam & ipsa ulcera sunt quæ depascunt. exeduntq;.

*Ad flaccida humiditate ulcera fœtidaque.*

**L**Emnia sphragis ex aceto, uel oxymelite, uel posca, uel uino subacta, ad luti spissitudinē illita benefacit, aut cupressi folia, germina & galbuli teneri, aut cucurbitæ aridæ concremata cinis, aut platani corticis cōbusti, aut anethi cremati similiter, aut lanarum sordidarum ustarum, aut plantago, aut isatis per se, uel cum polenta, uel peucedani radix arida.

*Quomodo cicatrix ulceri inducenda sit. Cap. XLV.*

**S**I carnē ulcerum quæ cicatrice indiget, siccemus, astringamusq; adeo, ut nō modo id qđ præter naturæ modū superfluum est, discutiamus, sed et illud qđ naturale est, attingamus, superficiē ulceris cuti similē reddemus. Ad hoc autē sunt idonea, galla acerba, & mali punici cortices modicē siccantes. Quæ uero præter astrictionē sine morſu exicāt, ea quoq; cicatricē inducūt, ueluti myrrha, argēti spuma, ostreaq; cōcremata. Nā hæc quoq; si inspergātur, arida, sæpe cicatricē inducūt: pinī cortex cū cerato myrteo, hederæ flos cū cerato, lilij radix cum rosaceo, resina ex pinu arida, pumex tostus, squama æris pari portione, siccis utitor, idem et reprimat, uel pumici trito, mannae thuris & diphrygis singulorū miscens paululū, utitor, uel argenti spumæ partē unā, diphrygis dimidiā cū cerato instar splenis impones. Vetera autē ad cicatricē ducit uiscus, cū lachryma thuris, ærugo cū diphryge æquali, ceratoq; myrteo: uel cetera uel minus recēs applicatū. At humidiora cyperi radice obducito: sedis aut naturaliumq; ulcera, præsertim si inflammationem experiātur, aloe persanat læuigata, arida, uel ex aqua aut squama æris, aut chrysocolle in sole cū cera emollita inducitur.

*Aridum ad cicatricem inducendam.*

**O**Streorum drachmæ duodecim, pollinis thuris drachmæ sex,



sex, cadmiæ drachmæ quatuor: facit & Nomis. ALIVD. Aristolochiæ, drachmæ sex, pini corticis drachmæ sex, pollinis thuris tantundem, pumicis, colophonæ, iridis, singulorum drachmæ quatuor. ALIVD. Cornus ceruini combusti drachmæ quatuor, pini corticis uncia sex, cerusæ uncia quatuor, æruginis rasæ uncia nouem, cadmiæ drachmæ octodecim. ALIVD. Cytinorum, atramenti sutorii, singulorum drachmæ sedecim, squamæ æris, aluminis scissi singulorū drach. octo, gallæ drachma. ALIVD. Cerusæ, argenti spumæ, singulorū drachmæ octo, recrementi plumbi, gallæ, myrrhæ aridæ singulorū, drach. quatuor.

*Ad cicatricem inducendam.*

**A**luminis scissilis uncia, trita in aquæ sextario maceratur: ubi solueris, aqua linamenta ambuis, & siccatis uteris.

*Emplastrum ad cicatricem inducendam  
ex simplicioribus.*

**C**eræ drachmæ quadraginta, argēti spumæ drachmæ triginta quinque, diphrygis drachmæ octo, myrtei hemina dimidium: efficax est his quoque; Palmulatu, quod phœnicine dicitur, item ex cadmia, tum myrsinatū, & consimilia. Ad ea uero quæ cicatricem uix recipiunt, ceræ myrtei singulorū drachmæ sex, cadmiæ drachmæ sex, plumbi, thuris, singulorū drachmæ duæ, aluminis scissilis, æris combusti singulorum drachma, æruginis rasæ drachmæ duæ: die interposito soluitur.

*Diu inueteratis & ægrè ad cicatricem uenientibus.*

**C**admiæ, chrysocollæ, aluminis scissilis, singulorū drachmæ octo, æruginis, squamæ æris, singulorū drachma, resinæ pityinæ drachmæ quadraginta, ceræ drachmæ centum, myrtei quod satis est. ALIVD. Ceræ resinæ pityinæ, singulorum uncia sex, cadmiæ tantundem, chalcitidis crudæ uncia tres, myrtei quantum satis est: uino læuigatur cadmia cū chalcitide, quando caniculæ sidus oritur: latiore utere splenio, quod platysma dicitur: super id linamentū carptū & spongiā ex uino inducito. ALIVD. Aeris combusti, aluminis scissilis, singulorū uncia duæ, salis ammoniaci drachmæ duæ, ceræ uncie sex, colophonæ tantundem, myrtei uncie duæ, arida in sole diebus uiginti ex aceto læuigantur, ubi mellis facta fuerit spissitudo, cera eliquata refrigerataque; emolliendo miscetur Valet etiam ad hæc medicamentum ex pumice, item Isis, & id genus alia.

De



*De maleficis ulceribus dolosisq; cacoethe Græci uocant, aliàs chironia & telephia. Cap. XLVI.*

**I** Nueterata & quæ uix cicatricē recipiunt ulcera, alii chironia appellarunt, ceu Chironiæ medicinæ peritissimo indigentia: alij telephia, q̄ in tali ulcere Telephus consenuerit. Inspiciendum igitur uenit, num & totum corpus uirioso redundans succe huiusmodi fluorem ulceri transmittat, ac qui superat humor, cōuenientibus uacuari debet remediis. Si uerò uarix cruribus ulcere infestatis illum impertiat, etiam hic auferri debet, sicut in parte chirurgica explicabitur: aut uenæ sectione ipsos uacuabimus, abundè sanguinis detrahentes. deinde loco inducemus auxilia quæ sine morfu reficiendi uim habent, simplicia igitur ex pumice, diphyrge, squama, ærugine, calce mediocriter lota: alumen scissile tritum inspergitur: hyssopi drachmæ quatuor, uux passæ tantundem, nitri drachmæ duæ, loco prius melle illito applicantur: squamæ eris drachmæ decem, aluminis drachmæ duæ, cum ceræ drachmis decem emollitis in sole, imponuntur.

*Composita hæc sunt, emplastrum ad chironia.*

**C**eruse uncie octo, aluminis scissilis uncie duæ, squamæ eris drachmæ duæ, salis ammoniaci, thuris, æruginis rasæ, malicorii, singulorum uncie duæ, calcis uiuæ uncia, ceræ libra, myrtei lidra una & semis, arida uino teruntur. hoc medicamentū protinus ab initio callum excindit, & reconditum seruatur, postremo autem in usu emollitum myrteo, cicatricem inducit.

**ALIUD.** Argenti spumæ libra, olei libræ duæ, chamæleontis nigri, radices aristolochiæ, gallæ omphacitidis, singulorum uncia, galbani, guttæ ammoniaci, lachrymæ thuris, singulorum uncie duæ, præparato radicibus uiridum arundinum agitans. Archigenis ad chironia, tum malefica ulcera quæ tibias mammasq; obsident, item strumas & parotidas. Adipis bouilli libræ tres, terebinthinæ quincunx, pollinis thuris septunx, terræ sardæ dictæ, qua scriptores utuntur quincunx, his quæ liquari possunt in arida coniectis unitisq; utitur. **ALIUD.** Archigenis, ceræ triens, olei omphacini, pollinis thuris, uel eius lachrymæ, diphyrgis, squamæ singulorum drachmæ quatuor, arida cū aceto læuigas, ubi mellis spissitudo facta, cerato misces, & uteris diluto quod linteolis possit illini. **ALIUD** ad mulierum dolosa ulcera,



ulcera, & aliorum qui tenera carne præditi sunt, Ceræ tyrrhenicæ drachmæ octo, adipis taurini, terebinthinæ, plumbi combusti, lotiq; singulorum drachma: utitor per linamenta ex rosaceo vel myrteo diluens.

*Ad cicatrices nigricantes. Cap. XLVII.*

**C**icatrices nigras tollit oleū in quo bryoniæ radix candida & nigra incocta sit, dum succum reddat, impostum: calamintha ex uino cocta, argenti spuma cū rosaceo albo lota: ex impetiginibus cicatrices, tū alias, & cōcolores efficit asini adeps illitus: ærucæ semē ex felle caprillo, bubulo, & ouillo, perunctū cū argenti spuma, ouillus talus combustus, ex uino austero tritus, gutta ammoniaci cū suillo felle illita. Cōposita uero, argēti spumæ, mētæ, lachrymæ thuris, pares portiones cū melle. *ALIVD.* Nitri, suffiminis ammoniaci, sulfuris uiui, myrrhæ, paria pondera, ex aceto albo, aut uino, aut aqua, minutim detrita modicè illinūtur, ne exulcerationē excitent. *ALIVD.* Cimoliæ cretæ, columbarum fimi, saponis, thuris, æquales modi ex aceto. *SMEGMA* ad cicatrices nigras. Cimoliæ cretæ drachmæ octo, aphronitri drachmæ quinque, ueratti albi drachmæ quinque, glandis unguentariæ expressi drachmæ quatuor: in balneo cicatrices abstergito.

*De sinibus. Cap. XLVIII.*

**C**um adiacens ulceribus cutis, diutius subiectis corporibus non coalescit glutinaturq; nostri sinū, Græci colpon nomināt. Si igitur ad superiorē partē porrectus sit, facilè sanies per os emanat, atq; ideo prōptè cōglutinetur. Si inferius ipse spectet, sanies uicinā aliquā partē intus erodit, ac nisi emissarium quoddā collectionis scalpello prius feceris, nihil promouebis, neq; carne ipsum replendo, neq; conglutinando. Quod si artus aliquos nepe cubitū, aut femur sinus occupet, poterit utiq; decliuis figuratus citra diuisionē ex aduerso factā coalescere. Etenim in cubito cum ore flexuræ ipsius uicinæ sunt, summam manum elatius protendens, sinum ad effluxum conuertis. At in femore si propter genu sinus designat, decliui figura posito, iuxta poplitem mollem puluinum subiicis, quò inguina genu humilia sint. Si igitur sinus carne impleri non desideret, statim fistula quadam recto peruia foramine cui uesica illigata sit, ad saniem quidem quæ sinui inhæret



inhæret abstergendam aquosa mulsâ potabili, èlui debet: uerum ut coalescat, uino aut mulsô: deinde ad glutinans medicamentum transeundum. Sin cauus sinus carnem requirat, primum medicamenti, quod charta constat, aridi paululum cum multo rosaceo inferi cõuenit. deinde carpto linamento os obturari. Inde emplastrum Isis aut Machæronis, aut simile quoddam unâ cum rosaceo cerato liquidiore solutum inijcitur. Vbi uero carne mediocriter sinus fuerit repletus, conglutinans quoddam medicamentum impones, quemadmodum & recens cruentum uulnus curabas. Huius autem generis sunt, Barbara, Dichroma, & scirrha, id est, fulua appellata. Maximè uerò omnium quod ex recinino, & metallicis sine cera præpatatur fuluum Galeni emplastrum conueniet. Post medicamentum, spongia recens ex mulsô, aut uino circumponitur, & quàm fieri potest mollissimè, deligatura à sinus fundo incipiens in ipsius os desinet, linteolum uerò circumductus fundum sinus sine dolore constringat, paulatim uero soluator usque ad sinus oras, emplastro extrinsecus sinui circumdato, sed ita iuxta oras descisso, ut sanies queat excerni: quod fiet paruo quodam alio emplastro superimposito ex eodem medicamento ob effluxum laxo: fines id adusque solutionem, qua tertio quoque die facta id ipsum auferes mutabisque: quod toti sinui circumdatum est relinquens. Nota uerò erit an sinus ima coaluerint, si sanies probè emanet pauca, & concocta, aut si nequaquam effluat: insuper eodem in sinu si neque dolor aliquis sensibilis, neque tumor, sed tota ratio contracta, sicca, & doloris expers appareat. At si pus etiam maturum in ore modicum conspicias, multo magis de sinu conglutinando sperandum est. At si primo altero uel die sanies quædam tenuis è sinu excernatur, nihil adeò de glutinatione despera, quippe medicamenti uirtus humorem tenuem † ex subiectis partibus frequenter extundit, unde partes siccæ mediocriter factæ coeunt, & glutinantur. Tertio uerò die, aut quarto ab initio si cruda per os sanies eualerit, scito sinum non coisse, eodemque medicamento non insiste, nam cum propter humiditatem quampliam, ut ueri simile est, à parte decidat, non alienum fuerit etiam mutare.

† Antiquus codex habet, ἐκ τῶν ὑπερχαιμένων. id est, ex superpositis partibus.

De



*De finibus laceris & tritisque.*

**V**bi abscessus tardè sectus fuerit, uel medici imperitia, uel  
 eius qui curatur timore, & cutis sinui obducta tenuis, diru-  
 praque, quod Græci ab attritis uestium laciniis rhacodes di-  
 cunt: nec fieri potest, ut prædictis collutionibus adimatur, gluti-  
 nante utendum medicamine, temperatura liquido, uiribus au-  
 tem sicco. tale est palmulatum dictum ex chalcitide, ueteri di-  
 lutum oleo, ut neque admodum sit durū, neque manus intin-  
 ctas inquinare desierit, deinde uino mediocriter uetusto ma-  
 ceratum, postea orbiculatim cum decenti deligatura imposi-  
 tum. Conuenit autem laceræ ut comprehensum est, cuti, po-  
 tissimum mel, quoad emplastris spissitudinem habet coctum  
 impositumque: Præstiterit autem post illitionem lacero in si-  
 nu factam, myrrham in pollinem coactam, cribro suspenso ei  
 inspergere, uel aloen, uel thus, uel simul omnia. Expertus au-  
 tem sum, tenue centaurium in hunc usum mirabile esse medi-  
 mentum. succedit huic symphytum, deinde iridis illyricæ ra-  
 dix, postremo erui farina. Nonnunquam uero inter coquendum  
 ea melli insperguntur, cum cacabus ab igne tollitur. Melius  
 autem fuerit, si lebetes iam à flamma amoto hæc fiant, deinde  
 diligenter agitemus: ubi medicamentum tepidum euaserit, si-  
 nui imponatur, illigeturque sicut expositum est.

*De fistula.**Cip. XLIX.*

**F**istula sinus est callosus, qui magna parte ex abscessibus  
 nascens, ab arundinearum fistularum translatione appella-  
 tur. Si itaque in os desinat, curari sine manu haud potest,  
 nisi temporis spatio, squama ultro uel os deciderit. Si uero in  
 os non finiat, medicamentis quæ callos elidunt & conglutinant  
 persanabitur. Itaque callos excidunt hæc quæ subiungam: Spon-  
 dylii radix circumrasa impositaque fistularum callos eximit, item  
 ueratrum nigrum duobus tribus uel diebus insertum idem præ-  
 stat. Ad hæc amurca cocta & in collutione adhibita. Iam sory  
 crudam uel concrematam cum uini diluti momento ad collu-  
 tionem iniectum: item sory & drocomagma cum hydromeli-  
 te, uel elaterium terebinthina exceptum in penicilla cogito,  
 impositoque, uel laserpitii radice succum infundito. Id quod se-  
 quitur callos consumit: æruginis drachma duodecim, ammo-  
 niaci drachmæ duæ, excepte aceto in longum inducuntur.

Collyrium



*Collyrium quo fistulis exterendis utor.*

**G**utta ammoniaci, atramenti sutorii, æruginis, misyos, chalcitidis, gūmi pari modo excipiuntur aceto. *ALIUD.* ex his quæ Heliodori chirurgica scribuntur. Cadmię, misyos, atramenti sutorii, eris combusti, gummi, singulorū drach. quatuor, chalcitidis crudæ drachmæ tres, excipiuntur pueri ueneris non experti urina & finguntur collyria, ex quibus uno fistulę imposito, panis mica aqua madens extrinsecus superaccommodatur, mutaturque sæpius donec inflammatio conquirit & crusta exciderit. *ALIUD* quod in Alexandria accepi, Anchusæ radicem, misyos tosti, chalcitidis, æruginis, aluminis scissi, atramenti sutorii, aloes, singulæ uncia, cantharides quinque, aceto trita in collyria coguntur. *ALIUD.* Atramenti sutorii drachmæ duæ, chalcitidis, æruginis, singulæ drachmæ, excipito ammoniaco & utor. Cum autem callus fuerit extricatus, æruginē cocta cū mulsā purissima octupla in collyrii formam redacta, repurgatur. Vbi uero callum eliseris, iis quæ carnem procreant uti opportunum est.

*Collyrium ad carnem generandam.*

**A**loes, myrrhæ, ammoniaci, ouorū putaminū combustorum cineris, æquale pōdus, aqua detritis omnibus collyria formantur, imponunturq; . *ALIUD.* Myrrhæ, aloes, & thuris, malicorii, æqualis modus aqua excipitur, quidā uerò taurino felle, carnes etiā oleo quod in maturis uuis expressum est eluuntur. Notus mihi est, qui cedrino liquore fistulas collueret, ac mirū quanta res felicitate successerit. Postquā uero carnes produxeris, glutinatorio utendū medicamine, quomodo in aliis finibus præcipitur. At cū fistula arctior, longaq; fuerit, Galenus ait, neq; callū adhuc, sed sordiciē tantūmodo contraxerit, primum lixiuā demisi, deinde eandem tantisper inibi permittēs dū sordes excidisse sperassem, medicamentū applicaui. Est autem in quod recinino oleo constat superius cōmemoratum.

*De ulceribus diruptis.**Cap. L.*

**N**onnulla ulcerū cicatrice obducta, frequēter haud magno temporis interuallo, iterū inflammatione tētantur rūpunturq; siquidē esse quodā affecto, interdū caro circundata ex facili cicatricē recipit, ac sana ex toto esse uidetur: uerum cursu humoris ualido paulatim ex osse in alto contabescit



sciente, tum inflammatio, tū pus oboritur, quod cicatricē deradit. Curatio igitur eiusmodi ulcerum tantam requirit siccitatem, ut os affectum decidat. Huius autem sinus concauos promptē replebunt papaueris syluestris ficiq; folia cū polentæ subtiliore parte læuigata, atq; ex uino applicabis, uel alterci semen & atramentum sutorium pari pondere contrita imponentur, uel peucedani radix de subito squamas ossium separat.

*De articulorum ulceribus. Cap. L I.*

**C**um articuli carnosus partibus sicciores existant, exulcerati sicciora medicamenta requirunt. Probe igitur facit pastillus Polyidæ ex uino subactus donec sordium fiat spissitudo. Item quæ similiter huic deficcant medicamina. Item marina, muriaque frequenter irroratos, melius affici conspeximus. Quare in articulis ijs utendum est quæ maiori etiam siccandi uirtute pollent.

*Quæ spicula, aculeos, spinas, & consimilia educunt. L I I.*

*Cap.*

**A**culeos, arundines, insuper spicula & spinas extrahit utrunque anagallidis genus, aristolochia rotunda, ammoniacum cum melle, alterci semen læuigatū inspergitur, arundinis radix contusa melliq; mista in linteolum largum illinitur, imposita de subito educit.

*Si ex uena, arteria ue, & naribus sanguis profluet. Cap. L I I I.*

**P**articulis sanguinē fundentibus, figura ei quā in sinibus exposui contraria, rectē adhibebitur, nempe quæ sursum uergat, neq; id tamen immodicē, nā periculum est, ne dolore oborto, uas rursus sanguinē profundat: cū nihil æquē sanguinis profluuiū excitet, inflammationesq; augeat, ac dolor. Cum itaq; sanguis erumpit, statim digitum ori ulceris uasculi iniicito, innitens leniter premensq; citra dolorem, nam simul & sanguinē continebis, & grumū uulneri induces. Quinetiam si altius deliteas uas quod sanguinem emittit, diligentius perdisces, & situm ipsius, & magnitudinē, item uena sit, an arteria: deinde si exiguū uas existat, aliquo ex his quæ sanguinem reprimunt utendum est. Optima uero eius generis sunt, quæ obstruendi uim obtinent, unde Græcis emplastica dicuntur, ex resina fricta, farinæ triticæ poline, gypso composita, similiaq;



oui candido macerata, & cū leporinis pilis imposita: at si amplum uas existat, hamo ipsum attollere conaberis, & mediocriter circumages, sanguine represso: siquidem uena extiterit sine funiculo sanguinē his ipsis medicaminibus sistere tentabis: si arteria, alterum ē duobus facies, aut funiculo circumposito, aut toto uase præciso sanguinem coercebis. Est, cū magnis quoq; uenis funiculos circumdare cogimur, quemadmodū nonnunquam easdem totas transuersim nimirum amputare, in cuius rei necessitatem uenitur, in uenis quæ à penitioribus rectē sursum feruntur, præsertim per actū quoddā spatiū, aut principes particulas, sic. n. utraq; pars utrobq; & reflectitur: & uulnus à uicinis corporibus premitur contegiturq;: tutius autem fuerit: utrumq; facere, funem quidē radici uasis circumdare, quod autē inde procedit abscindere. his sic peractis, uulneri celerrimē carnem inducere, priusquam funiculus à uase decidat, si. n. subito carnē contraxerit, & locus alibi inanis reperiatur, id quod græcè uocatur aneurysina sequitur. Dignosces autē num uena an arteria sanguinem profundat inde, quod huius flauior tenuior quæ sanguis existat, & cū pulsū uacuetur, † illius autē nigrior, & sine pulsu. Subsequens igitur est omnium optimū quæ nouimus ad carnem inducendā medicamentorū, quo etiā ad cerebri membranarū hæmorrhagias uti securissimū est, itē ad collī uulnera, ipsarūq; uenarum iugulariū quas sphagitidas Græci uocant, etenim & harū sanguinē citra uinculū cohibet, Recipit autē thuris lachrymæ pinguiſsimæ partem unam, aloes in mollioribus quidem corporibus partē dimidiatā, in durioribus æqualem, ac in uicē lachrymæ thuris, tenuissimæ eiusdē partis tantundem, cū oui albo subigitur, dū mellis fiat spissitudo. deinde leporis pilo mollissimo excipitur, mox uasi ipsi, tum ulceri uniuerso copiosissimē imponitur. Deligandum uerò extrinsecus est fascia ex tenui linteo, cuius fasciæ primi quatuor aut quinque; amplexus super ipsum uas quod profluit, iniiciuntur. hinc ad radicē ipsius distribuuntur, postea ubi tertio solueris die si tutò adhuc medicamentum ulceri adhæreat, aliud rursus orbiculatim circumdabis ac ueluti contegens iterum, deligabis quemadmodū prius. at si sponte sua primū reiecerit linamentum, uasis radicē digito leniter comprimens, ne uidelicet quipiam confluat, hoc quidē sensim auferes, alterum uero impones, atq; hoc modo quoad carnē obducatur uas, curabis, ita ut



semper acclius particulæ figura sine dolore seruetur. At quæ crustas generant, quoties illæ decidunt, nudam magis partem quam naturaliter esse debet, efficiunt, multiq; iâ ex iis quibus crusta decit, sanguinis profluium quod agrè suppressi queat superuenit, quanquã & his utendū est cū magna urget necessitas. Maximā uerò necessitatē uel crustā inducentibus medicaminibus, uel ignitis ferramentis utendi puto, ubi ex erosione putrescētis alicuius profluium sanguinis concitatur. Quinetiā cum in huiusmodi affectibus totū quod putredinē exper. ū est exciderimus, tutius est uel ipsius quasi radicē adurere uel medicamentis quæ crustā faciunt uti: hoc aut maximè tum in pudendis, tum in sedē fieri consuevit. At scopus crustā generantium medicamentorum erit calor cum astrictione, quemadmodū in chalcitide, misy & atramento sutorio habetur. Quæ autem ex calce una conficiuntur, uehementiora quidē his sunt, cæterū quia calx non astringit, crustæ citius ab ipsis decidunt, hæreere autem ipsas longè est utilius, quippe ad basim earum caro supernascitur, efficiturq; uasis profluentibus ueluti operculum, at huiusmodi sanguinis profluium isatis satiuā si inspergitur probè coercer, uel gallæ combustæ. Porro ipsa feramenta ignita ex aceto aut uino restringere oportet. In uniuersum sanguinis profluuionem sistunt, simplicia quidem, aloë, thus, eiusque pars subtilior, terra samia, ærugo ferri, lanarū crematarū cinis tenuissimus similiter, sterlus asini & equi, bitumen modicum, malicorium, diphryges, galla, myrtus arida, alumen omne, tum crudum tum combustū, resina fricta, uitis cortex, aut folia arida, platanorum galbulorum pollen tenuissimus, maximè cum humorem concretū deposuerit: priuatim autē ex naribus profluuium imposita reprimunt iunci acuti semen, urticæ foliorū succus, chalcitis, anthyllis concremata, pili leporis, ferulæ medium ustum cū aceto, † sterlus asininum siccum uel humidū, succus porri cum thure, ellychnio exceptus: composita uerò ad quodlibet sanguinis profluuium hæc quoq; faciunt, spongia recens in liquida pice mersa & bitumine circumlita, olla recenti concrematur, cineris partibus duabus, miscentur plumbi & stammeos, singulorum pars una A L I V D. Thuris lachrymæ eiusq; partis tenuioris, sulfuris ignem non experti, æqualem modum inspergito. A L I V D. Chalcitidis drachmæ uiginti, lachrymæ thuris uel tenuioris eius partis drachmæ sedecim, resinæ



resinæ frictæ, gypsi, combusti, singulorū drachmæ octo. ALIVD.  
 crustas inducens sanguinemque reprimens. Chalcitidis, æris  
 combusti, atramenti sutorii, misyos tosti paria pondera, item  
 Rhodia dicta, & Xanthe probè sanguinem cohibent.

† Hic locus sic rectius legitur in vet. τῇ δὲ φλεβὸς μελάντε  
 ρον τε καὶ παχύτερον, &c. uenæ autem nigrior & crassior sine  
 pulsu.

‡ Rectior est scriptura in ueteribus lib. ὄνωις ξηρὰ ἢ ὑγρὰ.  
 id est, Ononis sicca uel humida. Quid autem sit Ononis, Dio  
 scorides & Galenus docent.

*De nervis conuulneratis.*

*Cap. LIIII.*

**N**ervis uulneratis aut punctis, ex sentiendi quod obti-  
 nent, acumine, inflammatio & dolor immodicus acci-  
 dit. Quare & febres & conuulsiones his oboriuntur,  
 quibusdam & delirium ob commercium quod nervi cum ce-  
 rebro obtinent. Interim uerò in aliis quoque ambientibus par-  
 ticulam uulneratam locis inflammationes, & abscessus ex ip-  
 so nervo uulnerato ob cohærentiam solet accidere. Ratio igitur  
 est, cutis uulnus apertum inglutinatumque relinquere, quò  
 per id sanies effluat. At si punctus in conspectum non ueniant,  
 etiam duabus lineis sibi continuis incidere præterea oportet.  
 Remedio autem est, si corpus plethoricum sit & magna urit in-  
 flammatio, primum à sanguinis demissione auspicari: si uerò ui-  
 tiosis repletum sit humoribus, etiam purgatione utendum est.  
 Medicamenta uerò uulneri applicentur quæ dolorem leniāt,  
 & effluxum saniei patefaciant, non facta præsertim diuisione.  
 Itaque aqua calida, quanquam reliquis inflammationibus sit  
 accommodatissima, uulneratis tamen nervis est inimica, ac  
 præstiterit eos oleo subtili, quod astrictionis sit expers, ad sen-  
 sum calido irrorare, neque enim frigida neque tepida admo-  
 dum tutò adhibetur. Verùm ex medicamentis idonea est te-  
 rebinthina resina, per se quidem, in pueris & mulieribus &  
 ijs qui molli sunt carne, cum euphorbio autem emollita,  
 in duris corporibus: & si nonnunquam duriora contige-  
 rint, cum oleo quodam subtiliore. Cataplasmata uerò in  
 nervis, qui inflammatione tentantur & putrescunt, adhi-  
 bebis hordeaceam farinam, aut fabaceam, aut eruinam,



in lixiuo, cum oxymelite coctum. Si putredine careant puncturæ neruorū, rectè cerato uteris, quod recipit ceræ quadrantem, euphorbij unciam, aut columbini fimi in duriusculis corporibus, olei sextantem, interdum etiam terebinthinæ uncias: ut autem emplastri figuram induat medicamentum, unciae uni euphorbij, sex uncias singulorum sequentium, ceræ, resine frictæ, olei, picis liquidæ injicies. At si in uicem resinæ propolim pinguißimam indideris, multo id reddes præstantius: atq; hoc ad neruos punctos laudatum est remedium: idem & à rabioso cane morsis efficax est. Aceti sextarius, picis pinguis libra, opopanax quadrans: opopanax aceto solutus magis læuigatur, pix liquefacta mixtaque coquitur: medicamentum compunctis neruis idoneum est, ut quod os puncturæ non sinat conuiuere, quemadmodum nec in his qui à rabido cane morsi sunt, u'cus in cicatricem coalescere: sed efficax solis duris corporibus sinat autem in pueris, aut molli carne præditis, punctura affectis, uti cogites, licet ipsum ex digerente quodam amaracino, aut obo balsamo, aut oleo ueteri liquefacere. Conuenit etiam medicamentum basilicum quod nitrum recipit, aut calcem uiuam, aut euphorbium, aut sulfur uiuum, aut syluestris columbæ finium, aut opopanaxem, aut sagapenum, aut liquorem cytenaicum, aut castoreum, ac in medicamento libram, dictorum alicuius uncia debet injici. Facit autem bene neruorum uulneribus & præsertim puncturis: quin & in agro ubi nullius copia datur propolim recentem pinguemque uulneri poteris inducere, aut fermentum maximè uetulum, per se aut cum propoli minutum, uel cum liquore tithymalli: cataplasmatibus utendam ex oxymelite factis, aut lixiuo cum lomento fabarum, aut eruorum farina, aut cicerum, aut lupinorum amarorum, aut hordeacea, aut subtiliore polenta. idque non solum dum inflammatione tentati sunt, sed iam inde ab initio procius. Cæterum quæ relaxant cataplasma in neruorum uulneribus semper uitare oportet. At si neruus non punctim, sed planè celsim uulneratus fuerit, cute etiam quæ interueniebat diuisa, ut nudus appareat rectus, non transuersim dissectus, commemoratis ex euphorbio & tam acribus nullis utere, quippe nudus cum sit neruus, uehementem ipsorum uim ferre nequit. Quare calcem quæ sæpius æstiuo tempore lota sit, & oleo liberaliore intincta, assumes. Proficiunt hic & quæ

ex



ex pompholyge confecta sunt, item quod melle constat, rosa  
ceo largiore liquefactum. Sed ea adhibenda cura est, ne quid ex  
ijs uulnus contingat, quandoquidem neruus ipse & sensibilis ma  
ximè est, & temperamento suo frigidus, & principum corpora  
partium primati continuus, imò ne oleo quidem eiusmodi ul  
cus irrorare conuenit, hinc enim sordidum redditur. Abluenda  
igitur a uunere sanies est molli lana specillo subunctorio cir  
cumuoluta. Quòd si omnia ex animi sententia processerint, èt  
uino dulci madefacere citra periculum licebit, sed in robustio  
ribus Polydæ pastillo in linamentum illito cum sapa calida  
uti postquam neruum denudatum contexeris, linamenta ex  
trinsecus circumducere oportet ex medicamento quod angu  
gis uulneribus faciat, nempe eo quod euphorbio praeparatur,  
aut fimo columbarum: sed ita ut etiam sanas partes ampliter  
comprehendat. Quum uerò transuersum nerui uulnus est, ma  
ior conuulsionis merus impendet, ac quæ ad curationem uul  
neris spectant. hic quoq; sunt eadem, quanquam nonnulli in  
uulnere adhuc recenti futuris usi sunt, ac medicamento aliquo  
conglutinatorio: uerum suturas non summæ nimium cuti, sed  
altius moliri conuenit, ne quæ in imo sunt inconglutinata de  
hiscant: rursus cura adhibenda est, ne ab acu neruus compun  
gatur. Cæterum in summa sciendum erit, in neruorum uulne  
ribus medicamentum natura calidius quod puncturis mede  
tur, diuisionem nerui non posse curare, ut qui rosionem ipsorū  
feruoremq; sustinere nequeat: neq; quod diuisionibus mede  
tur, puncturis conuenire: non enim uirtus ipsius altè quā an  
gusta est cutis diuisio, penetrat. Victus itaq; adhibebit tenuior,  
lectus mollis, oleumq; calidum alis, capiti & ceruici superfun  
ditur, at si in crure neruus uulneratus sit, inguinibus, inferiori  
bus uentris partibus, & locis uicinis: balneo in totum donec  
inflammatio inclinauerit, abstinendum est, quum aquæ conta  
ctus nequaquam, ut dixi, ipsis conueniat. Quoniam uerò non  
nulli citra id manere consuetudinis gratia non sustinent, si qui  
dem læsa particula in manu fuerit, conādum est quatenus fieri  
potest, ipsam aqua seu calida, seu multo magis frigida nō made  
facere. Si pes uulnus acceperit, quoniam fieri nequit ut nō ma  
descat, ubi lauacrum ingressuri sunt, emplasticum aliquod me  
dicamentum uulneratę parti superaccommodabis, iterum ex  
trinsecus linteolos multiplicatos plures oleo imbutos iniices,



iterum fasciam ex linteo à foris deligabis, deinde rursus in ipso balneo fasciam oleo prius superfundes, cum æger in solium descendet: ubi lauerit, omnia quæ imposita sunt abicies, ac prædicta totius curationis ratione uteris. Contusi uerò nerui ubi simul cum his cutis confusa exulcerataq; fuerit, cataplasma ex fabarum lomento & oxymelite postulant, nonnunquã adicitur erui farina & iris. At si dolor contusioni adest, picem liquidam admisce: sin autem citra cutis contusionem euenerit, magis discutient adhibebitur, nempe oleum calers, anethinum dico, superiusum continuè, aut rutaceum, aut irinum, aut amaracinum. Quod si totus neruus præcisus sit, periculũ quidem nullum sequetur, uerum particula debilis manebit. Curationis autem eius communis est cum ea quæ aliis ulceribus accommodatur, hæc quidem ex simplicioribus remediis in neruis conuulneratis curatio abundè est. quidam uerò compositis uti consueuerunt, cuiusmodi sunt, ex metallicis confecta, Barbara appellata, Cissinum, ex senecione præparatum, melan chloron, Indice, Harmonia, & Athene, quorum & compositionem, & utendi modum septimo libro reperiēs. Sed quia nonnulli præpotentium etiam sumptuosis ad neruorum uulnera remediis uti uolunt, Galenus literis prodidit, ad puncturas neruorum, hæc, cinamomi, dictamni, fœniculi, singulorum uncia, amaraci sextans, ceræ bes, opobalsami dextans, terbinthinæ uncia. ALIUD. Liquoris cyrenaici uncia, ceræ quadrans, opobalsami libra. Ad denudatos neruos hoc ualet. Ceræ unguentariæ quadrans, unguenti spicati, aut foliati, aut nardini libra, pompholygis, spicæ nardi, amomi, phylli, singulorum uncia, atq; hæc supra spem respondere Galenus pronuntiauit.

*De articulorum contractione seu ligatione, quæ ancylo-  
sis dicitur. Cap. LV.*

**A**rticulos ex humidioribus infarctis, ac neruea quadam tensione contractos, detentosq; ancylas, & ancyloses appellare cōsueuerunt. In quibus remedio opus erit quod emolliat relaxetq;. Communiora igitur his remedia conueniunt, quæ in particulis scirrho induratis, ac adeò quæ in resolutis commemorata sunt, propria uerò magis, irroratio ex hydreleæ, in quo decoctum sit lini semen, fœnugræcum, althea, auris, cucumeris agrestis radix, ipsumq; oleum sicyonium. Vbi  
his



his artus irrorati fuerint, accommodatur primum acopa simpliciora, cuiusmodi ex nigra populo, ex abiete, Bromiū, quod ad Basileum refertur, Pyxis, deinde Aristophaneū, & quod Asanito attribuitur. Validissima, Lisoponium appellatū, & Pœcilū: emplastra, quod Amythaoni adscribitur & Anicetum. Laudatissimum uerò quod recipit bdellij, adipis uitulini, suffiminis ammoniaci, iris illyricæ singulorū drachmas sedecim, opopanax galbani cachryos, styracis, thuris singulorum drachmas octo, piperis grana centum sexaginta, ceræ libram semissem, resinæ terebinthinæ tantundem, irini sedimenti quod satis est, & uini quantum sufficit: tunditur hoc medicamentū Est & acopon non inefficax dissolutum irino, aut cyprino, aut laurino.

Inter acopa uerò & emplastra, medicamentū medium est diapternes uariis confectum misturis Verūm acoporū usus molli adhibebitur & continua frictione, ita ut simul affectum articulum experiare, an flecti possit, & extendi.

*De articulis relaxatis.*

*Cap. LVI.*

**L**Axantur subinde articuli ob longos febrium morbos, colicos & resolutorios, præsertim ubi calidior ipsos humidiorq; intemperies occupauerit: atq; motus inde impeditur. Succurrit his acaciæ succus aqua dilutus & parti superfusus: aut rubi, aut myrti, aut lētisci, uel ulmi radicū corticis decoctū cōgruet, aut malicoriū applicatū, aut myrti folia, cū cerato myrteo imposita. Nā colligātes nerui firmari desiderant facultate quæ astringat desiccetq; huiusmodi igit medicamenta articulis imponi debēt, cuiusmodi ex salicibus est & oxyra, & palmulatū quod uinum astringens, aut acetum assumpserit. Multi uero eiusmodi impotentiam à frigore fieri putātes, deinde calidioribus usi præliis, maiorem noxam intulerunt.

*De lumbricis.*

*Cap. LVII.*

**T**Res sunt uniuersæ lumbricorum differentię: prima retum secundum crassitiem, altera latorum, tertia eorum quos ascaridas nuncupant. Origo omnium generum est ex cruda, crassa, pituitosaque materia & putredini accommoda, qualis in pueris alijsq; uoracibus colligitur: non autem ex calida, acri, aut melancholica substantia. Hæ siquidem alimenti naturam egressæ, lumbricis procreandis ineptæ redduntur. e contrario autem, biliola potissimum recrementa



etiam hos perimunt. At si quando flaua bilis una cum lumbricis intra, aut etiam uomitu eruperit, ipsos qui de intestina obfidere, humorem uero biliosum uentriculi os aut aliam quampiam partem occupare scito. Cuiusq; igitur ipsorum differentiae speciem, generationem, locum, notas, curationemque exequemur, à rotundis exorfi.

*De rotundo lumbricis.*

**T**eretes igitur lumbrici speciem habent omnibus perspicuam, quae sanè aliis frequentiores sunt in gracilibus plerumque intestinis consistunt, & superiorem uentriculum subeunt, ideoque frequenter per os reiciuntur. quibusdam & è naribus redditi sunt: atque hoc genus infantibus peculiare & plurima parte cum febricula: sed per febrium initia orti, substantiam ex subiecta corruptione retinent: in statu, ex malitia morbi: in declinatione, toto ad melius mutato. Etenim Hippocrates memoriae mandauit bonum esse indicium teretes lumbricos prodire cum morbus ad iudicationem tendit, qui subito etiam intereunt. Sequitur autem eos qui rotundos lumbricos continent, rosio intestinorum & uentris, tussis exigua cum siccitate irritates: nonnullos comitatur singultus quoque, & somnus cum palpitatione, siquidem sine ratione expergiscuntur, nonnulli & cum clamore expergescunt, & iterum sopiuntur pulsus inaequales & febres augescunt inordinatè, quae cum extremorum perfrictione, tertiam, interim quartam, die uel nocte accessionem sine ratione habent. Infantes autem etiam mandant lingua inaniter exerta, & dentibus strident, oculis conuult, uoluntque conuiescere, excitantibus ipsos indignantur, tuculi apparent, genaeque rubescunt, ac rursus liuent: atque haec paulatim & ex interuallo. Quibusdam nausae & rosionis causae stomacho peculiare creantur, atque aegri cibum respuunt, compulsi autem ad cibum nauseabundi uix quod assumitur deglutiunt, uel etiam assumptum reuomunt, plerisque uero alius descendit corruptos cibos egerens, & tympani modo inflatur. Reliquum corpus sine ratione contabescit, neque esurie, neque euacuatione modica suborta. At qui non in omnibus omnia quae iam commemorauimus signa inquirere oportet. sed nonnulla ex eo quod praepollet in erim & plurima. Haec autem eueniunt, dum animalia per intestina serpunt toduntque, febris autem calor uapores sursum, cerebro



cerebro transmittit prauos, ex putrida in uentriculo collecta humiditate exhalantes, in quibus aniborum partim similiter curam habere conuenit & febris & lumbricorum, partim de febre parum solliciti, lumbricos de corpore eximere cōitemur. Multi siquidem nulla lumbricorum cura habita, exesi ab ipsis sunt, & conuulsi interierunt. Alii produnt se lumbricos uidisse, qui ex inguinibus ægri eruperint, Cæterū occisos hos omnes prius educes: occides autem, amaris potissimū usus remediis. Cum igitur febris & lumbricorum communis sit curatio, conuenient auxilia simpliciora: potui igitur dabitur chamæmelorum decoctum uel myxariorum, ut appellant, uel ipsa myxaria decocta esui dantur: item sereos succus, aut coriandri semen cum aqua calida uel cum posca, uel myosotidis herbæ decoctum, uel cornus ceruini tamentum, uel minium synopicum tenuissimum, ac olei immaturi amarissimi paulatim cochlearia duo absorbeant, qua enim amarum est, lumbricos occidit: quā lubricum, detrahens ipsos cum stercore reddit. At si inflammationem distentionemq; uiscera experiantur, cataplamate urendum est, quod lini semine, farina loloacea, absinthio & bryoniæ radice constat, ex hydromelite uel etiam humido foru ex oleo chamæmelino, uino, absinthii semine, & aloe, præcordiis accommodato. Vbi uero non uehementer febres molestant, miscenda est myxariis mentha & exhibenda est. Cum ad integritatem uentū est, efficaciora quoq; usurpantur, quale est decoctum seriphii uel calaminthæ, uel filicis, uel cardamomise men, uel mali punici acidi radice ius ad tertias redactū, uel fricti cumini, uel nitri fului, singulorū scrupula tria, uel sandonicum uel abrotanum, uel etiam ambo simul, cum melle in catapocia coacta, uel lupinorum amarorum scrupuli terni uel brassicæ, uel erucæ semen læuigatum, uel absinthinum, quod etiam solum frequenter abundè fuit. Dantur autem & terria lotæ aloes scrupulæ quod remedium est laudatissimum: in ualidioribus illota quoq; aloe utimur quia uerò infantes aloē cochleari non admittūt, supinis fasciola ipsis detentis, ore adaperto per clysterium quoddam ualido munitum canali, inuitis aloes quā penitissimè transmissam iniicimus. Atque hæc mirifica medendi ratio in pueris est, qui difficulter possunt tractari: quibus etiam cibos subinde sorbiles, quemadmodum iis qui cibum auersantur, infundimus. Cæterū & cyphi & masaphium



phium rectè dabitur, item cornu ceruinum combustum cū pī-  
pere & melle uel oxymelite, reliquaq; ex oxymelite ipsis dare  
conabimur: præstiterit autem si acetum scillinum fuerit, præ-  
fertim ætate prouectioribus, aut sinapicū oleo & aceto ad co-  
chlearis magnitudinem. At qui lumbricis, cum alui profluuiio  
infestantur, præbent plantaginis succum, ipsamq; plantagi-  
nem aridam assument, ex quo enim utriq; & fluori & lum-  
bricis efficax est. Cataplasma his accommodabitur ex farina  
ordei cruda, filici, absinthio, farina lupini, sandonico & abrota-  
no. Iam uero & malicorium acacia, galla, uel balauustum admi-  
scebitur. Quoniam uero nonnulli subinde amaras portiones  
ceu ingratas respuunt, ex iis quæ modò comprehensa sunt, da-  
buntur non manifestò amara. His accedent insuper chamævi-  
rys, marrubium, helenium, baccæ lauri, acacia, thymus, pule-  
gium, carpesium, iuncus odoratus angulosus, polypodium, iris,  
cnicon, erythrodanon, spina ægyptia cum piperē, singula sex  
scrupulorum instar: item decoctum menthæ, mori radicis suc-  
cus decoctum uē, petroselinum reliquaq; odorata semina, ex-  
trinsecus autem inducitur aloe cum melino & uino. hoc & ap-  
petentiam excitat, quæ uix maguo negotio recipitur: miscetur  
autem sæpius aloe absinthium: aut felle taurino, cum amaris  
quibusdam prædictis umbilicum impleto: aut oleum ex rho-  
dodaphne factum sæpe delinetur, aut liquor cedrinus & solus  
cum cerato, toti uentri imponitur, aut pix arida trita insper-  
gitur, uel mentha, uel melanthium cum rosaceo, uel etiam se-  
riphij decoctum ipsis admiscebitur, uel fraxini persicæ folia in  
pollinē detrita applicamus. Utendū uerò est & medulla cerui,  
unguinis modo, in umbilico, inferiore uentre & lumbi: ceratū-  
que adiūgetur, si res postulet hoc, Aloes, absinthij, farinæ lupi-  
ni, seripii, melanthij, singulorū scrupula sex, ceræ uncia & semis-  
sis, chamæmelini quod satis est, felle taurino arida læuigantur.  
Porro ab inferioribus partibus mulsam iniicere sæpius expe-  
dit, quo lumbrici mellis dulcedine illecti deorsum descendant:  
si autem putrefacti in alto corporis non excernantur, sed po-  
tius uapores sursum mittant, educendi sunt, aut aloes, aut me-  
dicamenti amari ex ea confecti portione, quandoquidem etiam  
in aliis mediocri alui uacuatio, non expers est præsidii.

† Integra huius loci scriptura est in antiq. codice ὁ φθάλμοι  
καὶ οἱ φάρμακοι, oculi caui apparent.

De latis



*De latis lumbricis.*

**L**atus lumbricus mutatio est (ut ita dicam) adnatæ in interiori intestino membranæ in materiã animalis modo mobilis, quæ sæpe tota redditur longitudine incredibili, uel pars ipsius excernitur: dissolutus uero, non coalescit: & nunc in iis etiam qui febre carent, abundat: nunc febricitantibus accidit, ex longo morbo continuas stomachi rosiones inferens, ac impotentem ciborum appetentiam. Nam quod animatum euasit, in intestinis obiectum rapit alimentum, ut alio statim opus sit, & nisi assumpserit, intestina rodantur. His occupatos comitatur corporis gracilitas & pulsus inæqualitas, cum inæqualitate: at quod certissimum est indicium, cum recrementis nonnulla semini cucurbitæ similia excernuntur. Curatio concordat, potio enim ex acris petita, & alliorum esus, tum filicis, uel centaurei decoctum, & potum & ab inferioribus partibus inditum, uel calaminthæ uel dictamni, uel pulegii: dabitur autem in aluum & muria. Præbire uero hoc medicamentum quod sequitur, neq; ijs qui aliis lumbricis infestantur, inutile est, si febre potissimum uacuerint. Nitri rubri, piperis, cardamomi pares portiones: dantur terni scrupuli cum uino aut aqua calente. *ALIVD* eclegma. Piperis, baccarum lauri purarum, cumini Aethiopici, mastiches, pares modi, mellis quod satis est: datur cochleare unum mane, & dormituro. At si efficacius id fieri desideres, nitri quoq; rubri parẽ portionẽ adicies. *ALIVD*. helenij, suffiminis ammoniaci, piperis in alio filicis, singulorũ drachmæ quinq; cum oxymelite calido: tempore interposito dabit euphorbii drachma, uel duæ prouectioribus potui. *ALIVD* Filicis acetabulum, nitri drachmæ duæ, datur uinum cochleare aquæ euacuatione prius facta: satius aut erit si etiam scammoni momentum assumat. *ALIVD*. Mali punici acidi radicũ corticis in summo decorticati drachmæ quatuor, piperis tantundem, cardamomi drachmæ sex, marrubii drachmæ duæ, melle dantur, porro prius assumpto. Verũ ut ex toto affectus discutiat, theriacem quoq; exhibebis, si ualida febris non prohibet.

*De ascaridibus.**Cap. LVIII.*

**A**scarides, ut modò etiam diximus, specie lumbricorum cõtinent, uermibus similes quæ in extremo lōganone & mu-



& musculi anum stringentis *σφιγγης* Græcis dicitur, initio reperiuntur, uehementem locorum horum pruritum excitâtes: generant speciem hanc praua alimenta, perfrictio, & ciborum corruptio. Vacuari igitur debent in infantibus, glandibus ex melle, cum salis momêto, uel nitri: in prouectioribus, acri muria, aut decocto centaurei, cum nitro & melle, aut cucurbitæ syluestris, aut absinthij, aut chamæleontis, aut anchusæ, aut enici, aut hyssopi, aut pulegij, aut calaminthæ, aut lupinorum: secundum clysteres sublinetur longanon, simplicibus quidem, acacia, aut hypocystide cū nitro, aut rhu syriaco cum alumine liquido: at quibus aluus astricta est, lemnia sphragide, cum uino: compolitis autem Andronis pastillo, similibusq;. Cedrinus autem liquor ipsis iniicietur per clysterem multis peruiū foraminibus, quales ab utero metrenchytx appellantur: aut carnem salsam commodè impositam deligamus, quamdiu sustineri possit, eamq; frequenter mutare oportet. Cæterum cōmuniter omnes quos lumbrici male habent, pellichneumonis iuuant, suffiri. Cibi præscribentur ipsis probi succi, & qui faciliè in membra digeruntur, nec lumbricorum effectricem causam adaugent, nec uires superari permittunt, propter quas & uinū aquosum exhibebimus: frequentius autē nutrire ipsos ob hoc ipsum oportet, ne alimenti expertes lumbrici rosiones pariāt. dabitur autem cibus, tum præcipuè quum potissimum nutriti magis fuerint. At si alui profluuium fuerit, sciendum est lumbricos magis abundare, cibo non distributo, ac iam sorbiles ægris cibi dantur, admixtis quibusdam etiam astringentibus, uerbi gratia, pyris, aut malo cotonio, aut malis punicis, præcipuè acidis, à foris autem uentri remedia continentia inducuntur, de quibus suprà dictum est.

*De dracunculis.*

*Cap. LIX.*


**I**N India & superioribus Aegypto locis dracunculi generantur, ceu animalia quædam lumbricos imitâtia, in partibus musculosis, puta brachio, femore, tibia: in pueris etiam latera sub cute perreptant & palam mouentur, deinde cum diu extremum aliquod dracunculi remanserit locus suppurat, & cute ipsius adaperata, initium ipsius progreditur: cum trahitur, dolores mouet, præcipuè abrutus. Quapropter nonnulli dicunt plumbeam molam ex dracunculo suspendendam ne uersim,




uerſim, ſed particulatim molis pondere decidat. Alij uerò hos damnant quòd nihilo magis pondere molis plumbeæ dracunculus abrompatur, & dolores uarios concitet. iubent partem in aquam dimitti calidam, quò dracunculus tepefactus foras prorepat, deinde digitis ipſum membratim extrahere. At Soranus neque animal prorſus, ſed neruoſi cuiuſdam ſubſtantiam eſſe putat, quòd opinionem motus ſolum præbeat, ſiue autem hoc ſit, ſiue quod prius dictum eſt, Sorano & Leonidæ, alijsq; uiſum eſt, calida ſuperfuſione & cataplaſmatis concoquentibus in his uti ex mulſa, farina triticea, aut hordeacea. Eſt cum emplaſtri uſum eiſdem potentia probant. Conuenit autem & quod ex baccis lauri & quod ex melle conſtat: emortui ſiquidem horum uſu dracunculi, nimirum quod continetur corpuſculum excidit. Suppuratione autem facta, niſi exiderit, curis diuidenda eſt: ubi denudaueris, quod continetur auferes, & cutem linamento penetrabis, ac deinceps eam curandi rationem adhibebis quæ puri ſit maturando.

## FINIS LIBRI QVARTI IOANNE


GVINTERIO ANDERNACO MEDICO INTERPRETE.







PAVLI AEGINETAE  
 IBER QVINTVS,  
 IOANNE GVINTERIO  
*Andernaco Medico Interprete.*



Quomodo quis ab omnibus communiter  
 uirulentis bestijs se tueatur. Cap. I.



**D**E VIRULENTIS bestijs præcipientes, ab ijs quæ in omnibus huiusmodi cõmuniter proficiunt, ex ordiemur, ita, ut quomodo quis ab illarũ iniuria se tueatur, prius expediamus. Si igitur aliquis necessitate quapiã coactus, loco feris frequenti obdormiat, ubi potissimũ salamandræ aut phalangia, aut serpẽtes aliqui abundet, horũ cauas latebras allio in aqua detricto, aut aliqua ex herbis quas expone-  
 mus, obturare conuenit. Suffitus autẽ rectẽ excitantur ex cornu ceruino, caprarum ungulis pilisve, lapide gagate, bitumine, bdellio, galbano, cupressi aut cedri rasura, melanthio, peucedano, uiticis foliis, nepita, sagapeno, castorio, cachryos radice, cunila, aut ex reliquis grauitè olentibus aliquo. Culces autem propriè persequitur suffitus ex atramenti sutorij, melanthij syluestris, seminis cumini, paribus modis, item finus bubulus eodem fugat. Ad hæc etiam ignes incendere crebriores uincit. fugiunt enim magna parte feræ corũ splendorẽ. Cæterum totũ substernere ex hastula regia, nepita, uitice, pulegio, polio, cunila bubula, abrotano, expedit. At si toto huiusmodi toto uti  
 non



non datur, † stratis saltē imponenda sunt. Iam uero animum adhibere oportet ijs quæ coquuntur, aquæ & uinorū cadis, ut exactē sint operculati. Focus autē non sub arboribus quibusdam excitabitur, præsertim pinu aut picea, in his n. salaman- dræ, & crucæ lethales crebræ uersantur, quæ ab ignis tempore calefactæ, decidunt in obsonia aut alia uasa, si nō fuerint opera. Qui uero tutiores esse uolunt, iis conuenit etiam ceratum corpori oblinere liquidius, ex cera, rosaceo, galbano modico, scobe ceruini cornus exigua, uel etiam æthiopico cumino: peculiariter autem malug folia cum oleo detrita si illinantur, ab apum & uesparum morfu præseruant.

† Hæc ita leguntur in antiquo libro, περιεχόντων τῶν ἰσχυρῶν αὐτὰ τιθέναι, id est, circum lectū saltē ipsa ponere oportet.

*Communis omnium qui à uirulento quopiam morfi  
uel icti sunt curatio. Cap. II.*

**Q**UOD si feriri aliquē aut morderi à uenenato animali contigerit, homo adhibendus est qui uulnus exugat. nō tamen eum ieiunū esse oportet, uerū etiā uino os coluisse, & oleū in eo continere. Deinde particulæ cōmorsæ, si ad mittit, cucurbitulā cū multa flāma adhibere oportet, sicut uicinæ etiā partes scarificentur. Nā uirus unā cū sanguine, & spiritu rursus ita extrahitur. Itē exulcerata adurere ac crusta obducere, adeoq; præcidere cōueniet, si fera quæ momordit, lethalis fuerit, quales aspis, cerasites, uipera, similesq; aliæ sunt quæ admodū Galenus memoriæ prodit, uinitorem quendam à uipera morsum ubi ferā cognosceret, falce læsum digitū statim abscidisse, atq; in totū periculo liberatū. At si uenenum per corpus fuerit dispersum, sanguis statim de mittendus est, præcipuè si is qui percussus est, plethoricus existat exhibere cum cibus edendum piper aut allium conducit: potui, uinum ualidum: recentibus vaporibus, & conuenienti naturæ caliditate, corporis temperamentum replere, deinde iis oblinere, quæ cōmorsam partem possunt calefacere, & uellicare. Imponetur itaq; cinis braslicæ aut fici aceto mistus, aut lixiuia, aut garum, & cape cum polenta aut pane: item porra abunde cum sale, aut pix liquida cum sale, calida: aut cedrus, aut fimus caprillus. Conuenit autē ipsis acētū calidum quoq; superfundere, in quo nepita sit incocta:



incocta: aut acetum & aquam marinā aut acetum cum muria. Ceterum locis effectis gallinæ, & magis galli gallinacei, aliæ animantia per medium dissecta, calida imponi debent. Nam uirus transsumunt euocantq; & dolores mitigant. Emplastra quoque utiliter applicantur, tum hoc quod sale, tum illud quod cachry & adarce constant: in totum, quæ acrioris sunt potentia. Omnes uero communiter & morfi, & icti à quocunq; tandem uirulento animali, præterquam si interiora omnino offensa non sint, porabunt serin, aut ericen, aut astragalon herbā cum aceto, aut bitumen, aut paliurū similiter, aut ueteris rhu decoctum, aut mustelę inueteratę drachmæ duæ ex uino sumptæ, præsentis sunt remedio, uel marinæ testudinis sanguis, aut castorei drachma cum diluta uini portione, aut roris marini tantundem, aut sicyonię radice aut porri succus, aut chamæpitys, aut smyrnium, aut cinamomum, aut aristolochia, aut uiticis semen, aut cupressi pilulę, aut seseli, aut piper, aut trifolij semen, aut baccę lauri, aut cancer fluuiatilis tostus aut elixus: item composita hæc Theriace utilis est.

*Theriace aduersus uirulenta & lethalia uenena,  
uiperę morsus, & scorpionis ictus.*

**B**Ryonię, opopanacis, iridis illyricę, roris marini radice, zingiberis, singulorū drachmæ quatuor, aristolochię drachmæ quinque, lachrymę thuris, rutę syluestris, singulorū drachmæ tres, farinę erui drachmæ duo: singuntur pastilli uino, danturq; singuli qui treis obolos pendeant, ex eodem uino. Ceterum purgatio omnibus conueniet, desudationes, & theriace ea uiperis assumpta.

*De rabiosi canis morsu, & metu aquę, quę hydrophobia dicitur. Cap. III.*

**E**Xordium sermonis à rabiosi canis morsu capere, quàm ab alijs muluimus, quod animal & fecundū prouentu, & contubernale homini existat, rabieq; sæpius corripiatur, & ægrè cauere possit, ac periculū ab eo sit inuitabile, nisi multis aliquis & conuenientibus usus fuerit præsidij. Rabiunt canes plerunq; in æstu uehementiore: autem Lycus memorię mandat, interim etiam per frigora maxima: rabidi autem & potum & cibum auersantur, si premuntur, neq; tamen bibunt: anhelant præterea non parum, aures inclinant, saluam & copiosam



piofam & spumantem ædunt, & muti in totū sunt, & ueluti infani, ut ne domesticos quidem agnoscant: insiliunt itaq; sine la-  
tru omnibus pariter & bestijs, & hominibus, mordentq; . ubi  
momorderint, statim quidem nihil molestiæ adferunt, præter-  
quàm ex uulnere dolorē: postea uerò aquæ metum, hydropho-  
biam Græci appellant, faciunt, qui cū conuulsione, totius cor-  
poris rubore, præsertim faciei sudore, & anxietate accidit, aquā  
fugiunt, & dum uident, & dum admouentur: nonnulli etiā om-  
nem humorē: alij canum ritu delatrant, & obuiū quemq; den-  
tibus appetunt, morsuq; suo in alios eandē affectionē transfe-  
runt. Porro accidentiū, aliorū quidem causa manifesta est, oc-  
cupatis. si ueneno partibus uniuersis: metum uerò aquæ non-  
nulli ex immodica fieri siccitate dixerunt, quasi humida ipso-  
rum substantia in contrarium penitus habitū mutata. uerum Ru-  
fus talem melancholiæ speciē ipsis oboriri pronuntiauit, uene-  
no humorem illum imitato: quemadmodū alios melancholi-  
cos nouimus alia timere, quæ causa superuenit etiā ijs qui di-  
cunt canis qui momorderit imaginē in aquis opinari se uide-  
re. At ex ijs qui hoc uitio sunt occupati, nullum, præterquàm  
unum aut alterū, superuixisse, ex historia didicimus, eosq; non  
à rabioso cane morsos, sed ab homine quodā morso uitiū ade-  
ptos. At ante affectus huius occupationē multi etiā quos ca-  
nis momordit, seruati sunt hinc igitur curatio auspicanda est.  
Quoniam uerò subinde, eo quod tunc aquæ metus non inua-  
dat, ( magna. n. ex parte circa quadragesimū ferè à morſu diē  
solet ingruere, quibusdā & post sex menseis, proditū est nonnul-  
lis post septem quoq; obuuisse) nonnulli canem qui momor-  
derat non rabire arbitrati sunt, properarunt uulneri cicatricē  
inducere: unde ipsi causam huic affectioni dederunt, hac autē  
probatione usus deprehendes, morsu rabiosi ne canis fuerit, an  
non. Iuglandibus nucibus concisis uulnus diligenter obstrui-  
tur, sequenti die ablata, gallinaceo, aut gallinæ in cibo appo-  
nentur: ac primum sanē non attingent, fame autem urgente si  
edant, rem considerato. Nā canis qui momordit si nō fuerit ra-  
biosus, uiuent: si rabidus, sequenti die peribunt, atq; tunc ad uul-  
neris dilatationē properandū est, iterumq; post paucos dies  
eadē probationē tendū, & si non perierint gallinacei, tunc ul-  
cus ad cicatricē perduces, nullū ueritus periculum. Hanc itaq;  
probationem Oribasius tradit. Quod si ex cōmemoratis indi-

PAVLI AEGIN.

y ciis-



eius accuratè canem rabire cognouerimus, statim iis medicamentis quæ aperiendi uim habent, utemur. Primum igitur ex aperiuntibus est, quod pice, aceto quæ acerrimo, & opopanace constat, in capite de neruorum uulneribus explicatū: at si qui morsum accepit, delicatiorē cutem habeat diluui ipsum irino debet aut balsamo, aut eiusmodi aliquo: uel ulcera prius fomētis ad iura, alio obduces. hoc quod sequitur etiam crustam facit.

*Aridum ad crustam in canis rabiosi morsu excitādam.*

**S**alis fossitij drachmæ octo, chalcitidis drachmæ sedecim, scilicet tantundem, rutæ uiridis drachmæ quatuor, æruginis rasæ totidem, marrubij seminis drachma: utitor primū arido ut crustam inducat, deinde cum rosaceo, ut crustæ excident. Cæterum partes affectæ ad dies quadraginta duos, ut minimum, sine cicatrice seruentur.

*Cataplasmata quod oras uulneris latas in rabidi canis morsu seruat.*

**C**Epæ cum sale & ruta inducuntur, aut la serpitiū cū sale, aut salsamentū uetus, aut cinis sarmentaceus cum oleo, aut alia, aut sambuci folia, aut mentha, aut apiastrū, singulatim, aut cū sale: aut iuglandes nuces, cū allio, sale & melle, aut cinis fici, cerato exceptus, uulnus autem aqua, abluetur, in qua decocto sit chamæmelum, & syluestris lapathi radix. Nonnulli & ferro candenti ulcus adurunt. Cæterū potui assument cōmorsi, simplicia quidē, lycium, absinthiū, liquorē silphij, chamædrin, scordiū & poliū: composita autē hæc, cancerorum fluuiatiliū, sarmētorum uitis albæ, in cyprio uase, aut æreo cōbustorū, cochlearia duo, gentianæ radice læuigatæ cochlear unū, cum uini meri ueteris cyathis duobus, ad dies quatuor potui dato, aliqui uerò & perdicis sanguinis duo cochlearia addunt. Capiēs autem caneros dū lina increfcit, priusquā sol exoriat. iis autē qui eodem die non biberunt, duplicē portionē exhibeto, interim & triplicem. Iam theriaca ex uiperis rectè datur. Purgare expedit medicamēto ex cucurbita syluestri, ita ut quotidie, id exhibeas, cum decocto elelisphaci, aut sideritidis heraclæ, quam & dialyson appellant: nonnulli uerò & iecur canis qui momordit edendum dederūt. Cæterū uictus ratio talis adhibenda est, quæ simul ueneni uireis haberet extinguatq; , simul & descensum ad interiora prohibeat: quæ duo præstare potest, uini dulcioris uetusti



uctusti & meraci, lactisq; potio. idem efficiunt allia, porri & cepæ in cibo sumpta. At si per initia ob impedimentum aliquod non præsumpta quæ retulimus remedia fuerint, carnis præscissio uel cucurbitulæ uel ustio non adhibenda est, ut quum iam uenenum penitus secesserit: medicamentis autem quæ euocent, Græci metasyncretica uocant, uti consilium est, aquæ metu uidelicet non oborto. purgatio ex hiera & scissili lacte petetur. item sudoris euocatio, dropacismus & sinapismus, toto corpore particularim adhibebitur. omnium tamen efficacissima deprehensa est purgatio quæ fit per ueratrum.

*Ad morsus canis non rabiosi. Cap. IIII.*

**C**anis non rabiosi morsus, quum & ipsi uirulentæ cuiusdam substantiæ sint participes, statim aceto irrorans, laeta manu morsum ferito. insuper nitrum cum aceto tritum ex alto in patrem fundito, deinde spongiâ recentem aceto, aut ipso nitroso aceto madidam imposito, triduo id ipsum superfundens, tandem enim consanescet: uel erui farinam oleo maceratam imposito: aut spongiam recentem, aut lanam succidam aceto & oleo imbutam accommodato, aut rubi folia cū aceto tinsa inducito, aut cepam tritam cum melle, ut origanî comæ, salis, cepæ, pares singulorum modos cum melle: uel mar rubium nigrum, quod & balloten dicunt, cum sale ad feruidos autem iam morsus, erui farina melle macerata admouetur. peculiariter enim his efficax est: inflammatione confictantes, argenti spuma trita ex aqua oblinito.

*De uestis & apibus. Cap. V.*

**A**pium ictu dolor sentitur. locus rubescit, propinquæ partes tument increscuntq; aculeus, in uulnere relinquitur. In uestis autem similia quidē, sed intensiora omnia sunt, nec aculeus relinquitur. Remedio sunt aduersus utraq; lutum, & bubulus fimus, illita: & lac ficulneum, aut læuigata mori arboris folia, aut maluæ: aut farina ordeacea ex aceto imponitur. quinetiâ muria aut marina aqua fouere cōducit.

*De phalangijs. Cap. VI.*

**P**halangiorū morsu, locus ipse quidem rubescit, & ueluti punctus per ambitū apparet, non autem tument neq; incalescit, sed leniter rubidus frigore & pruritu uexatur.



Comites notæ percussorum sunt perfrictio, tremor, corporis grauitas, sudor frigidus, dolor ualidus, pallor, cōtinua urinæ excernendæ incitatio: quibusdā & urinæ difficultas, colis intensio, oculi hument: inguina & poplites intenduntur rigentq; cōuulsorio modo, ualida stomachi rosio urget, lingua sermonem manifestò non explicat, uomitus aquæ uel aranearum textis si milium erumpit. sunt etiā quibus per urinas, & aluum eadē descendūt demissi igitur in aquā calidā dolore liberantur, ac rursus ualidè indolent. Auxilio est, si extrinsecus cinerē ficulneū cum sale læui ex uino maceratum, imponas: aut radicem syluestris punicæ tritam, aut aristolochiam, cum farina ordeacea aceto madefactam. Iam & ulcera funere marina aqua calidiorē, aut apiastri decocto, conducit, eiusdemq; folia imponere, ad hæc balneum frequentius utile est, atq; his potionibus medicis uti: uti abrotani semine, anetho, aristolochia, agresti cicere, cumino æthiopico, cedri baccis læuigatis, platani cortice, trifolii herbæ seminæ, myrticæ semine, singulorum drachmis duabus cum uini cyatho & uiridium cupressi foliorum aut pilularum decocto, uino temperato. Ferunt nonnulli & cancrorum fluuiatilium succum cum lacte & apij semine datum, periculo subtrahere.

*De araneæ ictu.*

*Cap. VII.*

**E**st quoddā etiam aranearum genus quod percussu ualidos dolores circa media præcordia excitet, item ruborem, & urinæ difficultatem, nonnunquā & suffocationē. Leuantur autē ictu hisce remediis: cumini syluestris thebaici, aut uiticis seminis, aut albæ populi foliorum poto, uel alijs foliis assumptis & uino meraciore superbibito iuuantur.

*De scorpionis ictu.*

*Cap. VIII.*

**A**scorpione ictis locus quàm primum inflammari incipit, duratur, rubet, & cum dolore circumtenditur, nūc feruor, nunc frigus uicissim inuadit, acceditque dolor qui itidem modo decreuit, modo intenditur, comitatur ipsos sudor, horroris sensus, tremor, extremorum perfrictio, inguina his attolluntur, particula intenditur, sæpe etiam flatus cum sonitu per sedem erumpunt, pili rigent, cutis fit discolor, dolorque tota cute affligit, ceu acus spiculo excitatus. His auxiliantur protinus, lac ficulneum instillatum uulneribus,



neribus, ipsæq; scorpio qui percussit minutim contritus, uulneriq; impositus, sibi remedium est. post hæc est sal tritus cū lini semine salutariter imponitur, itē althææ herbæ semen: succurrit & sulfur uiuū resina terebinthina exceptū: similiter ē galbanum splenii modo dilatātū impositumq; nepitaq; læuigata & applicata, & ordeacea farina in uino parata & in rutæ decocto exhibita. auxiliatur his ē trifolii herbæ semen læuigatum iniectumq; Ad hæc, potiones hæc cōueniunt: aristolochiæ drachmæ duæ, præsertim corticis cum uino, gentiana tusa, pulgiumq; abundē decoctū, item baccae lauri numero decem leuigatæ, nepita cū posca largiter incocta, cyperis cū uino, ruta similiter, lac ficulneum & laserpitiū, si adsit, si desideretur, parthico liquore utendū erit. benefacit ē trifolij ocimiq; semen epotū. Idem præstat argenti spuma subito ictui præter opinionem imposita omniū aut horum uicem præstat balnei continuus cum multo sudore usus, uini potio plenius diluta. Porro composita hæc potari debent: sulfuris uiui fabæ Aegyptiæ instar cum piperis granis octo, in dimidia uini hemina: uel liquor laserpitii cum cancro detrito in uino: aut melanthii, cumini æthiopici, uiticis seminis, pares portiones cum uino.

*Ad scorpionum periculorum & phalangiorum ictus.*

**F**Ecis drachmæ sedecim, pyrethri drachmæ quatuor, rutæ syluestris seminis drachmæ tres, castorii, erucæ seminis, singulorum drachmæ duæ: excipiuntur sanguine hirudinis marinae. dantur quaterni oboli cum uini meraci uel aceti cyathis tribus. **ALIVD.** Pyrethri, aristolochiæ, singuli trientes, piperis drachmæ duæ, liquoris laserpitii drachma: exhibetur ad fabæ Aegyptiæ magnitudinem.

*Descolopendra terrestri & marina. Cap. IX.*

**A**T si scolopendra momordit, communiter quidem locus affectus in orbem liuescit attolliturq; aliquando feci similis, rarius autem ruber apparet, exulceraturq; statim ab ipso morsu adeo ut uix magno labore curari queat. præter hæc etiam toto corpore pruriginis sensus percipitur peculiariter autem iis qui à marina scolopendra imperiti sunt, aquosus pellucidusq; tumor interim efficitur: à terrestri, rubens. Plagæ igitur imponi debet sal bene tritus uel ruta leuigata, aut cinis

y 3 aceto



aceto maceratus, aut scilla. Fouendus locus est muria cū aceto. Arigenes aut oleo calido liberaliore fieri id iubet & prae dicta sic imponi. Potui dabitur aristolochia cum uino, aut serpillum, aut calamintha, aut syluestris ruta, aut trifolium aut succus radicis hastulae regiae dimidia heminae mensura cum uino.

**S** Ad stellionis transmarini morsum. Cap. X.  
Esamo trito cataplasmatismodò obducito.

De fele. Cap. XI.

**Q** Vi à fele mordentur, ualidè quidem dolent, & locum affectum liuidum habent, sed statim cepae & allia ictui applicata, auxiliantur. insuper eorundem elus, uino meraco superassumpto, remedio est.

De mure araneo. Cap. XII.

**V** Bi uerò mus araneus nocuit, sequuntur dolores pulsátiles, & in singulis detiū eius animalis ictibus, rubores: pustula insurgit sanioso humore plena, propinquae partes oēs liuent: cute pustulae dirupta, albū ulcus apparet. nā ad mēbranas neuosas deraditur. ad hāc, excidunt ēt partes exese depastione oborta, his quae serpunt simili: prāter ea ēt intestinorū tormina comitātur, urinā difficultas, & frigidi madoris undiq; eruptio. Auxiliatur ipsis galbani spleniū per se impositum, uel tritū cū aceto, uel ordeacea farina, cū oxymelite applicata, ipseq; mus araneus qui momordit dissectus admotusque sibi est remedio. aduersatur ēt pyrethrū illicitum, uel mali punici dulcis corium incoctū, uel malua syluestris, uel allia contrita, uel sinapi laeuigatū cū aceto: itē ex calida muria forus conducit, deinde ordeū uistū ex aceto applicatū. Potui propinabitur abrotanū ex uino coctū. aut sisymbriū, aut serpillum, aut eruca, aut galbanum, aut elelisphacum, aut tenerae cupressi pilulae cū oxymelite, aut pyrethrū cum uino, aut chamaeleontis radix, aut hoedi agniūe coagulū, aut gentianae radix, aut uerbenaca, quae etiam imponitur cataplasmatismodo: ipsūmq; murem qui momorderit, exactè detritum cum uino bibunt. Efficax hoc etiā quod sequitur: myrrhæ drachmæ sex, aristolochiae corticis drachmæ quatuor. porrò ad muris aranei & scolopendrae morsum sal cum liquida pice rectè applicatur, aut cedria cum melle, aut allium cum fici foliis & cumino, aut calaminthae folia, uel ordeum etiam cum aceto.

De



*De uiperatum mare tum fœmina. Cap. XIII.*

**I**N uiperæ tū maris tū fœminæ morſu ſimiliumūe animā-  
 lium uirus iaculantium, dolor loci ſtatim ab initio ſequit̃;  
 mox totius corporis: apparent ē̃t in morſu duo foramina  
 paruo inuicē ſpatio discreta, fluitq̃; ex his ſanguis humorq̃; ſa-  
 niōſus, deinde oleoſus, poſtremo ē̃t æruginōſus, quē nonnulli  
 uicus uiperarū eſſe dicunt, præter hæc tumores iuxta morſum  
 ſubrubi liuidiq̃; aſurgūt, corporis color perit: uertigines ocu-  
 lorum, ſtomachi reſolutio, & animę defectus oboritur, quibus-  
 dam ē̃t uōmitiones bilioſæ, urinæ anguſtia: inſuper puſtulæ in  
 cōmorſa parte erūpunt, ueluti in ambuſtis: itē depaſtio ipſam  
 inuadit, ad uicinā procedens, gingiuae his cruentantur, accedit  
 etiam tremor, ſopor, & frigidi ſudores. minori aut̃ cum pericu-  
 lo liberari, quos uipera mas, quā quos fœmina momordit,  
 uidentur: ex his ipſis minus periclitantur qui cibum præſum-  
 pſerunt. In curatione autem præſtantiffimum remedium eſt,  
 allii eſus, & uini meraci potio, adeò, ut ſi aliquis uti ſuſtineat,  
 nullum præterea remedium deſideret. edūtur etiam utiliter &  
 porra & cepæ & ſallamētum quā acerrimum. Sunt qui & ra-  
 nas in cibo elixas dederunt. benefaciunt & hæc quæ ſequun-  
 tur cum uino ſingulatim pota: teſtudinis marinæ ſanguis re-  
 ſiccatus cum cumino ſylueſtri, coagulū leporis, aut hinuli tri-  
 bus obolis, ceruini genitalis ſicci, anchuſa tenui folia tota, hæc  
 autē nonnulli ē̃t collo ſuspendunt, porri ſuccus dimidiæ hemi-  
 næ menſura ex mulſa, apiaſtri foliorum ſuccus, ſylueſtris ruta,  
 gallinarum cerebrum, panacis radix cum uino incocta, agarici  
 drachma, iuniperi baccæ, haſtulæ regiæ radix, piſtacia trita, uiti-  
 cis ſemen, muſtelæ inueteratæ ſiccataq̃; drachmæ duæ: echini  
 radix ſuccusq̃; cancri fluuiatiles aut per ſe, cumq̃; herba pedicu-  
 laria, ſale & polio: ariſtolochiæ radix cum myrrha, gentiana,  
 baccis lauri, æquali modo melle excepta, atq; hoc quod ſub-  
 iungom mirificē efficax eſt.

*Oribasii ad uiperarum morſus.*

**A**Niſi acetabulum, piperis, drachmæ quatuor, ariſtolochiæ  
 corticis, opij, caſtorij, myrrhæ, ſingulorum drachma: paſ-  
 ſo læuigata in paſtillos inſtar fabæ Græcæ cogiro, & pro ui-  
 ribus cuiuſque exhibero, cum ternis diluti uini cyathis.

ALIUD, ex Lyci commentariis medicamentū uiperæ morſibus

y + præſen-



praesentaneum, Myrrhæ castorij, piperis, sandarachæ, singulorū drachma, anethi seminis acetabulū : læuigata ex passō dantur. ALIVD. Ex Archigenis commentarijs. Cancros uiginti cū farinæ triticeæ quod satis est, in pila diligenter contundito, admixtaq; nepita & salis momento, pastillos fingito & siccato: in usu, cum lacte applicato, unumq; cum mulsâ potato. At si fluuiatiles cancros desideres, marinis utitor. extrinsecus autē plagæ inductus caprarum simus ex uino strenuē auxiliatur: aut lauri folia cum oleo incocta, aut baccæ lauri, aut nepita, ericæ, ruta, apium, abrotanum, galbanum in splenio adhibetum, origanum uiride læuigatum, gallinacei pulli dissecti, † & protinus calidi impositi: farina erui cum uino macerata crebro emplastri forma illita, raphani cortex læuigatus, scilla cocta, farina hordeacea ex oxymelite, cucumeris syluestris folia cū tenuissimō farinæ ordeaceæ polline, sex uini similiter cū farinæ polline, ruta cum sale & melle, furfures in aceto coctæ, cinis cū aceto, cedrinus liquor cum sale, pix liquida cum sale. Foueri debent trifolij decocto aut pulegij, aut muria aceto adiecto. Quū autem subcruentæ pustulæ euaserint, ipsas scarificabis, ita ne excories. deinde multa aqua foueto, lenticulam coctam cum melle obducito, dum consanescant. At ex uiperis antidotum propriè his & potum & plagæ impositum efficax est.

† Melior est uetus cod. ἐπιτιθέμενοι θερμοὶ καὶ συχνῶς ἐπ' ἀλλήλους, id est, calidi impositi & frequenter permutati.

*De amphibæna & scytale. Cap. XIII.*

**C**onsimilia ex horum moribus eueniunt, eademq; ipsis auxiliatur, quare peculiarem aliquam descriptionem sortita non sunt.

*De dryino. Galeni hæc præfatio. Cap. XV.*

**D**ryinus in quercuum radicibus uitam agens, tam malefica parataq; ad nocendum ui est, ut calcatus solum, pedes hominis cute nudos relinquat: totisq; cruribus tumorem laxum quē œdema uocant, copiosum excitet. Ad hæc quod multo magis est mirabile, forunt omnes eorum pariter manus excoriari qui curationem uitii administrauerint, & si quis ulciscendi studio interemerit, dicunt hunc prauè admodum olere, illoq; suo fœtore omnium aliorum odorū sensum auferre. Ictis ab hoc animali tumor circa locum uitiatum cum



cum rubore excitatur, pustulæ in circuitu assurgunt. aliquādo aquosa sanies emanat, stomachi erosio uexat, & torsiones. Cōgruit ipsis aristolochia uino pota. item trifolium herba, radixque hastulæ regiæ consimiliter assumpta. prodest cuiuscunque quercus fructus lænigatus, & epotus. Iridem ilicis radices tussæ, & loco admotæ auxiliantur.

*De hæmorrhoo, & prestere seu dipsade. Cap. XVI.*

**Q**Vi hæmorrhoi ictum sensere, ualidos experiuntur cruciatus, admodum exigua angustaq; redduntur corpora ex dolore continuo, multus ex plaga sanguis erūpit: & si cicatrix toto corpore inducta fuerit, rūpitur, funditq; sanguinē, cruēta excernunturcrementa, sanguis qui defluit in grumum concretus est: tussi ex pulmone sanguinem reiciūt, quæ euomentes ēt sine remedio intereunt. A dipsade percussos ardor intolerabilis urget, sitis tanta excruciat, ut nec extinguī, nec intermitteri possit, copiesē potū agri hauriūt, eadē tamē siti cōficiunt, tanquā nihil planē hausissent, similesq; toto habitu sunt ijs, qui antea potus nihil hauserint. unde propter cōtinuā potus assumptionē præstet ab urendo, dipsas à sitiendo serpens appellatur. Multi aut ueterum ab hæmorrhoo & dipsade commorsos ceu desperatæ salutis & conclamatos esse putauerunt. Porro si specialia aduersus feram præsidia desideremus, communia tētare oportet, ac protinus scarificationem ustionemq; adhibere: & si liceat partem uitiatam præcidere. deinceps aut acria cataplasma imponi debent. utilia sunt omnium ciborum acrium esus, præsertim quæ ex salsamētis petuntur, uini meraci potio, & lauacrum hæc autem continuè, & exiguis temporum interuallis subinde adhibenda, priusquam morbi corripuerint. nam ubi illi semel emerferint, nulla medicorum ope iuuantur. Cæterum remedia, quæ loco inducuntur. contra morsus inscripta reperimus, dipsadis quidem, portulacæ folia contrita ex aceto, polentam, rubi folia cum melle lænigata, plantaginem, hyssopum, allium album, porrum, rutam, urticam, hæmorrhoi præter iam dicta etiam hæc benefaciunt, uitis folia cocta cum melle læuigata. per os autem hæmorrhoi ipsius crematum potui datur, aut allium cum irino oleo: esui dantur etiam uux passæ.

De



*De natrice quam Græci hydron dicunt.**Cap. XVII.*

**N**atrice morfu ulcus factū dilatatur, & liuescens auge-  
tur, sanies ex eo nigra copiosa, & foedi odoris, qualis  
ex depascēte ulcere, excernitur. Curatio mali, tēporis  
processu, & uix procedit. imponēt itaq; moribus origanū læ-  
ue, ex aqua maceratū. confert & cinis quercus, oleo tēperatus:  
uel ordeacea farina cū melle deliquato bibit, itē aristolochia  
drachmis duabus diluta uini potione, uel in poscā duobus cya-  
this: deinde marrubij succus aut decoctū cū uino, aut nastur-  
tium syluestre, aut semen hastulæ regiæ seu flos, aut fœniculi  
semen cum uino: item recens fauus cum aceto comeditur.

*De Cenchro. Cap. XVIII.*

**Q**uod si cenchrus nocuit, morsus eius uiperæ similis  
est, putredo comitatur & carnes intumefactæ prius,  
ut in aqua inter cutē, defluunt, lethargo ueternoq;  
premuntur. Testatus Herasistratus est, iecur ipsis, uescam, & co-  
lon affici: resectis siquidē ipsis, partes quodammodo corruptæ  
inueniuntur. His igitur lactucæ semen cum lini semine appli-  
catum auxiliatur. succurrit & satureia trita, ruta syluestris, ser-  
pillum cū hastula regiæ læuigatum. potui uero datæ protinus,  
centaurij radicis drachmæ duæ cum ternis uini cyathis: aut  
aristolochiæ radix similiter, nasturtium itidem & gentiana,  
potu conducunt.

*De Ceraſte & Aspide. Cap. XIX.*

**T**ria aspidis genera Galenus prodit, primum eius quam  
cherſæam quasi terreſtrē uocant, mox eam quæ chelido-  
nia dicta est, tertiā ptyada appellarunt, quæ omniū est  
perniciōſiſſima. siquidē erecto collo, extenſoq; pro diſtantiā lo-  
ci, ad quē dirigit, uenenū in hominē iaculatur. hanc memoriæ  
tradit, reginā Cleopatram, quā Antonio deuictō Auguſtus eā  
capere uellet, ſiniſtræ mamme admouiſſe, morſamq; ab ea in-  
teriſſe, ut quæ longē celerrimam mortē inferat. Porro cera-  
ſtis, morſu locus cum durtie & puſtulis intumefcit, emanat ex  
uulnere ſanies, modò nigra, modò ſubpallida & porraceo colo-  
re: totū corpus uaricum modo attollitur, genitale arrigitur;  
mens alienatur, oculi obſcureſcunt: poſtremò, conuulſione ut  
in tetano pereunt. Verūm aspidis morſus acus puncturæ ſimi-  
lis, om-



lis, omnino exiguus sine tumore apparet, sanguis non copiosus, sed exiguus & niger destillat, subita oculorum hebetudo inuadit, dolor corporis multiplex admodum, sed mitis, nec sine uoluptate comitatur. Quapropter rectè Nicander cecinit.

*Et uir perit absque dolore.*

**M** Vratur color & uirescit, stomachi rosio exigua infestat, frons continuè reuelli, palpebræ sine sensu ueluti in somno comouentur, atq; inter hæc morsprehendit, ne tertia quidem diei parte dilata. His itaq; uirisq; membri affecti mutilatio mox à morfu facta, succurrit: eoq; sine mora, si fieri potest, præcidendum est, & in his & propinquis partibus omnem carnem circum secare statim, & radicitus usq; ad os excindere oportet. deinde reliquæ ferro candenti excandæ sunt. etenim horum uirus, sicut & basilisci, taurino sanguine similiter, celerrimè sanguine sistit, celerrimè sanguinem in arteris & spiritum coagulat.

*De basilisco.*

*Cap. XX.*

**H** Aec bestia rarò quidem hominum oculis occurrit. Erasistratus autem hæc inquit quum basiliscus momorderit, plaga sub aureo colore tingitur. conducunt ipsi, inquit, castorij drachmæ tres potæ. similiter etiam papaueris liquor. Nos autem hæc experti non sumus.

*De pastinaca marina, & muræna. Cap. XXI.*

**I** N marinis nempe pastinaca & muræna, agnitio manifesta est, pisces enim hi ab omnibus cognoscuntur. Auxiliatur ipsorum moribus lactis ficulnei guttæ quatuor aut paulo plures, cum ramusculis, serpilli tribus aut quatuor, & quæ ad uiperas commemorata sunt.

*De dracone marino.*

*Cap. XXII.*

**M** Arini draconis ictum plumbo infricato, aut serpillio trito obducito, aut lente elixa, aut sulfure cum aceto, aut dracone ipso euiscerato. foueri locus urina humana debet, absinthium cum diluta uini potione bibi: aut eleliphacus, aut furculi ficulnei, in dulci uino dilutum, aut piscis ipsius cerebrum.

*De scorpione marino.*

*Cap. XXIII.*

**S** Corpij marini ictum sanat mullus piscis dissectus impositusq; sulfur uiuum cum aceto infricatum, baccæ lauri tres tritæ potæque.

Quomodo



*Quomodo testudinis marinae sanguis præparetur. Cap. XXIII.*

**T**estudinis marinae sanguis in hunc modum præparatus, reponitur. In ligneo aut fictili uase resupinata testudine, caput ipsius celeriter amputato. cōcretum autem sanguinem in multas partes arundine diuidito, impositoq; operculi instar uasi cribro: siccatum excipiens utitur aduersus uiperarum morsus, ut prædictum est, drachmis duabus cum uno aceti cyatho. sequenti drachmis quatuor, cum duobus cyathis: tertio die, drachmis octo cum tribus aceti cyathis.

*De crocodili morso. Cap. XXV.*

**A**d crocodili morsus nitrum cum melle tritum usque dum ulcus repurgetur, imposito: deinde repleto melle, butyro, medulla ceruina, adipe anserino. Galenus autem tradit se cognouisse qui à crocodilis commorssi, adipe ipsorum imposita uulneribus, exactè fuerint adiuti.

*De hominis morso. Cap. XXVI.*

**N**on extra institutum fuerit, cum uirulentis bestiis, et hominis morsus conscribere. siquidè maligniores multo aliis ulceribus apparent, præsertim si ieiunus momorderit, prius leguminibus usus, & præsertim lenticula. Cōmuniter itaq; quæ in aliis uirulentis cōmemorata sunt, et in his extrinsecus per initia moribus applicare cōueniet, præter ea quæ nimium acria, adurētiaq; sunt. peculiariter autem oleo morsum prius illitum, fœniculi radice cum melle obducito, aut lomento cum posca & oxyrhodino, frequenter immutans. Emplastro aut hoc utere, quod recipit squamæ æris, galbani, æruginis singulorum uncia, ceræ libram, plumbaginis libras duas, olei sextarium: plumbago cum oleo prius incocta assumet æruginem, & squamam: ubi coierint, quæ liquari possunt adduntur. Finita autè inflammatione, communis ulceris modo etiam hæc curabis.

*De uenenis. Cap. XXVII.*

**Q**uum de uirulentis bestiis succinctè tradiderimus, proximū fuerit, ut de uenenis sermonē aggrediamur, simplicia quidè referētes eorumq; notas & remedia, tum cōia, tum specialia: cōposita aut ex studio omitemus, etenim nonnulli uariorū medicamentorū lethaliū cōpositiones exposuerunt, quæ nocere magis, quàm iuuare legētes possunt, neq; n exacta horum



Et horum indicia in his qui assumpserunt, inueniuntur, ut etiā congruum ipsis remedium queas adaptare. Quum igitur hæc uaria ex superante in ipsis ui appareant, id etiam aliquis rectè quod exhibetur, uarium adaptans, nonnunquam ex æquo, nonnunquam ut excellat, medebitur. Incipiemus itaq; & hic rursus à præcautione.

*De uenenorum præcautione.*

*Cap. XXVIII.*

**D**E uenenosis medicamentis disciplinæ ea pars quæ præcauere illa, & declinare præcipit, longè difficillima est. propterea quòd ij qui huiusmodi insidias homini clām machinantur, tanto id astu faciunt, ut uel peritissimus quisque decipi possit. siquidem amaritudines uenenorum dulci aliquo admixto, obtundunt, grauemq; odorē odoramētis additis operiunt. interim ceu ad sanitatē, salutisq; gratia in morbis hæc propinare crediti, quod genus est absinthium, abrotanum, opopanax, castorium, uenena ipsis admiscunt, tum in cibis, puta solidioribus, uel obsoniorum uarietate adumbrantes, ipsa offerunt, unde cui in suspitione huius doli uita fuerit, uitare eum oportet condita elaborataq; cibaria, omneisq; in gustu qualitates intensiores, exempli gratia, dulcis, acidus, & salsas, potissimum uero aquæ quod satis est præsumere oportet, restincto enim hac appetitu, postea qualitates aliæ à stomacho non apprehenduntur. ueruntamen alia quædam ratio asserendi hominem ab iniuriis uenenorum est, est efficacior. Couenit. n. quum suspicio mali medicamēti accepta fuerit, præcomedisse aliquid quod obtundere uenena possit, & inefficacia reddere: cuiusmodi sunt caricæ cū nucibus iuglandibus, ruta, salis grumo, & quæ mala medica dicuntur: item naporum semen drachmæ pondere cum uino, aut nepitæ folia, aut terram quam lemniam sphragidem uocant, aut tutæ folia uiginti: nullamq; nocet uenenum. Iam uerò antidota cum uino quotidie fabæ Aegyptiæ instar assumpta, tutò admodū præseruant, quale est quod terrestri crocodilo constat, dia scincu dicitur, & quod à ueriorum animalium sanguine dia hæmaton uocatur, & Mithridatium, hoc aliquando etiā ipse rex Mithridates usus est, quotidie præsumens, ut à lethali medicamento se uinuicaret, præseruaretq;. Quum igitur à Romanis captus, bis lethali medicamento epoto, mori non posset, gladio sibi ipsi uitam ademit.

Quoniam



Quoniam uerò etiā citra infidias propter necessitatē aliquādo locis desertis nociuis uersantes: fortē sub arboribus, ut picea aut pinu cibum assumunt, diligenter attendendū est, ne ex his aut superioribus locis mortifera labantur animalia, & uasa, tū quibus hauritur uinum, tum quibus aqua, tum quibus obsonia incoquantur, exactē operculentur, quemadmodum in uirulentorum animalium pręcautione expositum est.

*Communis uenenorum quomodocunque assumptorum curatio.* Cap. XXIX.

**A**T si nonnulli lethale uenenū sponte sua, ut mortem sibi consciscant, assumpserint, qualia multa in hominū uita solent accidere, aut etiam aliquorū infidiis, siquidem nobis constet quod ueneni genus potatū sit, protinus ad conueniēs ei remediū discendemus, ut in horū enumeratione dicetur: at si medicamen exhibitū tunc nobis fuerit incertum incognitumq; conuenit statim ad ea quæ cōmuniter ad quæcunq; uenena sumpta congruunt, diuertere. Nam indicia quæ comitantur si expectes, nihil planē in medicina spei est, egris propter moram iam deploratis, desperatisq;. Actutum igitur nulla mora interposita, oleo calenti per se, aut etiam cū aqua exhibito, uomere cogendi sunt. Si eius copia non est, butyrū cū aqua calida ingeri debet: aut maluæ, lini' ve seminis, aut tragi frugis, aut fœnugræci, aut urticæ seminis decoctū. Non enim solum uomitionibus euacuabunt, sed aluum quoq; subducent, & uenenorum malignitati aduersabuntur, acrimonias ipsorum habetantia, præsertimq; oleum, quod manifesto inde licet cognoscere. Si nanq; cutis exulcerandæ studio, cantharide aut calce uiua, aut eiusmodi quodā acri utaris, corpus oleo prius oblitum, non exulcerabitur. imo neq; corpus astringere potueris oleo præunctum. Præterea uomitus non modò quod nociuū euacuat, utilis est, sed interim haustum uenenū odore, concretis grumis, aut colore prodit. odore siquidem & amaritudine, cicutam: colore, cerussam, uel gypsum: concretria grumis, lac aut recentē sanguinē. halitus grauitate: uirus qualitate & odore, leporem marinum, & rubetant. ranam ostendit, ut per hæc ad accommodata singulis remedia uia non sit difficilis. Admiscebitur autem oleo maluæ, decoctū, aut anserinus adeps, aut ius ex carnibus pinguibus, uel gallinarum: aut ex lignorum cinere



nere facta lixiuia . Facit etiam huc nitrum detritum cum hydromelite potum, uinum copiosum & uetus : & quæ adipe aut butyro constant. Verum ijs quæ in uentriculo hærent, par uomitum ablatis : quod intestinis illapsum est, clystere acriore euacuabimus . Post hæc lac potui dabimus . nam ab hoc quod afficit, & uenenosum est, facîle inmutabitur . Iam uero medicamenta omnibus communiter conuenientia offeruntur, quale est, minium lemnium, abrotanum, agaricum, erythrum, eryngii radix, pastinacæ erraticæ semen, uel nepitæ, nardum gallicum, castorium, medulla uiridis ferulæ, nerii, quod rhododendron est aut rododaphne flores, marrubii succus, laserpitium aut liquor ipsius, sagapenum, opopanax, peucedani liquor & radix, aristolochia longa, rutæ syluestris semen, folia cestri, quæ betonica dicitur. danturq; singula drachmæ pondere cum uino. Efficax in id est, polii herbæ decoctum & picis liquidæ linctus generosissimè etiam opitulantur antidota superius comprehensa, magisq; ex uiperis theriaca . non autem easdem uireis habent, si post medicamenta lethalia, assumantur, quas præsumpta . quæ enim ipsorum quantitas præsumpta ad affectum cauendum est sufficiens, hæc si quadruplò auctior, aut quintuplò post præstetur, adiuuat : idque non semel die, sed bis etiam . sic enim & Galeno illi admirando uisum est .

*Enumeratio simplicium uenenorum. Cap. XXX.*

**I**nter uenena, animalia quidè sunt uitæ noxia hæc, cantharis, buprestis, salamandra, piceæ eruca, lepus marinus, rana rubeta, & mutescens palustris rana, hirudines deuoratæ : ex seminibus, altercum, coriandrum, psillium, cicuta, melanthium : ex liquoribus, meconium, opocarpasum, thapsiæ succus, elaterium, mandragora : ex radicibus chamæleon aconitum, thapsia, ixia, uera trum, agaricum nigrum, ephemeron, quod nonnulli colchicum dicunt, quod in colchide nascatur : ex ramosis & oleribus, sinilax, quam nonnulli thymium uocant, Romani taxum, solanum furiosum, quod etiam dorycnion appellant, saidoæ herbæ, quæ species est ranunculi, papauer corniculare, pharicum, toxicum, ruta syluestris, fungi : ab animalibus autem, sanguis tauri recens, lac cui coagulum sit admixtum, mel quod ad heracliam nascitur : metallica, gypsus, cerussa, calx auripigmentum sandaracha, argenti spuma, adarce, plumbum, & quod uocatur argentum



argentum uiuum: ex iis quę domestica & in quotidiano uitę usu sunt, uinum copiosum raptim à balneo potum, aut passum aut frigida aqua similiter.

*De cantharide.*

*Cap. XXXI.*

**Q**ui cantharidē assumpserunt, eos notę grauissimę comitantur. ferē. n. à stomacho usq; ad uescicam cuncta illis morderi sentiuntur, gustum similē pici aut cedri-  
no liquori habent, dextra præcordiorum parte inflammationē expetiuntur, urinam difficulter, sæpe etiam sanguinē per eam reddunt: item per aluū ipsis excernuntur, qualia in torminibus intestinorum egeri solent, præterea animo linquntur angunturq;, & uertiginibus laborant: tandem uero mente alienantur. Succurrit ipsis uomitus ex hydrelæo petitus, & lactis potio, terrę cimolię drachmę quatuor cum mulsā, nuclei pinei, cucumeris semen. Adiuuat bene & ius pingue ex bubula factum, aut anserinum, aut ouillum: carnesq; gallinaceorum, aut agninę, aut ouillę, aut porcellorū, omnesq; flaccescentes coctura longiore, & pingues cum lini semine elixę: uinum itidem dulce, & copiosum, thuris corticis drachmę quatuor. Post cibum iniicietur per clysterem cremor oryzę aut chondri, aut tragi, aut ptisanę, aut malux, aut lini seminis, aut althę, aut fœnugræci. interim etiam mulsā cum nitro intestino absterfo, conuenit hæc rursus inserere. postea uerò inflammatione occupata medicamentis ex lini semine & ordeo lenire. per initia enim offendunt, deinde & lauacris aquę dulcis utendum est, item unguentum irinum rosaceumq; potui dabitur.

*De buprestī.*

*Cap. XXXI.*

**B**upræsti potione absorpto, in gustu niroso simile quipiam percipitur, dolor stomachi uentrisq; uehemens comitatur, eademq; partes in speciem hydropici intumescunt, extima totius corporis cutis intenditur, urināq; cohibetur. Profunt ipsis quęcunque aduersus cantharides opitulantur. priuatim autem conducunt, post euacuationes & uomitu, & clystere factas, ficus aridę, item earum decoctū ex uino. Vbi uero periculum iam de suo acumine remiserit, declinaq;, Thebaicarum palmularum cibo, aut earundem tritarum in mulso aut lactis potu, uuantur, pyrorum etiamnum omne genus esse, & lac muliebre bibere, conuenit.

De



*De Salamandra .**Cap. XXXIII.*

**Q**uibus Salamandra data est, eis lingua inflammatur, mens impeditur, tremor cum torpore quodā & resolutione urget, partes quædam corporis in orbem liuoribus uariantur, ut subinde permanente ueneno, putrefactæ defluant. Ad quæ omnia faciemus quæ in cantharidibus dicta sunt propriè autem resinam è picea, aut pinu, uel galbanū cum melle offeremus, aut nucleos pineos cum decocto chamæpityos, aut urticæ folia cū lilijs in oleo decocta, testudinis marinæ uel terrestris oua elixa, ranunculorum ius esculentum, in cocta simul ipsi eryngii radice.

*De pinorum erucis .**Cap. XXXIII.*

**P**inorum eruca pota, statim sequitur oris palatq; dolor, ualida linguæ inflammatio, stomachi, intestinorumq; cruciatus, quæ cum pruritu circumtendi sentiantur: feruor itidem toto corpore affligit, & stomachi fastidium urget. Succurri debet nō aliter quā in iis qui cantharidas biberunt priuatim aut in ipsis loco simplicis olei melinum adhibebimus.

*De marino lepore .**Cap. XXXV.*

**L**eporis marini potum, gustus sequitur piscibus urosis nō absimilis, tempore procedente aluus indolet, urina supprimitur: si quando autē eruperit, purpurei coloris cernitur. præterea qui illum assumpserunt, auersantur oderuntq; pisceis omneis: sudor foetidus erumpit, biliosusq; uomitus, nonnunquam sanguine mixtus superuenit. Adiutari autē debent hoc malo circumuenti, lacte asinino aut passo continuè exhibito, aut malux radice & foliorum decocto, aut cyclamini radice trita ex uino, aut ueratri nigri, aut scammonia liquoris drachma ex mulsâ, anserique sanguine recenti adhuc calido. item caneros fluuialeis solos, si sustinent, offerre oportet. Nota autem salutis est, quum piscem quoq; possunt comedere.

*De rana rubeta & palustri.**Cap. XXXVI.*

**R**ana rubeta, aut palustris hausta, corporis tumorem inducit, palloremq; intensum, buxo similem, ægrè spiritus trahitur, os foetet, singultus infestat, aliquando etiā semen sine uoluntate prorumpit. facile autem post uomitum reficiuntur, multa meraci uini portione assumpta, arundinis radicis drachmis duabus, aut cyperi totidem. Cæterum cogendi

PAULI ÆGIN.

z sunt



sunt obambulare celeriter & currere, ob torporem qui ex hoc malo contrahitur, adhuc quotidie lauare.

*De hirudinibus.*

*Cap. XXXVII.*

**H**irudines deuoratas, cum aqua & adhærescenteis faucibus, inde adeò dignosces, quòd uentriculi os ueluti exustione uellicatur mordeturq; atq; hæc etiã nota est hirudinis deuoratæ, nonnunquam & sanguinem floridū, hoc est uiuum excreant, hirudinibus gutturi affixis, quas muricæ sorbitio expellit, aut betæ folia cum aceto, aut niuis glebula cū posita epota. gargarizandum quoq; nitrum cum aqua, & atramentum sutorium cum aceto. At si gutturi adhæserint, in calidam aquam descendant, item lupinorum farinam assument, frigida in ore retenta eximentur quippe frigida aquæ appetentiores ad eam festinant profiliuntq;. Nonnulli cimices iis quibus sanguisuga deuorata erat, exhibuerunt ego autem (inquit Galenus) alliis in his utens, cimicibus nunquam opus habui.

*De chamæleonte.*

*Cap. XXXVIII.*

**C**hamæleonte nigro assumpto, ualida superuenit uétris erosio, dolor, cum totius corporis peruersione tremor, mox conuulsio incidit. item uomitiones pituitosæ & spumantes, quibusdam etiam singultus aduenit, uox nihil sonat, facies distorquetur. His autem conuenit cremor tritici pinguis, calidus epotus, item dulce uinum aquosum calidum, uomitus, lactis potio, mollis clyster, fomentaq; ex cataplasmatibus. ad eum uerò qui suffocationem parit liuoremq;, absinthium bibitur, aut nitrum cum oxymelite, uel radicula: fofusq; præcordiorum congruet.

*De alterco.*

*Cap. XXXIX.*

**S**altercum aliquis, aut ebibit, aut comedit, mente abalienatur ebrii modo: facilem tamen curationem recipit, multa liberalius pota, & lacte, præcipuè asinino: sin minus, caprillo, aut uaccino: siccumq; siccatum decocto, benefaciunt ipsi & nuclei pinei, & cucumeris semen cum passo assumptum, præterea uinum salium cum recenti adipe suillo & passo: urticæ semen similiter, uel nitrum cum aqua conducit: insuper cichorium, sinapi, nasturtium, raphanus, cepæ, & allia, singula cum uino, sumpta. Cæterum conuiescere cogendus qui altercum hauserit, ut id sicuti qui uinum biberunt, concoquat.

De



*De coriandro.**Cap. XL.*

**C**oriandrum latere propter odorē nō potest: potū uerò rauritatē facit & mentē mouet, consimiliter temulentis. Loquuntur itaq; qui id sumpserunt turpia, totius corporis ipsorū odor coriandi sī indicat. Aduuantur, ubi id oleo aut irino unguēto, ut suprà monstratū est, eduxerint, uinō meraciorē cū absinthio, & p se potō: ouisq; uacuat in sese detritis, cū muria sorptis: ad hęc muria ipsa bibitur, & ius salsum & gallinaceū & anserinū: postremo passum cum lixiuia sumitur.

*De psyllio.**Cap. XLI.*

**P**syllij potu totum corpus refrigescit torpetq; cum resolutione & tristitia, ut animum despondeant. Præsidio sunt omnia quæ contra coriandri potum commendantur.

*De cicuta.**Cap. XLII.*

**C**icutam potam caligo uertiginesq; insequuntur, ut nec minimum uidere liceat. item singultus, mentis alienatio & artuum perfrictio comitatur: ultimoque conuulsi qui eam sumpserunt, præfocantur, cessante à motu omni in arteriis spiritu. Per initia igitur, quemadmodū & in alijs, uomitu eam eliciemus. deinde hac euacuatione usi, quod in intestina delapsum est, excernemus: ac tunc, ad uini meraci potionem ueluti præsentissimum remedium transibimus, per interualla eam exhibentes in quibus interuallis lac uaccinum, aut asinum, aut absinthiū cum pipere & uino, item castoriū, rutamq; & mentam cum uino exhibebimus, præterea cardamomi, aut styracis drachmā, aut piper cum urticæ semine ex uino, aut tenera lauri folia: similiterque laserpitiū, aut eius liquorem cum oleo & passo. Item passum per se potum, præclarē opitulatur.

*De papaueris liquore.**Cap. XLIII.*

**P**apaueris liquorē, e potum, subsequitur ueternus cum perfrictione & pruritu adeò uehemēti, ut subinde ueneno in crudescēte tanta oboriatur prurigo, ut qui id biberunt, ab ea excitentur, adhæc totò corpore ueneni odor sentitur. Saluti est post uomitiones oleo factas, acri uti clystere. item oxymel cum sale potum proficit: aut cum calido rosaceo, mel: præterea merum copiosius, cum absinthio & cinnamomo: necnon

z z acetum



acetum calidum per se: insuper nitrū cum aqua: origanum cum lixiuio, rutæ semen cum pipere, ipsumq; piper cum castorio & oxymelite, uel satireiæ, aut organi decocto, uino addito. Cæterum excitare ægros oportet iis quæ naribus admoventur, & in aquam calidam deducere, fomentisq; propter accedentem pruritum adiuuare: à lauacro, pingui iure, cum uino aut passo, uti. Iam medulla cum oleo pota ipsis opitulatur.

*De carpesiæ liquore.*

*Cap. XLIIII.*

**C**Arpesiæ liquor potus, soporem & strangulatum præcipitem inducit. Eodem remedio, quo & cicutæ, auxiliamur.

*De mandragora.*

*Cap. XLV.*

**A**Ccidit mandragoræ potu quàm primū sopor, uiriū resolutio ualidus ueternus, ut nihil à morbo qui lethargus dicitur differat. quibus antequàm horum aliquod eueniat, uomitus cōducit: post hunc, aqua mulsa, nitrum, & absinthiū cum passo, aut uino dulciore sumpta, caput rosaceo foueri & aceto debet, corpus excitari, cōmoueriq;: adhibenda itidem quæ odoratu excitant, piper, sinapi, castoriū, ruta cū aceto trita, pix liquida, lucernarū funiculi cōbusti extinctiq;. Quod si ægrè excitentur, etiā quæ sternutamenta mouent, adducenda, alijsq; communibus remedijs in his quoq; utendum est.

*De aconito.*

*Cap. XLVI.*

**A**Conitum statim quum potum est, in lingua cum astrictione quadam dulcescit: inde uertigines, præsertim in exurgendo, & oculorū humiditates inducit, thoracis, grauitatē & præcordiorū, ita ut multi flatus erumpant. In quo uitio uomitu uenenum educi debet, & aluus clystere subduci. Portiones contra aconitū hæc proficiunt, origani, rutæ aut marubij cum uino, aut absinthii, aut erucæ, aut abrotani, aut chamæleæ, aut chamæpityos Prodest ipsis & opobalsami drachma cum uino item coagulū hœdi, aut leporis aut hinuli cū aceto, adhæc ferri recrementū aut uinum in quo ipsum ferrum, aut aurum, aut argentū sit restinctum. insuper lixiuiū cum uino, & gallinacei elixa cernium uel pinguiū ius cum uino assumptum. Cæterum chamæpitys quæ peculi ariter aduersus aconitū conducit, in Heraclia Ponti, ubi & aconitum nascitur, holocleros appellatur, Athenis, didionia: in Eubœa, sideritis.

De



*Deixia.**Cap. XLVII.*

**I**Xia quæ & ulophonos dicitur, odorem habet & gustū quū sumitur ocimi, linguæ inflātionē ualidā inducit, mētem abalienat, atque omneis naturaleis excretiones suppressit, strepitus tumultusq; alui elidit cum animæ defectu, nec quicquam tamē eiicitur. Adiuuātur læsi ab ea, postquā uomitio- nibus fuerit educta maior ueneni portio, aut aluus soluta, ab- sinthij diluto cum uino pleniore aut aceto aut oxymelite po- to: item ruta syluestris semine, uel laserpitij radice, similiter tragorigani decocto cum prædictorū aliquo, aut lacte, aut resi- na terebinthina, aut nardo, aut castorio, aut Laserpitio, singu- lis oboli pondere. Profunt cum uino etiā nucis iuglādis nuclei læuigati, resina, castorio, & ruta additis, singulis drachmæ pon- dere. Proficiunt itidem chamæleæ drachmæ duæ, aut thapsiæ succi totidē cum aqua mulsa. utiliter & acetū calidum bibitur.

*De ephemero.**Cap. XLVIII.*

**E**phemeron, quod nōnulli Colchicon eo q̄ in Colchi- de nascatur, uocant, aut bulbum agrestem, epotū protū nus, totū corpus prurire facit, uelut urtica & scilla ta- ctum irritatumq;: interiora erodit, stomachū urit cum ponde- rosa gravitate. Inualecente aut malo, cruenta strigmentis mi- sta per aluum egeruntur. Succurrendum, ut salamandræ, uomi- tionibus & clysterijs: sed antequā uireis sibi asciscat uenenū, dari debet foliorum quercus, aut glandium, aut malicorij, aut serpilli decoctū cum lacte bibendum: aut polygonii succus. aut furculorum uitis, aut rubi, aut tenerarū ferularum medulla, aut myrtorum cum uino item ipsorum myrtorū in læuorem detritorum, maceratorumq; in aqua, dilutū potum auxiliatur: benefacit itidem castanearum interior tunicula, si cum aliquo ē succis quos prædiximus, assumiatur: origanum quoque cum lixiua potum, in idem efficax est. Adeo uerò exactum præsi- dium est lac uaccinum calidum potum, & simul in ore conten- tum, ut hoc præsentē nullum aliud desideretur.

*Desmlace.**Cap. XLIX.*

**S**milax, quæ à quibusdam thymion, à Romanis taxus no- minatur, pota perfrictionem totius corporis & strangu- latum, mortemq; maximè præcipitē inducit: quibus om- nia auxiliantur, quæ & cicuta epotæ.



*De solano furioso, quod dorycnion à nonnullis  
dicitur. Cap. L.*

**D**orycnium potum, quod aliqui solanū furiosum appel-  
lant, gustum quidem ceu lactis repræsentat, singultus  
crebros facit, linguæ humiditatem, & cumulatam san-  
guinis educationem: per aluum mucosa feruntur simillima tor-  
minosis. Auxilio sunt, antequam horum aliquod fuerit secu-  
tum, quæ in ephemero dicta sunt, uomitus dico & clyster, &  
quæcunq; potum uenenum possunt excernere. Propriè autem  
ipsi succurrit aqua mulsa aut lac asininum caprillumie, & dul-  
ce uinum tepidum cum anisi modico potum: item amygda-  
læ, & elixa gallinarum pectora, idem præstant conchyliis cru-  
da pariter & tosta, in cibo, adhæc locustæ marinæ & gammari,  
& ius ex ipsis esculentum potui assumptum.

*De sardonio. Cap. LI.*

**Q**uæ sardonio herba nuncupatur, ranūculi species est,  
pota autem uel comesta mentem abalienat, conuul-  
siones adfert cum labororū contractione, ut risus ima-  
ginem præbeat, à quo affectu etiam risus sardonius non lauda-  
bili dicitur inter homines iactatur. Cui uitio priuatim post  
uomitionem conducit aqua mulsa liberalius exhibita, lactisq;  
potio. itē corporis totius respersio inunctioq;, ex medicamen-  
tis quæ calefaciunt perita uincit item in hydrelæum calidum  
descendere, deinde corpus inungere & ualenter infricare. sum-  
matim, ut in conuulsione tota curatio administranda est.

*De papauere corniculato. Cap. LII.*

**P**apauer quod corniculatum appellatur, esum potumve  
eadem quæ papaueris liquor inducens pericula, iisdem  
quoq; curatur remediis.

*De pharico. Cap. LIII.*

**P**haricum dictū toto gustu nardium syluestrem repræsen-  
tat: potum uerò resolutionē cum furore & conuulsione  
excitat. Aduersus quod, ubi uomitu fuerit eductum, absin-  
thium cū uino propinatur: item cinamomū, aut myrrha, aut  
nardū Cilicium, quod nonnulli isatin uocauerunt, aut spicæ nar-  
di drachmæ duæ, myrrhæ oboli duo cū passo misti: aut iris cro-  
ciq; flos ex uino Caput ipsorum derasum farina ordeacea cū  
tuta trita, & aceto cataplasmatibus modo obducere conuenit.

De



*De toxico.**Cap. LIIII.*

**T**Oxicum inde nomen uidetur accepisse, q̄ barbari sagittas, quas toxumata uocant, eo illinant. ubi potum est sequitur labrorum & linguæ inflammatio, mētis furor, qui coerceri non possit, uariis obnoxius imaginibus. eoq̄; difficilem curationem recipit: rarò etiam nonnulli qui id biberunt uitæ restituuntur. Oportet igitur continere ipsos uinculis & cogere, & ui adigere, ut uinū dulce cum rosaceo bibant, reddantque per uomitum. Item raptum semen cū uino potum peculiariter ipsis confert, & quinq; folij radix, hircinus caprillusue sanguis potui datus ad hæc, quercus cortex aut fagi, aut ilicis cum lacte læuigatus potusq̄; proficit. Idem faciunt mala cotonea manducata, uel trita cum pulegio, ex aqua pota: prætera amomum, & balsami cum uino semē. Qui uero mali huius periculum euaserint, diu in lecto decumbunt, & quum surrexerint, attoniti ac stupentes reliquum uitæ tempus transigunt.

*De fungis.**Cap. LV.*

**F**Vngorum alij genere, alij copia offendunt, integri sumpti strangulatus laqueis simileis inducunt. his statim cōmuni præsidio resistendum est, & qui eos hauserūt, oleo ad uomitum cogendi. Mirificè his proficit lixiuium ex famentis, aut ex pirastri surculorum cinere cum posca, sale uel nitro, potum: item pira ipsa syluestria aut folia simul incocta, uini strangulandi quæ fungis inest, tollunt, eademq̄; in cibo conferunt. ad hæc oua gallinarū elixa & in posca pota, aristolochiæ drachma aut absinthij, cū uino, insuper mel delinctū potumq̄; cum aqua Prodest apiastrum cū nitro, panacis radix & semē cū uino, floces uini cōbustæ, cum aqua, aut atramentum sutorium cum aceto, raphanus itidem aut sinapi, aut nasturtium in cibo sumptum. Quoniam uero nonnulli fungi à uenenatis corrosi non modò strangulant, sed etiam intestina exulcerant, dari debet absinthium copiosum & ficuum decoctū, organi q̄; ad hæc ex aqua malsa, uomitus confert, in calidam descendere, & crudam farinam ordeaceam præcordiis admouere.

*De sanguine taurino.**Cap. LVI.*

**S**anguis tauri recens occisi potus, spiritus difficultatem & strangulatum procreat, dum tōsillarum & gutturis meatus cum ualida conuulsione obstruit. Iam lingua ijs qui



sanguinem hauserunt rubens inuenitur, dentes tincti, & uestigia cruoris concreti inter ipsorum commissuras. In hoc malo uomitus uitari debet, grumi enim attractu ad sublime relati, magis gulæ inculcantur. Exhibentur ergo quæ sanguinem coeuntem soluere, & aluum subducere possunt, ut grossi liquore suo pleni cum posca & nitro huc facit etiam omne coagulum cum aceto, & laserpitij radix cum suo liquore. similiter etiam brassicæ semen, lixiuiumq; ex cinere ficulneo: item cunilæ folia cum pipere, rubiq; succus cum aceto. Iam uerò alius rectè subducetur. Solent iis qui seruantur inferius recrementa foedi odoris egeri: stomachus & uenter ordeacea farina cum aqua mulsa obduci debent.

*De lacte intus congelato. Cap. LVII.*

**L**Ac potum quod subito ac confarctum sit intus congelatum, multam strangulationem parit, eo q̄ in grumos coit gelaturque. Auxiliatur huic malo, antidoti modo, coagulum, si cum aceto frequenter bibere compellas eū qui lac hausit. item conferunt æpitæ folia arida, aut succus ipsius similiter, aut laserpitij radix liquorue cum posca: idem præstat thymus cum uino, & è cinere lixiuia. salsum uerò nihil offerri debet, nam hinc lac magis coit ac in caseum transit. nec uomitus in hoc malo conducit, nam in grumos concretum, dum ad stomachum assurgit, strangulat.

*De melle quod in Heraclia nascitur. Cap. LVIII.*

**M**Ei quod in Heraclia Pōti prouenit, aut esum, aut bibitū, eadē pericula q̄ aconitū, infert. quare & eadē utriq; cōueniunt remedia. Facillimè aut curatur qui id hauserunt, cōtinuo hydromelitis potu, cui rutæ folia sint admista.

*De gypso. Cap. LIX.*

**G**Ypsum potum strangulatum parit, in lapidem coalescens: unde trāsferre oportet huc præsidia quæ aduersus fungos cōueniunt. datur et in hoc malo maluæ decoctum loco olei. pingue siquidem quum sit, & lubricas uomitiones procreet, corpora deradi non finit: quod lapidescens gypsus facit. Porro cōducit & oleum in mulsa, & ficuum decoctum, lixiuiaq; è ficulneo, aut è sarmentorū cinere facta cū uino copiosiore, item origanum, aut thymus cum lixiuia acetoue. Clyster ex passo & maluæ decocto in anum dabitur:

De



*De cerussa.**Cap. LX.*

**C**erussa propter colorem facile deprehenditur, quoniā sponte sumpta palatū & linguam, dentiumq; commissuras albefacit. præterea singultū, tussim, linguæ siccitatem, extremorū perfrictionem, cū menthis ab alienatione, & difficili corporis motu, inducit. His prodest aquā mulsam, aut ficuum, aut maluæ decoctū propinare. itē lac calidū, uel sesamum cum uino tritum, aut lixiuium ē uitium sarmentis: aut oleum amaricinum, siue irinū, uel persicorum ossa cum ordeī decocto: uel lachryma thuris, uel prunorum gummi, aut ulmī humor qui in folliculis ipsius seruatur, cum aqua tepida. Iam uomitus continuē cietur. Proficiet etiam succus thapsiæ, uel liquoris scammoniae terni oboli cum aqua mulsā poti.

*De calce, sandaracha, & auripigmento.**Cap.**LXI.*

**C**Alx, sandaracha & auripigmentum pota, uentris & intestinorum torsiones cum uehementi rosione faciunt. quare omnia quæ temperare & soluere ea possint, adhiberi debent, item quæ uomitiones facileis & aluum lubricam efficiant, qualis est hibisci & maluæ succus, decoctumq; lini seminis, aut tragi, aut oryza: lac præterea copiosum, aqua mulsā, iura pingua, boniq; succi.

*De argenti spuma.**Cap. LXII.*

**S**puma argēti pota, quā Græci lythargyron dicūt, grauitatē stomachi, uētris, & intestinorū, cū torsionibus ualidis infert: nōnunquā & intestina pōdere uulnerat disrūpitq; urinā impedit: corpus eorū qui eā biberūt, intumescit, & coloris plūbei sūt, & deformitatē acquirūt. Adiuuātur, secūdū uomitiones, agrestis hominis semine cū uino: myrrhæ drachmis octo, absinthii, hyssopi aut apii semine: aut pipere, aut ligustri flore cum uino: palumbium fimo orido cum nardo & uino.

*De plumbo.**Cap. LXIII.*

**P**lumbi scobs aut lotur: pota, similia inuehit argenti spumæ pericula: eademq; requirit præsidia.

*De argento uiuo.**Cap. LXIIII.*

**E**T argenrum uiuum potum, eadem quæ spuma argēti infert, atq; eisdem remediis qui id assumpserunt, adiuuantur.



uantur adhæc prodessē ipsis uidetur lac copiosè datum. ceterum & hi uomitionibus sollicitabuntur.

*De ueratro albo, thapsia, elaterio, agarico nigro, ruta syluestri, nigella, & pappis. Cap. LXV.*


**H**A benda cura est & eorum quæ iuuandi gratia exhibentur, sæpe uero non minora aliis pericula adferunt. cuiusmodi sunt superius commemorata, nempe ueratrū album, thapsia, elaterium, agaricum nigrum, hæc enim strangulatus excitant, aut magis quàm opus est, purgant: in quibus strangulationes, ut in fungis & similibus comprehensum est, curabuntur: nimias purgationes, iis quæ excretiones cohibent, sistimus. Iam uero quæ paululum nocere uidentur, interim tamen pericula inferunt, negligi non debent: cuius generis est syluestris ruta, melanthium, recentes pappi, flores autem sunt spinæ quæ cactos dicitur, in quibus solus uomitus adhibitus laborantes sanitati restituit.

*De familiaribus ac domesticis, nempe uino & aqua frigida. Cap. LXVI.*

**A**qua frigida subito ac cumulatim pota, uinumq; meracius copiosum, dulce, præsertim à balneo, aut cursu, ualidisq; exercitiis strangulatus & dolores concitat. in quibus sanguinis dimissio protinus adhibita & inanitio, imminēs periculum dissoluit.

FINIS LIBRI QVINTI IOANNE

GVINTERIO ANDERNACO MEDICO INTERPRETE.








PAULI AEGINETAE

I IBER SEXTVS,

IOANNE GVINTERIO

*Andernaco Medico Interprete.*



Proemium Chirurgicae. Cap. I.



VONIAM chirurgica in parres duas diducta est, ut una sit quæ carnis uitia tractet, altera quæ ossium, tam in rupturis quàm luxationibus comprehendat, ab ea quæ carni seruit in præsentia exordiemur, consueto & hic usi cōpendio. Rursus igitur à superioribus auspicantes quomodo caput, præsertimq; eius uertex utat, exponemus.

*Quomodo caput aduratur in lippientibus, egre spirantibus, & elephanticis.* Cap. II.

CVM humor oculis influit supernè, cumq; difficilis urget spiratio, quæ humiditatis excrementitiæ copia è capite inferius in thoracè trāsmisla, & particulas indidem cōtinuo suo cursu offendēte cōtrahit, caput per mediū hoc modo urunt. Vertex ad cutē prius tondetur cutis adusq; os ferrentis candētibz, nuclei modo rotundis aduritur. quod, ubi crusta deciderit, raditur. Nōnulli uero ubi id ipsum os addussērint, faciūt ut squama inde recedat exigua, quò facilè humores illinc perspiratu dissipētur euacuēturq; seruato diu ulcere, deinde sic ipsum ad cicatricē perducūt. At in elephantiasi curāda, quinq; nōnulli crustas in capite excitant, unam in priori parte  
supra



supra sinciput, alterā hac inferiorem, paulo superius quā frōs habetur, ubi ferē pili desinunt: ac aliā in occipitio, quod Græci opisthocranion uocant, reliquas duas iuxta ossa à squamis dicta lepidoidē quæ superius aures conglutinant: unam ex his, parte dextra, alteram sinistra: atq; ita pruribus squammis detractis, & copiam, & crassitiem humorum euaporatu ex alto capitis deriuantes, lumina offendi prohibent. Iam heni quoq; aliud ferramentum adigunt, ut primo melancholici recremēti opifici per crustam in cute excitatam medeantur,

*Cum humor capitis cutem inflat, eoq; intumescit & prementi digito cedit hydrocephalon dicitur. C. III.*

**S**I humor natura aqueus capitis cutē subit, uirū propriē hydrocephalon appellatur: accidit aut pueris quāmpri-  
mū in lucē æduntur, capite ab obstetricibus parū dextrē pressō, aut ex causā latente, aut ex uasis unius, plurimūe ruptura & sanguine, qui emanat in ociosā inutilemq; mutato substantiā, aut materia ob meatuū raritatē resudante, ac inter cutē & mēbranā quæ caluariā integit, pericranion Græci uocant, erūpente: uel. n. inter hanc, & cutem humor consistit, uel inter pericranion & os, uel inter os & cerebri mēbranas. Cui itaq; cuti & mēbranæ caluariā integenti, humor interiacet, tumor sequitur, tactu mollis, concolor, indolens, turgidus, puluino sublimi, & paucis particulis subiectus: digitis prementibus faciliē cedit, & rursus astringit. Quibus pericranion & os intercedit humor, reliqua sanē respondent, sed tumor durior multō est & lentē cedit, ut qui ēt pluribus corporibus subit, dolorq; magis urget. Si inter cerebri mēbranam & os humor se receperit, tumor quidē erit, sed qui prementi nō cedat, neq; tactu sit mollis, tamē uiolēter pressus cedat, siquidē os infantū recens adhuc cōpactū faciliē cedit, præsertim cū futuris rarefactis humori trāsitus foras pateat: cognoscitur ex facili inde qd humor cū illū cōstringere uolumus, ex aduerso repressus in altum effugiat. Dolor his acrior obuenit, caput totū in diuersa agitur, frōs ipsis foras producta est, oculis cernūt incōniuentibus, & crebrius illachrymant. His igitur ceu desperatæ salutis nō est manus adhibēda, & si maximē nonnulli chirurgicorum cerebra perforatum os exemerint, ut in capitis fracturis dicitur. At si intra cutem & mēbranulam quæ sub cute caluariam cingit,



cingit, humor sit collectus, tumore quidem exiguo subflante, una linea per medium transuersa caput incidendum: si membranulæ caluariam inuolenti & ossi colluies interueniat magisq; caput inturgescat, duabus utemur lineis per medium se mutuo secantibus: si magis adhuc sit turgidum etiam, tribus, ad similitudinem H literæ. Vbi manu humorem exemeris, inser-tis linamentis commodè partem deligabimus, & usque ad tertium diem œnelæo perfundemus, inde solutam medicamento in linteolum illito persanabimus. Quod si longiore spatio os carnem non recipiat, leuiter ipsum rademus.

*Quomodo arteriæ diuidantur, arteriotomia dicitur.*

*Cap. IIII.*

**I**N longis oculorū defluxionibus, tum uertiginoso affectu, arterias post aures incidere consueuimus. Radenda igitur posterior capitis pars, & digitis notanda est. Nam arteriæ si tus ex loci pulsū facilè deprehenditur. deinde ipsam linea scriptorio prius atramento ducta, duos digitos longa, usq; ad os di uidere oportet. Quod si in conspectum ita non uenit, incidendum circiter triū digitorū interuallum, atq; tunc manus iniicienda, sic ut arteriæ transuersim dissecantur, quousq; & pulsatilis sanguinis fluor apparuerit, & instrumentū os propius accedat. Vbi sat fluxerit sanguinis membranula, quæ caluariā sub cute ambit, diuisa, ne extensione inflammationem contrahat, rosaq; osse penicillum ex panniculo uulneribus debet insinuari, & medicamento quod linteolis illinitur adhiberi, quod si remaneat etiam hoc os lene, similiter id scalpello rademus.

*Quomodo uasa diuidantur, quæ angiologia dicitur, eorumque aduſtio sit administranda.*

*Cap. V.*

**I**N hemicranicis, & in iis, quorū oculos aut longus, aut etiā acutus dolor ex calida, acriq; fluxione infestat adeò ut in temporum quoq; musculis calor, laxisque tumor, œdema uocant Græci, excitetur, omnes medici uasorum diuisionem probarunt. Derasis igitur primum in temporibus pilis, digitis uasa notabimus, sic ut fomenta præcesserint, aut etiam ceruix ligata sit: ubi iam uasa oculis sese obiecerint, atramento notabuntur, & cutis ex lateribus, tum sinistrae manus nostræ digitis tum ministri lenabitur, ipsumq; uas superficiali linea incidemus, deinde ubi totum penetrauerimus hamulis eleuatum & a membranis



membranis uicinis instrumento quo ille detrahuntur, denudatum, suspendemus undiquaq; liberum, et si tenue uas fuerit, per hamulū cæcum, elato ei circumductoq; membranā detrahemus ita ut partem quoq; ipsius apprehendamus. At si magnum est, duplex acu funiculus subiicietur, aut linum crudum, aut aliud quoddam ualidum, ac quamprimum uas in rectum scalpello diuisum, sanguinis quantum satis est fuderit, in utroq; extremo quod denudatum est, lino ligabimus, quod intercedit excisum, aut protinus, aut cum soluetur auferre conuenit. Nonnulli etiam candentibus ferramentis citra sectionem uasa adurunt plagis satis altis. ubi iam ferro negotium absolutum est linamentis carptis siccis uulnere oppleto, splenium quoq; superac commodatum deligabimus. postquam solutum fuerit, medicamenta carni generandæ accommodata, tum arida, tum quæ linteolis conceptis illinuntur, nec non cicatrici inducendæ apta, ad curationem absoluendam inducemus, nimirum ubi uincula deligaturæ computruerint exciderintque.

*Quomodo frons incidatur, hypospathismum uocant.*

*Cap. VI.*

**I**Nstrumēti species nomen administrationi dedit: utimur autē hypospathismo, in quibus fluor multus, & calidus in oculos defertur, faciesq; rubescit, & in fronte sensus quidā & discursus ueluti uermium, aut formicarū oboritur. Derasis itaq; in fronte pilis iubebimus, ut inferior gena moueatur, cauētesque musculorū ad tēpora motionē, tres lineas rectas pari spatio distantes in fronte incidemus, latas quidem singulas duos digitos, altas adusq; os, trium digitorum interuallo inuicē discretas. secundum sectionem tenuem, spatham subiicientes à linea quæ in sinistro tempore ad mediam tendit incipiemus, totum quod interiacet excoriantes cum membrana quæ caluariam incingit, deinde rursus spatulā à media ad reliquam demitemus. Deinde scalpri quod scolopomachærion dicitur, aciem in primam conijcientes lineam, ut acutum ipsius latus carni quæ ab interna parte cuti cohæret accommodetur, retusum uero, ossi, propellemus ipsum adusq; mediam lineam, omnia à capite ad oculos descendentiā uasa præcidentes, non autem usq; ad cutis superficiem: rursus à media ad postremam ipsum deducemus, similiter uasa amputantes. Vbi mediocriter  
sanguis



sanguis effluxerit, extusis grumis, tria linamenta tortilia singulis incisuris inferemus, panniculumq; implicitum aqua madentem superiniectum deligabimus. Postridie œnelæo non solum ulceribus respersis, sed etiam temporum musculis, auribusque propter inflammationem, tertio die cum solueris, superfusione diu utendum, & basilico rosaceo soluto, linamentis insertis curationem quæ restat, absoluemus.

*Quid agendum in sincipite secando, Periscyphium appellant Græci. Cap. VII.*

**I**N quibus multa, & in alto uasa fluore copiosum oculis transmittunt, tribus lineis transversus coronæ modo sinciput secatur, quæ ratio periscyphismus Græcè uocatur. Hoc morbo laborantium comites notæ sunt tales. Primum oculi alimētum nō sentiūt, exigui, & ad uisum impotētes, sunt anguli erosi, palpebræ exulceratæ, & pili ipsorū deflui, lachrymæ tenues admodū & acres cū calore deferuntur. Dolor in alto capitis acutus & uehementis urget, sternutamentū cōtinuū. Itaq; de rasō capite, transversam lineā sine musculorū in tēporibus, motus offensa, ut dictū est incidemus, quæ à sinisteriore temporum parte incipiens in alteram desinat, habeatq; terminos, ubi motus nullus est, paulo superius q̃ frons habetur, ducta: sic ut sutura capiti pueriticæ tendēs ad aures, Græcis dicitur τεφανια, uitetur. Leonides per mediā frontē lineam deducit. Cæterū ossē detecto, penicillis, aut linamētis pluribus inuicē separabimus, extrema diuisionis deligabimus, & uino oleoq; mixtis ut prius dictū est, aspergemus. A solutione cū inflāmatio iā declinauerit, os radeatur, quoad caro suppullare incipiat, rationemq; carnis producendæ accommodabimus medicamentis aridis in id efficacibus utentes, quale est, quod recipit farinæ triticeæ partes duas, colophonix resinæ partē unā. Item quale est Cephalicum appellatum. Item quod ex pumice ad carnem creandum cōficitur. Nam cutis crassiuscula cicatrice densata, & occlusa uasorum ora per initia pituitæ impetum in oculos deferri prohibent.

*De superioris palpebræ sutura, alijsque modis.*

*Cap. VIII*

**G**Ræci appellant δισχιλασιν, cum naturali pilorum palpebræ ordini, alij præter naturam pili succrescunt: Quod uitium ex fluida affectione contrahitur quando humor qui



quin influit, copiosus quidē, sed rosionis & acrimoniæ expertus fuerit. Nam acrior, aut falsus magis, aut alio quodam modo rodens, spatio temporis etiam naturales palpebræ pilos corrumpit. Interim igitur in hac affectione, futura utimur: interim in phalangosi cum cilium introspectat pilorum acie simul cum eo inuersa, interdum etiam in palpebris relaxatis, quando naturales pili bulbum compūgunt. Aeger itaque in sedili collocabitur, uel aduersus, uel à sinistra, superiorque palpebra inuertetur: siquidem longos habeat pilos, illos ipsos indice & magno sinistrae manus digito apprehendemus: sin admodum breueis, acus filum ducens per medium cilium in exteriorem partem transmittetur, deinde per filum sinistra manu sublata palpebra, dextra, cuspide specilli post filum in rugas plicasque coacta inuertetur, & subtus linea interius quàm pili pungentes habeantur per cilium ducetur, à maiori angulo usque ad minorem pertinens. filo autem post interiorem sectionis lineam subiecto, pollice manus sinistrae exiguum quoddam linamentum implicitum obijcientes, supercilium attollemus, aliaque parua linamenta implicita summis angulis imponentes famulo posterius stanti iubebimus, ut palpebras per ea attollat, atque tunc lineam uero modo rectam, obeliam Græci uocant, primum scalbello futuris aptato incidemus paulo superius quàm naturales pili existant, ab angulo ad angulum tendentem, altam ut sola possit cutis diuidi: post eam, lunatam adhibebimus, incipientes quidem unde & uero similis linea inceperit, in tantam uero sublimitatem tendentes, ut totam cutem quæ superflua est circumscribamus, desinentesque similiter ubi & illa iam commemorata linea. Postea cum cutis duabus lineis circumscripta myrti similitudinem representet, angulo qui ad dextram nostram spectet hamulo transfixo totam hanc cuticulam excoriabimus, deinde uibicibus spongiater quaterve ablutis, oras uulneris contrahemus, à media cuspiantes, acumen uero per ipsam interiorem sectionem transmittentes: porro filum ex lana esto. Cæterum quod eius superfluum est ambutabimus, non prope suturas, sed ut circiter trium digitorum longitudo otiosa pendeat, eamque per frontem exporetam, cum emplastro quodam conglutinate applicabimus, palpebræ autem pullos à futuris, cuspide acus liberabimus. Hic igitur agendi modus & communis & securus est. Nonnulli exco-  
nationem



riationem fugiunt, eoq; post ductum subtus lineam, uolSELLA palpebris continendis accommoda, hoc est, ad palpebræ ambitum apprehendendum figurata, id quod superest cutis, eleuatū, scalpro amputant, ac suturas, ut comprehensum est, adiiciunt. At si in parte aliqua solū palpebræ ex pilis oriatur punctura, illi etiam soli manum adhibere conuenit, deinde linamenta implicata posca madida imponemus, deligabimusque imbuentes ipsam partē posca aquosa usq; ad tertium diem, quo ligaturam soluemus, ac superflua fili parte abscissa oblinemus palpebras, uel croco, uel glaucio, uel aliquo collyrie, quod inflammationem arceat, ut, croceno diarodon. At si inflammationem suturæ patiantur, etiā emplastrum aliquod lene ipsis superaccommodabimus, & ueluti lacte infuso oculum leniemus, laxiores autem redditas suturas amputando abstrahemus. Notus mihi quidam est qui palpebra, ut dictū est, excoriata futuris non uteretur, sed medicamento cicatricem inducente curationem absolueret. Nam uulnere ad cicatricē ueniente, palpebram ex parte attollens pilos extra inclinare coegit. Quemadmodū igitur alius quispiam ne exoriens quidem palpebrā neque externis duabus utens diuisionibus, sed ininteriore solum adhibita, palpebræ rugas digitis uel hamo attollebat, item duabus arundinulis aut lamellis quibusdam palpebræ longitudinem æquantibus, latitudinem angusti scalpelli, quod uenis secandis adhibetur, superfluum rotam cutē mediam prehensam cōstringebat, utriusq; ipsius terminos deuinciens. Atq; hac ratione, tota posterior cutis alimentum non sentiens, eoq; emoriēs, intra decimum aut plurimum quintumdecimum diem cum arundinulis aut lamellis excidebat, ita ut nulla ferē cicatrix appareret.

*Quomodo palpebræ medicamento urantur. Cap. IX.*

**V**isionem palpebrarum ex urente medicamento factam, omnes, ut uno uerbo dicam, ueteres damnauerūt, tum propter medicamenti acrimoniam oculis insidiantem, tum quod ex immodica uestione affectus nascitur, quem Græci lagophthalmum appellant, in quo hiantibus palpebris qualicunq; de causa lumen offenditur. Quoniam uerō multi a pilis semper punctiōnem experiunt, ne uocabulum quidem suturæ frequenter audire sustinentes detinent plerunq; nos etiā inuitos, tanquā aliis destituti præsidij uestionem per medica-

PAULI AEGIN.

A

mentum



mentum adhibemus. Compositio uerò medicamenti hæc recipit, calcis uiuæ partes duas, saponis gallici uel cõis, toridè. Quidam èt aphronitri partes quatuor læuigatas lixiuio, aut saponario, aut alio, è ficu, aut quercu, aut urina pueri impubis excipientes mucrone scalpelli palpebræ iniiciemus, tm̃ in myrtacei folij figurā, adurentes quantū etiam in descriptione cõprehenderimus ubi iam primo medicamenti impositu cutis fuerit adusta, eo spongia ablato rursus aliud iniiciemus, tam diu id cuti inhærere sinentes quousq; nigrescat. Sin id non affecuti fuerimus, etiā tertio inducetur. Postquā uerò cutis nigruerit, & reliquū iam crusta oborta medicamentum ablueris, & balneis & superfusionibus, quousq; crusta deciderit, utemur. Inde rasilibus linamentis & penicillis teneris, cicatricem moliemur.

*Si oculus cute non obtegatur, lagophthalmum dicitur.* Cap. X.

**L**agophthalmon uocant cum superior palpebra sursum retracta est. Accidit aut hoc uitij, aut naturaliter, aut ex cicatrice uulneris, eiusq; uel sua spõte facti, uel ex sutura, uel uisione, ut nuper dicebamus, parū dextrè administrata: in qua etiā solum mediocris emendatio fieri potest si palpebra crassitiē amplā habeat. cõuenit n̄ ipsa cicatrice diuisa, & oris per linamentū diductis, etiā deligatura prius usq; ad absolutam curationē uti, ita ut non nimiū sicca, sed relaxantia magis unguina adhibeantur: quale est fœnugræci succus superfusus & basilicum tetrapharmacū quod linteolis illinatur resolutum.

*De inferioris palpebræ sutura & uisione per medicamenta.* Cap. XI.

**Q**uot pilorum affectibus superior palpebra opportuna est, tot etiā inferior. Etenim ultra naturæ suæ modum excrescēs, inuertitur, & phalangosim, & distichiā sustinet. Eodē igitur modo quo in superioris palpebræ sutura, utendum est, ordine inuerso: primū lunata incidi linea debet, ne sanguinis fluor opus impediat, deinde recta. Subtus uitanda est sectio, quoniam palpebra inferiore pondere suo genuino prout inuertitur. Cæterum reliqua curatio in superioris palpebræ sutura tractata, hic quoque conueniet, præter quā quod filorum excessus fronti sint agglutinandi. At si in hac etiam affectione manum extrimescens, uisionem potius è medicamento



mento deligas, hanc quoque iam traditam habes.

*De ectropio.*

*Cap. XII.*

**Q**Uemadmodum superiori palpebræ uitiū uocatū lagophthalmos, ita inferiori ectropion oboritur: uerum id intercedit discriminis, quod hoc non est natura prouenit, sed nonnunquā ex relaxatione, quam medicamenta in id efficacia, inflammatione præcedente cōcitarint: nonnunquā ex sutura, aut inartificiosa uisione palpebra inuertitur. Acu igitur duolina trahente carunculā transuemus, à sinistro angulo ad dextrū deducta. Deinde lino utrisque ipsius extremis admoto, carunculā per acum attollemus, atque ita ipsam scalpello excindemus, auferentes simul cum ea & acum. Atque si figurā palpebra receperit, & æqualiter sit conuersa, satis manu profectū est. Sin autem postea quā caro fuerit ablata, adhuc inuertatur, auersum scalpellū quā partē Græci cyathiscū nomināt, iuxta cuspidem palpebræ sectæ subiiciemus, ac in externa illius parte duas incisas lineas, à duobus factæ sectionis angulis, auspicantes, in acutiē quandā ducemus, easque in unū cogentes, partikulā Græcorū literæ Λ similem amputabimus, ut eius acuta pars infra spectet oculum, latitudo suprā, cilium appellatum respiciat. Secundum hoc diductas oras acu ex lana filum ducente commitemus, duabus suturis contenti. Quod si uerō suturæ, aut uisioni fertur acceptū ectropion, etiam sub inferioribus palpebræ pilis per ipsam primam cicatricē lineā simplicem incidemus, labrisque diductis linamenta inferemus, ac aliis præsidijs, quæ in lagophthalmis comprehensa sunt, utemur, præterquā fomentis, usque dum sutura fuerit conglutinata.

*De anabrochismo, & uisione ferramento adhibenda.*

*Cap. XIII.*

**I**N quibus haud multi palpebræ pili habentur, qui oculū iritent, sed circiter unus, aut duo, aut plurimū tres, inuicē propinqui, anabrochismū græcè dictū, probamus, isque fit hunc in modū. Per acus tenuissimæ auriculā capillus muliebris, aut simplicissimum byssinum linum transmittitur, duobus simul extremis commissis, ut quod inferitur duplicem habeat ansulā alterumque huiusmodi filum, aut capillus ansulæ iniciatur: tracta que acu per cilium ubi pili enati apparent, pilū, pilosve ansulæ impositos, auri scalprio detrahemus. Et siquidem palpebræ

A 2 pilus



pilus prehensus est, ansulam attrahimus. Sin uerò unus, aut plures exciderint, per iniectum principium rursus ansulā deorsum trahemus, iterumq; pilo, seu pilis in eam positis, attrahe-  
mus. At si unus duntaxat pilus gracilis oculū pungat, etiā alterum ex naturalibus palpebræ pilis simul euellemus, mundum prius gūmi, aut alio quodā glutinante, deligabimusq; donec pilus coalescat. Nonnulli autē uisionem præponunt anabrochismo: palpebram inuertunt, extractoq; uulsella pilo pungente siue uno, siue duobus, uel etiā tribus, candens aut specillū, quod utroq; extremo in cuspidem abeat, aut auriscalpium, aut eiusmodi aliquod tenue instrumentū loco adigunt, unde pilus, pilive sint euulsi. Sic enim cute densata, nullus, pilus enascitur.

*De hydatide.**Cap. XIII.*

**H**YDatis pinguis quædā est substantia, palpebræ cuti præter naturā substrata. In aliquibus autem, & præsertim pueris ceu natura humidioribus augescens, malorū superuenientiū causa redditur, dū oculū pondere suo grauatur, eoq; fluxionē excitat, palpebræ igitur ipsis subter supercilia aquē inter eutem representant, nec ut par est sursum possunt attolli. Si uerò digitis ipsas deprimamus, inde digitos separemus, qd̄ mediū intercedit, inflatur. Horis autē antelucanis porissimū de fluxione tentantur, neq; contra solis splendores cernere sustinent, sed tamē illachrymant, continuisque lippitudinibus infestantur. figurato igitur cōmodē ægroto, digitis duobus, indice & medio paululū distantibus palpebrā constringemus, collectionem quandā hydatidis ad mediū digitis interpositū molientes. Ministro autē posteriori stanti caputq; ægrotantis firmiter continenti iubebimus per mediū supercilij palpebram modicē attollat, Nos sumpto in manus scalpello, ipsam per mediū lineam transversa diuidemus, non maiore quā in sanguinis per uenas detractioe fieri solet, alta uerò ut totā cutē diuidat, uel etiā hydatidē ipsam attingat, sed cura omnino debet adhiberi. pleriq; siquidem altius demisso scalpello, uel membranā quæ à cornu similitudine Ceratoides dicitur, uiolarunt, uel certē palpebræ musculos conuulnerunt. Atq; si quidē protinus hydatidis in conspectū uenerit, ipsam extrahemus: sin minus, iterum diuisionem leuiter moliemur. Vnde si apparuerit digitis cum linteolo molli apprehensam huc, illuc, nonnunquam etiā circumactam



cum actam mouendo extrahemus. ubi ablata fuerit implicitum panniculum posca madentem impositumque deligabimus. Sunt autem qui & laeuigatum salem specilli capitulo diuisionibus inserant, ut si ex hydatide quippiam fuerit relictum, ipsam consumat: postquam solueris si desit inflammatio collyrijs quæ illini possint, aut lycio, aut glaucio, aut croco curationem expediemus. Sin inflammatio urgeat, cataplasmatibus ad ea inscriptis, alijsque præfidijs medebimur.

*De palpebris commissis.*

*Cap. XV.*

**S**uperior palpebra interim cum inferiori cilio coalescit, interim cum membrana adnata, interim etiam cum ea quæ ob cornus similitudinem græcè ceratoides appellatur, ac morbus oculum tractatu difficilem efficit. Conuenit igitur uel auriscalpio, lato palpebræ spatio subiecto, uel ea per hamulum eleuata coalitum scalpello ad pterygia excidenda idoneo dissoluere, cura adhibita ne cornea membrana uulneretur, atque inde procidentiae occasio fiat. Vbi incideris, succo in oculum infuso linamentis palpebras diducemus, ne rursus commissura fiat, lanaque ouo madente imposita post tertium diem extenuantibus & quæ cicatricem inducunt collyrijs utemur.

*De chalazijs.*

*Cap. XVI.*

**C**halazium otiosi humoris in palpebra concretio est: quæ si ab exteriori parte palpebræ coaceruetur, scalpello extrinsecus transuersa linea incidi debet: deinde auriscalpio, uel aliquo huiusmodi instrumēto Chalazion auferemus. Quod si magna est diuisio, aut dehiscit, suturis oras commitemus, ac emplastro utemur. Si exigua est, omisissis suturis, curationē absoluemus. Si ab interiori parte fuerit, ut per cartilaginem ipsa pelluceat, inuersa palpebra & transuersim intus diuisa, chalazion tolletur: quo facto, muria uulneri infundemus.

*De uerrucis & encanthide.*

*Cap. XVII.*

**P**alpebrarum uerrucis, & in maiore angulo encanthidibus appellatis uulsella preheñsis, scalpelloque amputatis chalazidem laeuigatam imponemus,

*De ungue oculorum, quod pterygion à Græcis*

*uocatur.*

*Cap. XVIII.*

**P**terygion neruosa membrana est: quæ ab oculi angulo maiore plurimum initium capiens, per minorem ad inter-



rora progreditur, officitq; oculo, quod motū ipsius, bulbi cōtractione impediat, & q̄ progrediēs, totā pupillā cōtegat. Cū igitur facilius curationē recipiāt, quæ tenuia sunt, & albicant, hūc in modū admouēda manus est. Diductis palpebris, unguē hamulo modicē inflexo exceptū attollimus. A cū uerò, pilum equinū, aut linū ualidū ducentē, ac paululū inflexā per summa ad unguis dimidiū traiecinus. Et lino quidē unguē deligatum sublimē eleuamus, pilo aut partē pupillæ proximā defecantes, usq; ad extremū excoriamus. Reliquam partē maiori angulo utcinā scalpello futuris dicato ex basi abscindimus, ita ut anguli carunculā relinquamus, ne ea ablata, humor postea semper descendat, rhyada Græci uocant. Aliqui lino unguē eleuatum ut diximus, scalpello in id accōmodato, totum illum excoriāt, cauentes ne à cornu dictam Ceratoidem tunicam attingant. Post manus administrationem momento salis in leuorem detriti loco iniecto, lanam ouo imbutam illigabimus. Ab huius solutione, murtam ipsis liberaliter instillabimus. Si inflammatio subsecuta fuerit, ad eam inscriptis auxiliis succurramus.

*De staphylomate.*

*Cap. XIX.*

**S**taphyloma est tunice Ceratoidis, una cū rhagoidi, debilitatæ: aut uitio defluxionis, aut exulcerationis, eleuatio. Admouemus aut huic uitio manū, non ut uisum abolitū restituamus (nā id fieri nequit) uerū ut moderatū ægrotanti decorē cōciliemus. Itaq; acu ab inferiore parte sursum per basim staphylomatis traiecta, deinde alterā acum duplex linū ducentē ab angulo qui ad manū spectat, ad alterum per basim staphylomatis trāsmittere oportet, manenteq; prima acu, duplici lino amputato, staphylomatis aliā partem sursum, aliam deorsum filis deuincire: atq; tunc acu detracta lanam oui liquore imbutā imponere. Post solutionem blandis infusionibus oculū lenire, donec fila simul cum staphylomate decidāt.

*De oculis purulentis, qui hypopyi dicuntur. Cap. XX.*

**D**e oculis purulētis Gal. uerba apponere abūdē est, quæ in eū modū habēt. Nostra ætate medicus quidā ocularius cognomēto lustus, ēt cōcussione capitis plerosq; hypopyos perſanauit. collocās. n. eos in sella rectos, ac capita ipſorū utrinq; à lateribus cōprehendens, mox quatiebat adeò ut pus ipsis descēdere palā uideremus. māſit aut deorsum propter



pter gravitatē substantiæ, tametsi hypochymata nequaquā manerent nisi quis admodū diligēter ea infarxisset. Ac progressus iterū idē Galenus (inquit) frequenter autem multū simul puris uacuauimus tunica ea diuisa quæ cornus speciē refert, paulò supra locū quo uniuersæ inter se tunicæ cōmittuntur, nominant aut locū Græci nunc irim, nunc Stephanem hoc est coronam. Hoc quidē Galenus in commentario de morbis caradis prodidit. Cæterum post puris euacuationem, ulcus ex mulla aut fœnugræci succo, melle addito infusionibus repurgantes, deinceps reliquam purgationem accommodabimus.

*De suffusis.**Cap. XXI.*

**S**uffusio, ociosi humoris in cornea mēbrana iuxta pupillam cōcretio est. quæ uisum impedit, aut certē ne clare oculus cernat, efficit, Accidit potissimū ex perfrictione ac imbecillitate spiritus uisorii, eoq; senes magis & lōgo morbo confectos inuadit. fit ēt ex uomitu uiolētius cōcitato & ex ictu, aliisque pluribus de causis. Verū de ijs suffusionibus quæ nondū radices egetūt, nullā manus administrationē requirētibus, tertio libro cōprehensum est. In hoc aut eas quæ iam cōfirmate sunt & ex toto cōcreuerunt, notis suis describemus. Oēs igitur suffusione laborātes lucē uidēt aut multā aut paucā, eoq; discrimine suffusiones ab hebetudine & glaucomate separamus, tū eo q̄ hebetudinē & glaucoma experti lucē omnino nullā cernunt. Rursus igitur Galenus docebit te suffusionū & cōcretionem & differentiā, itē quō his manu mederi cōueniet. Oculus suffusione tētatus cōcluditur, & palpebra magno digito ad oculum premitur, eiq; adducitur, simulq; hac illac exprimitur, deinde oculo aperto & mēte ei adhibita suffusionē conspicimus. In iis. n. quibus humor nondū coaluit, fusio quædā ex digiti impressione oboriē. ac primū latior apparet, rursus in suā & figuram & magnitudinem recurrit. At in cōfirmatis suffusionibus nulla immutatio nec latitudinis nec figuræ ex impressura obuenit. Quoniā uero cōe hoc est indicium & eorū in quibus modicē, & illorū in quibus supra modū humor cōcreuit, colore ipsos discernemus. Nā si ferri aut marinæ aquæ aut plūbi colorē suffusio habeat, moderatē coaluit, & ad educationē idonea redditur: si uerò gypso & grandini similis color suffusionis est, supra quā par. Il concruit. Sed quia hæc à Galeno didicimus,

A 4 collocato



collocato ægrotante aduerso lumine citra solē, oculum sanum accuratē deligabimus, & diductis alterius palpebris recedemus ab iride appellata ad minorē angulū, quantū specilli cuspidis spatii continet, atq; tū punctorii stili mucrone locum delignabis quem puncturus es: in sinistro quidē oculo dextra manu functionē obiens: in dextro autē sinistra. Atq; inuersa punctorii specilli acie quæ ad extremū rotunda est, ualēter impingimus, & partem designatam usq; ad uacuum intus sinū penetramus: idq; tā altē fiet, quā pupilla ab iride nūcupata distat. Ex superiori igitur parte uertici suffusionis stilum punctoriū adigentes, (uidetur autē cōspiciuē ferrū, quod tunica cornea pel luceat) humoris colluuiē per ipsam in subiecta loca deriuabimus. Et si protinus educta fuerit, sistemus quiescentes paululū, sin autē recurrerit, rursus ipsam deducemus. Euacuata suffusione, stilū tollemus, leniter circumuertēdo. Post hoc oculo aqua eloto pauxillū salis cappadocici instillabimus, lanamq; oui luteo cū rosaceo madescētē impositā deligabimus, ita ut sanū quoq; oculū cōprehendamus, ne una cōmoueatur. Cæterū collocātes ægrū in domuncula subterranea iubebimus prorsus ipsum cōquiescere, tenui uti uictu, ad usq; septimū diem illigatū, nisi quid prohibeat. Post hūc solutis ligaminibus uisum experiemur, ostendētes ei res quasdam uisibiles, quod dum manu curamus, aut postea, fieri dissuademus, quod ex cōtinuo nimīū intuitu promptē rursus suffusio repleatur. Si inflāmatio urgeat, etiā ante septimum deligatura soluta, aduersus hanc pugnabimus.

*De ægilope.*

*Cap. XXII.*

**A** Egilops, tumor est abscessorius inter maiorē angulū & nares proueniēs. Vix curationē admittit, tū partium tenuitatis causā, tum periculi, ne oculus consortii lege indolescat. Si igitur per summa ruptus fuerit abscessus, totum id quod eminet usq; ad os excidēdū. Et si ad malas subluuiēs deciderit, totam ipsam explicabimus, os autē cariem nōdū sentiēs, rademus. Quod si iam carie uexatū est, ferro cādenti acuto ac in cuspidē abeunte, aduremus. Spongia frigida madente, oculo imposita. Sunt qui post carunculæ excisionē terebra usi, humorem, aut pus in nares deriuarint. Nos autē satis habuimus eo usq; solum ferramenti ad ægilopem accommodatis adurere, ut squama abscederet. Ab ustione lēticula melle adiecto quod phacomeli



phacomeli uocant, uel malicorio cum melle reliquisq; siccantibus præfidiis utemur. At si ægilops serpat ad angulum, summaq; inuadat, nequaquam tunc scalpello, quo aut pterygia, aut uenas secamus, media anguli parte ad abcessum resoluta, carnes ex alto educemus, item mediocriter desiccabimus. Vitri autem puluis tenuissimus ipsis insparfus, mirabiliter desiccet. Ad hæc aloë similiter cum fuligine thuris. Reliquam uero Aegilopn medicinam, tertio libro sumus executi.

*Si meatus auditorij non perforati sint. Cap. XXIII.*

**H**ic affectus à prima natali die contrahitur, membrana quædam auditorij meatum obstruente, nunc per summa, nunc in alto, postea accidit præcedente in audiendi meatu exulceratione. siquidẽ caro supernascens ipsum occludit. Itaq; si membrana auditum impediens altè inhærescit, difficilis erit administratio. Tenrandum tamen est, tenui quodam instrumento ipsam incidere. si in summo fuerit, scalpro quod Græci scolopomachæ rion appellant, hæc diuisam, ubi usus exigat, et auferemus. At si caro supercreuerit, hanc pterygijs apto scalpello, aut specillo polypis idoneo tollemus, deinde tortile linamentum ex uiliore panniculo, spatiofo meatus sinui apratum aqua imbuemus, inuolutumq; chalcitide læuigata, aut huiusmodi quodam arido in meatum demitemus, ne rursus caro enascatur. Si inflammatio male habeat, protinus id auferemus. Si fundat sanguinem meatus, spongiam aqua frigida imbutam imponemus. aliisq; conuenientibus utemur remediis.

*Ad ea quæ in meatum auditorium inciderunt extrahenda.*

*Cap. XXIII.*

**S**olet etiam in aurem incidere, non modò calculus, sed et uitrum, faba, & filiquarum grana. uitrum itaq; & calculus suam seruant magnitudinẽ: fabæ autẽ, & filiquarum grana, aliq; id genus, naturali corporis madore inflata, maximos cruciatus mouent. Conuenit igitur uel auriculario specillo, uel hamulo, uel uulsella hæc extrahere. Aut uiolenta capitis cõcussione, aure super circulum quendam imposita. Iam uerò calamo hæc subinde extraximus, exurgentes et aquam auribus illapsam similiter, cera calami ambitum, qui auri inijcitur, obstruentes ne spiritui usquã sit exitus. Calculos, & eius generis corpuscula, ieduximus specillo lana inuoluto & in resinam terebinthinam,

aut



aut aliud quoddam glutinans demisso, eoq; in meatum auditorium coniecto leniter. Sin ista nihil proficiunt, medicamēto quod sternutamentū prouocet, naribus indito, os & nares obturato. Si ne horū quidem nulli cesserit prius quā inflammatio, conuulsio, & omnino periculū fuerit subsecutum, manu, & ferramentis ipsa auferemus: figurabitur itaq; egrotus, ut auris auersa sit ad basim ipsius post appellatā fibram, & lunata utemur diuisione exigua, auersaq; specilli parte corpusculū quod insidet, eximemus. Hoc ablato uulnus suturis committemus, & medicaminibus ad cruenta inscriptis utemur.

*De polypo.**Cap. XXV.*

**P**olypus tumor est præter naturā in naribus oboriens, ex marini polypodis similitudine nomen sortitus, tum q̄ illius carnē repræsentet, tum q̄ suo cōplexu quemadmodum ille, captantes ulciscitur, nares ipsorū cōprehendens, ita & uitium hoc laborantiū nares obstruit, id efficiens ut & difficulter respirent, & sermonē ægrè exprimant. Duri igitur polypi, tactui renitētes, liuidi, & maligni, ceu cancri naturā induentes, attingi non debent. Molliores autē, laxos, stupidos, neq; maleficos scalpello curare tentabimus. Figurato homine in sedili aduersus solis radios, & nariū meatu sinistra manu explicato dilatatoq; spatula ad id facta in myrtacei folii modum acuta orbiculatim polypū, aut carunculam dextra præcidemus, illic acie ferramēti imposita, ubi naribus coaluit: secundū hæc instrumento in oppositū cōuerso, manubriolo ipsius, succisam carunculam foras eximemus. Et si quidem purum naris meatū uiderimus effectum, ad curationem descendemus. Sin reliquæ aliquæ polypi superfuerint, alterius cultelli rasorii acie relictū corpus cum tensione, agitatione, & rasura ualenti auferemus. Malignos & peruiaces polpos candentibus ferramentis adurere cōsiliū est. inde remedijs ustioni dicatis uti. Postquam ferro satis effectum, spongia detergemus, ac poscam, aut uinū in nares fundemus. Et si humor per palatum in fauces euaserit, bene se habent munia scalpello obita: sin minus permeet, nota est carunculam polypi ossibus à colando ethmoidibus dictis insidere, aut supremis nariū partibus, quam instrumenta non comprehenderit. Linum igitur mediocriter crassum funiculi instar, ceu duorum triumue digitorum longitudinis in nodos co nstrui-



constrictum, per specilli duplici cuspide præditi foramen trāsmitemus, alterumq; extremum specillo per nares sursum ad meatus colatorios inferetur: idem perpalatum, & os eiicientes utraq; manu extrahemus, tanquam carunculas nodis desecantes. Deinde funiculari linamento meatum diductum habentes post triduum pastillo musæ, & consimilibus, reliquias absuimemus simul & locum exiccabimus. Postea uero pastillis cicatricem ducentibus utemur, plumbeos canaliculos naribus, si opus sit, per totam curationem accommodantes.

*Curta in auribus, & labris quomodo sarciri possint:*

*Græci uocant colobomata. Cap. XXVI.*

**C**urta igitur in auribus aut labris, colobomata Græci uocant, hac ratione curantur. Primum cutis ab inferiori parte soluitur: mox oræ uulnere contrahuntur, ac id quod in callum coaluit, aufertur. Dein suturæ illis iniici debent, & conglutinantia,

*De epulidibus, & parulidibus. Cap. XXVII.*

**E**pulis carnis tuberculū est iuxta dentiū aliquē in gingiuis oriens. Parulis exiguus abscessus est, gingiuis infestans. Epulidē itaq; uulsella, aut hamulo eleuatā præcidemus. Parulidi in orbem exactæ linamēta inserimus. Vidi autē subinde scalpello, quo uenas secamus, ipsam dūtaxat pūctam, & pure uacuato consanuisse. post ferrum, uino collui præcipimus. In sequēti die mulsæ, tertio Antheron, puluerē uulnere inducimus usq; dū curatio finiatur. At putredo gingiuis oborta si cōgruis medicamētis nō curetur: cādēti ferro ipsā aduremus.

*Quomodo dentes eximantur. Cap. XXVIII.*

**D**ens qui eximetur usq; ad receptaculū suum circumradi debet, inde forfice paulatim concussus, extrahitur. At si exesus est, id forauem tenui linamento primum replendum est, ne constrictus sub forfice confringatur. Eo exempto, sale tenuissimo insparso relictas carunculas consumemus. Postea uino, aut posca os colluetur cum consanescat. Quopiā uero superflui nonnulli dentes enascuntur, eos qui receptaculo adnati coaluerunt, scalpris excindemus: qui non coaluerūt, forfice tollemus. Sin autem dens aliquis excreuerit, aut etiam confractus fuerit, nonnunquam limula, id quod excedit, superfluumq; in eo est, deteremus, adiectasq; ipsis, ut uerisimile est, squamas



squamas auerso scalpello, aut rasorio, aut lima perpurgabim<sup>9</sup>.

*De ligatione linguae quod ancylion dicitur.*

Cap. XXXIX.

**L**igatio linguae quae ancylloglosson Graecis appellatur, alias naturaliter accidit, membranis durioribus magisque à prima origine minutis linguam continentibus, alias ex acquisito ob cicatricem quampiam duriores sub ipsa ex ulcere contractam. Qui igitur ex natura hoc uitii habent, eo quod tardè sermonē explicare incipiunt & uinculum sub lingua iusto magis appareat, exulceratione non praecedente, cognoscuntur. Qui uero ex acquisito, cicatricem manifesto conspicuam habent. Collocari igitur debet aegrotus in sedili ea figura ut linguam ad palatū suspendeat, & nerueum illud uinculum transuersa plaga incidetur. Quod si ex cicatrice aliqua ligatio pro- uenerit, ea hamulo transfixa callum sursum extrahemus, ac laterali facta diuisione ligationē soluimus, cura adhibita ne particulas altè latentes incidamus. Nam sanguinis profusio quae sisti nequeat, frequenter inde secuta est. Post hæc aqua frigida, aut posca uulnus debet elui. deinde medicina utendum quae relaxet & carnem inducat.

*De tonsillis.* Cap. XXX.

**Q**uemadmodum glandulae scirrho induratae, strumae appellatur, ita etiam tonsillae inflammationem expertae, & supra naturalem modum auctae, & ueluti desiccatae, deuorationi spirationique negotium exhibentes, e regione utrinque sibi inuicem oppositae, eodem partis uocabulo, tonsillae, Graecè antiades uocantur. Quibus cum adest inflammatio, scalpellum ad mouere cautio est. ubi illa modicè con- quierit, manum admoliamur, praesertim albis, contractis, angusta basi firmatis. Nam humiditatis flaccescentes, rubicundae, amplam basin habentes, facillimè sanguinem profundunt. Collocatio igitur homine aduersus Solis lumen, iubebimus ut ore hiet, ministro caput continente, alteroque linguam spatula ad id facta quam Graeci glossocatochon appellant, inferiori maxillae apprimente, nos hamulo per tonsillam traie- cto, etiam quantum licet ipsam attrahemus, ita ut non membranas simul euellamus. Deinde totam ipsam ex basi am- butabimus scalpro ligationi dicato, ἀγκυλότομον nuncu- pant.



pant. Sunt n. duo eiusmodi instrumenta, aduersos acie inflexus habentia. Postquam una fuerit succisa, ad alterā eodem modo uice conuersa ueniendum est. Functione scalpello obita, æger ex aqua frigida, aut posca gargarizabit. At si profluuiū sanguinis eueniat, etiā rubi & rosarum, & myrtiq; diluto egelido utetur. Si uero copia sanguinis prorumpat, plantaginis & symphyti succo: item electro, pastillo & lemnia sphragide posca soluta os collui debet. Cessante autē profluuiio, proximo die, rosarū flore, croco & amylo cū tacte perungentur ex aqua, uel oui liquore cādido, uel hydrososato. Si sordes ulceribus increuerint etiam ex melle & collutiones, & illitus commodè adhibetur.

*De uua.*

*Cap. XXXI.*

**G** Vrgulio tanquam aliquod uocis plectrū subinde destillationem à capite recipit: idemq; præter naturā auctus, si oblongior, tenuisq; fuerit, Columella nuncupatur: si uero crassior ab ima parte, & rotunda, Uua dicitur. utranq; autem nomen à similitudine factum est. Si igitur uniuersalibus, nempe & per sanguinis dimissionē, & medicamento adhibitis uacuationibus non abigatur, neq; etiā remedijs loco admotis, quæ astringāt, repellantq;, etiam discutere possint, cesserit, ad scalpellū ueniamus: ne cōtinuo irritatu, tussis, uigilia, interim etiam strangulatus subsequatur. Quæ igitur cōtractæ sunt rotundæ, non oblongæ, cruentæ, uel subnigræ, nō attingi scalpello debent. Tenuēs autem, oblongæ, per summa graciles muris caudæ modo, remissæ, sanguinolentæ non admodū, sed albicantes, ex curandæ sunt. hæc siquidē protinus inflammatione liberantur. Id autē ex uua præciditur, quod præter naturæ modum eminet. Etenim si ad finem illa præcidatur, extremam omnes thoracis regiones noxam percipiunt: & uox intermoritur. Itaque figuratu, ægrotatus in sedili contra Solis lumen, iubeturque magnum hiare deinde uulsella, aut forfice quod superuacuum est prehensum, inferiorique parti adductū scalpello uuis aut futuris accōmodato, præcidimus. inde quæ in uasorum sectione comprehensæ sunt, agemus. Sepe uero, aut propter laborantis timorem, sanguinis profluuij metum, medicamētū uel siccitatem ferrum uitantes, adurente potius medicamēto hanc absumimus. Conuenit igitur medicamento adurente quod in palpebrarum uestione dictū est, aut eius generis alio, uua uestæ sinus implere, ac homini magnum hiare iusso lingua per famulum



mulum forfice constricta, instrumento adaperto tam uue par-  
tem comprehendemus, quantam etiam sumus amputaturi.  
Cæterum spissitudinem medicamentum habebit neque liqui-  
dā, ne diffuens ab uua deerret, subiectas autem partes adurat  
ob quod egro interdiciamus, ne per totum ustionis tempus de-  
glutiat, neq; omnino duram, quò facilius uue incidat, & si ex  
uno ipsius iniectu summa uuæ pars nigruerit, abundè est: sin mi-  
nus, etiam bis utemur, egro per totum administrationis tem-  
pus inclinante ore, in terram, ut saluta eliquesceus simul cum  
medicamenti particulis extra os euadat, siquidè hora una emo-  
ritur: excidit autem tertio, quatuorve die Secundum ustionem  
lana molli aut stappa indice digito inuoluto quæ gurgulioni  
circum adhærescunt, extergemus, uel etiam aqua os collui iu-  
bebinus. At ceruicis regionem fomentis ex chamæmelino,  
tum in his, tum in illis quibus confillæ ademptæ sunt ex con-  
sortij lege adiutabimus. Ad hæc gargarizationibus, & perun-  
ctionibus similiter utemur.

*Quomodo spinæ gutturi eximantur. Cap. XXXII.*

**D**euorantur subinde inter edendum spinæ, aut piscium,  
aut aliorum quorundam, diuersis in partibus. Quæ igitur  
in conspectum ueniunt, uulsella, quam Græci pro-  
priè appellant acanthobolon, eximemus: quæ inferius ad ipsas  
fauces peruenerint, alio modo. Sunt qui dicant maiores mo-  
les esse deuorandas, ut, caulem lactucarum, aut buccellam pa-  
nis. Alij uero spongiam puram mollemque exiguæ magnitu-  
dinis linio illigaram deglutire iubent, linoq; apprehenso retra-  
hi, idque frequenter efficere ut spina impacta spongiæ educa-  
tur. Leonides autem iubet cataplasmatibus uti, quæ concoquāt,  
cuiusmodi ex cruda ordeï farina conficiuntur, quò spina in pus  
redacta sua sponte excidat. At si eadem hora aut etiam ante  
uentriculi concoctionem in ægrotum inciderimus, eo quod in-  
fixum est nobis non conspicuo, uomere iubebinus digitis  
aut pinnis in os dimissis. Nonnunquam enim, id quod est infi-  
xum unà cum uomitu educetur.

*Quomodo aspera arteria incidi debeat.*

Cap.

XXXIII.

**C**hirurgicorum præstantissimi hanc quoque administra-  
tionem literis prodiderint. Antyllus itaque huc in mo-  
dum



dum scribit, In synanchicis quidem, ut in ea parte dicetur quæ uictus rationem tradit Chirurgiam improbamus, cum inutilis sit præcisio, in quibus omnes arteriæ & pulmo affectus est. In ore autem & mentio inflammationem experiuntibus, aut etiâ tonsillis, asperæ arteriæ os operientibus, incolumi sanè ipsa arteria, ratio est sectione uti, quò periculum strangulatus euitur: deinde cum infra arteriæ caput spatium trium ipsius quatuorve circulorum manum adegerimus, partem nonnullâ ipsius arteriæ scalpello pertundemus, totam diuidere securum non est, tum quòd hic locus excarnis sit tum quòd uasâ procul à loco diuiso sint dissita. Itaq; inclinato ægroti capite retrorsum, ut arteria reddatur conspicua, transuersam lineam incidemus, inter duos circulos ipsam ducentes, ne cartilago, sed membrana cartilagine colligans, discindatur. At si meticulosior aliquis inter agendum fuerit, hamulo prius cutem eleuatam diuidet: deinde sic ipsi arteriæ incidens, uasis, si fortè occurrant, præteritis, lineam ducat. Hæc quidem Antyllus dixit: Conijciens arteriam scalpello esse penetratam, inde quòd spiritus per eam cum murmure quodam erumpat, tum quòd uox intercisa sit. ubi uero de strangulatu metus amplius non est, oras uulneris renouabimus, mox suturis committemus, ita ut solam cutim citra cartilaginem suamus, utemurque medicamento quod cruentis facit. Sin minus conglutinetur, præsidio quod carnem inducat insistemus. Simili uero curatione utendum etiam si quis nobis obtigerit qui mortis desiderio iugulum sibi inciderit.

*De abscessu.**Cap. XXXIIII.*

**Q**uòd abscessus carniū, uel partiū carnosarū corruptela mutatioq; sit, quomodo generetur, quotq; eius sunt differentiæ, quarto libro abundè tractatum est. Nunc aut quæadmodū munu scalpelloq; ei medendū sit, exponemus, cū omnino in pus transierit. Hoc aut deprehēdimus inde quòd dolores, febris, si præcesserit, rubor, pulsus & reliqua inflammationis signa minora tunc appareant, ubi iam tumor in acutum fastigiatus est, & pus digitis innixis occurrat, præsertim cū summa occupat abscessus, tunc ad scalpellū ueniendū est. Si uero neque ad tactum occurrat, neq; fastigietur, eo quòd in alto delitescat, alij mutationis notis attendentes, manum admoliermur. Sciendum uero est crudos interim ipsos priusquam ex

toto



toto in pus murati sint, incidi, si aut articulis, aut principibus  
 particulis uicini sint, ne ligamentum, aut aliquod eis necessa-  
 rium assidua putredine pariter contabescat. Porro abscessus  
 ano proximos crudos antequam in totum ematuruerint, disseca-  
 ri Hippocrates praecipit, ueritus ne perforationem experian-  
 tur. Inciduntur ergo non omnes simili linea, sed naturali qui-  
 dem, ut in fronte: & pilosis locis, ut in capite cura decoris quan-  
 tum licet, habita Recta uero linea artus secamus, ueluti in mu-  
 sculis, diligentiam adhibentes ne & neruos & arterias & prin-  
 cipales particulas attingamus: interim in rectum, interim trans-  
 uersum abscessum prout cuiusque usus exigit, diuiso. In minoribus  
 unam scalpello sectionem molimur, in magnis plures, iuxta  
 amplitudinis rationem ubique ea quae tenuiora sunt & effluxioni  
 idonea, incidentes. Illos sane abscessum qui plurimum fastigian-  
 tur, crudi tenues, & emortui sunt, praecidimus trianguli, aut  
 mirtacei, folij, aut alterius anguli figura, cum circularis ad cic-  
 atricem recipiendam sit in idonea. Qui uero non in fastigium at-  
 tolluntur, eos simplici duntaxat linea dissecamus. At ubi ma-  
 gnum sinum inuenimus, si cutis superinecta carnosae sit, & queat  
 conglutinari, diuisione loci ea duntaxat utemur, quae humoris  
 effluxui conueniat: Sin tenuis, admodumque ex carnis, totam in  
 longitudinem simpliciter dissecabimus, & post simplicem diuiso-  
 nem si corpora utrinque sita gracilia ualde & non carnosae uidean-  
 tur, ipsa tollemus. Administrato iam scalpelli munere, spon-  
 gia locus abstergi debet: si paruus, est abscessus, unaqueque diuisione,  
 simplex linamentum inferemus: Si magnus est & plures inci-  
 sae lineae, implicitum aliquod in longitudinem linamentum, lem-  
 niscon Graeci uocant, ipsis demitteamus, ipsas similiter plagas  
 linamentis replentes. Quod si erumpat sanguis, aqua frigida,  
 aut posca utendum. si ita non substiterit, chalcitidis pollinem  
 inspergemus, eoque frequenter ob flaccidam humore putredinem  
 utemur. Splenia si hyems est, & partes sint neruosae, aenelæo  
 imbuta deligabimus: sin aestas, & partes carnosae, aqua cum oleo.  
 aut ipso quoque uino cum uino frigido tincta illigataque sequen-  
 ti die eisdem liquoribus superfundemus. Post tertium diem ubi  
 soluerimus, spongiaque deterferimus tetrapharmaco quod in  
 linteola illinitur, utemur. Si inflammatione caret uomica, idem  
 fomentum & medicamen linamentis illitum accommodabimus.  
 Si inflammatio adest: cataplasma, quod concoquendi uim ha-  
 beat,



beat, iniiciemus, superfusionibus antea usi ubi cessauerit inflammatio, medicina quæ pus maturet, & carnem inducat, medebimur. Cæterum unus, glutinantibus remedij, ut quarto uolumine de sinibus comprehensum est, curabimus.

## De strumis.

## Cap. XXXV.

**S**truma quæ græcè chœras dicitur, glandula est indurata, in ceruice, alis, & inguinibus potissimum enascens. Nomen habet à chœradis petris, aut suis, quod numerosæ sobolis existant, aut quod colla habeant glandulosa. Oriuntur autem strumæ in priori ceruicis parte, aut in altera, aut utrinque una, aut duæ, aut plures. Omnes autem suis membranis includuntur, quemadmodum steatomata, atheromata, & melicerides. Quæ igitur indolent attractu, & medicamentis impositis deteriores redduntur, malignæ sunt, quas etiam Carcinodas aliqui dixerunt, notumque est omnibus ipsas curationi quæ manu sit, non cedere. Morigeræ autem ac blandæ tum tactui, tum congruo medicamentorum usui, hoc modo tractandæ sunt. Superficiaræ igitur, & in cutem erumpentes, simplici linea diuisæ, ab incumbenibus dissoluuntur: orarum cute hamulis distenta, membranæ liberantur, ut in uasorum cōsectione, quam angiologiam uocauimus, expositum est, ac paulatim eximentur. Maiores autem strumas hamis transfixas suspendemus, & similiter excoriare corporibus eas continentibus undiquaque liberabuntur, animo adhibito ubique, ne arteriæ, quas carotidas uocant, & nerui recurrentes uiolenter. At si uas aliquod diuisum opus obscuret, funiculo id excipietur, uel per medium amputabitur, nisi magnū fueit: ubi in arcum strumæ basis uenerit, dextrè ipsa præcideretur: ac indice demisso tentabimus num & aliæ sint strumæ adiectæ quæ eodem modo auferentur. Quod si magnum aliquod uas aut etiam plura subinde iuxta strumæ fundum esse suspicemur, non ex basi ipsam excindere, sed funiculo excipere conuenit, quod particulatim citra periculū sua sponte excidat. quo tempore medicamento in linteola illito, curatio tentabitur. Si uerò inde excindatur, oras committemus. omnino autem rectas diuisiones adhibere oportet. Atque si nihil superuacuum habuerint, inde suturis iungemus. Sin ex strumæ tumore cutis redundet, parte ipsius myrti instar ablata, suturis utemur, & medicamen cruentis aptum iniiciemus.

PAULI ÆGIN.

B De



*De steatomatis, atheromatibus & meliceridibus.*

Cap.

XXXVI.

**H**Aec quoque in abscessuum genere comprehenduntur: sed hoc discrimine ab illis variant, quod abscessus propriè dicti inflammationē doloremq; testentur, & acrem humorem, ac rodentem contineant, nulla peculiari membrana, aut tunica inclusi. Cæterum illa inter se quoque differunt, quod humor in steatmate contentus, sicut appellatio ostēdit, seu sit persimilis. In atheromate, pulti frumentaceæ. In meliceride, humor mel repræsentet. Agnosces ipsa hunc in modū. Steatoma aliis durius est, tactui renititur, & basim habet solidiorem. Meliceris laxi cuiusdam corporis modo subsidet, & tardè quidem funditur: cito autem rursus succrescit. Curantur hæc quemadmodum strumæ, incisione, excoriatio, suturis & reliqua curatione, id solum cauendo, ne membrana uulneretur, unde humor qui continebatur, profusus operationem impediat, & ne pars ipsius relinquatur, nam renascendi occasionem plerumq; in brachiali, talo & articulamentis motui dicatis exhibet, quemadmodū etiam struma uel tota, uel portio ipsius relicta. quod si huiusmodi quippiā fuerit deprehensum, satius est non suere, sed exedētib; medicaminibus reliquias absumere.

*De aneurysmate.*

Cap. XXXVII.

**A**neurysma tumor blandus tactu est, digitisq; cedit, ex sanguine & spiritu contractus. Galenus de eo hunc in modū scribit. Arteriæ apertæ affectus, aneurysma uocatur. Fit autem eadē quoq; conuulnerata, quoties incumbēs ei cutis cicatricē quidē contraxerit, maneat autē arteriæ uulnus, dum nec coaluerit, nec carne fuerit obstructa. Agnoscuntur huiusmodi affectus arteriæ pulsū, imò etiā prementibus nobis tumor omnis euanesceat, substantia quæ ipsum efficit, in arterias recurrente. Hæc quidē Galenus. Nos autē ipsa aneurysmata hoc modo inuicē discernimus. Quæ ad aperta arteria sunt, prolixiora apparent, & in alto constituuntur: digitisque impressis ceu strepitus quidā ex auditur, cū nullus sonus in iis quæ rupturæ feruntur accepta percipiatur: illa uerò rotunda magis sunt, & per summa occurrunt. Quæ igitur alas, inguina & ceruicē infestant, aliāq; loca, eximie magnitudinis aneurysmata, curare propter uasorū amplitudinem non tentabimus.

Quæ



Quæ uerò summas partes, artus uel caput affligunt, hac ratione aggredi conuenit. Si quidem ex aneurysmate tumor obuenit cutem linea recta in longum incidemus, deinde hamis ductæ oræ sicut in uasorum dissectione dictum est, excoriabuntur, & scalpellis quibus membranæ auelluntur circumpurgata arteria nudabitur: acu traiecta duobus funiculis deligabitur, puncta prius arteria scalpello per medium: ubi cum ambienti membrana unita fuerit, curatione pus maturante utemur usque dum funiculi exciderint. At si ex ruptura arteriæ creatum sit aneurysma, totum id quatenus fieri licet, cum cute digitis apprehendendum est, deinde acu duplex linum trahente, inferius eo quod exceptum est transiendum. Et post acus traiectum ansulam forcice præcidere oportet, atque sic duobus fili, hic illic tumorem deligare, ueluti in staphysomate comprehensum est. At si metus sit ne fila circumuolantur, altera etiam transmittenda est acus per totum quæ priorē premat similiter duo fila ducens: amputata ansum ex quatuor filis constata, ita tumorem ex lino deligabimus, uel tumorem per medium adaperto post excretionem, cutem adimemus, eam quæ ligata est relinquentes, ac splenium ex uino & oleo imponentes, remedijs in linamenta illitis utemur.

*De asperæ arteriæ tumore qui bronchocele dicitur.*

*Cap. XXXVIII.*

**G**Randis in ceruice, & rotundus tumor fit, nomen claturam ab internis partibus sortitus. Duplex eius tumoris differentia est. alius in adipe tumet, alius partium illarum dilatatione accidit. Atque hunc notabimus ueluti & aneurysmata, desperatumque fugiemus, non aliter ac uniuersa aneurysmata quæ periculosam habeant administrationem: præcipue uerò quæ circa ceruicem oriuntur, ob articularum magnitudinem. Qui adipe inturgescit, ita ut steatomata curari debet, discretis, præteritisque uasis, eo nimirum modo quem in strumis exposuimus.

*De ganglijs.*

*Cap. XXXIX.*

**G**anglion, nerui est in nodum concretio, ex ictu, aut labore proficiens, plerumque uerò in manus iunctura, quæ cum brachio committitur, talo, & articulamenti absoluitur: quanquam in alijs quoque partibus proueniat. Hæ comites sunt notæ, tumor, concolor, renitens, indolensque. At si uiolenter premas, stupidum sensum experitur, non in alto, sed ipsa sub cute

B 2 te radices



te radices agens:& ad latera quidē transferri potest: sin autē uī adigas: tum antē, tum post, nequaquā potest. Quæ igitur in cruribus aut brachiis aut summis partibus oriuntur, excindere tutum non est: periculum enim ne particula reddatur mutila. At quæ caput aut frontē inuadunt, cutē scalpello diuisa curamus, & si quidē parua fuerint, uulsella cōprehensa ex basi præciduntur: si maiora, hamis transfixa excoriataq; tolluntur: oras futuris commissas, medicamento ad cruenta apto per sanamus.

*De uenæ sectione.*

*Cap. XL.*

**E**T si omnibus satis cōstet, quomodo uena incidi debeat, tamen ne parti chirurgicæ aliquid desit, & propter artificiosas ipsius distinctiones, omittendū non est. Primū itaque uenæ sectionis consiliū est, ut sanguis qui redundat, euacuetur. Copia uerò ipsius duplici modo capi demonstrata est, uno ad uires, uenæ licet plenæ nō appareāt: in quo statu, homo protinus imbecillis ac inualidus reddi: natura ceu ad graue aliquod onus ferendū impotēte. Altero, uasa quæ id cōtinent, in alia loca pondus transfundere spectātur: & si uirtus haud cū molestia ipsum toleret: in quibus ruptis interdū uenarū cōmerciis, sanguinis sputū, aut aliæ fluxiones accidunt. Copiæ igitur, quæ ex uiribus estimatur, corporis grauitas, nota est. Venarum copia tum extensione, tum quod illæ plenæ tument, agnoscitur. utraque autem, uacuationem necessariam indicat. Itaque primo quoq; die sanguinem usu id exigente demittes, sola in uentriculo ciborū concoctione, aut etiā perfecta in iocinore sanguinis elaboratione expectata. At si inter initia ob causam aliquā sanguinis detractio prætermissa fuerit, uel ultra septimanam cum mittere alienū non est, si necessitas postulet, & uires non dissuadeant. Cæterū qui uenā incisurus est, id habet inspiciendum, num multa stercoris retentio intestina urgeat. Quod si ita deprehensum est, molli clystere aluus antea uacuari debet: ne uenæ putridam aliquam excrementorum colluiē ab intestinis attrahant. Ijs igitur qui ob morbi necessitatē, sanguinis detractiōnem requirunt, quouis tempore uenam incidemus, si particularium duntaxat in febribus accessionum uigorem seu statum excipiamus. At si continens febris extiterit, matutinū omnino tempus magis idoneū est. Qui uerò nullo morbo urgente, sed præcauēdi illius gratia sanguinis uacuationem postulant,



stulant, his uero opportunū est. Porro in ætatibus usq; ad quartumdecimum annum sanguis mitti non debet, sicut ē post sexagesimum, nisi necessitas quædā ineuitabilis huc nos cōpel-  
lat. in summa, imbecillis uiribus præditi, hanc uacuationē ui-  
tabunt. Cæterū in particulis recens inflāmatione tentatis, ex  
opposito inanitione in moliri conuenit: in uetustioribus, ex  
propinquo: siquidē ex multis corporis partibus sanguinē mit-  
temus: frequētius aut ex interiori cubiti uena. Verū id cō-  
siderandū uenit, interiori & alariæ dictæ uenæ, per totū, arteriā  
subijci: mediæ neruū: superior quæ & humeraria dicitur, peri-  
culi expers est. Ac in capitis morbis humerariā inci dimus. In  
his qui infra ceruicē affligunt, alariā: media utrisq; conuenit.  
Fascia igitur arcta partem aliquā circa brachij musculos deli-  
gare oportet, & frictione manuū alternante, repletā uenā usui  
cōmodā transuersim per totā ipsius latitudinē solam diuidere.  
Etenim maiores hac plagæ, ægrè cicatricē admittunt arctæ ni-  
miam inflammationē experiuntur, præterquam q̃ crassioris  
succī transitū impediunt. In quibus autem & secundo & tertio  
die, interim uerò & quarto sanguinē detrahendū esse speramus,  
obliquius uena secari debet, quò manus inflexu dehiscens non  
protinus cicatrice obducatur, sic. n. uisum est Antyllo. At quā-  
tum euacuabitur, ex uiriū robore, & morbi magnitudine me-  
tiemur. Si humoris copia subest, & materia efferuescit, una ui-  
ce usq; dū anima deficiat extrahemus, uirtute uidelicet robu-  
sta, sic aut ut æger nō ex humoris in uentriculū confluxu defi-  
ciat: ob quod ē multi ante iustā uacuationē per initia statim  
animo destituuntur: uerū eius deliquiū his uacuati humoris  
ratione obueneri oportet. Iam uerò si magnā uacuationē res  
postulet, uires aut sint inualidæ, distribuenda erit inanitio: ac  
primū parcius detracto sanguine denuo idem auferetur: si res  
exigat ē tertio. Cæterū uacuare solemus corpus uniuersum  
non modo in plethorica affectione, ueluti & Galenus tradit,  
sed ē propter affectus magnitudinē, quanquā totū corpus hu-  
moribus uideas cōmoderatū, quemadmodū in sanguinis ex na-  
ribus, aut alia parte profluio, quod nō copia excitauerit: ac  
uacuare reuulsorio modo ex oppositis conuenit. Quinetiam  
in ualida inflammatione idem faciendū est, sicut in colicis & re-  
nibus calculosis, lippitudine, & ijs quæ tā præcipiti modo ur-  
gent. Nā dolor & partis inflammata calor defluxioni præbent  
B 3 occasionem,



occasionem, licet uniuersum corpus superfluitatibus careat.  
 Quapropter parcius id tunc faciundū est, uacuatione adhibita,  
 quæ potissimū laborantis ætatis, & naturæ cōpetere uideatur:  
 cōsideratio ēt anni tempore, loco, & ægrotantis cōsuetudine.  
 Porro in quibus propè uenā quæ diuidetur magna quædā est  
 inflammatio, quemadmodū in pleuriticis & iocinorolis, opti-  
 mum est expectare, dū color sanguinis, & substantia mutetur.  
 Diuersus autē est in inflāmatione sanguis, à naturali: quoniam  
 largius incalescens, siquidē prius erat crudior, rubicundior, ma-  
 gisq; flauus euadit: si autē talis prius extiterit, in nigrū adustus  
 mutatur. Nō tamen ex toto mutationē ipsius expectare cōsi-  
 lium est: sed ēt ante illam nōnunquam cessare cōuenit, idque  
 duplici de causa, aut ob uiriū imbecillitatē, quas solui ex pul-  
 suum tactu cognosces: sunt. n. ipsi inæquales uehementia, &  
 magnitudine, uel ēt languidi, & robur fluxionis inclinans im-  
 becilles iam uires notat: ut propter inflammationis maligni-  
 tatem: nonnunquā. n. nihil remittit, sed uehementer impacta.  
 At si nihil horū obstiterit, ægerq; floridæ ætatis sit, expectanda  
 est sanguinis mutatio, magisq; si ambiens aer temperatus fue-  
 rit. Si uerò sanguis ante iustam uacuationē fuerit suppressus, id  
 aut accidit, aut propter timorē, & animi defectū, aut sanguinis  
 grumū, aut uiolentā constrictionē, cōtra singula pugnabimus:  
 Animā deficientem, odoratis naribus admotis refocillantes: cō-  
 strictionē, uinculo remissio soluentes: in grumū coactū sangui-  
 nem, uel olei infusione, uel digitorū fōtu dissoluentes. Reliqua  
 sanguinis dimittendi præparatio nulli non cognita est: uerum  
 hæc in cubiti uenis fieri solent. At ex fronte sanguis detrahet  
 in capitis doloribus ita: capite fomentis adiuto, fascia ceruicē  
 uinciemus, digitis super guttur interpositis, ne suffocatu ægri  
 intereant: repleta iam uena in fronte, acie scalpelli diuidetur.  
 Eodē modo etiā circa guttur extantes uenæ sphagitides ap-  
 pellatæ, ob uetustam lippitudinem aduersa scalpelli parte scin-  
 dentur, ita ut sanguis erūpat. Item uenas linguæ subditas, ue-  
 luti in anguis, transuersas incidimus, euitantes cōstrictionem.  
 Nonnulli uero in maioribus oculorū angulis uenas eminētes,  
 sicut in longis capitis, uel oculorū morbis similem in modum  
 diuidunt. In quibus internas quoq; nariū uenas uel mucrone  
 scapelli cōrudentes, uel quibusdā asperis irritantes disrūpūt,  
 item post aures sitas ob capitis affectus feriunt. Quæ uero po-  
 plitem



plitem perreptant, in renū cruciatibus aperiūtur. Quæ extremas corporis partes intercurrunt, superiacentibus uinculo exceptis & manuū frictione, & pedū incessu repletæ diuidētur. in sinistra quidem manu, cum lien malè habet, uenam quæ inter paruū & anularem digitū porrigitur, præcipuè incidemus. cum secur affligitur, in dextra. Nam extremarum partium inanitio è longinquo magis facta efficaciorē molitur reuulsionem: in pede, ueluti cum coxendicum dolores, aut uteri uitia urgent, eam quæ supra interiorem talum eminet, dissecābimus.

*De cucurbitularum usu. Cap. XLI.*

**C**ucurbitulis neq; per affectuum initia, neq; cū corpora sunt plethorica, utemur: sed ijs prius euacuatis, cumq; nihil particulæ influit. Vsus eius est mouere aliquid, agitare, & foras extrahere. Leuis itaq; cucurbitula inflationes discutit, distillationes in stomachū suspendit, sanguinem attrahit, & profluentem rursus sistit, obiectis partibus admota: & quod alte conditum est, in summa rursus educit. in totum humores traducit, spiritus euacuat. At quæ cum scarificatu adhibetur, efficaciorē causis perspiratū præbet, sensibiliter ex alto ea quæ nocent eliciens: quippe non modò sanguinem, sed alios quoq; humores uacuat, præsertim cum flamma ampliore adglutinata: uerū si à carnosis particulis detractionem moliri statuimus, primū cutis scalpello exasperanda, deinde cucurbitula imponenda est. Sin ex carnis magis pars fuerit, leuem prius cucurbitulam defigemus: ubi in tumorem particula eleuata sit, scarificatu adhibito, rursus ipsam accommodābimus: & si paululum uacuare cogitamus, unā diuisio abundè est: sin amplius, plures adhibentur. Item si tenuiorem qui continetur sanguinē acceperimus, summa scarificari, si crassiorem, alta debent: quando etiam concretum ex ictu sanguinē educere animus est. Terminus autem moderatæ diuisionum altitudinis est, sola cutis crassitudo. Nonnulli instrumentum ad hoc excogitarunt tribus scalpellis æqualibus simul iunctis, ut unica iniectione tres fierent plagæ: uerū hoc nos inutile purantes simplici scapello contenti sumus. Alii cucurbitulis usi sunt uitreis, ut sanguinis qui uacuatur mensura in extractione pellucescat: uerum æneæ cum maiorem sustineant flammam, multo sunt efficaciores uitreis, quæ faciliè dirumpuntur. Quinetiā

B 4 quæ



quæ ex cornibus, ore sugētes trahunt, minus quidem inaniūt, non autem siccant, quemadmodum quæ cum flamma si opus fuerit, adhibentur. Cæterum cum admoturi sumus cucurbitulam, particulæ in rectum figuratæ ex latere hanc defigemus. Si enim iacentibus ipsis super linamentū ex lucerna, simul cum flamma inducamus, in cutem decidens illa, grauiter adurit, usu hoc non postulante. Est cum cucurbitulæ magnitudo subiectę parti adæquabitur, eaq; de causa permultū cucurbitulæ & paruitate & magnitudine differunt, quemadmodum etiam collo prolixiores & spatio inferiori latiores aliis efficacius extrahūt. Cauendum autem ne prope māmillas cucurbitula applicetur. nam illapsæ cucurbitulis nōnunquā mammæ & inturgescētes uehementer, haud facilē ipsas relinquunt, atq; tunc spōgias ex calida cucurbitulis circundare oportet, sic enim remittuntur: sin minus hoc modo fuerint laxatæ, perforari ipsas ratio est.

*Quomodo alæ adurantur. Cap. XLII.*

**H**Vmeri articulo luxato in nonnullis caput frequēter & continuē excidit, uel humiditatis superantis uitio, uel quod cōtinuæ luxationi opportunus locus euaserit, quando ad uestionē descendere oportet. Proinde ægro, aut supino, aut in sanum latus inclinato, interiorē alæ cutem quā potissimum articulus excidit, duobus sinistrę manus digitis, uel hamulis tenuibus & oblongis eleuatā, candenti ferro adurere oportet, quousq; ferramentum ex aduerso inflexum uno impressu duas crustas excitari, & si magnū intercedens harū spatium fuerit, mucrone scalpelli per ipsas traiecto aliam in medio crustā faciemus, adurentes usq; dum ferramentum urens scalpello inciderit. Item alias duas Hippocrates iuxta utriusque dictæ mediā fieri cōsulit, æquali illis spatio distantes quadrangulæ figuræ modo. Altius autē cute non penetrabimus, q̄ nerui, glandulæ, ac aliæ particulæ quæ inflammationē difficultatemq; functionum, excitare possint, subiecta sint: curari uero aduulsa debent porro cū sale trito & imposito, tū aliis præiudiis ad crustas inscriptis, postea manu operandum cautē erit.

*De adnatis digitis & sexto digito. Cap. XLIII.*

**A**Dnascuntur digiti in manu nunc propē maiores digitos, nunc propē exiguos, raro autē uisi sunt iuxta aliorum aliquem. Eorum uero qui adnascuntur, alii per totum



tum carnosum sunt, alii ossa in se continent, nonnunquam & ungues. Ossa habentium, hi ab articulo procedunt, cuius commissuram alteri digito communicant, alii ex naturalium digitorum fissura oriuntur: atque huiusmodi perpetuo sunt immobiles: reliqui mouentur nonnunquam. Carnosorum expedita est praecisio. nam scalpello quod superuacuum est in totum tollimus. Eorum qui ab articulo prodeunt, difficilior est tractatio illis qui à digitorum fissura originem traxerunt: primum caro orbiculatim usque ad os excinditur, ipsumque os excisum aut erasum, aufertur. Ceterum inter curandum radimus ipsa, & cicatrice obducimus quemadmodum etiam in ossium uulneribus declaratum est.

*Quomodo purulentis adustio adhibenda.*

*Cap. XLIII.*

**V**stio efficacissimum purulentis praesidium inuentum est. Conuenit igitur ferro candenti crustas excitare: unam inter clauiculae compagem cute sursumeducta. duas autem exiguas iuxta mentum, sic ut ab arterijs quae carotides appellantur, recedatur. Duas item sub mamillis ampliores inter tertiam quartamque costam, alias duas inter quintam & sextam paulum in posteriora spectantes: aliam, per medium pectus: rursus aliam supra os uentriculi, tres posterius: per medium dorsum unam, utroque spinae latere duas, quae in dorso facta crustam excedant non admodum extantes. Alii, ut tradit etiam Leonides, ferro mucronato candenti per medium costae spatium ubi abscessus est, adacto, usque ad pus uestionem moliri sunt. Nonnulli etiam hos curare ausi sunt, transuersa linea inter quintam & sextam costam ducta, & cute paululum oblique diuisa, deinde sic scalpello membrana quae costas succingit perforata, pus excreuerunt. Atque hi cum illis qui ferro usque ad imum adurunt, aut statim mortem inferunt, uitali spiritu confertim una cum pure euacuato, aut fistulas reddunt insanabiles.

*De cancro.*

*Cap. XLV.*

**C**ancer, tumor est inaequalis, oris praetumidis, aspectu teret, liuidus, & indolens, interim sine ulcere, quem Hippocrates latentem nominauit: is si curerur, peior euadit: interim exulceratus: nam cum ex atra bile ducat originem, magna parte eroditur. Pluribus quidem corporis partibus accidit,



cidit, præcipuè fœminarum locis, & mammis, quæ uenas undiquaq; turgidas habent, quemadmodum cancer animal pedes, unde etiam nomen sortitus est. Quæ igitur per medicamenta curatio adhibetur, quarto uolumine abundè explicata est: eius autem cancri qui uuluam infestat, tertio. Quoniam uero partes putrefactæ, aut quæ (ut simpliciter dicam) naturæ modum excesserunt, ablationem sui postulant: cancris autè uulvæ manus opera nec potest, nec utile est admoueri: eorum qui exteriora infestant, præcipuè mammas curandi administrationē trademus. Quidam enim totam partem uitiatam ferramētis candentibus absumunt: alij totam mammam præcisam adu-runt. Galenus solam administrationem quæ per sectionem fit, recipiens, hoc modo scribit. Si quando cancrum scalpello curare audebis, incepisse uacuationem à melancholici humoris purgatione oportebit, ubi iam totum quod uitiatum est exactè præcideris, sic ut nulla radix superlit, sanguinem effluere finito, nec celerius eum cohibebis, uerum etiam premēdo uicinas uenas, crassio-rem ex ipsis sanguinem exprimes: deinde aliorum ulcerū modo curabis. Hæc quidē Galenus memoriæ prodidit Reliqua uero maligna putridaq; ulcera nempe phagedænas, gangrænas & cōsimilia eodem tractare modo debes.

*De ijs quibus mamma fœminarum modo inturgescunt. Cap. XLVI.*

**Q**uemadmodum fœminis, ita masculis quoq; pubertatis tempore, māmillæ modicè inflantur, sed plerisq; rursus subfidunt, in nōnullis sumpto initio crescunt pinguedine subnascente. Cū itaq; indecora hæc corporis figura muliebris habitudinis notam repræsentet, digna est cui manus admoueat. Lunata per imam māmillæ partem līnea ducitur cute detracta: ademptaq; pinguedine, futuris cōmittetur. At si fortè māmilla partibus ipsius ob magnitudinē ad ima, ut in mulieribus, inclinauerit, lunatas duas plagas in extremis inuicem coeuntes inferemus, ut minor à maiore cōprehendatur. Cute quæ intercedit cum pinguedine adempta, similiter futuris utemur. At si aberrantes minus exciderimus, tunc eo quod superest rursus adempto, futuras iniiciemus, & medicamentum cruentis idoneum accommodabimus.

*Quomodo*



*Quomodo iecur aduratur. Cap. XLVII.*

**S**I dolor cum grauitate iis oboriat, quibus iecur uomica laborat, carnea ipsa substantia uiciata ostenditur. Si acutus dolor magis urgeat, puris in tunica collectio: adurere hoc modo oportet: ferrum candens mucrone tenui, paulò supra inguen qua iecur desinit, iniicitur, ut crustam unam excitet: Vbi uero totam cutem adusserit, & usq; ad tunicam penetrauerit, pus excerneretur. Ab euacuatione phacomelites, hoc est, lenticula melle addito utemur, tum ijs quæ mulsæ & speciebus ad carnem creandam componuntur: postea uero etiam cicatricem ducentibus.

*Quomodo lien aduratur. Cap. XLVIII.*

**C**utis quæ lieni incumbit, hamo eleuata, oblongo ferro candenti per totum ipsa aduretur, ut unico impressu duæ fiant crustæ idq; faciemus ter, quò omnes crustas numero sex habeas Marcellus autem tridente quam trianam Græci dicunt, aut tridenti simili ferramento utens, uno adactu crustas excitaui.

*Quomodo Stomachus aduratur. Cap. XLIX.*

**I**N longis stomachi defluxionibus, recetiores usi sunt aduritione. Alii ferramentis candentibus mucronatis tres crustas moliuntur, unam iuxta cartilaginem quæ ab ensis figura Græcis uocatur xiphocides: alias duas inferius trianguli figura, altas ut cutem diuidant: Alii unam duntaxat adhibent, ampliorem supra ipsum os uentriculi. Sunt, qui ne ferro quidem urant, sed iscis appellatis: sunt autem hæ spongiosa quædam corpora in quercubus & corylis nascentia, barbaris magis usitata. permittunt autem uulnera sine cicatrice diu manere, imò etiam magis adhuc diuidunt, ut maiore per ipsa difflatu os uentriculi ab influxionibus immune permaneat.

*Quomodo aqua hydropicis emittatur. Cap. L.*

**Q**uomodo aqua intercus contrahatur, quot sint ipsius differentia, quæ causa, quæ notæ, quodq; remedium, tertio uolumine sumus executi: ubi & demonstratum est, illud solum aquæ inter cutem genus quo ueluti in utram aqua



aqua colligitur, asciten dicunt, manus operam postulare. Atq; eam hoc loco explicabimus. Itaq; rectus homo statuitur, sin minus, in sedili collocatur: si ne hoc quidem fieri potest, attingi non debet, cum adeò sit inualidus. Stante recto homine ministris retro assistentibus, iubebimus ut tumorem ad pubem digitis premat, depellatq;. Nos aculeo, aut scalpello quo uena inciditur, si ex partibus iuxta intestina sitis originem cōtraxerit. directè sub umbilico tribus digitis interpositis inum abdomen usq; tenuem membranam quæ peritonæos uocatur, diuidemus. Sin autem primario iecoris affectui malum fertur acceptum, à sinisteriore umbilici parte dissecabimus. si à liene uitium trahit originem, in dextra non enim in illa parte sectionem moliemur, in quam decumbent. Ac cute quæ superiacet acie instrumenti excoriata, membranam quæ sinit abdomen, peritonæos uocatur, diuidemus, quousque scalpellum ad uacuam usq; regionem penetrauerit. Deinde per foramen abdominis, & peritonæi, æneam fistulam scriptoriis calamis acie similem demitemus, & per hanc humor effundendus est pro cuiusque uitium ratione, quam ex pulsus tactu deprehendemus. Deinde exempta fistula, humor fisti debet, sistetur autem statim cum diuisio ipsa alternatim sit facta. At nos securitatis gratia linamentum tortile per solam abdominis diuisionem dimittimus, ægro recumbente recreatoque, per insequentem diem rursus momentum humoris quantum uirtus exigit fistula euacuabimus, atq; ita deinceps faciundū est, quousq; minimum humoris superfit, ita tamen, ut ubique subitam cumulatamq; uacuationem uitemus, multis siquidem imperitè manum admoliti una cum humore uitali etiam spiritu uacuato subito hominem iugularunt: qui uero securius rem agunt, modico humore educto, ut uirtus magno leuaretur pondere, reliquum medicamentis aquam ducentibus arena, sole, siti, & cibis desiccantibus consumpserunt. Iam uero uestione super stomachum, iecur, lienem, inum uentrem & umbilicū usi sunt, quinque crustas adhibentes. Alii ferro tenui candenti: alii iscis nuncupatis, aut aliquo ex alia huiusmodi materia, & pleriq; hac curandi ratione magis consaquerunt, interim nullam in totum compunctionem (quam paracentesin uocant) experti.

De umbi-



**V**mbilicus indecorè prominere solet, quod uitiū Græcè exomphalon dicitur, interim mēbrana quæ abdomen finit, peritonæum appellauit, illic dirupta, ac procidente, aut omento, aut intestino, interim colluue otiosi humoris sub umbilico contracta, interim uero carne subnata, aliquando sanguine irrumpente, propter uenæ, aut arteriæ rupturam, ut in aneurysmatis, interdū non sanguine, uerū spiritū solū irrumpente. Si igitur momentū prociderit, circa umbilicū tumor cōcolor, mollis tactu, indolens & inæqualis apparet. Si intestinum prolapsū est, præter compressis memorata, etiam inæqualis magis tumor est, & digitis impressis cedit, euanescitq; nonnunquam strepitū elidens, balneis, & distentionibus magis incrementum accipit. At si humor collectus est, mollis similiter tumor apparet: pressus autem non cedit, neq; decrescit, neq; tamen augetur. Quod si autem accedat superioribus signis, ut tumor sit liuidior, carneq; subnata durior, etiam tactui renitetur, & eadē in magnitudine manet. Si ex inflatione eminet, tumor mollis ad tactum subsequetur, qui digitorum impulsu sonum quendam reddit, & pressus aboletur. Hunc in modum curabitur: erecto homini iubemus ut spiritum contineat, quod in omnē partem distendatur: deinde omnem umbilici excrecentiā orbiculatim atramento scriptorio norabimus, resupinatoq; homine scalpello tumore, quā nota atramenti est exasperabimus: deinde medium hamo eleuatum, lino aut neruo quā exasperatio, est circum astringemus (hoc enim pacto continebitur ne deuoluatur) ansulam supra deligaturam ponentes, postea tumore quē constrinximus iuxta uerticem ad apertum digitū indicem demittimus, tentabimusq; diligenter num intestini implexus, aut pars omenti simul fuerit constricta. Ac siquidē intestinum fuerit relictum laxata funiculi ansula, id introrsum pellemus: si uero omentum sit, eo retracto, quod superuacuum est amputabimus, uase quod (ut uerisimile est) coincidit, lino deligato: mox accipientes duas acus simplex linum ducentes, iuxta hiatū per incisionem cutis factam traiectamus, & ansulis linorū præcis, quemadmodū in aneurysmate dictū est, ex quatuor initiis constrictionem moliemur. Vbi corpora lino deuincta computruerint exciderintq;, medicamentis in linteola illitis curatio obsoletur,



soluetur, si cauiam magis cicatricē fieri semper cupiamus. Hæc quidē ad momenti, aut intestini affectum pertinent At si caro aut humor, aut sanguis uitū crearit, tumoris medio circulatim præciso deinde eo quod incumbit extra peritonæū, sublato, curationem carni generandæ dicatā tentabimus. Porro si umbilicus emineat, aut ex uasorum dilatatione, aut spiritu intercluso, attingi non debet, quemadmodum etiam aneurysmata .

*De peritonæo, hoc est, interiore abdominis membrana conuulnerata item de intestini, aut omenti procidentia. ubi etiam tractatur, quomodo uentris uulnera sanentur ex commentarijs Galeni. Cap. LII.*

**Q**uomodo peritonæi, hoc est, interioris abdominis membranæ uulnera optimè queas manu curare, deinceps uenit considerandū. Si igitur paruū adeò uulnus extiterit ut inflatum iam quod procidit intestinum remittere non liceat: necessarium est, aut flatū elicere, aut uulnus ampliare. Satius autem fuerit meo iudicio quod prius dixi agere, si modo id consequi possis At qua magis ratione id consequare, quàm si causam unde intestinū inflatur, è medio sustuleris? Quæ igitur ea est, nimirum, ambientis nos aeris refrigeratio: quare etiam remedium ex calore petetur. Itaq; spongia molli aqua calida madenti, mox expressa calefacere intestinum oportet. Præparetur autem interea uinum austerū calidum etenim hoc magis quàm aqua calefacit, ac robur intestino adijcit. At si per hæc intestini inflatio non cesserit, tanta peritonæi pars incidi debet, quanta id quod excidit, opus habet. Idonea uero ad eiusmodi sectionē habentur scalpella recta quæ Græci syringotoma uocant, id est, quæ ad fistulas incidendas sunt accommodatæ. Figura autē laboranti appolita fuerit, cum in inferiori parte uulnus factum est, si sursum uergat: cum in superioribus, si deorsum, & si in dextris uulnus sit, in contrariā partem corpus incumbet, si in sinistris, in dextram, atq; hoc tum magnis, tum exiguis uulneribus commune est. Cæterū cum intestina in proprium reponi locum debent, ex magno uulnere collapsa ministro dextro opus est: oportet n. ipsum, ubi manibus suis totum uulnus à foris apprehenderit, intro repellere, constringere ac exiguū semper fuerit denudare: quinetiam id quod consutum est, mediocriter



diocriter comprimere, quoad totum exactè persuatur. Porro quæ idonea suendi abdominis ratio existat, deinceps dicamus. Quoniam coire abdomen cum peritonæo conueniet, incipien- dum quidem à cute est, atq; ab externo introrsus acus demitti- tur: ubi iam & cutem, & rectum musculum totum transferit, præterito quod ei adiacet peritonæo, per reliquam huius par- tem eam ab interno extrorsum, atq; inde per reliquum abdo- men traiectabis: ubi hoc penitus pertransierit, rursus ab exter- no introrsum, idem abdomen perforandum est: mox ubi peri- tonæum quod illi quoq; adiacet præterieris, & ad oppositum perueneris, id quoq; ab interno extrorsum perpungi, unaq; eū eo totum ipsi cohærens abdomen debet. Deinde ab hoc rursus incipiendum, atq; id cum opposito peritonæo consuendum. Ac rursus uicina etiam cute traiecta, iterum ab ea parte acus in- trorsum est iniicienda, consuendumq; id cum opposito perito- næo, inibi quoq; uicina cute transmissa: atq; hæc iterum ite- rumque facienda sunt, quoad totum uulnus similiter consue- rimus. Interuallum uero suturarum quod ad compescenda ea quæ subsunt, pertinet, breuissimum esse postulat. Quod autem ad firmitatem requiritur, inter suturas cutis ne alibi rumpatur, utiliter breue non est, quare uitato utriusq; excessu, eligen- da mediocritas est. Iam hoc quoq; omnium ulcerum commu- ne quodammodo est, sicuti etiam ipsius quo suuntur, fili ratio. Quod enim durius est, cutem rumpet: quod mollius, confestim ipsum rumpitur. pari modo si proximè oras summas acū trans- egerit, quod reliquum est cutis, quoniam minimum est, dum uiolenter adducitur, rumpi cogitur. Sin plurimum ab iis reces- seris, non parum cutis inglutinatum relinquetur. Hæc licet omnium sint ulcerum communia, maximè tamen seruanda in abdomine suendo arbitror. Porro ipsum abdomen, aut quem- admodum est expositum, consuetur, huc diligentia adhibita, ut peritonæum abdomini coalescere possit: quod uix sperare au- deas, cum neruosum existat: aut sicuti quidā faciunt, qui quæ cognatæ naturæ sunt, ea committunt, utpote peritonæum peri- tonæo, abdomen abdomini. Id autem fiet in eum modum. A uicino nobis abdomine incipitur, atq; ab externo introrsum per id solum acus traiectatur. post præteritis utriusque perito- næi labris, ex obiecta parte à foris introrsum per utrunq; eius labrum acus reuocatur: dein hæc rursus reducitur, atq; ab inte- rioribus



rionibus foras per aduersum abdomen transmittitur. Hic modus à communi, & ex prompto, quo nimirum uno adactu per quatuor labra acus traicitur, id differt, quòd peritonæum totū intra abdomen prorsus recondit. Cæterum medicamenta ad hæc idonea materiæ illius esse debent, cuius sunt ea quæ cruentis iniiciuntur. Vt autem nulla pars principalior consortij lege doleat, lanam conuenit mollem oleo mediocriter calido imbutam toti, quod inter inguina & axillas est, circumdare. Præstiterit autem si per clysterem intestinis aliud simile infundas. Si uero nonnihil in ipsis quoq; intestinis conuulneratum sit: quod iniicietur, uinum nigrum, austerū & repens erit, eoque magis si totum usque ad interiorem meatū pertusum sit. Facile igitur curationem recipiunt intestina crassa: secus habent tenuia: ieiunum uero omnibus insanabile est, tum propter uasorum magnitudinem multitudinemq; tum quòd tunica eius prætenuis neruosaq; existat. accedit huc quod etiam bilem synceram totam recipiat: adde quòd omnium maximè iecori uicinum habeatur. Ventriculi porrò imè partes carnosæ ulceratæ curari cum fiducia debent, siquidem fieri potest ut res bene succedat, non solum quòd hæ crassiores sint, sed etiā quòd sedes medicamenti quæ illas curabunt, adhibendis in eo loco est accommoda. At ulcerum quæ os & gulam infestant, solo transitu medicamenta attingunt: quæ autem orificium ipsius obsident, ij sensus quoq; in illo acutus sanationi aduersatur. Cùm autē peritonæo rupto omentum prolapsum aut liuescat aut nigruerit, fune exceptum antequā nigrescat, ne sanguis profundatur, præcidere conuenit id quod post uinculum habetur, atq; ut in extremo inferiori iam cōmemoratæ abdominis futuræ uinculi fines pendeant, curabimus, quo scilicet facile eos cum ex uulnere suppurante eructentur, eximamus.

*Ad tegendam glandem colis si nuda est. Cap. LIII.*

**I**N quibus glans colis penuria cutis non contegitur, aliqui indecori gratia duplicem administrationis modū excogitant, nunc in superiore colis initio cutem orbiculatim secantes, ut facto ipsius diuortio, inferior cutis attrahatur, donec glans occultetur: nunc subtus interiorem cutem à glandis radice scalpello excoriantes, inde inferiorem trahentes, mox lintheo quodam molli ambicis præputium deligantes, ita ut lintheolum



teolum aliquod quâ cuti excoriata est, interponatur, ne præputium cum glande coalescat. Hunc modum Antyllus magis recipit, longiore ipsi oratione exponens. Nos autem summam dixisse contenti sumus, quoniam raro inter artis opera huiusmodi administratio requiritur, tum quod affectus nullâ minus obeundis difficultatem pariat, tum quod neque tantum indecori afferat, ut hac magis inquisitionem aliquam ex chirurgia deligas.

*Quomodo glans penis contecta aperiri possit, vitium dicitur hypospadiæon.*

*Cap. LIII.*

**P**lerisque glans ab origine non perforata est: uerum sub carne appellato quâ glans suspensa est, foramen habetur: unde neque urinam facere antea possunt, nisi particulam uersus imam uentris regionem, admodum inclinent, neque liberis dare operam, cum semen ipsorum in uterum rectâ non possit eiaculari. Omnium itaque simplicissimus tutissimisque curationis modus est qui fit per præcisionem. Itaque resupinato homine glans sinistræ manus digitis ualidè attolletur: deinde scalpelli acie ipsa iuxta coronam præcidetur, plaga non obliqua, sed sculpturæ simili, ut per medium eminentia quædam glandem repræsentans appareat. Quoniam uerò sæpe sanguis profundi solet, si fieri potest medicamentis ei retinendo dicatis sistemus, sin minus, tenuibus ferramentis aduremus.

*De phymo.*

*Cap. LV.*

**D**vplex phymi causa est: aliquando enim sic glandem præputium tegit ne nudari possit: aliquando retrorsum deducta reduci non potest. Hæc species propriè periphymosis dicitur. Prior itaque differentia, aut ex cicatrice quæ in præputio concreuerit, aut ex carnis incremento quæ illic coaluerit. Altera genitalium inflammationibus fertur accepta, quod abducta cuti retrorsum glans intumuerit, nec ultra præputium receperit. Si igitur prima phymi causa fuerit, curationem hoc pacto tentabimus: figurato homine, ut par est, præputium in anteriorem partem attrahemus, demissisque in summum ipsum hamulis tribus, quaternisque, ministris continendum exhibebimus, iubentes, ipsum quantum fieri potest, diducant aperiantque: deinde si ex cicatrice exterior collectio fuerit creata, scalpello ab interiore parte præputium in tribus quatuorve lo-

PAULI AEGIN.

C cis



cis incidemus lineis directis & æquali inuicem spatio distantibus, idq; intrinsecus: est autem duplex in glande præputium: os igitur ipsius ab interiori parte diuidemus, sic. n. contractione quæ ex cicatrice coaluit, dissoluta, præputium superinducemus. At si caro ab interioribus adnata phymum produxerit, carne tota ferro scarificata, præputium abstrahemus: carnem inter lineas eminentem rademus, postea plumbeum canalem glandi uniuersæ circumdabimus, inuoluta ipsi papyro sicca. Hæbeat autem canalis foramen undiq; æquale. sic enim huius circumpositi præputium adductum rursus coalescere prohibebitur, dum & à plumbo & papyro inuoluta distentium seruatur: intumescens enim ex deligatura magis adhuc cutem diducet. Hoc igitur faciundū est, siue ob cicatricē, siue carnis excresecientiam phymo generato manū adhibuerimus. Sin autē periphymosis appellata creetur, uetustate temporis coalescit, & curationem non recipit, nisi quis eo modo uelit tractare quem ad tegendam glandem usurpamus. Sin autem nondum coaluerit, uibicibus super ipsum rectis tribus, aut quatuor, aut etiam pluribus circulatim excitatis, oleo copiosiore tepido superfuso, extrorsum attrahemus.

*Si præputium glandi adhærescit. Cap. LVI.*

**G**Lans & præputium inuicem committuntur exulceratione præcedente. Conuenit igitur subtus cute, quantum licet, excoriata, acie scalpelli, aut spatula polypo accommodata, ea quæ resistunt dissoluere, id potissimum conantes, ut glandē purē à præputio adhærescente discernamus: quod si non fuerit expeditum, glandis potius nōnihil ad præputium assumere, quàm e contrario: cum enim præputium tenue sit, facile perforatur. Vbi commissurā dissolueris linteū tenue aqua frigida madens, glandi & præputio interponendum, ne rursus coalescant, uino astringente cicatricem ipsis obducemus.

*De circumcisis. Cap. LVII.*

**N**on de ijs qui religioso gentium more circumciduntur, nunc uerba faciemus: sed de ijs quibus affectu naturalium oborto, præputium nigrescit. Itaq; in ijs totum quod nigruerit, orbiculatim præcidi debet, deinde squama cū melle utendū, uel etiam malicorio, & eruo medicamento instar quod linteolis illinitur. Si uerò sanguis quandoq; profluat, fer

ramentis



ramentis lunatis candētibz utendū, quæ utrisq; simul iniiciantur, & ipsi sanguinis profluuiō, & uulneri depascenti. At si tota interim glans absumpta fuerit, exiguū ē plumbo canaliculū imponētes meatui, per ipsum ægroto urinā reddere iubebimus.

*De thymis naturalium.*

*Cap. LVIII.*

**T**hymi carnosā sunt tubercula, nunc in glande, nunc in præputio prouenientia. Ex his, alij maligni, alij nō sunt. Mitiores itaq; scalpelli acie deradere conuenit, & cicatridem ipsis inspergere: in malignis, eo quod uitiatum est, exciso, adustione utendum. At si ex opposito aduersoq; sibi inuicem in præputio fiant thymi, hi, intra ipsum, illi, extra, nō oportet omnibus ipsis confestim manum admoliri, ne præputium structura tenue, imprudenter pertundamus. Sed primū interiores auferre consiliū est, ijsq; cicatrice obductis, tunc quoq; exteriores aggredi. Nonnulli uerò recentiorū forfice ipsos auelentes equino pilo deligatos, curare solent, quemadmodum alij refrigerato ferro candenti eosdem deurunt.

*De catheterismo, & clystere uesicæ. Cap. LIX.*

**C**um urina non redditur, quod iter ipsius obstructum sit aut concreto intus sanguine, aut calculo, aut alia quadam causa, catheterismo id quod superfluum est eximemus. Sumpto igitur cathetere, ætati & sexui conuenienti, probè ipsum dirigemus, quod hoc modo fiet: lana exigua lino deligata per mediū, linoq; ex acuto iunco per catheteris fistulam traducto lanam foramini adaptabimus, quod iuxta catheteris mucronē est, ac forfice præciso eo quod ex lana eminet, catheterē in oleū demittemus, ægro in subselliū collocato, & fomentis si nihil prohibet, irrorato: catheterē in rectū inferemus usq; ad colis basim: deinde naturalia ad umbilicum inclinabimus, etenim ab hac parte obliquus uesicæ meatus existit, deinde sic cathetera adigemus. Quum uerò iuxta regionē inter scrotum, & anum, propè sedē fuerit, rursus genitalia imposto instrumento deflectemus, in naturalem reducentes figuram. nam à peritonæo uesicæ meatus sursum tendit, propellemusq; catheterē usq; dum uesicæ sinum penetrauerit: secundū hoc, linū catheteri iniectū retrahemus, quò urina simul cum lana attracta subsequatur, quemadmodū in syphonibus accidit: atque talis demittendi catheteris modus est. At quia subinde

C 2 exulce.



exulcerata uesica collui desiderat, siquidē auricularij clysteres, id quod iniiciendū est possint trāsmittere, illis in prædictū modum utemur, in uesicā demissis: si fieri nequit, catheteri pelle, aut uesica bubula adaptata, eoq; indito, uesicam colluemus.

*Quæ curatio calculosis adhibeatur.* Cap. LX.

**C**um alibi demonstratū sit quæ ex causa calculi generentur, tum, quod pueris in uesica magis: prouectioribus, in renibus crescant, nunc rationē exponemus, quæ excindi possint, ubi notas prius eorum qui uesica habentur, designauerimus. Vrina igitur aquosa est, quod in eis subsidet, arenosum: pundendū cōtinuo uexatur pruritu, laxatur sine ratione, rursusq; arrigitur, crebro id contrectant irritati ægri, & maxime pueri cum calculus in ceruicē uesicæ incidit, etiā repentē urina supprimitur. Porro inter eos quibus calculus excinditur, pueri quidē usq; ad quatuordecim annos propter corporū molitudinē, facile curationē recipiunt: senes, quod corpus ipsorū contumax sit, uix consanescūt: mediæ horū ætates etiā in hoc, medio quodā modo habēt ac rursus facile sanantur qui maiores calculos habēt, quod inflammationibus assuerunt: qui minores, difficulter sanantur, contrarias ob causas. Hæc cū ita se habeant, ad chirurgiam profecti, cōcussione utemur prius, interrim per famulos, interim ipso ægroto ex alto quodā loco deficiente, quod calculus ad uesicæ ceruicē propellatu, deinde figurari æger debet, ceu rectus in sedili, manibus subter femora porrectis, quod in angustū uesica compellatur. Si igitur cōtingenti bus nobis calculus in regionē scroti & ani intermediam proci dat concussione exturbatus, inde ad sectionem conuertemur. Sin minus occurrat, indicē sinistrae manus digitū, si puer sit qui ægrotat, uel etiā mediū, si ætatis sit prouectioris, oleo perunctum, in anū demitemus, & supinis digitis perquirentes, calculumq; occurrentē paulatim traducētes, in uesicæ ceruicē coarctabimus: & digito uno, pluribusq; propellētes ipsum in exteriora, impactū, ministro altero manibus uesicā premere iusso, alteri præcipientes dextra manu testiculos sursum teneat, sinistra regionē inter scrotū & anū mediā extēdat in alterā partē, ab ea qua sectionē moliemur: ipsi assumpto scalpello ad calculos aptato, inter anū & testiculos, non per mediū locū inter scrotū & anum, sed in alterā partem iuxta sinistriorē clunem obliquam



obliquam super lapidē qui subiicitur incidēdis, ducemus lineā, quā extrinsecus latū habeat spatiū, intus nō amplius, quā ut calculus per id queat excidere. Interim siquidem igitis super anū innixis, aut digito una cū sectione sine euulsione calculus leniter exilit. sin minus exilierit, unco huic rei accōmodo iniecto eximeinus. Calculo iam ablato, medicamētis sanguinem coercentibus ex fuligine thuris, aloē, symphito, uel ēt misy, & cōsimilibus sanguinis profusione sistētes, lanas, aut linamenta implicita, uino & oleo madentia imponeinus, & ligaminibus sex processuū ad calculos accōmodatis utemur. At si profluuij sanguinis metus, sit linamentū implicitū ex posca, aut rosaceo aqua admixta injiciendū est, & ægro decūbente crebrius locū perfundemus. Postquā tertio die solueris, & hydrelæo copioso irroraueris, tetrastapharmaco linteolis illinito utendū, ita ut frequētius ipsos soluas, curesq; propter urinæ acrimoniā. At si inflammatio quæpiā superuenerit, cataplasmatibus & superfusionibus ad eā inscriptis adiuuabimus, ac in uesicā rosaceū, aut chamæmelinū, aut butyrū nisi aliqua nos inflāmatio impediāt, demittemus similiter ēt si ulcus pascendo, aut alio quodā modo serpat, aut maleficū fuerit, singulis cōgruētia adaptabimus, cū ulcus inflāmatione caret, lauacrū adhibetur, inde emplastrum diachylon, tū lumbis tū imo uentri super accommodatur. Per totū uero curationis curriculū, femora inter se cōuenit deligare, & cū remediis requiescere. Sin exiguus calculus coli incidērit & per urinā reddi nequeat, præputium ualidē in anteriora attractū deligabimus iuxta glandis summitatē, itē posteriore parte pudēdi colē uinciemus, iuxta terminū ad uesicā spectantem cōstrictione adhibita: deinde infra colē diuidemus, super lapidē ipsum qui excidendis subiicitur, flexo autē cole calculū eiiciemus, solutisq; uinculis ulcus sanguine concreto uacuabimus. Posterius itaq; uinculum iniectum est, ne calculus retrorsum recurrat: antè, ne post calculum exemptum præputij soluti cutis in oppositum recurrens diuisionem contegat.

*De testiculorum partibus.*

*Cap. LXI.*

**P**Articularū quę circa testes habētur, finitiones cū ad rami cum incidendorū doctrinā cōferant prius describemus q̄ ad illā ueniamus. Igitur testiculus substantia quædam est glandulosa, fragilis, ad genitricem seminis effecta. At nervi testium,



stium, quos Græci parastatas & cremasteras ab eo appellāt, q̄ ex illis genitales partes depēdent, spinalis medullæ ex cerebri mēbrana propagines sunt, cū uenis arteriosis ad testiculos pertinentes, per quos semen in naturalia permeat. Seminaria aut uasa, uenæ sunt à caua uena in testiculos sinuosis anfractibus pertingentes, unde testiculi alimentū capiunt. irē tunica erythroides naturæ neruosæ, in gibba quidē parte, atq; anteriori, à testiculo libera est: in cōcaua & posteriore, ipsi adhærescit, ex peritonæo originē trahēs. Vocāt aut partē hanc qua testiculo adnata est, posteriorē prosphylin, quasi dicas adnexū. Darti uero mēbranæ sunt, quæ exteriorē testiculū cōglutināt, iuxta tunicā erythroidē dictam ei adhærentes: quibus partibus & illa post testiculos tunica adunitur. Hæc autē ipsa cutis exterior rugosa testibus circumdata, scrotum nobis Græcis oscheon dī.

*De aquoso ramice, hydrocele dicitur. Cap. LXII.*

**H**vmoris ociosi in particulis scrotū implicantibus collu- uies, tumorē excitās sensibilē, hoc nomē sortita est. Ita- que humor magna ex parte, in tunica erythroide appel- lata, testiculū ambiente, in partē anteriore colligitur, qua potissimū mēbrana illa à testiculo separāt. Raro extra mēbranā hanc erythroidē uitiū cōtrahitur. Subinde peculiari tunica hu- mor cōprehenditur: uocantq; hoc malū chirurgici in superad- nata ortū. Quare si ob causam præcedentē, exēpli gratia, par- ticularū imbecillitatē uitiū oboriatur, sanguis alimēti ratione adductus, in aquosam serosam uie, & inutile substantiam muta- tur: si ex ictu, sanguinea, aut fæculenta substantia cōprehendi- tur. Cōis igitur nota est, tumor indolens, firmus, ac stabilis in scroto, quacunq; tandē occasione nō euanesceus, sed in iis qui modicū cōtinent humorē, cedēs: in illis qui copiosum habēt, nō item. Ac quibus in erythroide tunica humor cōprehensus est, tumor rotūdus paululū, & oui modo lōgiusculus apparet. His testiculus in cōspectū nō uenit, ut qui undiquaq; sit impli- citus. Sin aut extra erythroidē mēbranā sub dartis habeatur, propter paucitatē particularū occurrit. At si humor in mēbra- na superadnata coierit propter cōtractionē ex omni parte, & ro tunditatē, tumor alterius testiculi imaginē exhibet: & cum a quosus humor exititrit, tumor cōcolor pellucet: cum autem fæculentus fuerit, aut sanguineus, aut rubicūdus, aut liuidus ap- paret.



paret. At cū in utraq; scroti parte hæ notæ apparuerint, duplicem ibi ramicē esse cognoscēs. hoc modo scalpello curantur: deraſa pube & scroto, niſi puer fuerit, ægrū ſuper ſedile reſupinabimus, podici panniculo multiplici ſubiecto, ſcroto autē ſpongia iuſtæ magni udinis, ac ſedētes à ſiniftra ægrotātis, miniſtro qui ad dextrā ſedebit, iubebimus ut genitale in alterā partem protendat, & cutē ſcroti ad abdomen eleuet, nos scalpello ſcrotum à medio iuxta lōgitudinē uſq; ad pubē ferè recta linea incidemus, quæ uicina ſit lineæ ſcrotū per mediū ſecanti, diuidemusq; tūc tunicā erythroidem. Porro ſi humor in adnata membrana hæreat, quā uertex eiſdē tunicæ eminet, illac diuiſionem moliemur. Hamulo autē oræ uulneris diducētur, & cultro ad hydrocelicos aprato scalpelloq; dartos detegemus, crudata uero erythroidi, scalpello quo uenæ incidi ſolent, mediam ipſam diuidemus. per illas potiſſimū partes, in quibus à teſticulo recedit. Humore iam toto, aut maiore ipſius portione in uafe aliquo excreto, erythroidē membranam hamulis eximemus, quā in fieri licet tenuiſſimā ipſius partē. Inde uerò Antylus ſuturis & medicina cruētis accōmodata uititur: recētioreſ ea, quæ q̄ carnē inducat, ſarcotice appellatur. At ſi teſticulus putredinē expertus aliōue modo uitiatus deprehendatur, uafa cū neruo, qui ab inguinibus dependet, cremāſtere dicto, fune excipiemus, ipſoq; cremāſtere præciſo, teſticulus eximetur. Itē in ijs qui duplici laborant ramicē, ſimiliter bifariā curationē moliemur, utrinq; per ſcroti partes ad inguina lineas incidentes. mox ſpecilli mucrone per diuiſionē deorſum ad ſcroti extremum demifſo, ipſoq; ſcrotū attollentes, acuto ſcalpro lineam qua humoris eſt emiſſariū, incidemus, ut & ſanguinem cōcretū & pus per eam excernamus, ipſo uerò ſcapelli mucrone linamentū in longitudinē implicitū ſuperiori diuiſioni inferemus, & uibicibus per ſpongiā deterſis lanā oleo madentē per ſectionem infra ad teſticulū, inſinuabimus, extrinſecus alias lanas uino & oleo imbutas ſcroto, imo uentri, inguinibus, regioni inter ſcrotū & anū & lumbis ſuperiniſciebus, ac ubi linamentum triplex ſuper hæc implicitū deligauerimus uinculo in ſex proceſſus expotrecto, congruiſq; faſciis, homo decūbet lanis ſcroto ſubiectis, ut cōquieſcat, pelleq; ſuper ipſas molli explicata, quo fomenta excipiantur. Superfundemus autem oleo calente, uſq; ad triduum. poſt hoc ubi ſolueris, tetrapharmaco lin-



teolis illito in uulnere, uteris, linamentum in longitudinē implicatum ex farinaceo polline superaccomodans. extrinsecus fomenta rursus propter inflammationē usq; ad diē septimum injiciuntur: inde medicamēto quod linteolo sernetur utemur. Vulnere expurgato, & carne iam mediocri obducta, deinceps etiā lauacris adhibitis linamentū in longitudinē implicatū auferri debet, & reliqua curationis parte subsequente, quēadmodum prius explicatū est, utemur. At si inflammatio quāpiā fuerit, aut sanguinis profluuiū, aut aliquid eiusmodi interea superuenerit, cōuenienter unicuiq; occurrere cōuenit, ne semel dicta iterū repetā. Si uero uisionē potius in aquoso ramice, sicut recentioribus uisum est, adhibeamus, omnia quæ ante chirurgiam, & post eā dicta sunt, exequemur, ipsum uero chirurgiæ opus sine ferro tantū & diuisione per humoris emissariū fieri debet. Decem itaq; aut duodecim ferramētis literā græcorum Γ imitātibus, & duobus gladiolis primū scrotū ferro Γ referēti per mediū aduremus, cultello aut, aut cæco hamo membranas excoriantes ferramēto ensi simili, has ceu præcidentes, aduremus. Nudata uero tunica erythroide, faciliē aut cum alba & tenuis existat, cognoscitur, acie ferramenti instar Γ literæ facti perurentes humorē excernemus, postea totam ipsam detectā hamulis attolentes, ferramento gladiolo simili auferemus.

*De carnosio ramice & tephaceo. Cap. LXIII.*

**C**aro in particulis quæ scrotū implicant alibi succrescēs carnosum ramicem producit. Nascitur aut ea, ex causa latēte, testiculo fluxionem scirrhumq; experto, aut exitu, aut imperita post ramicis succisionē curatione: subsequitur aut hos color ubiq; sui similis cū duritia. Si aut tumor in scirrhum coaluerit, nullus nec color, nec sensus adest: si malignus sit, dolor urget punctorius. Itaq; manū admoventes egro, figurabimus ipsum, sicut & prius, diuidemusq; similiter, & si quidem ex generata carne, uitiū testiculi creatū sit, & darton membranā & erythroidē cōsimiliter discindemus, deinde testiculo eleuato, eoq; extra erythroidē exēpto, cremastere segregato à uasis, hęc quidē cōstringemus, illū uero nēpe cremastere amputabimus: testiculū aut qui cū adnata carne coaluerit, ceu alienum eiiciemus. Sin hęc carnis generatio in tunica aliqua, aut, uase fiat, scroto diuiso subiectisq; carni membranis, totum



totum quod in carnē cōcreuit auferemus, q̄ si posterior commissura carne fuerit obducta, iis quæ ambiunt ipsam ademptis testiculū simul cū ea excipiemus: quippe fieri nequit, ut testiculus sine hac permaneat. Cæterum tophi & in testiculo & in membrana erythroide occalescūt, renixu multo, duritie, & inæqualitate à carnosio ramice & aquaso discreti. His igitur manum sicut etiam carnosio ramici admoliermur.

*De uaricoso ramice & uentoso. Cap. LXIII.*

**V**asa in scroto, aut dartis mēbranis, dilatata, uarices simplici uocabulo nomināt. Alia uero quæ testiculum nutriunt, si uaricū more dilatentur, uaricosum ramicem, Græci cirrocelen uitiū nuncupant. Notæ horū euidentes sunt, quippe pars affecta tumidior, obliqua modicè uuæ in modū, & testiculi relaxatio antea apparet, tū aliæ nonnullæ in agendo difficultates maximè in cursu, exercitio, & itinere. Hoc modo curamus: ubi cōmodè ægrum figuraueris, scrotum manu permulcetur, neruus cremaster in partē inferiōrē repellitur. Facile aut is dinoscitur, ut qui tenuior uasis sit, solidior, renitēsq; ceu potēs ualidusq; æger quoq; ad depressionē ipsius indolet, & iuxta colē turbatur: uasa aut digitis nostris & ministri excepta in scroto, ualideq; distenta, acie scalpelli obliqua adacta supra instrumentum quod uasis cedendis supponitur secabimus. deinde per hamulos ea quæ cuti subiacent eleuata excoriantur. uasis ut in capite de angiologia & aneurysmatis disputatū est, denudatis, acus duplex linū trahens transmittitur: ansaque lini abscisa, uasa & in prima ipsorū dilatatione & inferiori extremo fune deligabimus, & per mediū recta incisa linea, & sanguine qui coierat euacuato, medicina ipsos curabimus quæ pus moueat, ut et funiculi cū uasis sua sponte excidant. Leonides autem præcipit, q̄ si aliqua ex uasis testiculū nutrientibus dilatata fuerint, hoc modo esse faciendū: sin autē omnia, testiculum cū ipsis capi oportet, ne uasis alentibus destitutus contabescat. Porro uentosus ramex, quū genere aneurysma existat, Leonidi quidē nō attingendus uidetur, propter periculū quod in uaricibus ab incessabili sanguinis profluuio accidit. Recentiores autē quum duplex ipsius sit generatio, alia ex quatuor uasis testiculum alentibus, alia ab arteriis darton membranam & scrotum intercurrentibus: hunc quidē ceu desperatæ salutis,



tis, repudiant : illum priorem scalpello curant, discernimus autem ipsos, quod qui ab arteriis enascitur, facile ad digitorum constricti onem euanescat, qui à uenis testiculum nutrientibus, aut neutiquam, aut cum multo metu. Cæterum curamus ipsos, ut in uaricosis ramicibus comprehensum est, singulas uenas fune excipientes deligantesque.

*De intestinorum ramice.*

*Cap. LXV.*

**I**ntestinorum ramex, quem Græci enterocelen dicunt, est cum intestina sunt in scrotum deuoluta : id quod fit aut peritonæo circa ilia dirupto, aut eodem extenso. utraq; igitur, ruptura (dico) & extensio ex uiolenta quadam occasione præcedente proueniunt, nempe ictu, aut saltu, aut clamore. At qui laxationi fertur acceptus, propriè & propter resolutionem & alias corporis imbecillitates. accidit. Notæ utriq; communes sunt : conspicuus in scroto tumor : item q̃ in exercitiis, itinere, spiritus retentione, aliisq; occasionibus, idē maior quàm prius euadat : cōpressus, tardè quidem recurat, celeriter autē rursus deuoluatur, supernè intestinū resupinatis in loco permaneat, donec exigantur. Stercus autem in scrotum receptū periculum subinde ipsis intulit : dolent enim, nonnunquam etiā impressis digitis sonitum elidunt. Peculiaria ramicis ad relaxationem relati indicia sunt, q̃ ob causas quolibet, nonnunquam intestinum deuoluatur, tumor æquabilis & profundus appareat, intestino quod deuolutum est, peritonæo constricto. Ex ruptura facti ramicis signum est propriū, q̃ una uice ac subito ab initio intestinum deuoluatur, idq; ob causas uiolentas duntaxat : q̃ tumor immensæ magnitudinis, inæqualis, & per summa protinus in cute emineat, quoniam intestina extra peritonæum elabuntur. Si igitur rupto peritonæo omentū duntaxat in scrotū inciderit, uitium omenti ramex, Græcis epiplocele appellatur : si intestinum quoq; delabatur, omenti intestiniq; ramex, Græcè epiploenterocele dicitur : si uero & aqua in tunica erythroide apparuerit, cōposita ex tribus quoq; appellatio sumitur. Cæterū neq; hos, neq; ex ruptura intestinorum ramicē chirurgiæ subiicimus, solum uero ex relaxatione ramicē intestini manu curamus, hūc in modū. homine resupinato & cute iuxta inguina per ministrū eleuata, trāsuersam lineā incidimus, ut in angiologia explicatum est. Nonnulli uerò non



non trāsuersam, sed rectā lineā ducūt, hamuloq; defixo diuisionem explicant, quæ testiculū retractū mēsurā adæquet, deinde rursus tot hamulis per quartā cutē transmissis quot uulneris magnitudini sufficiant, cæco hamo, aut cultro membranas & pinguedinē subtus excoriantes, scalpello præcidimus. detecto aut undequa; peritonæo, demissoq; indice digito ad posteriorem scroti partē inter peritonæū & dartū membranā, posteriorem cōnexū soluemus, deinde dextra manu extremum implicantes ad interiora scroti, simulq; sinistra peritonæū retrahentes ad diuisionē retrahemus testiculū una cū membrana erythroide, ac ministro uni iubebimus testiculū eleuet, ipsi uerò posteriorem adnexū ex toto simul cū membrana erythroide dissoluentes, explorabimus digitis nū intestini inuolutio quædam in tunica erythroide relicta sit, & infra hanc ad aluū propellemus, deinde acu bonæ magnitudinis linū ducente duplex, decies implicitū ad peritonæi terminum qui diuisionē respicit per mediū trāsuemus. † Succisis aut linis quatuor faciemus inīria, atq; his per uinculū rursus implicatis, utrobique peritonæū ualēter dstringemus, iterumq; initiis circumuolutis, astringemus quidē strenuē, ut nullū ex uasis nutrientibus adhuc possit cedere ne inflāmatio inde cōcitetur, itē secūdum extrinsecus uinculum iniiciemus minus quā duos digitos à priori distās; Post hæc uincula digiti instar ex peritonæo relinquentes, totum ipsum orbiculatim præcidemus, auferētes simul nimirum & testiculū: rursus diuisione iuxta emissarium scroti adhibita, linamētum in longitudinē implicitum iniicitur, & fomētis oleo imbutis uinculisq; ut in aquoso ramice iniectis, oīa quæ restant, quēadmodum illic expositum est, perficiemus. Nōnullos autem nō imperitos chirurgos noui, qui membrana erythroide excisa, ferramētis cādentibus extremum ipsius adurent sanguinis profluuij metu, ut est uerisimile. Hi autem ipsi post scalpelli administrationem ægros protinus in folio oblongo ligneo, cui aqua inesset calida ad septimum diē usq; lauabant, quinquies per diem noctemq; id facientes, præsertim in pueris, & mirificè res processit: nā citra inflammationem ipsi secabāt, & funiculi una cum corporibus protinus decidebant. Interea uero dum ægri lauabāt, prædictæ superfusiones iniiebantur. Alius quispiam præter cōmemorata etiam pipere trito cum oleo ceruicem ipsorum eodem tempore infricabat.

†Hic



†Hic locus sic legitur in ueteri cod. κόψαντες δὲ τὴν δαιπλόην τέσσαρας ἀρχὰς ποιήσωμεν, καὶ ταύτας κατὰ χιασμὸν ἀντεμ-  
πλέξαντες ἐξ ἀμφοτέρων, i. postquam sciderimus duplicatum  
linum quatuor capita faciamus, & his decussatim implicatis ex  
utraq; parte peritonæum ualidè constringamus.

*De inguinum ramice, bubonocèle uocatur.*

Cap. LXVI.

**I**n testini ramice ex relaxatione creatū, inguinū hernia præ-  
cedit: primū. n. peritonæo nimis inteso, intestinū laxatum  
tūc quidē in inguina abscedit, facitq; ramicē, quē Græci bu-  
bonocelen dicūt. Hūc uetustiores in eū modū scalpello curāt,  
linea trāsuerſa per inguina intumescētia, tres digitos lōga inci-  
ditur. Hinc mēbranæ & pinguedo eximūtur, aduerso autē specil-  
lo peritonæo per mediū detecto qua fastigiāt adigi debet, id n.  
intestina in altū repellit. Itaq; peritonæū intus restitutū utro-  
biq; aduerso specillo, suturis inuicē cōmittemur, deinde specil-  
lum extrahemus, neq; peritonæū præcidētes, neq; testiculum,  
neq; aliud quippiā rerinētes, sed præsidio cruentis idoneo per-  
sanātes. Qm̄ uero recētiores uſtionē potius in inguinū rami-  
cibus probarūt, hāc quoq; non præter institutū trademus. Ho-  
mo mediocriter moueatur, tussī uiolēta, intēctione, spirituq; re-  
tēto. ubi tumor in inguinibus apparuerit, locū qui uri debet,  
atramēto scriptorio, aut collyrio, figura triāgula circumscribe-  
mus, trāsuerſam lineam per inguina sursum ducētes, inijcie-  
musq; signū per trianguli mediū. postquā æger decubuerit, cā-  
dens ferrū per mediā notā imprimemus, primū clauatum, inde  
per triāguli costas Græce Γ literæ figurā representans, tertio  
laterculari, aut lenticulato totū triangulū adæquabimus, mini-  
stro per totā uſtionē sanie panniculo extergente: tā altè ue-  
ro aduremus quousq; pinguedinē pertingamus, idq; in habitu  
corporis moderato, neq; n. in gracilibus ob siccitatē ferrū al-  
tius admouendū est, ne imprudentes peritonæū aduramus, ne-  
que tamē in crassioribus pinguioribusq; in quibus uel ante iu-  
ſtam uſtionē pinguedo apparet, sed quantum uti conueniat ar-  
tifíciosa deprehendemus coniectura. Secundum uſtionem sal-  
ua cum porro tritus crustæ insinuabitur, & inguinatio in lite-  
ræ Χ similitudinem ligamento utemur, per inſequētes dies re-  
mediis crustā adimūt, nēpe phacomelite & similib⁹ curabimus.

De scioto



*De scroto attenuato, laxoque attritorum panniculorum modo.*

*Cap. LXVII.*

**L**Axata scroti cute siue interioribus ipsius particulis uitium maximè indecorū gignitur, quod Cræci racosin appellāt. Leonides igitur resupinato homine, quod in ea superfluum erat scalpello super asserē, aut durū coriū, quod incidendis subijcitur excidebat, orasq; uulneris suturis committebat. Antyllus autem tribus etiam quatuorve suturis superfluum cutem prius punctam forfice acuta aut scalpello post suturas auferēbat, suturisq; adunitam ut ciuenta.

*Quomodo fiant eunuchi.*

*Cap. LXVIII.*

**C**um ars nostra huc tēdat, ut corpora à statu qui præter naturā est in naturālē deducat, eunuchos faciēdi ratio, quam Græci eunuchismū dicunt, contraria promittit. uerum quia & inuiti subinde à præpotentibus quibusdā eunuchos facere cogimur, explicandus cōpendiosè modus est, quo illis satisfaciamus. duplex itaq; est, alter contusione, alter excisione perficitur, & prior quidē in hunc modū. Pueri adhuc infantes. in aquæ calidæ soliū collocantur: deinde ubi corpora eodem folio fuerint relaxata, digitis testiculi premuntur, usque dum aboleantur & euanescent, dissoluti non amplius ad tactum occurrant, Excisione hac ratione efficitur: Resupinatur in sedili qui eunuchus fieri debet, & scrotū cū testiculis sinistrae manus digitis premitur: quo facto duas lineas rectas unā per alterū testiculū scalpello incidēs: ubi exilierint testiculi cute detracta execabuntur, ita tenuissimū solū naturale uasorū commercium relinquatur, atq; hic modus, eo qui per contusionem fit magis probatur. Nam qui contusionē testiculorum sunt experti, nonnunquam uenerem appetunt, parte aliqua ut uerisimile est testiculorum inter contundendum delitescēte.

*De hermaphroditis.*

*Cap. LXIX.*

**H**ermaphroditon uitium ex compositione Mercurijs, Veneris appellatum est, multū utriq; sexui adferens indecori. Cū. n. quator Leonide autore differentiae existant, tres quidē in uiris, una in mulieribus constituitur. In uiris siquidē aliās iuxta regionē inter scrotum, & anū aliās in medio scroto muliebris pudendi pilis obsiti forma apparet. Tertia uero ad hæc accedit in qua nonnulli ueluti ex pudēdo quod in  
scroto



scroto est urinā profundū. In mulieribus supra pudendū iuxta pubē uirile frequēter genitale inuenitur tribus quibusdā extantibus corporibus uno tanquā cole, duobus autē ueluti testiculis. Tertia itaq; uirorū deformitas qua urina per scrotū excernitur, curationē non recipit, reliquæ tres curantur corporibus superuacuis è medio sublati & ulcerum modo tractatis.

*Quomodo nymphea excidenda sit, & cercosis emendanda.* Cap. LXX.

**C**Aruncula in sinu muliebris pudendi subsultans Graecorum lingua nymphe dicitur: quibusdā immensæ magnitudinis efficitur, & non decentis inuerecundiæ notam præse fert. Quemadmodum uero nonnulli memoriæ produnt, sunt quæ hanc partem arrigunt, uiris similiter, & in uenerem ruunt. Quapropter resupinata muliere uulsella nymphæ superfluum prehensum scalpello exindimns: diligentia adhibita ne altè ipsam penetremus: unde fluidus affectus, rhyda uocant, excitetur. Porro cercosim, cum sit carnis ab uteri ore propago quæ muliebre pudendum repleat, interim foras caudæ modo procidat, nymphæ consimiliter auferemus.

*De muliebrum locorum thymis condylomatibus & hæmorrhoidibus.* Cap. LXXI.

**T**Hymus eminentia quædam est, nunc rubens, nūc alba, plurima parte sine dolore, thymi corymbis similis: condylomata uero, excrescētiae sunt rugosæ, quemadmodū hæmorrhoides ijs quæ in ano sunt respondētes, interim & sanguinem profundunt. omnes itaq; eiusmodi in mulieribus excrescentias, quæ in conspectū ueniunt, inter detegendū uulsella cōprehensas, ferramenti quod ex dimidio spathā refert, acie excindemus, utemurq; galla leuigata, aut scisso alumine. Nam è lino deligaturam in his maiores chirurgi non admittunt.

*De non perforatis & phymo.* Cap. LXXII.

**G**enitales mulierum partes clauduntur, interim ex natura, interim ex accessorio, morbo quodā præcedēte, aliàs in imo, aliàs in alis, sæpe etiam in medio spatio, idque aut secundū naturā aut ex obstructione. Quod autē foramen intersepit intercluditq; uel caro uel membrana est. Cæterum hoc mali graue fit impedimentū, modo in coitu, modo in conceptu



ceptu uel puerperio, aliquādo mēsum purgatione, si quæ loca obstruit caro totum spatium occupauerit, in quibusdam. n. me dium foramine patescit Causa igitur inuenta, uel ex promptu uel etiam demisso speculo, si quidē cōmissura solū fuerit, hanc recta linea scalpello fistulis accommodato dissoluemus: sin autem distentio; hamulis per mediū corpus siue id membrana siue caro existat transfixis eleuatum, scalpello diuidemus, ac sanguinis fluore medicamentis sine rosione siccantibus suppressio nis quæ cicatricem ducunt utemur, pestarium aliquo cicatricem inducente unctam subiicientes, in quibus potissimum non al- tē admodum administratio est adhibita, quod ea de causa fiet, ne particulæ rursus coalescant. Iam phymus in ostio uulvæ succrescens pari modo curatur.

*De abscessu uulvæ.*

*Cap. LXXIII.*

**V**Bi abscessus circa os uulvæ prouenerit qui manu tra- ctari queat, non promptē ad sectionē properare confi- lium est, sed cum affectio fuerit absoluta, inflammatio plurima parte increuerit, corpora quæ humoribus incumbūt, attenuata, idq; propter uteri excellentiā. Inter agendum uero mulier in sella resupinabitur cruribus ad abdomen, & femina contractis, inuicē diuaticatis: cubiti ipsius sub poplitibus subii- ciuntur, & funiculis congruentibus ad cervicē deligabūtur, me- dicus autē ex dextra sedens tentabit speculo, quod dioptrā di- cunt ætati accōmodato. conuenit autē specillo sinus muliebris altitudinē metiri, ne maiori speculi tridente, uterū premi con- tingat, & si amplior ille sinu reperiatur, linamēta implicita alis imponuntur, ut super ipsa speculū firmetur. Cæterum cōuenit speculi tridentem qui testulam habeat, in superiore parte intro- demittere, & specillū à medico cōtineri, testulā à ministro con- uerti, ut laminis tridentis diductus sinus aperiatur. Iam uero si abscessus occurrens mollis & tenuis existat, qui digiti tactu sub- sidet, iuxta uerticē diuidetur spathula, aut specillo: ori uulvæ pure uacuato, linamentū in longitudinē implicitū, lemniscon- dicunt, tenerriimū ex oleo rosaceo imponetur, uel potius ex- tra diuisionē sinui muliebri sine compulso inseretur. Extra ue- ro summās oras & super pectinem lumbosq; lanæ succidæ aut puræ, oleo madētes accōmodabuntur. Tertio die insidebit mu- lier in hydrelzū calidū, aut malvæ decoctū: absterfis sudoribus linamentum



linamentum in longitudinē implicitū in fissuram tetrapharma-  
co per se, uel cum discocto melle inunctum leniter insinuabis:  
erit autē solutum butyro aut rosaceo, exterior regio cataplas-  
matis obducetur dum inflammatio cessauerit, & uulua absces-  
su purgata fuerit. Sin autem difficulter expurgetur, collui de-  
bet auriculario clystere ex iridis decocto, aut aristolochiæ aut  
melle. Cicatrix duci debet emplastro ex cadmia, soluto uino  
per linamentum madidum. At si intra os uulux abscessus fue-  
rit. Attingi non debet.

*Qua ratione partus ex utero excutiat excida-  
turque.* Cap. LXXIII.

**Q**uomodo ægrè parienti succurratur tertio uolumine  
tradidimus: sin autē eo nihil proficiatur, ad chirurgiā  
merito diuertimus, id primū notantes, mulier super-  
stes ne futura sit, an minus: & si quidem salus speratur tunc ma-  
num admolierur: sin contrā, attingi non debet. Quæ igitur  
perniciem sui portendunt, in expugnabili dormiendi necessita-  
te ut in lethargo sopiuntur, resolutæ sunt, & uix possunt excita-  
ri, ac si excitentur, imbecilliter respondentes, rursus graui so-  
pore præmuntur. Nonnullæ conuulsionis modo contrahuntur,  
aut neruis cōmouentur, aut alimentū non sentiunt, pulsus ua-  
lidè inturgescens deprehenditur, sed languidus & imbecillis:  
quæ incolumes futuræ sunt, nihil eiusmodi patiūtur. Oportet  
igitur resupinam mulierē in lecto sic collocare, ut figura ipsius  
magis sit decliuis, crura ipsius elata mulieres utrinq; cōtineāt,  
aut quædā ministræ. Si uerò non adfuerint, mulieris thoracē  
uinculis quibusdā lectulo adfirmabunt, ut ne corpus attrahen-  
tes sequens, tractionis uim dissoluat, ac alis uulux diductis, per  
ministrū † sinistram manū contractam cum ualentibus digitis  
extenuatis, in ostiolū inferemus, idemq; pertētabimus, & oleo  
infuso relaxabimus disquirentes ubi uncū quo foetus extrahe-  
tur, defigi conueniat. Idonei uerò loci sunt quibus iniicietur, si  
in caput conuersus infans descendit, oculi, occiput, os iuxta pa-  
latum, mentū, clauiculæ, & sub costis sitæ regiones, adhuc præ-  
cordia, quæ Græci hypocondria appellant: si in pedes conuer-  
titur, ossa super pubem extantia, intercostalia, clauiculæ rursus  
& deinde uncus dextra manu continebitur, flexu ipsius digitis  
occultato, sinistra manu leniter inferemus, & particulæ cuipiā  
ex



ex prædictis usq; ad uacua transmittemus. huic alter opponetur, quod attractio recta procedat, neq; alterâ in partem inclinet, deinde æquabiliter trahetur non solû recta, sed etiam in latera quemadmodum in dentibus eximendis fieri solet, & tensionem interea remittere iterû non conuenit, postea uerò indicem digitû unctum, aut etiam plures demissos inter os uulvæ & corpus impactû, orbiculatim circumagere, ueluti excorians: si autē iuxta rationē uncus subsequatur, in superiora transferre cōueniet, atq; sic agere dum perfecta fœtus sit extractio. Si autē manus obiecta fuerit, nec propter obstructionē queat conuerti, circumposito panniculo, ne reuoluatur, modicè attrahere oportet, ac prolapsam totam ab humero abscindere, idemq; facere etiam si duæ manus prociderint. similiter etiam pedes procidentes, corpore reliquo nō subsequente, ab inguinibus amputari oportet: deinde reliquum corpus dirigere cōnandum. At si caput iusto maius obstructionē pariat, & hydrocephalon sit, id est, aquâ in capite infans collegerit, spatula polypis dicata, aut scalpro, aut cultro quod scolopomechæron dicitur, inter digitos occultato, caluariâ diuidemus ut uacuata concidat. q̃ si naturaliter amplû sit caput, similiter diuisam caluariâ forcipe qua dentes aut ossa extrahuntur, cōprimemus. Si ossa emineant, hæc quoq; auferre ratio est. At si capite ad thoracem adactò, obstructio prouenerit, eodē instrumento clauicularum compages usq; ad interiora spatia diuidentur, ut humore uacuato thorax concidat & collabatur: quòd si non concidat, diuisas etiam clauiculas ipsas auferemus, tunc. n. collabatur. Porro si imus uenter mortuo fœtu sit inflatus, aut aquam subter cutē collegerit, eadē ratione ac uia eum uacuare cū ipsis interaneis aggrediemur. Cæterû si in pedes deferuntur, fœtus declinati facile ad uteri os diriguntur: quòd si iuxta thoracem aut abdomen fuerit impactus, linamento ipsum attraheamus, eodemq; modo ea quæ ambiunt, diuidemus. At si reliquis ablatis caput ad superiora reuersum inhæserit firmitus, sinistra manus demittetur in uterû, & si os ipsius pateat, manû in ima transferemus, ac caput inuestigatû digitis ad os deuoluemus: deinde uncum unû aut alterû defigētes, propter orificij inflammationem non propellemus, sed infusionibus pinguibus copiosissq; utemur: itē infusibus, fomentis, & cataplasmatibus, ut d' ducto ore auferatur, quemadmodum superius cōprehensum est.

PAULI AEGIN.

D

Porro



Porro latera foetus, si quidem in rectū diriguntur, praedictis utemur rationibus: sin minus, totū ipsum intus dissectū particulatim extimemus, cura adhibita, ne particula quæpiā ipsius nobis nesciis intus relinquatur. Postquā manu scalpelloq; administrationem obierimus, remedijs ad inflammationem inscriptis utendum est. quod si profluvium sanguinis oboriatur, huius quoq; curationem accepisti.

† Huius loci multò uerior est scriptura in ueteri codice, τὴν ἐξώκον χεῖρα συνγκμένην μετ' ἐνδῶτων δακτύλων λελιπασμένην, id est, dextram manum contractam cum fortibus digitis pingui aliquo inunctam, &c.

*Si secundæ fuerint relictæ.*

*Cap. LXXV.*

**F**oetu excussio frequēter accidit, ut uelamentū illius in utero firmiter adhærescat, quod nostri secundas, Græci chorion, & deuterion appellant. Diducto igitur uulvæ ostio, secundæ quæ inibi relictæ sunt, & in partē aliquā orbiculatim conuersæ, facile educuntur. Manu siquidē sinistra calida, inunctaq; in fundum demissa, secundas sublabentes oportet eijcere. Si autē fundo uteri fuerint adnatæ, demissa similiter manu comprehendentes tendemus, neq; in rectū, ne uulva procidat, neq; uiolēter admodū, sed leniter primum deducemus, huc illuc circumagentes, deinde paulo ualētius. hoc. n. pacto obsequuntur & à connexu dissoluuntur. Quod si uulvæ os conuiere fuerit deprehensum, remedijs ad hoc cōmemoratis utendum est. Si uires nō fuerint inualidæ, etiam iis quæ sternutamenta prouocant, & aromatum halitu ex fecili uapori conueniet: & si os uteri diductum sit, manu inserta, secundos ut dictū est extrahere conabimur. At sine sic quidem exemptæ fuerint, terrere nos non debet, secundum paucos. n. dies putrefactæ & in saniē resolutæ excidunt. Quia uerò grauitate odoris & caput opplent & stomachum peruertunt, suffitus conuenientes excitabuntur: ad eos autem cardamomum & ficus aridæ commendantur.

*Quomodo coxendices adurantur. Cap. LXXVI.*

**Q**uemadmodum humerus, ita etiam coxa propter humiditatis copiam nonnullis excidens, uisionē postulat, quod Hippocrates his uerbis testatur. Quibus coxa ea diuturno ipsius cruciatu loco suo mouetur, crus conbescit & claudi fiunt, nisi uisionem experiantur. Conuenit igitur



tur tunc illum præsertim locum adurere, è quo articulus excidit: sic. n. humor redundans desiccabitur, & locus cicatrice densatus non amplius os suspiciet, quare etiã penitus illic ustionem moliri conuenit. Recentiores autẽ tres crustas adhibent, unam retro urentes in acetabuli sinu, alterã supra genu extrinsecus, & tertiam supra exteriorem talum, quã est carnosior.

## De fistulis &amp; fanis.

## Cap. LXXVII.

**C**VM locus postulet de ani fistulis differere, nihil mali fuerit prius generatim de omnibus fistulis uerba facere. Itaq; fistula sinus est callo obductus, aliquatenus indolens, in pluribus nascens particulis, magna uerò parte ex abscessibus oritur parũ dextrè curatis. Callus autẽ continua quãdam caro est, albida, madoris expers eoq; etiam doloris, neque uena, neq; neruo ad ipsum pertinente Interim sinus siccus, interim humidus est, nunc humor incontinenter fluit, nunc certis quibusdã temporibus remittit, ore ipsius oppleto iterumq; adaperto: Alias fistulæ in os desinunt, aliàs in neruum, aut aliã quampiam principẽ particulam, uel rectè intus tendentes, uel oblique, item uel uno ore, uel pluribus peruix. Quæ igitur in grandes arterias aut neruos, aut tendines notatu dignos, aut membranã costas succingentẽ, aut aliquam principalẽ particulam deueniunt, uel nequaquã, uel certe, cum artificiosaq; diligentia attingere debemus reliquis hunc in modũ manum ad moliemur, primum tentabimus, si quidem rectè intus tendant, cultro excisorio: si oblique, specillo duplici cuspide, flexili. Huiusmodi autẽ sunt quæ ex stagno fiunt, itẽ ex ære tenuissima. In quibus autẽ duæ pluresue oræ habentur, notationi per specillum non obtemperantes, sinu per unum ipsius orificiũ adusto, ex clysteris in reliquas oras transitu deprehendemus, num una fistula sit pluribus oris dehiscens, in plures: ac ubi tentatũ est, siquidẽ per summa habeatur sinus, arctusq; sit, demisso specillo explicantes, scalpello figura cõmodiore callum tollemus, aut unguibus, aut acie scalpri deradentes: at si latitudinem habeat, corpora superflua, tolli debent: sin autẽ non summa occupauerit, sed penitus rectè tendat, eo quatenus licet in alto diuiso, orbiculatim totũ callum auferemus: quod si reliquæ ipsius aliquæ remanserint, medicamento adurente eas consume mus, quod si amplius quũ sit medicamento non cedat, ferro can-

D 2 dent e



dente crustas ei inducimus. Cæterū si fistula in os terminatur, hoc idē quod integrum est, duntaxat rademus: ubi uero cariem aliamve quandā corruptionē experitur, quod uitiatū est, totū excisorijs, aciē inter sese oppositā habentibus tollemus, si opus sit, prius terebra perforatū, siue ad perspiratū duntaxat, siue ad medullam usq; fuerit uitiatum. At si os quoq; emineat, caulis modo porrectum, serra ipsum adimemus. Sumptis itaq; duobus loris, unius quidem medium ossi, eminenti subijciemus, ipsumq; per ministrū attollemus: alterius autē quod crassius est, uel ex lana quoq; factum, similiter medium carni quæ ossi subiacet adaptantes, initiaq; infrā prehendentes, per ipsum lorum carnem deorsum iubebimus detrahi, ne ipsa serræ dētibus peraradatur, atq; hoc pacto nos excretionē molimur. Vbi uerò particula quæpiam princeps subiecta est, exempli gratia, membrana costas inuoluens aut spinalis medulla aut eiusmodi aliqua, inter excidendum aut serra concutiendū os, lamina, quæ quod membranam cerebri custodit meningophilax græcè dicitur, subijciemus: non uitiato autē osse, totum orbiculatim carne nudum serra eodē modo deradetur. Fieri nanq; haud potest, ut ossa circularim implicita carne obducantur. Simili ratione si ossis terminus prope articulū fuerit uitiatus, idam serra auferri debet. At si totum subinde os, nempe cubitus aut radius aut tibia aut eiusmodi aliquod contabuerit, totū adimetur. Femoris autem caput, aut coxa, aut spinalis medullæ uertebra affecta, attingi non debet, periculi quod ex arterijs adiacētibus accidit euitandi gratia. Hoc igitur modo ac uia faciendū est, in singulis ubiq; particularum uitiarum situ, uicinitate, & naturæ consortio inspecto, item morbi magnitudine, & laborantis uitium robore considerato. Cerion autē, hoc est fauæ quū sinus sit fistulosus, mellea diffuens humiditate, eandem administrationem curationemq; cum fistulis & aliis sinibus requirit.

*De ani fistulis.*

*Cap. LXXVIII.*

**A**Ni fistulæ latentes quidē notantur inde q̄ ore nō apparente dolor ipsis oboriat, & purulenta humiditas per anum profundatur. Plurimis abscessus quoq; indicia præcesserunt: manifestæ autē cultro excisorio, aut serra porcina demissa noscuntur. Nam instrumentū ad ima penetrat, & digito indice in sedem transmissio occurrit, fistula nimirum ad interiora



interiora perforata. At in ijs quæ perforatæ nō sunt, instrū digito, nō statim occurrit, sed obstat in medio corpus nō perforatū. Tortuosas aut & labyrinthi modo flexuosas agnosces inde, q̄ instrū paululū procedat, pus aut ad illarū portione copiolū efferať. At quæ prope intestinū oriunt̄ fistulæ, agnitionem sui præbēt, q̄ nōnūquā & lumbrici & stercus per orificiū erumpat. In oībus aut ferē callus aliquis in orificio prominet. Itaq; fistula isanabilis est, quæ uesicæ ceruicē perforauerit, aut quæ ad femoris articulū sit, aut quæ ad ipsum lōganonē tēdat. Aegrē uerō cōsanescit, quæ orificio caret, tū quæ delitescit & in os terminat̄, multifariamq; fissa est: reliquæ in uniuersum facile curant̄, administratione hūc in modū adhibita: resupinato hoīe, ut cruribus sursum porrectis femora ad uētrein inclinet, quēadmodū sit in ijs quibus clyster in aluū mittit̄, si fistulæ extremū in summo, occurrit, culter, aut auricularū specillum per orificiū demittit̄, subiectaq; cutis simplici linea excidit̄: si autē altē intra sedē fistulæ terminus finiat, demisso per orificiū cultello, siquidē perforatā ipsam inuenerimus, demisso iuxta oppositam affecto ano manū indice digito, eiusedē cultelli initiū adigentes, & descectētes, ipsum foras reducemus, ac corpora quæ incūbunt cultello, simplici diuisione liberabimus. At si nōdū fistula perforata reperiāt, in altū uero ani duntaxat termineť, & tentatibus nobis indici digito occurrat, corpus intercedens cū squamosum mēbraneumq; sit, uehemētius mucrone cultelli perforabimus, traductoq; per sedē cultro, rursus scalpello corpora quæ ei incūbunt dissoluemus, quēadmodū prius explicatū est. Si igit̄ terebræ, aut scalpelli ad fistulas accōmodati acie sinus fundū iuxta sedē perforauerimus, ipsum instrū per anum inferentes, illinc totū quod interiacer acie terebelli pertundemus, & post excisionem uulsella, aut forfice corpora diuisionē ambientia (calli aut sunt) prehensa ex toto adinemus, musculum qui anū cōstringit, spinēter dī, ubiq; uirantes. Nōnulli siquidem rudius dū in alto sectionem molirent̄, ipsum cōuulnerarūt, atq; inde inuolūtaria stercoris excretio homini accidit. At si qui timi diuisculi chirurgiā fugiant, Hippocratica ut debent ē lino deligatura. Iubet siquidem Hippocrates, linū quintuplex crudū cultro foratro uel specillo p̄ fistulā demittere, & lini principia cōiungi, ac quotidie cōstringi donec corpus totū quod duabus oris intercedit, dissectū, linū eructet. Si uetustate



malū cōtraxerit, quum dissolues, ēt psaro, aut eiusmodi quodā arido illito linum oportet pertrahere. Sunt qui foramini terebræ fistulis dicatæ insertū linū iuxta prædictā rōnem propellant, quod meo iudicio nō cōuenit. Dum. n. chirurgiā uitant, præter q̄ hanc requirunt, ēt curationem remiorantur. de latentibus autem fistulis Leonides in hunc modum tradit. Cum autem alta pars stringentis anum muscoli in fistulam dehiscir, quæ uel à sede incipiat, uel longius procedat, post notas iudicatas, disquiretur instrū quod ad sedem diducendā sit aptatum. dico aut̄ exiguo per specillo quod Græci dioptrion appellant, anū ut muliebrem sinum, distendi. At cū fistulæ os clarè appa-ruerit, per ipsum specilli mucro demittetur, propelleturq; in imū: lamina uero subiecta tota fistula super eā diuidet̄ semipathula, aut spatha fistulis incidēdis peculiari. Nos aut̄ cum in talem incidissemus affectū, hoc administrationis modo uti non potuimus, q̄ ductus fistulæ in cōspectum nō ueniret. Nā inter anum & eius fibulā dextra parte sita erat, instrū uerò quod ei diducendæ erat impositū, magis operationē adumbrabat: at per digitos distendentibus anū nobis, rima quædā inter unam quandā ani rugā ceu fistulæ emissarium apparebat, etenim pus per ipsam emanabat, per eandē uero cultelli mucronē in fistulam demittebamus ceu manu ab ea ducti, deinde dextræ manus indice digito, ani fistulæ inserto, cū inuenissemus quoddam inter digitum & instrū, tenue corpus, cumq; uiolentius cultellum digito adegissemus, fundum fistulæ sursum cōuersum perforauimus, ubi iam digito mucronem instrumenti foras traiecitassimus, conspicuum nobis factum totum corpus quod inter fistulæ orificia habebatur, dico autem ea quæ initio ad humoris emissarium sita erant, & ea quæ nunc à nobis facta sunt scalpello præcidentes dissoluimus.

*De hæmorrhoidibus.*

*Cap. LXXIX.*

**C**Um hæmorrhoidum notæ ex ipso quod uacuatur innotuerint, antequam manum admoliamur, clystere utemur copiosissimo, simul intestini superuacua inanientes, simul & anum, ut prōptius interuertatur & extrema ipsius pars exeat, irritatēs. Resupinato igitur ægrotante aduersus lumen clarum, siquidē cōstrictione usi fuerimus, linū quintuplex ferramēto quo ora uenarum in ano extantia adurūtur, uel quo



uel quo uuæ, labris hæmorrhoidum circumponentes unam-  
quamq; hoc fune astringemus, una duntaxat relicta, qua san-  
guis superfluus emanet, quod etiã Hippocrates præcipit. Post  
astrictionē linamento implicito oleo madēte, & ad sedem ac-  
commodato ligamine, uſi, ægro quietē indicemus, oleo repi-  
do, aut muſa uentri medicātes, deinde poſtea cataplaſmate ex  
micis panis & croco utemur. Vbi hæmorrhoides exciderint  
uino cicatrix ducitur. Leonides aut nō è lino deligat, ſed for-  
cipe prehenſas ampliter hæmorrhoidas ſcalpello excindit. A  
chirurgia, fuligine thuris utendum & amylo, chalcitide, uel eo  
medicamento quod uſta ſpongia ſimul & pice cōſtat, itē paſtil-  
lo fauſtino ad abſolutā aduſtionem. Alii uero inſtrumēti quo  
uuæ uruntur, concauo, medicamine quod adurat repleto, quē-  
admodum uuam, ſic etiam hæmorrhoidas uſſerunt.

*De condylomatis, tuberculis, & rimis. Cap. LXXX.*

**A**ſi condyloma loco ſolum ab eo quod muliebres lo-  
cellos infeſtat, differt, rugoſa & ipſa ſedis excreſcētia,  
aut inſlāmatione, aut rima quæ dicitur rhagas præce-  
dente. Per initia itaq; tuberculum appellatur: cum occaleſcit  
autem, condyloma: quare conuenit, hæc quoq; , quemadmo-  
dum illa, uulſella apprehenſa excindere, & medicamentis cru-  
ſtam ducentibus curationem abſoluere. rimas autem à ſterco-  
re potiſſimum indureſcentes, & quia dum cicatrix generatur,  
occaleſcunt, inueteraſcuntq; , recentes, faciemus, uel unguibus  
uel ſcalpello radentes & cicatricem ut par eſt, inducemus.

*De ano non perforato. Cap. LXXXI.*

**P**eris receus natis, anus ex natura nō perforatus interim  
inuenitur, membrana nidelicet obſtructus. hæc igitur ſi  
fieri pōt, digitis ipſis dirumperur: ſi minus, acie ſcalpellī  
eam excidentes, uino curabimus. Qm̄ uero & prouectis ſubin-  
de ob ulcus non dextrè curatum anus committitur, conuenit  
hanc unionem inſtrumento cōuenienti diruptam curare, ſi-  
ſtula plumbea, aut obturamine quodā ano uſq; dum in totum  
conſaneſcat, cōmodè impoſito, ne ruſſus coaleſcat. Porro ob-  
turamentū medicamine quodā cicatricē ducēte obliui debet.

*Quomodo uarices excendantur. Cap. LXXXII.*

**V**arix uenæ dilatatio eſt, aliquando in temporibus, ali-  
quando in ima uentris parte ſub umbilico, nonnunquā



etiam circa testiculos, sed maximè in cruribus. Hic igitur originem plurima parte ex materia melancholica trahit, eorum autem qui testiculis oboriuntur curationem per scalpellum iam in capite de uaricum ramice tradidimus, atq; his similiter crura infestantes aggrediemur, ab interiori femoris parte incipientes, ubi etiam origo ipsorum magna ex parte inuenitur. Interius enim, in plures distributi propagines difficilius tractantur. Loco igitur humore, funiculum superiori femoris regioni circundamus iubemusq; ut inambulet inde repletâ uenam atramento scriptorio, aut collyrio notabimus iuxta uaricis situm trium digitorum, aut paulo ampliori spatio interposito, decumbente agro cruribus extensis, alterum funiculum supra genu iniiciemus. Elata autem in tumorem uenas, scalpellum adigimus, quâ atramenti nota est tam altè, ut cutè duntaxat scalpellum penetret, ne uenam diuidamus. ubi oras uulneris hamulis diduxerimus & membranas cultro inflexo ad ramicem aquosum accommodo excorauerimus, uena detecta & undiquaq; explicata femoris ligamenta soluemus, uasè per cæcum hamum suspenso, acum duplex linum trahentem subijciemus, plexumq; lini amputabimus, & diuisa scalpello per medium uena, detrahemus sanguinis quantum usus postulat: deinde funiculo superiorem uasis partem constringentes, erectumq; crus eleuantes manuum expressu, sanguinem qui in crure est euacuabimus: deinde infra rursus uas denuncientes, uel id uenæ quod inter uincula est, abscissum tollemus, aut manere id sinemus usq; dum sua sponte cum funibus excidat, & uulnere siccis linamentis oppleto, splenium uino & oleo madens, iniectum deligabimus, medicamentoq; ad pus faciendū apto quod linteolis illinatur persanabimus. Noui autem ueteres nonnullos, funibus non usos: alios inde uas denudatum ex cindere: alios altè ipsum eleuatum cum uiolentia extrahere abruptētes. Verū omnium tutissimus chirurgiæ modus est, quem supra diximus. Porro uarices in imo uentris suborientes consimiliter tractabimus item eos qui tempora infestant, quemadmodum in angiologia comprehensum est.

*De dracunculo. Cap. LXXXIII.*

**D**E dracuuculo quomodo medicamentis porissimum emendetur, quarto libro peregrimus.

De ex-



*De extremarum partium præcisione, acroteria simon appellant.* Cap. LXXXIIII.

**S**VMmis partibus nonnunquam putredine cōsumptis, nepe manu aut pede, ut etiam ossa ipsa contabuerint, uel ex causa exterius adueniente, fracta, uel etiam ex interiore causa putredinem experta, & ferrula præcidi postulent, ante hanc necesse est corpora ossibus circumdata primum diuidere. Verum quia dum hoc primum fit, deinde longiore temporis spatio serræ administratio peragitur, sanguinis profluuij metus subsequitur, rectè Leonides non omnia primum corpora præscindit, nisi ex toto putredine contabuerint, sed partē, ubi non plures neq; grandiores esse uenas aut arterias existimet principio celeriter usq; ad os resecat, deinde os protinus serra præscindet, panniculum lineum partibus sectis circumponēs, ne serra per ipsa tracta do'ores pariat. Atq; tunc reliqua parte excisa, ferramenta candentia uasis inijcito, & sanguinis fluore suppresso linamentis insertis & conuenienti deligatura adhibita, remedio utitor quod pus moueat.

*De unguium pterigijs.* Cap. LXXXV.

**P**TERYGium in unguibus carnis incrementum est partem unguis operiens. Fit autem in pedis manusq; potissimū pollicibus: in pedibus quidem, ex offensione plerunque: in manibus autem, ex neglecta reduuia, inflammata, & in pus mutata. Siquidem hoc, pus dico. spatio temporis unguis radicē exedit, ipsumq; corrumpit, subinde totum abolet, sæpe mediū unguis admodum infestat. Iuxta unguis autem radicē ipsam, nonnullam ipsius partem putrefactam, aliquando totam radicem à rosione immunem relinquit. Est quum & os corrūpat, odor ædāt grauis, digitus per summa dilatetur magisq; liueat. his igitur manes deber admoueri, ita ut totam unguis partem relictam acie scalpelli reseceamus auferamusq; deinde exulceratam incisamq; partem ferramentis aduramus. Etenim pterygium genere depastio est, quæ nome Græcè dicitur, neque subidet, nisi adustum, adeoq; si negligitur, digitum corrumpit. At si ossē & unguē à uitio immunibus, exterior unguis angulus qui delitescit, & carnem ipsi agnatam pungit, & inflammationem excitat, conuenit pungentem unguis particulam tenui cultro aut eiusmodi quodam subiecto sublimen eleuatā, acie



acie scalpelli adimere, & quod eminent medicamento crustis faciundis idoneo consumere. Pleriq; hoc modo administrationis consanuerunt. Si amplius fuerit uitiū primū scalpello circū adimemus, mox remedium ex medicamētis petemus.

*De ungue contuso. Cap. LXXXVI.*

**Q**uoniam uero subinde ex ictu unguibus contusis dolores subsequuntur, qui ad manus operationem nos pertrahant, satis est Galeni uerba hic apposuisse, quæ sonant in hunc modum. Unguibus contusis præsens planè remedium ad dolorem auferendum sanguinis detractionem experti sumus, quum pulsus doloresq; uehementissimi oboriuntur. Cæterum linea obliqua, non recta in imum, supernè deorsum scalpello acuto debet incidi, ut sanie excreta, secta hæc unguis particula ueluti operculum quoddam subiacētium efficiatur. At si in rectum supernè deorsum lineam duxeris carnis excrescentia quam Græci *ὑπερσάρκωτια* uocant, diuersum nimirum corpus à carne quæ ungui subijcitur per mediam diuisionem suppullulante, gignitur, inde rursus doloresprehendūt, quos in reduuiis nominauimus, carne quæ sub ungue succreuit, compressa. Quia igitur ex huiusmodi sectione dolorē protinus ægro adimi uidere licet, per dies insequentes commodū est, nobis subsectam unguis carnem leuiter attollentibus, unguis saniem excernere, ac rursus subiectæ carni quemadmodū dixi unguem operculi modo imponere: reliqua uero digiti totius medicina uti conuenit quæ leniat, discutiatq;.

*De clauis, myrmecijs, & uerrucis. Cap. LXXXVII.*

**C**lauus rotundus callus est, coloris candidi, clauorū capitibus similis: toto corpore, sed pedū solo digitisq; præcipuè enascitur, dolor sequitur, & incessus impedimentum. Itaq; circumsarificatus uulsellaq; apprehensus, scalpro acutæ aciei, aut quo uenæ scinduntur, radicitus eximetur. Nonnulli, ne rursus succrescat, candenti ferro utuntur. Myrmecia uerò cutis tuberculum est exiguum, callosum, rotundū, & crassum, ad basim insidens, & ad frigora sensum formicarum moribus similem excitat. Hæc quoq; totum corpus, præsertim aut manus infestat, nonnulli igitur, inter quos & Galenus est, præcipiunt scarificata extrema parte, fistula pennæ durioris, quales sunt ueterum gallorum, anserum, & aquilarum, in imum adacta,



adacta, ex basi myrmeciam auferre. Alij ærea, aut ferrea fistula, idem faciunt. Recentioribus satis est, scarificatam uulsellaq; apprehensam, scalpro, clauorum modo excindere. At uerruca, quæ acrochordon græcè dicitur, exigua cutis eminētia est, doloris expers, callosa, rotunda, plurima parte basim habet angustam, ut suspensa esse nideatur. Nominata uero sic est, quod choræ nexui respondeat. Extendentes igitur, eminentiam excindimus: sin autem hoc non fiat, lino saltem, aut pilo deligabimus. Noui plerosq; & has & prædictas omneis excrescentias ferramento extincto, ut dicunt, consumpsisse.

*De telis è corpore extrahendis. Cap. LXXXVIII.*

**C**hirurgicæ partem telis extrahendis dicatam maximè necessariam esse poeta Homerus his uersibus innuit.

*Vir medicus multis alijs præstantior, ut qui*

*Corpore tela trahens, medicamine uulnura curret.*

Primum itaq; telorum differentia enumerari debent, differunt autem tela materia, figura, magnitudine, numero, habitu, uiribus. Materia quidē quatenus hastilia, aut lignea sint, aut arundinea. Ipsa uero tela aut ferrea sunt, aut ærea, aut stænea, aut plumbea, aut cornea, aut uitrea, aut ossea: aut arundinea, uel etiam eadem linea, tot enim diu potissimum apud Aegyptios reperiuntur, figura autem, quatenus alia sunt rotunda, talia unguulosa, nempe triagula, alia sulcata quæ & gonchota dicuntur, alia trifulca, atq; alia cuspidata, alia cuspidibus carēt. ac cuspidatorum, hæc cuspides posteriora spectantes habent, ut dum extrahuntur cōtra defigantur, illa in anteriora, ut propulsata idem faciunt: quædam obuersas cuspides habent, fulminis instar, ut dum ipsa trahuntur propellunturq; in obiecta infigantur. Sunt quæ mota cardine cuspides habent, cōtractas, quæ dum in trahendo explicantur, telum extrahi prohibent. Magnitudine uariant tela, quatenus alia magna sunt, ut trium digitorum longitudinem expleant: alia parua, ut unum digitum æquent, quæ sanè & myiata apud Aegyptios uocantur, alia medium inter hæc locum occupant, Numero autem quatenus nonnulla simplicia sunt, nonnulla composita. tenuia siquidem ferramenta ipsis imponuntur, quæ in teli extractione in imo delitescunt. Habitu, quatenus alia ferrum acutum ligno habent insitum, alia cōcauum: ac quædam firmiter ligno

infixa



infixa sunt, quædam negligentius, ut in extractione separata  
 intus remaneant. Viribus differunt, quatenus ueneno quædā  
 sunt oblita, quædam non. Atq; hæc sunt telorum discrimina.  
 Nunc dicamus quō extrahantur in conuulneratis, & in bello,  
 & extra bellum, sponte, & inuito, quacunq; occasione, ac qua-  
 libet ex materia confecta. Cæterum dupliciter tela in carne  
 extrahuntur, tum euulsione, tum propulsatu. In quibus n. per  
 summa telum impactū est, euulsione eximi debet. similiter ē  
 quæ altè inlixrent, obiectæ uero partes si conuulnerentur, san-  
 guinis profluuiο, aut dolore ex confortij lege periclitātur. At  
 propulsatu utimur in quibus altè telum infixum est, & partes  
 obiectæ breue spatium cōtinent, neq; neruus, neq; os, neque  
 eiusmodi aliquod diuisionem impedit: osse autem cōuulnera-  
 to euulsorium modum assumit. Si igitur telum conspicuū fue-  
 rit, inde extractionem moliemur: si occultatum est, conuenit  
 autore Hippocrate, modò uulneratus possit, in ea figura con-  
 stitutum notare, in qua ēt uulneratus est: si non possit, iacen-  
 tis certè quatenus licet modo figurantes specillo tentabimus,  
 & si quidem in carne fixum est telum, manibus extrahemus,  
 aut eius hastili quod etiā atractō appellat, nisi exciderit, li-  
 gneumq; id potissimum sit: si excidat forcipe quæ dentes radi-  
 ces uē, euelluntur, aut ferramento quod à telo extrahendo be-  
 lulcum Græci uocant aut alio quopiam instrō accommo-  
 do, extractionem moliemur, nonnunquam etiam carnem prius  
 incidentes, si uulnus instrū non recipiat. At si etiam in oppo-  
 sita telum processerit, nec illac ipsum possit extrahi quā infi-  
 xum est, diuisis ijs quæ opposita sunt, per illa ipsum eximemus,  
 uel euellentes ut dictum est, uel per eam partem in quā teten-  
 dit propellentes, uel si hastile exciderit, demisso instrumento  
 propulsorio ita ut neruum, aut tendinem, aut arteriam, aut  
 eiusmodi aliquod necessarium uitemus, protrudere oportet,  
 turpe siquidē est, dum telum extrahimus, peius eo malum effi-  
 cere. Et siquidē caudatū telum sit (hoc aut specillo deprehen-  
 demus) femina propulsorii instrumētī demissa accommodataq;  
 telum propellemus: si cōcauitatem, marem. Telum uero ex ē-  
 ptum si sculpturas quasdā habere, ceu aliorum tenuium ferra-  
 mentorū quæ ipsis imposita esse possint, appareat, specillo rur-  
 sus usi, si illa inueniamus, eadē rōne & uia auferemus: sin opposi-  
 tas cuspidēs, ut uerisimile est, telum habēs nō exilierit, uicinus  
 ei locus



ei locus dissecari debet, si nulla pars necessaria contigua sit, de-  
tectumq; telū eleuantes, modeste extrahemus. Nonnulli uero  
exigua arundine cuspidibus ipsis circumposita sic telum euel-  
lunt, ne carnes à cuspe radantur. & si uulnus inflammatione  
uacauerit, futuris usi cruentorum modo curabimus: si inflam-  
mationem experiatur, fomentis, cataplasmatis, & consimilibus  
medebimur. Porro si uenenato telo quis ictus est, totam car-  
nem quæ ueneno iam mutata est, si quidem fieri potest, præci-  
demus. Agnosces autem eam quod è sana carne differat palli-  
da enim, subliuida, & ueluti emortua apparet. Aiunt autē Da-  
cos & Dalmatas cuspidibus elenium & ninum dictum obline-  
re, idq; ubi sanguini uulneratorū obuenerit, hominem occide-  
re: comestum uero ipsis innocuum esse, & nihil mali, efficere.  
At si telum ossi inhæserit, rursus instrumento experietur, & si  
quidem caro impediatur, hanc adimemus aut diducemus: si uero  
etiam altè in osse lapsus est, quod cognoscimus si firmiter id  
infixum nulla ui cōmoueatur, excisorio cultro osse quod iux-  
ta est exempto, aut etiā terebra prius perforato, si crassum sit,  
telum liberabimus. Porro si in principem aliquam particulā  
telum defigitur, exempli gratia, cerebrum, aut cor, aut guttur,  
aut pulmonem, aut iecur, aut uentriculum, aut intestina, aut re-  
nes, aut uulnam, aut uesicam, quum iam notæ lethales apparue-  
rint, & euulsio præsertim multum cruciatum exactionemq; ac-  
ceritura est, nihil tentabimus, ne præterquam quod nihil su-  
mus profecturi, etiam conuictiandi occasionem idiotis præbea-  
mus. Si uero exitus fuerit obscurus nec in conspectum ueniat,  
præfati periculum, opus aggrediemur. Multi siquidem absces-  
sū quoq; in aliqua uitæ necessaria parte oborto, præter opinio-  
nem consanuerunt, quum & iecoris fibram, & omenti partem,  
peritonæique, & totam uulnam subinde ademptam fuisse, nec  
mortem inde subsequutam, memoriæ prodatur. Est quum gut-  
tur de industria subinde in angulis diuidamus, ut in capite de  
ipsius incisione dicebamus telum itaq; si in his relinquatur, in  
præsentaneam mortem præcipitat, præterquam quod artem  
etiam inhumanum ostendat: si eximatur, fortè etiam salus sub-  
sequitur. Porro principalium particularum uulneratarū agnitio  
non est difficilis, ut quæ ex accidentium proprietate, ex cremē-  
tis, & particularū situ, inueniatur. Si enim cerebri membrana  
uulnus accepit, dolor capitis ualidus subsequitur, oculi feruēt,  
rubentq;



rubentq̃; lingua agitur, mens desipit. Si cerebrum percussum est, ægri concidunt, uox nihil sonat, facies peruertitur, bilis uomitus sequitur, sanguis per nareis erumpit, per autem humor albus puliculae similis emanat, sanies per uulnus exit. At si in uacuam thoracis regionem telū defigatur, foramine spatiofo permanente spiritus erumpit. Corde uulnerato iuxta mamillam sinistriorē, telum apparet non penetrant, sed ceu alteri impactum, ac nonnunquā pulsatilem motū ædit, sanguisq̃; niger effertur, si transitus pateat: extrema frigescent, sudor emanat, animus deficit, & sine mora exitium subsequitur. Pulmone icto, si spatiosa laxitas est, sanguis ex plaga spumans uacuatur: quum non est; ore magis per uomitū redditur, ceruicis uasa attoluntur, lingua alium colorem assumit, multum spiritus attrahunt ægri, frigidi appetentes. In septo transuerso uulnerato, telum quidem iuxta spurias costas defixum apparet, inspiratio autem magna oritur, cum gemitu & dolore per totā humeri partium compagem. Quod si abdomen uulnus acceperit, id excrementis innotescet, quum latum intrus spatium existat, uel etiam telo exempto, uel hastili intus fracto, succus ex uentriculo euacuatur, ex intestinis sterces, interim & omentum, uel intestinum procidit. Vesica autem uulnerata, urina excernitur. Itaq; in cerebro eiusq̃; membranis ictis, caluaria perforata telum eximimus, quemadmodū in capitis fracturis mox dicitur. In thorace autem, nisi telum subsequutum fuerit, per mediocrem intercostalium incisionem, uel etiam una excisa costa, lamina quæ membranam custodiat subiecta, euellemus. Similiter in uentre, uesica, cæterisq̃; in alto particulis, si quod telum subsequatur, citra negotium eximemus: si minus, rursus disione adhibita medicina utemur, quæ cruentis cōueniat. In uentre, si res postulet, etiam suendi eius ratio, quæ gastro-raphia dicitur accommodabitur, quem in modū comprehensum est. At si in grandiore quodam uase, exempli gratia, in iugularibus uenis quæ in imo latent, aut arteriis quas carotidas appellant, aut etiam magnis arteriis quæ alas uel inguina intercurrunt, telum dextrum, copiosius sanguinis profluiū propter exemptionē minetur, ratio est hæc funibus antea ex utraque parte constringere, deinde teli euulsionem moliri. At si particulæ plures confixæ fuerint, uerbi causa, brachio cum thorace coniuncto, uel cubito cum aliis corporis particulis, uel pedibus



dibus inuicem, siquidem non per totas utraq; partes telū penetrauerit aut hasta, apprehensa hæc extrinsecus, ueluti etiam in una euellemus: sin ambas penetrauerit, dimidia ligni parte ferra refecata, particulatim singula faciliore figura extrahimus. Quoniam uere & lapides subinde uel buccina, uel plumbum, uel simile quippiam ex funda mittitur, tum ui, tum quod angulosa sunt deliguntur. Agnosces igitur ea, quod moles aspera & inæqualis illabatur, item quod non omnino in rectū tendit diuisio, sed amplior, & caro ueluti cōtusa huidaq; appareat, adhæo, quod cum grauitate dolor affligat. Hæc igitur conuenit agitata instrumento quo quid attollimus, aut aduersa scalpelli parte, aut uulnerario specillo recipere. si autem fieri potest, etiam forfice extrahemus. Multis autem infixæ tela integra intus insederint, quæ uulneribus cicatrice obductis, deinde longiore temporis spatio partem eam abscessu occupante & disrupto exiliere.

† Hic locus sic descriptus est in vet. Cod. τὰ δὲ γωνιωτὰ καὶ τοῦτων τὰ μὲν διχλῶχινα, τὰ δὲ γλῶχινωτὰ καὶ λῶχλωτα καλοῦμενα, τὰ δὲ τριγλῶχινα, i. alia angulis habentia, & horū quidē alia duos angulos habēt, alia uerō angulū habentia, quæ lonchota, id est, longa ut hasta, alia tres habent angulos &c.

*De fracturis, & quot ipsarum sint differentiæ.*

Cap.

LXXXIX.

**P**roximū fuerit tradita carnis uitiorū manu scalpelli, uel curandorū ratione, etiam de ossiū fracturis, dico sanè etiā luxationibus, sermonem instituere, quoniā & ipsæ chirurgiæ generi subijciuntur & primū de fracturis agam, ijsq; prius quæ in capite sunt, tum quod inter carnis & ossiū chirurgiam medium locum obtinent, tum quod omnibus partibus caluaria præcellit. In uniuersum igitur fractura ossis est diuisio, aut ruptura, aut præcisio, à uiolentia quadam extrinsecus accidēs. Cæterum plures fracturarū sunt differentiæ, alia siquidem dicitur fieri raphanidon, hoc est, ad raphani speciem, alia schidacidon, alia es onycha, alia alphithidon, alia cata apothrausin, id est, iuxta refractionem. Raphanidon igitur ruptura ossis est transuersim per crassitudinem facta, quæ etiā sicyedon & cæledon nonnullis appellatur, ex cucumerū & cauliū fractorū similitudine. Schidacidon autem, quasi assulæ modo, est oblonga  
ossis



ossis fissura. ut onychia, quasi dicas in unguem, iuxta partē aliquam recta est fissura, in extremo lunata: quæ etiam calamidon appellatur. Alphiidon, ad farinæ similitudinē dicta, est quū os in multas tenuis partes finditur, quæ & ipsa caryedō à quibusdam uocatur. Refractio aut, quæ apothrausis dicitur uel etiam præcisio, est quū pars ossis per summitatis rupturā auferitur, ut ablata superinnatet. Atq; tot fracturæ constant differentijs.

*De fracturis capitis.*

*Cap. XC.*

**F**ractura in capite peculiariter caluariæ est diuisio, nunc simplex, nūc multifida, à ui quadam exteriorē facta. Porro differentiæ capitis fracturarū hæc numerantur. Rhogme, id est fissio, Eccope, hoc est excisio, Ecpiesma, quod est effractio, Engisoma, id est corporum appropinquatio, Camarosis, hoc est testudinatio, in infantibus etiā Thlasis quod est contusio. Rhogme igitur caluariæ per summa est diuisio, aut rima profundior, in qua nequaquam os uitiatū foras emouetur. Eccope caluariæ fissura est cū ossis offensi ruptura. At si à reliquo osse pars offensa discesserit, aposceparnismon nonnulli uitii appellant. Ecpiesma in multas parteis caluariæ effractio est, in qua profundius ossa descenderint, & cerebri membranam contactu suo premant. Engisoma caluæ ictus est, in quo os uitiatū ad interiorē cerebri membranā descenderit. Camarosis diuisio caluariæ est, in qua pars affecta cameræ modo exaltata relinquitur, ut Galenus tradit, ac intro à sanis fracturæ partibus ossa magis recedunt, membranæq; innituntur, quemadmodum in ecpiesmate sic enim ille existimat. Alii etiam trichismon, quasi dicas capillationem, his adnumerarunt. Est autē trichismon arctissima rhogme, sensum plerunq; fallens, eoq; latens: quæ quia non facile se ostendit, mortis causam sæpe adferat. Thlasis caluariæ diuisio non est, eoq; nec fracturam rectè dixeris eiusmodi affectionē, uerū est ossis caluæ in interiorē partem impulsio, aut inflexio, concauitatē integræ caluæ continuitate tantū efficiens, ut licet in plumbeis ex crudoq; corio confectis uasculis, si foris percutiantur illidanturue, cōspicari. Porro contusionis huius duæ existunt differentiæ: uel enim calua per totam ipsius crassitiē contunditur, ut frequenter etiam cerebri mēbrana abscessū occupetur: uel omnino à caluaria hæc per totum aut non per totū premitur, sed iuxta exteriorē duntaxat



taxat superficiem usque ad laminam secundam deprimitur. Sunt qui his differentiis apechemia, quasi dicas ab Echo respon-  
sionem, addiderint. Ea est, à contraria ictus parte facta calua-  
riæ fractura. At falluntur hi, quoniam non fit in hominis cal-  
ua quemadmodum in uitreis quibusdam uasculis fieri illi do-  
cent. illa siquidem uacua sunt, ideoq; id patiuntur: calua autē  
hominis undiq; plena & alioquin solida est, ac rhogme seu fissu-  
ra caluariæ, quæ aliarum complurium capitis partiū ictarum  
lapsu, uel citra cutis continui solutionem generatur: quæq; po-  
stea abscessu in ea facto, eodemq; secto, apparuerit, in opposita  
ictus parte factā esse ipsius uidetur. atq; hoc uitiū quemadmo-  
dum prima dicta rhogme curatur. Si igitur fractura capitis fa-  
cta fuerit, speciem ipsius ex corpore quod percussit, deprehen-  
des, si acutum fuerit, aut graue, aut durum, aut uiolenter impa-  
ctum. Item ex symptomatis quæ icto superueniunt, exempli  
gratia, uertiginibus, uoce amissā, aut subito collapsu, præser-  
tim in engisomate, aut cōtusione, aut ecpiēsimate, aut interiori  
camarosi cerebro cōpressio: item ex notis quæ à sensu capiun-  
tur. Si n. ampla cutis fuerit diuisio, per ipsam promptè cogno-  
scemus: sin autem diuisio non per totū ierit, aut angusta sit, fra-  
cturam tamen esse suspicemur, cutē diuisā, & oculis, & specillo  
demisso eam pernoscemus. Si n. ex alijs quæpiam fracturis fue-  
rit, inde manifestum euadet: at si rhogme solum angusta & pilo-  
sa sensum fugiens, medicamento aliquo nigro, liquido, uel etiā  
ipso atramento scriptorio infuso, os rademus, ipsa nanq; rhog-  
me nigra ostenditur, conuenitq; rasuræ tam diu insistere, quo-  
usque signum rhogmes aboleatur. Si ad cerebri membranam  
usq; peruenerit fractura, non rademus, sed agnoscere conabi-  
mur utrum membrana ab osse recesserit, an affixa permaneat.  
Si enim ipsa manet, inflammatiō nulla uulnus infestat, eger pau-  
latim febris liberatur, & pus coctum apparet: si recesserit mem-  
brana, augentur dolores, & febris similiter, os alium sumit co-  
lorem, pus tenue & crudum effertur, & si medicus rem negli-  
gentius tractet, nec perforatione utatur, hoc grauiora oboriun-  
tur symptomata, nempe bilis uomitus, conuulsio, mentis deli-  
rium, febris acuta, in quibus manum admoliri non oportet.  
Quod si his absētibz membrana cerebri nō abscesserit, rhog-  
me autem duntaxat fuerit, etiam solo rasorio curatur, uel si us-  
que in altum penetrat. Sin autem tantum usq; ad laminam se-  
cundam,

PAULI AEGIN.

E

cundam,



cundam, quæ diploe dicitur, fractura peruenerit, eo usq; radendum est, uel etiam confractum os eximendum, quemadmodum docebitur. At si in tenuia frustra os fuerit comminutum, hæc quoq; diligenter instrumento idoneo auferentur, etiam si membrana non abscesserit. Ab initio autē quū uulneratū susceperis, hieme quidē ante diē quartū de cimū omnino os auferre tenta to: æstate, ante septimū priusquā cōmemorata oboriantur symptomata. Cæterum manum hoc modo admolieris.

*Caluariæ fractæ curatio.*

**D**Eraſo ſuper uulnus capite, duas lineas iuxta rectos angulos mutuò ſe ſecanteis, quæ literæ X figuram accipiant, incidemus. harum autē alterā eſſe conuenit, quæ iam antea erat, deinde quatuor in uertice angulos excoriantes, ut totum os, quod perforabitur nudum exiſtat: ſi quidem ſanguis fertur, linamentis ex poſca obiectis cohibebimus: ſin minus, ſiccis deinde implicito linamento ex uino & oleo iniecto, conuenienti uinculo utemur. ſequenti die, niſi recentius aliquod ſymptoma prohibeat, perforare os uitiatum aggrediemur. Collocato igitur in ſedili agroto, aut recumbente prout uulneri conuenit, auribusq; ipsius lana obturatis, propter ſonitum qui ex ap pulſu redditur, uinculum aliquod uulneris ſoluemus. linamentis omnibus exemptis, & ſpongia deterſis ſordibus, iubebimus miniſtris duobus, ut tenuibus faſciolis circumpoſitis, quatuor angulos corporum quæ fracturæ incumbunt, attollāt, & ſi quidem os fuerit imbecillum, aut natura, aut fracturæ uitio, id ſcalpris exciſoriis acie inter ſe aduerſis, auferemus, primum cauſ exciſorijs ſcalpris, quos Græci cycliſcos uocant, à latiore incipientes, mox anguſtioribus, deinde ſpecilli modo anguſtis, mal leolo ſenſim adactis, ad capitis concuſſionē utemur. Si autem ualidum os fuerit, prius eo terebellis quæ mergi non poſſint, quas ab argumento a baptiſmos dicunt, perforato, (eiufmodi uero ſunt quæ paulo interius quā culpis acuta eſt, eminentias habent, quæ ipſas ad cerebri membranā demergi prohibeant) per ſcalpra circuncuſione uſi, id quod uitiatū eſt, aufere mus, non ſubito, ſed particulatim, ſiquidem fieri poteſt, digitis: ſi non, forcipe, aut uulſella qua uel oſſa uel pili apprehenduntur, aut eiufmodi quodam inſtrumento. Locus autē qui inter foramenta eſt, tantum ſpatium continebit, quantum maximi mucronis



mucronis specilli longitudo, tam altè uerò descendet, ut in-  
 riorem ossis superficie accedat, cura adhibita, ne membranā ce-  
 rebri terebra attingat. Quare etiā terebram ossis crassitudini  
 respondere conuenit, cōpluribus id genus ad hoc præparatis.  
 At si fractura caluariæ usq; ad secundam laminā duntaxat per-  
 uenerit, ad hanc etiam usq; solum foranda est. Ossē iam abla-  
 to, asperitudinem quæ ab excisione caluariæ prouenit, rasorio  
 aut quodam scalpello excisorio adæquabimus, laminam quæ  
 membranæ custos est, subijcientes, ac ossiculis quæ remanse-  
 rant, ut uerisimile est, aut spiculis ingeniosè ablati, linamenta  
 inferemus, quē modum diamotosin appellant. Hæc ratio chi-  
 rurgiæ communior simul & promptior est, & periculo uacat.  
 Item modus qui per lenticulatum excisorium scalpri, sit mirū  
 in modum Galeno commendatur, sine foratione, post inscul-  
 ptionem cycliscis scalpri factam, ipsum adhibenti. Scribit ita-  
 que hunc in modum. Si uerò unam semel partem nudaueris,  
 ac scalprium qui in cuspide præfixam habet retusam leuemque  
 lenticulæ speciē, aciem uerò per longitudinem erectam, submi-  
 seris, ubi latam partem lenticulæ super membranam defixe-  
 ris, malleolo feries, diuidesq; sic caluariā. ita siquidem agenti-  
 bus, omnia quæ requiruntur, euenient. Nam membrana, ne si  
 dormitans quidē, agas, latæ tantum lenticulæ parti occurrens  
 uiolari non potest. Quòd sicubi adhæreat caluariæ membra-  
 na, huius quoq; adhærentiam innoxia dirimit rotundum len-  
 ticulæ extremū, subsequitur autē præeuntem eam à tergo ip-  
 se scalper caluariam secans. Quare nec qui minore cum peri-  
 culo, nec qui celerius perficiatur, forandi modum inuenias. Ac  
 quæ administratio ferris & mediolo, quē chœnicion siue chœ-  
 nicida Græci uocant, peragitur, recentioribus, ceu noxia, im-  
 probata est, sed administrationem quam in rhogme exposui-  
 mus, probant. Idē uero modus ossium excindendorum conue-  
 niet in reliquis etiā caluariæ fracturis. Quantū uero excidere  
 conueniat. Galenus nos, docebit, hunc in modū manifestò scri-  
 bens. Quod uehementer est confractū id totum auferri debet:  
 si uero ab eo fragmenta quædā longius excurrant, quemadmo-  
 dum aliquando cernitur accidere, hæc persequi ad extremū nō  
 oportet, illud probè scientes, nullā inde noxā sequuturam, mo-  
 dō reliqua omnia ritè sint confecta. Post chirurgiam pannicu-  
 lo simplici lineo uulneri æquali, rosaceo madeti, cerebri mem-  
 branam



branam operiemus, exiguamq; lanæ stuppâ similiter rosaceo imbutê prædicto panniculo imponemus, deinde linamentum implicitû duplex in uino & oleo aut ipso rosaceo tinctû, toti uulneri circumponemus, diligentia adhibita ne cerebri membrana grauetur, postea latiore utemur ligamento, neque hoc altringentes, uerû ut linamenta solû retineat. Victus adhibebitur qui inflammationê arceat, & febribus peculiaris est, membrana cerebri crebrius interea rosaceo, superfusa. Post tertium dem, ubi uincula dissolueris, & sordes spongia deterferis, remedium induces quod crentis inijcitur, & inflammationê repellit superaccommodans membranæ aliquod ex cephalicis dictis aridis, usq; dū carne oppleatur. Nonnunquâ os radetur, si hoc res postulet, propter quasdā summitates extantes, aut etiam propter ipsius carnis productionem. Reliqua medicamentorum materies, ut in uulneribus comprehendimus, ad moueri debet.

*De cerebri membranæ inflammatione.*

**Q**uoniam frequenter cerebri quoq; membrana post chirurgiâ inflammationem experitur, ut non solû caluariæ crassitudinê, sed etiâ cutem ipsius excedat cū renixu, & ut naturalis ipsius motus pulsabilis impediatur, quæ potissimum & conuulsio aliâq; grauiâ symptomata uel ipsa mors subsequitur. Origo inflammationis aut ex acuti quadam ossis eminentia pungente ducitur, aut ex linamentorû grauitate, aut perfrictione, aut multo esu, aut uini potione, aut alia quadâ occasione latente. Si quidê ex manifesta occasione inflammationê contraxerit membrana, ea protinus amputanda est: sin ex latenti, magis pugnare cōuenit, † ut pote sanguinis dimissione, si causa nō obstiterit, uisû qui inflammationi cōgruat. Itē loco induci remedia debêt, calētis rosacei fots & superfusio ex althææ decocto, aut fœnugræci, seminis lini, chamæmelorum, similiumq; cataplasmata uerò ex cruda ordeï farina, aut lini semine, cū prædicto decocto & gallinarû adipe, adhæc fomētû ex lana adhibebitur. Capiti & occipiti meatuiq; auditorio oleû aliquod inflammationem prohibēs instillabitur. Viscerû quoq; cura habēda est, cataplasmatibus adhibitis, itē toti corpori prospicere, consilium est, in calidâ id aquam, ut par est, collocantes inungentesq;. Si perseverat inflammatio, & nihil aliud prohibet, medicamento quod bili ducendæ est, purgare ipsos Hippocrates præcipit.

† Rectior



† Rectior est scriptura ueteris libri, πλέον ἀγωνίζεσθαι πρός σῆκει ἢ φλεβοτομίᾳ χρωμένους εἰ μηδὲν κολύσι, ἢ ασιτία, ἢ τῇ πρὸς φλεγμονὴν ἀρροζούσῃ διαίτῃ. Id est magis pugnare oportet, uel uenam secantes, si nihil prohibet, uel inedia, uel uictu inflammationi conuenienti.

*Si membrana cerebri nigruerit.*

**C**erebri membrana si quidem per summa ex medicamentis in id efficacibus nigruerit, † mel triplum rosaceo miscētes & per linamenta id applicātes, curabimus, deinceps & reliqua admoūētes. At si nigrities sua spēte prouenerit, idq; in imo potissimū, cū aliis grauib; indicijs, attingi tūc non debet, ut quæ natiuū calorē emortuū innuat. Noui quendā qui post annum quā̄m affectu cōflicaretur. caluaria perforata superuixerit, erat enim fractura in sincipite ex telo facta, emissariumq; habēs per quod etiam membrana ab offensa immunis conseruata est.

† Græcus codex antiquus μέλιτι τριπλὸν μίξαντες ῥοδίνῃ. Id est, melli triplum rosacei miscētes.

*De naribus fractis contusisq;.* Cap. XCI.

**N**arium pars ima, quū sit cartilaginosa, frangi nō solet, sed contundi, sima fieri & peruerti: superior quæ ossæa est, nōnunquā frangitur. In his autē deligaturā damnat Hippocrates, ut quæ magis resimas efficiat & distorqueat, præterquā̄m in his quæ ex ictu per medias nareis emineant. in his enim cōuenientē fasciā, cū medicamine imposito assumit, ut cōpressæ nares naturalē figurā recipiāt. Fractis igitur naribus, in ima quidē parte, indice aut paruo digito demissō in exteriora dirigētur: in interiore, ēt scalpelli nucleo id faciundum est, primo statim die, aut nō multo post. Quū uero decimo die naris ossa cōtinentur, extrinsecus indice magnoq; digito hāc formare cōgruit. Vt autē figura quā fingis non cōcidat, duo obturamina tortilia ex panniculo inuoluta, naso impones, unum singulis nasi foraminibus, & si altera dūtaxat naris pars sit peruersa: eaq; sinere cōuenit, donec os aut cartilago contineat. Nōnulli hīstulas ex anserū pennis pāniculis replentes, naribus insinuarūt, quod figura custodiatur, & respiratio nō impediatur, quod nō necessariū puto, quū spiritus per os trahatur. At si inflammationē nares sentiant, medicamentū aliquod quod camarceat indemus, exēpli gratia, ex succis inscriptum, aut quod



oxelæo constat, aut eiusmodi aliquod, uel ex triticea simila & thuris fuligine seu gūmi una incoctis cataplasma iniiciemus, tum propter inflammationē, tum ut nares cōtineātur. Quod si in alterā partē nares distortæ, Hippocrates postquā commodē eas figuraueris, oblongā habenulā digitali latitudine iubet circundari, alterā ipsos extremū taurino glutine, aut gūmi illitū summæ nariū parti agglutinari, ex latere quò inclināt. ubi illa exaruerint, habenā transferre per autē oppositā uersus occipit. & fron ē oportet, deinde ipsi sub altero habenæ principio affirmabitur, ut nares in latera retractæ ad mediam dirigātur figuram, quod nō admodum recentioribus placuit. Porro minutim confractis narium ossibus, diuidere ipsas, aut superiorē ipsarum partē cōuenit, ac frugmenta ossiculorū uulSELLA auferemus, futuris diductas partes cōmittentes accommodantesq; ipsis remedium quod cruentis aptum est, & cōglutinat. Sin autem extra nares ulcus fuerit excitatum, linamentis in longitudinem implicitis curabimus. Sūt qui plumbeis canalibus, quas solenas Græci dicūt, usq; dum cicatrix fuerit obducta usi sunt, ne caro ex ulceribus supercrescat.

*De maxilla confracta, & aure contusa. Cap. XCII.*

**D**E aure contusa tertio libro tractatum est, tanquā huiusmodi affectio ad fracturas non pertineat. Maxilla multas ob causas frāgitur. Si igitur extrinsecus solum offensa, non per trāsuersum fissā, introrsus cauata fuerit, promptum sanē est cognoscere, Opus autē est altera manu, siquidem dextra maxilla fracta fuerit, dextra: si altera, sinistra. indice igitur & medio digito in affecti os demissis, interiorē fracturæ extantiam, probe foras cōpellere conuenit: altera manu foris eā excipiente. Rectitudinē uerò maxillæ ex eiusdem dentium æqualitate deprehendemus Quod si fractura per transuersum facta fuerit, primū tensione, deinde retractione, quā antitassin uocāt, partis in cōtrariū, usus, ministro eā cōtinentē, ut dictum est, dirigere aggredieris: porro denteis in parte cōfracta diductos, inter se, ut Hippocrates præcipit, auro deligare, nēpe lino ab auro chrysolino dicto, aut chrysonemate: qm̄ uero huius facultas nō omnibus cōceditur, lino ualido, aut bysso, aut pilo equino, aut id genus aliquo, Verūm si quidē cū ulcere fractura



Aura euenerit, specillo tentandū, nō tandem ēt refractio ossis facta sit. atq; si exigua diuisione facta, os unū refractum, aut plura remanserint, idoneo instrō auferentes, futuris oras ulceris cōmittemus, & medicamento cruētis apto usi deligabimus: sin aut citra ulcus cōtigerit, ceratū simplex maxillæ impositū conuenienter deuinciemus. fasciæ medium per occiput dispensabitur. habenulæ utrinq; per aureis ad summā maxillā, inde rursus ad occiput, mox ad mentū, inde per genas ad sinciput, inde rursus sub imā occipitii partē, distribuentur, ubi & fasciā desinere oportet. Super hæc rursus uinculum aliud fronti circumdatum, quod epistēma Græci dicunt, post caput cōiugetur, oēs prædictæ fasciolæ id circum astringēt. Alij uero tenuem ferulā, quē admodum alij corium, quod æquē sit longū impositum maxillæ, de ligant, ut commemoratum est: reliqui deligatura, quam Græci dicunt phorbiā, quasi dicas capistrū, utuntur. At si utraq; maxilla in summo mento auellatur, qua etiam parte coeunt, ambabus manibus parum inuicem distantibus, rursus adaptato, & denteis adunitos, quomodo diximus, deligato: † ac congrua usus ligatione, tenui ac sorbili alimento ægrotantem nutrirī iubeto. Nam mandere ipsi inimicum est. Si aliquid emorū à figura conuenienti putaueris, tertio die soluens, iterum illigato, quod tam diu facies, quā callus fracturam firmarit. firmatur autem maxilla intra treis potissimū septimanas, quoniam laxa & medullæ plena est. Quod si inflammatio aliqua superuenerit, ne aduersus hanc quidem tum somenta, tum cataplasmata negligere oportet. Quod in omnibus ex æquo obseruatum abs te cupierim.

† Antiq. codex, καὶ τῇ προσηκῶσιν χρησάμενος ἐπιδέσει κέλευσον ἡρεμεῖν λεπταῖς καὶ ῥοφηματώδεσι τροφαῖς χρωμένοις, & congrua usus ligatione, iubet ut quiescat & tenui ac sorbili uictu utatur.

## De iugulo confractō.

## Cap. XCIII.

**I**vgulum, quod etiā clauicula dī, quū naturaliter figuratū est, interiore ipsius extremo, cū pectore cōmittitur: exteriore, cū summi humeri cōpage, seu articulamēto adunit. eoq; si humerū, aut ipsum sustinēs brachiū, fracturā quacunq; tandē parte experiat, quā humerū suū spectat, plerunq; infra interius extremū fertur, una cū brachio detractū. Præstite-

E 4 rit au-



rit autē per transuersum potius quā assulatim, aut arundinis modo, hoc est, in longitudinē clauiculā frangi, quod uulgo receptum est. Nā trāsuersim cōfractū, extensione cōpressionēq; digitorum prōptē in naturalem figurā reuertitur: cætera uero eminentias habent, quæ ægrè possint coaptari. Si igitur per totam ipsius crassitudinē quocunq; modo, iugulū fractum fuerit, duo ministri, unus ad humerū eiusdem lateris fractæ clauiculæ manibus circūiectis, brachiū ad exteriora simul & sursum trahens, alter oppositū humerū, aut certē ceruicē attrahens, retractionē à se, quā Græci uocant antitasin, molientur: medicus suis digitis fracturā diriget, prominētiora pellendo, ima foras attrahendo. Quod si maiorē retractionē à se desideret, orbiculū bonæ magnitudinis ex panniculo, aut lanis, aut eiusmodi aliquod corpus alæ subiiciens, curbitū lateri indidem adiget, ac reliqua sicut dictū est, exequetur: si aut id nequeat, extremum clauiculæ iuxta humerū in alto sitū ad superiora, ægro tate resupinato, educet ceruicali quodā mediocri, dorso subiecto. ministro humeros duos ad ima deprimēte, ut os clauiculæ quod in imo est, reuocetur, rursus digitis suis fracturā conformabit. Porro si partē aliquā iuguli refractā, instabilē, aut ēt pungentē percipiamus, scalpello in rectū diuisam eandē auferemus, ac reliqua scalpris excisoriis, lamina quæ à tuendis cerebri mēbris menyngophylax dī, aut alia quæ excidēdis supponit propter firmitatē clauiculæ subiecta, exæquabimus & siquidē inflammatione careat, suturis: sin aliter est, linamētis utemur. & tēplenis diuersis præparatis ad ossis eminētis inclinationē, maiora ex eis & crassiora superaccōmodabimus, si inflāmatio infestat, oleo imbuta: si minus, sicca, ac mediocri ex lana orbe propter alā subiecto, cōuenientem inducemus deligaturā, per axillas, affectā clauiculā, scapulasq; prout res exigit, deligātes. & si quidē ad ima tetenderit pars clauiculæ humero proxima, latoris habenulæ dimidiū, eiusdem cubito subiicientes, totum brachium ex collo suspendemus: altero autē uinculi dimidio, manū, quemadmodum in iis sit quibus ex cubito sanguis detractus est. At si uersus superius extremum inclinauerit, quod rarum est, brachium suspendi non debet, uerum resupinus æger decumbet, & tenui nutrietur uictu. si uerò opus est, etiā fomentis adiuuabitur, sed pro ratione, usq; dum callus eam firmarit. id quod fit plurima ex parte diebus uiginti.

De sca-



*De scapulis. Cap. XCIII.*

**S**capulae quae latae sunt & mensae figuram representant, non franguntur: iuxta spinam uero fracturam sustinent, nunc compressae, nunc rupturam simplicem expertae, interim etiam refractae. Compressionem itaque tactu cognoscimus, si caua occurrat, stuporem proximi brachij, & dolorem pulsatilem inducat. Ruptura ex tactus asperitudine & loci doloreprehenditur: ambo autem ratione qua inflammationem arcemus, curantur. Refractio & ipsa tactu agnoscitur: leuis ac modica fascia conuenienti adaptatur: aucta uero & pungens ablatione per scalpellum adhibita & futuris, ut prius dictum est. Fasciae autem & hic similiter ut in clauicula iniiciuntur: incubitus oppositi lateris conueniet.

*De pectore. Cap. XCV.*

**M**edium pectus, diuiditur imprimaturque: summum, refringitur. Rupturam itaque per medium factam dolor loci & inaequalitas sequitur, & strepitus digitis innixis eliditur: impressionem uero dolor uehemens, spirandi difficultas, tussis, membrana quae costas incingit dispunga, nonnunquam etiam sanguinis eruptio, partis confractae cauitas, & in cedendo facilitas. Curationem eam adhibere oportet, quam in scapulis prodidimus. In impressione autem adaptatio Hippocratis adhibebitur, quam ille in clauicula quae foras processerit, usurpat, per incubitum supinum cervicali dorso subiecto, scapulisque constrictis, ita ut costae utrinque manibus simul contrahantur. Iam uero costis lana obtectis circularem adhibebis deligaturam, loris prius in rectum subditis, postea duorum initia inuicem excipiuntur, quae orbiculares fascias decidere prohibeant.

*De costis. Cap. XCVI.*

**E**X costis quae pleurae & spathae Graecis dicuntur, osses quidem omni in parte rupturam sustinent: spuriae autem in ea tantum quae spinae adiacet. nam hic solum ossilem habent naturam: in exteriori parte in cartilagine degenerantes, contunduntur, nullam fracturam percipiunt. Notae ipsarum non sunt difficiles, etenim inaequalitas digitis explorantibus occurrit, strepitusque, & ad confractum adductio. Quod si intro spectauerint, dolor uehemens punctorius sequitur, eo qui in costis prouenit grauior, quam aculei modo membranam costas



stas integrentem contuulneret, item ægra respiratio, tussis, eruptio sanguinis, subinde comitatur. & reliquas utiq; declinationes digitis licet cōformare, eam uero quæ intrò spectat, nequaquam, q̃ tendi nequeat. unde alii cibum flatulētum uberemq; assumi iubent, ut fractura ex inflatione & tensione foras propellatur, quod necessarium non esse puto. Nihil. n. cōmune ad hoc inter se habent, tū thorax, tum uiscera nutritoria, præterquam q̃ inflammatio ēt ex repletionē augeatur. Alii cucurbitulam adglutināt, q̃ à ratione & uia curandi alienum non esset, nisi particularū ex attractu, collectione, fracturam amplius ad interiora propellerent. Quapropter Soranus hunc in modum scribit Lanis oleo calido madentibus partes cōtegentur, & linamentis implicitis intercostale replebitur, ut deligatura æqualis iuxta orbicularem circumductū ueluti in pectore fiat. Omnia uero ut in pleuriticis fieri debent. ad magnitudinis proportionem. Porro si magna quædam necessitas compeliat, q̃ membrana costas cingens uehementer cōpungatur, cutem diuidere conuenit, & fractam costæ partem detegere. deinde lamina, ne tunica costas regens cōuulneretur, prius subiecta, officula quæ pungunt ingeniosè excindere ac eijcere oportet. postquam hoc feceris, ea sanè quæ inflammatione carent cōiunges. & cruentorū modo curabis: quæ aut illa affliguntur, linamentis oleo madidis operies uictū curationemq; adhibens inflammationi dicatā. Decumbēt ægri ea figura quā facilins tulerint.

*De coxarum & pectinis ossibus. Cap. XCVII.*

**C**oxarum aut ilium ossa rarò quidem franguntur, sed easdem cū scapulis differentias sustinent. Franguntur. n. in extremis, rumpunturq; in longitudinem, & per medium comprimuntur. Comites notæ ipsorum sunt, dolor partem affectam affligens, punctiōis pulsusq; sensus, cruris in eodem latere subitus stupor propter cōpressionē, adaptationem uero scapulis simile postulāt, auersantur aut solam ex chirurgia eius quod fractū est, exemptionem per externas partes. nā si opus sit, digitis cōformantur. deinceps aut etiam aliam curationem moliri oportet, & fomentis utendo, & cōcaua ilium linamentis adimplēdo, quò deligatura ceu fasciis circularibus, superiniectis, æquabilis efficiatur. Eadem ēt dicenda sunt, de pectinis ossibus, nihil enim peculiarius de ipsis dicere habemus.

De uer-



*De uertebrib, spina dorsi & sacro osse.**Cap. XC VIII.*

**V**ertebrarum complexus interim sanè contusionem, raro uero & fracturam experiuntur. propter quæ contusis spinalis medullæ mēbran s, uel ipsa ēt medulla, nervi in doloris consortium aduocuntur, & mors præceps subsequitur, magisq; si cervicis uertebbras affectus infestarit, unde præfatus periculum, siquidem fieri potest, audebis ēt sectione ossiculum quod premit eximere: si minus, ratione saltē quæ inflammatio propulsatur, ipsas lenies. At si processus uertebra- rum aliquis unde spina constat, fuerit refractus, digitis tentantibus promptè occurreret, dum fractio mouetur, rursusq; in locum transponitur. Conuenit aut id quod fractum est auferre, cute extrinsecus incisa: futurisq; commissa, remedio cruentis idoneo uti. Cæterum osse sacro confracto, index sinistrae manus digitus in anum demittendus est, dextra manu quod con- fractum est, quatenus licet, in naturalem figurā reducere oportet. Si autem aliquid fractum sentiamus, hoc quoq; diuiso, deligaturam curationemq; congruam adhibebimus.

*De brachio.**Cap. XC IX.*

**I**N brachio confracto Hippocrates quidem intentionem hoc pacto molitus est. Lignum, inquit, oblongum manubrij ligonis modo, per summa fune deligatū, obliquum ex trabe quadā suspendere oportet: collocato autem homine in sublimi quodā erectius, quā iuxta figuram qua recta ceruice dormimus, orthocatheudon dī, manū ipsius super cōmemoratum lignum traducere, ut mediū ligni alæ eius transuersim adaptetur. manum aut inflexo iuxta rectū angulū cubito, minister procūbens continebit, deinde graue aliquid, exēpli gratia, lapidē aut pondus plumbeū uel eiusmodi quippiam ex cubito suspendens, sinensq; pendere sublime, ita fracturam cōformabis: uel loco ponderis, famulus ad ima brachiū detrahat. Nonnulli uerò loco manubrij ligonis gradu scalæ usi sunt. Soranus hunc in modū tradit: ægro in sedili collocato, uel, quod satius est, resupinato quò minus molestiæ sentiat, manu fune ligata iuxta compagem qua ipsa cum brachio cōiungitur, & ex ceruice suspensa, ut angulosā ipsius figura seruetur, ministris duobus



bus iubeamus, huic, supra fracturā, illi, infra digitos circumponant, atq; sic tensionem perficiant. Quod si ualētiore opus sit tractione, duos funeis æqualeis brachio circundamus, unum, supra fracturam: alterum, infra. atq; uni famulo super ægro:antis caput consistenti, alteri iuxta pedes, capita funiū tradentes, iubeamus in diuersa brachiū distendere. At si summus humerus fracturā senlerit, dimidio uinculi, quod ciria dicitur, alæ subiecto, reliquā partem iuxta caput teneri iubentes, alio quod oppositū est retrahente antitafin, hoc est à se retractionē uti dictum est, moliemur, quēadmodū sanè si cubitus confractus fuerit, illi uel iuncturæ manus cū brachio funis iniicietur. Oñibus iam fracturæ probè coaptatis, distentio quidem remitteretur, sed iuxta Hippocraticam consuetudinem deligabitur. Porro si fractura inflāmate uacet, recensq; sit, lineis utendū fasciis oblongis abūdē, circa treis quatuorue digitos latis, aqua madētibus, aut ēt posca si inflāmatio adest, lanis tenuibus mollibusq;, oleo imbutis: & si quidē in medio brachij fuerit fractura, initiū fasciæ super fracturā iniiciet: ubi his térue illigaueris, rursum fasciā ducere cōuenit, ut (quēadmodū inquit) sanguinis influxiones excipiātur, atq; illic finiat. Iam uero & secūda fascia uti oportet, initiū eius similiter supra fracturā iniiciēdo, atq; alia eo modo quo in priori: rursus aut̄ supernè deorsum, atq; iterū rursum reuocare, illic ēt sic terminabitur. Porro cōstrictio mediocris esto, tū nostri sensus, tū ipsius ægrotantis iudicio. At si iuxta summā humeri cōpagē cōtigerit, priore fascia illā & scapulas, & pectus cōprehendes, ut deligatura fiat quā Græci geranida appellāt, perq; secundā usq; ad cubitū dispēsabis, ac inde ad supraposita recurre, cū summo humero scapulas pectusq; cōprehendens, primæ fasciolæ similiter. Quod si iuxta cubiti flexū fractura obuenerit, ēt cubitū colligare expedit, ita ut angularis figura cōseruetur. similiter in aliis quoq; artubus, nimirum cubito, femore, tibia, cū fractura in parte, aut ēt iuxta articulamentū & nō in medio mēbro existit, post articulū fasciam iniicere expedit. Recētiore itaq; secundum deligaturam protinus ferulas ēt iniiciunt, ut adaptationis figura contineatur, constringentes ipsas prout sensus & tumor ex inflammatione posu'at: ueteres autem, à die septimo ferulas accommodarunt. nam intra hunc inflāmate declināte membrū redditur tenuius. At Hippocrates tertio quoq; die ligamēta solui iubet,



iubet, ne tensio quæpiã, aut motus præter solitũ cõtectæ parti-  
culæ obueniat, aut eius quod iam infixum fracturæ est, perspi-  
ratus prohibeantur, propter quos non solum noxius pruritus  
quibusdam accidit, sed etiam erosa è saniei acrimonia nonnun-  
quam cute, exulceratio concitatur. Itaque aquæ temperatæ  
tantum superfundere ratio est, quantum saniem discutere suf-  
ficit. Post septimum diem, ex maiore interuallo soluere con-  
uenit, ceu partes non amplius saniem excernere desiderēt. imò  
etiam calli obfirmatio hoc modo felicius prouenit. Cæterum  
ferulæ iuxta sequentem rationem debent iniici. Splenia tri-  
plicia oleo imbuta super fascias circundantur. Si igitur mem-  
brum crassitudine fuerit æquale, similiter: si inæquale, partibus  
magis concauis per splenia repletis, æquale ipsum crassitie fe-  
rulis accommodandis efficiemus. deinde lana aut stuppa ferula  
mediocriter inuolutas, in orbem fracturæ circundamus, non  
minore quàm digiti spatio inuicem distantes, easque mode-  
ratè constringemus: ita tamen, ut quatenus fieri licet, ferulas  
propius accedere articulum prohibeamus, præsertim iuxta in-  
teriolem flexus partem. ulcera siquidem in ipsis nonnunquam  
& neruorum inflammationes pariunt, uerum. illic laxiores ip-  
sas esse oportet, quemadmodum ualentiores, ubi fractura cur-  
uatur. Præstiterit autem thoraci etiam brachium mediocri-  
ter colligare, ne ipsum loco motum, figuram peruertat. At  
si quandoque inflammatio fuerit, (eam uerò agnosces ex am-  
biente tumore, ac rubore, & quod membrum nunc multò ma-  
gis quàm prius stringatur) uel si confractum membrum, di-  
stortum sit, & nihil horum appareat, sed ligamenta laxa, uel  
econtrario strictiora, quàm par est, inueniantur solutis ipsis de-  
ligatura instauranda est. Resupinari igitur egrotus debet, ita  
ut super stomachum manũ contineat: brachio subijcietur mol-  
le quiddam pellem super se habens, ut superfusionum influxus  
excipiat. Superfunderetur autem quotidie oleo calido, præser-  
tim quum urget inflammatio, quando etiam cibus tenuis exhi-  
beri debet: postea mediocris, ad calli generationem quies indi-  
citur usque dum fracta occalluerint. occalescunt autem bra-  
chium & tibia, diebus circiter quadraginta, post quos ubi solue-  
ris fascias, & lauacro usus fueris, emplastris ad fracturas faciis  
perfanare conuenit. hæc tractandi ratio omnibus alijs prope-  
modum confractis artubus conuenit.

De



**C**ubitus radiusq; interim uterque iuxta eundem locum frangitur, interim alter duntaxat, uel in medio, uel in parte iuxta flexuram, aut brachiale. Omnium itaq; deterrimum est quā ambo eadem parte franguntur, deinde etiam cubitus solus. At radius fractus, aliis facilius curatur. siquidem maior cubito non est, sed illum ipsum subiectum habet, ut ueluti infideat. Porro si ipsorum alter duntaxat fractus fuerit, in illo maximè intentionem ualidiorem moliemur: si uterq; similiter intēdemus, manu anguli modo figurata, ut pollex omnium digitorum altissimus, exiguus digitus humillimus habeatur. sic enim cubitum radio subiici contingeret. At si ualentiore opus sit intentione, ambobus potissimum confractis, non solū manibus, sed etiam funibus intendere aggrediemur, ut in capite de brachio comprehensum est. Cæterū omnis deligatura, & reliqua prælidia, una cum ferularum iniectione, hic adhibenda sunt, dum callus eos firmarit. Firmatur autem cubitus diebus plurimum triginta. Ac repositio ipsius similis erit ei, quam brachium fractum uendicat, præter ea quæ ipsi subiiciuntur.

## De summa manu, &amp; ipsius digitis.

## Cap. CI.

**B**rachialis & aduersæ eius partis, & in digitis articularū ossa, quā laxa fistulosaq; natura sint, contunduntur quidem plerunq; raro autem franguntur. Aegro igitur in alto sedili collocato, medicus in altero quodā æquali aduersus sedebit, priusquā manū imponat: ac tensis per ministrum iis quæ fracta sunt, duobus digitis ipsa cōformabit; pollice & indice digito prius cōpressā. deligatura utetur, quo tempore urget inflāmatio. Nā propter laxitatem facilè in ipsius callus amplior concrefcit. At si acies digitorū, aut digitus simpliciter confractus est, siquidē magnus & pollex appellatus, fuerit, post commodam deligationem ab inferiore parte, ipsum utiq; cum manu ligabis, ne dimoueatur: si ex aliis quispiā, uel index, uel paruus digitus, proximo colligabitur: sin aliquis ex mediis, iis qui utrinque habentur, uel etiam omnes deinceps ligari unā debent, melius enim conquiescunt. quemadmodū si confracti ferulis quoque colligentur.

De



## De femore.

## Cap. CII.

**E**Adem de femore dicenda sunt, quæ de brachio prodidimus. peculiariter autem magis femur fractum, in anteriorem partem & exteriorē promouetur. etenim in his naturaliter dilatatum est, instauratur autem manibus, funiculis, & antennis æquivalentibus, una, supra fracturam posita: altera, subter. Quod si in parte fractura euenerit, idq; iuxta femoris caput, dimidio fasciæ lana circumdato, ne corpora incidat, iuxta inguina disponemus, & initia ad caput reducta, famulo ut partem contineat, trademus: infra autē fracturam fune circumposito initia ad intentionem alteri ministro exhibebimus. Quod si ad genu fractura habeatur, funem sanè supra fracturā iniiciemus, initia eius ad extensionem dispensamus, genu etiā ipsum implicito quodam fune continemus. hanc autem partē restituimus ægro decumbente, & crure exporrecto: quæ pungunt ossa ut subinde dictum est, eleuata, superius tollemus. reliquam curationem in capite de brachio exposuimus. cæterum callo firmatur femur quinquaginta circà diebus. At quomodo reponi debeat, post totius cruris disciplinā, comprehensum est.

## De patella.

## Cap. CIII.

**P**atella os laxū est ac molle, ualidè corporibus superiore & ima parte cōprehensum. frequēter sanè contunditur, raro autē frangi solet. sustinet autē rupturā per crassitudinē, & in tenuia fragmēta finditur, cū uulnere, uel sine uulnere. Nota uero cōspicua (motus. n. continuitatis intercudit) & cavitās & sonitus. Instauratur autem pars cruris extensa, nam quæ bifariā fissā est digitis eousq; cōmittitur, donec fracturæ labra supra sese contingant, & inuicē iungantur: quæ uero in tenuia fragmenta fissā est, manu cōformatur. etenim callo nō generato, cō quod pars utraq; per musculos cognatos & neruos, à femore & tibia in contrarium non retrahatur, tamē multitudine distentionis contrahet, & functionis difficultatē affectis inducet, neq; enim laborantibus ipsis diutius genu sustinet, & obambulādo illi impediūtur, præsertim ascensuri. siquidē in æquali per planiciē motu actionis difficultas occultatur: in ascensu autē, eo quod genu, in crucis eleuatione & positu non inflectatur, deprehenditur. Iam uero ossiculum si quod pungit, eleuatum prius eximito, ac curationē consentaneam adhibeto.

D



*De tibia.**Cap. CIIII.*

**T**ibia cubito respondens, eandē curationem recipit. etenim illa duobus ossibus fulta, altero crassiore & cognomini, altero tenui, quod ex similitudine perone Græcis, quasi fibula, latinis sura dictū easdem fracturarū differētiās recipit in omnem enim partem distorquetur, quū ambo ossa confracta fuerint. in treis autē, quum alterum, intra & extrā: tibia quidem, retro: sura, antierius. quapropter etiam ipsa similiter restituitur manibus, aut funiculis superioribus, quā fracturæ funes sunt, interim ipsi tibiæ circundatis, interim femori. Nam quum genu sit ualidius, articulum integrum per tentiōnem seruabimus. Similiter & inferiore fracturæ funiculo, ut in cubito dictū est: reliqua ut in capite de brachio tradidimus.

*De pede summo.**Cap. CV.*

**T**alus nequaquā frangi solet, eo quod undequaq; tibia, sura, & osse quod ob tessaræ similitudinē uocatur cyboides custodiatur minuaturq;. At os quod à cymbæ figura dicitur scaphoides, & supernæ pedis regionis, item pedis digitorum ossa, ipsumq; cyboides, similiter iis quæ in brachiali & opposita eius parte, manusq; digitis sunt, franguntur. quare etiā quæ de illis diximus, ne eadem repetantur, illinc huc transferre consilium est.

*Quomodo crus reponi debeat.**Cap. CVI.*

**F**emore fracto, aut tibia, non minori cura repositionē ipsius, quā reliquā curationē obibis. Nā: partiū confractarum æqualitas, hac potissimū probè administrata, conseruatur. Nonnulli igitur canali, quā solenam Græci dicunt, nunc lignea, nunc fictili, membrū fractum, aut etiam crus ipsum reposerunt: alij uerò sola ea quæ cum uulnete fracta sunt. eo qd hæc ferulis nequeant constringi. in totum uerò solenarū usum posteriores damnarunt, multis sanè de causis, sed præcipuè, qd ipsarū duritia partibus negotiū facesseret. Neq; tamen alienū est, artus cū uulnere fractos ferulis excipere, ut ostēdemus. Aeger itaq; resupinabitur, ac indumentum aliquod crassum cruri æquale, in longitudinē utrobq; contractū & inuolutū, ut canali per mediā concauitatē oblongā proportionē respōdeat, subijciatur: pellis super ipsam molliuscula explicabitur, quæ superfusiones excipiat, deinde in longū crus concauitati huic canalem



nalem referenti, insinuabitur. à lateribus alia uestimenta lina ve apponentur, ne membrū in latera declinet, pedis autem ima pars asserculum rectū panniculo circumdatū, propter molitiē, assumet. ac maioris securitatis gratia, media fasciarū duarum trium ve, uestimēto canalīs modo pręparato subiicientes fractum membrū ipsi leuiter deligabimus. At si æger non tolerans conetur pedem totū contrahere, conuenit id facere quod in superiore pedis parte dictum est, deinde blandē cum asserculo deligare, ne inuiti inter dormiendū, ut uerisimile est, pedem contrahant. Aliqui uerò etiā stragula lecti per medium pertrundunt, ut ipsi sint immobiles, & per foramen urina & stercus reddatur, usq; dum callus coalescat.

*De fracturis qua cum uulnere incidunt. Cap. CVII.*

**F**ractura cū uulnere facta, siquidē sanguis profundatur, hunc prius sistemus: si inflammatio fuerit, præsidiis in eam efficacibus utemur. Carnibus contulis, partē affectam scarificabimus, metu, ne in gangrænā incidat, sublato: at si illa quoq; accesserit, aut alia quæpiā serpens putredo, conuenienter occurremus habes autē horū singulorū curationē quæ toto uolumine explicitam. At si nihil horum adfuerit, neq; ossa largiter denudata sint, hamulis, suturisq; usi, remedio cruentis apto, his medebimur, sic, ut ossicula refracta, ut uerisimile est, & pungentiā innatantiaq; primū auferamus. Quod si magnū aliquid os emineat nō commissum propter magnitudinē, in intentione huic prospicies. Siquidē Hippocrates femore & brachio confractis ossa excedentia statim eiicere dehortatur, periculū his futurum prædicens ex inflammatione, quam tensio crearet, uel etiam cōuulsione, ut credibile est, musculorū neruorumq;. Tempus uerò nōnunquā administrationē cōmodam inuenit. In quocunq; igitur ossē quod ex sede sua excidit, manū admo- uere uolumus, nequaquā in inflammatione aggrediemur, sed primo statim, die, antequā inflammatione occupetur: aut nōno, inflammatione iam finita. Adaptamus uerò ossa uectis quam Græci mochliscon uocāt, est autē ea instrumentū ferreū septē octo ve digitos longū mediocriter crassum, ne inter cōmouendum inflectatur, acutū in summo latumq;, & leuiter inflexū, cuius acutum extremū superposito ossis tuberculis subiicientes, ex altero in oppositū tendentes simul, & mediocri inten-

PAULI AEGIN.

F sione



sione membri facta, inter se sineis fracturæ cōmittemus quod si facere nequeamus, scalpris excisorijs obuertas acies habentibus quod eminet auferemus, aut serra subsecabimus, quemadmodum in fistulis docuimus: ossiumque asperitudine adæquata, & membro directo, medicamentis quæ in linteolis illinantur, curabimus. Maximè autem animum adhibere oportet in membris coniugalibus, aut à iugis appellatis, aliter autem in ipsis ossè particulatim serra abscisso, ut membrum in contractum maneat, etiam intensione accurata utemur. deligatura uerò hoc modo adhibenda est. Circulares itaq; fasciæ, partibus uulneris utrobiq; iniici debent: obliquæ uerò, per ulceris longitudinem, ut in literæ Græcæ X similitudinem conclusio omnium fiat. Si sordidum adhuc ulcus est, purgantia adhibebimus: si purum, quæ carnem inducunt, linteolis illita, aliamq; comprobata usum materiam. Hippocrates pissera emplastro in linteolis utitur, id autem esse dicunt tetrapharmacum basilicum. Vbi caro increuerit, ferulæ iniicientur. aliqui uerò per initia ipsas accommodant, ulceris locum nitantes, & pro usu urgente ipsas constringentes, uel rursus remittentes. In quibus autem squama ab ossè recedet, notabimus quidem hoc, inde quòd copiosus humor & tenuis excernatur, caro autem ulceribus uacua inanisq; facta attollatur: deligatura quidem laxiore ad curationem utemur, hamulo autē, aut eiusmodi quopiam squamam euellentes, iterum ualidiore deligatura utemur. porrò per totum ulceris tempus medicamen aliquod ex ijs quæ inflammationem arcent linamento illitum, uulneri incumbet, ac simplices fasciæ iniicientur, quæ singulis curationibus solui debent, quum aliæ suprà dictæ maneant, ut in capite brachio expositum est.

*Si præter modū fracturis callus obducatur. Ca. CVIII.*

**I**mmodici fracturarum calli indecoram omnino speciē efficiunt, nonnunquam etiam functiones impediunt, si prope articulum coaluerint. Si igitur recens adhuc callus coierit, remedijs admodum astringentibus utemur deligatura ipsa accommodantes. Nonnunquam uero & plumbea imposita lamina, id quod requiritur, efficimus. At si lapidosus solidusque fuerit, incidentes ipsum rademus, id quod eminet, scalpris auferentes: si res exigat, etiam terebris usi.

Si



*Si distortum membrum callus firmarit. Cap. CIX.*

**Q**uibus membrum distortum callus firmauerit, difficultate functionū obeundarum haud exigua subsequente, præsertim si in pedibus fuerit, repositionis quidē modus nō recipiendus est, ut qui extrema inferat discrimina, uerū si callus nondū radices egerit, laxatibus superfusionibus, & cataplasmatibus ex ficis pinguibus & colubarū stercore, alijsq; medicamentis quæ à callo soluendo porolytica dicuntur, utimur. Insuper per manus frictione, & confectione hunc dissoluemus. Quod si lapidosus euaserit, scalpello superficie diuisa, excisoriis scalpris consortiū ab osse liberabimus, deinde fracturæ medebimur, ut superius à me dictum est.

*Si fracturæ callo non firmentur. Cap. CX.*

**F**racturæ nonnullæ sine callo permanēt, suprā definitū naturæ tēpus, aut ob cōtinuas resolutiones, aut immodicas superfusiones, aut motū intempestiuū, aut fasciarū copiā, aut quia totū corpus alimentum nō percipit, in quibus etiam tenuius fieri membrū contingit. Itaq; cum alias occasiones, tū maximè corporis inediā tollere conandum est, partim per calidiora alimenta materiam particulæ distribuendo, partim cibū subministrando sufficientē, item lauacra, & reliquas animi uoluptates. Porro notæ eos qui callo iam firmanentur comitantes, hæ inter alias sunt præcipuæ, si fasciolarum cruorē referāt, et non ob orto uulnere, quod forsan accidit, calli substantia quando coalescit fistulis ossium inspersas sanguinis guttas extudentes.

*De ossibus luxatis. Cap. CXI.*

**Q**uoniam luxationes fracturis proximæ sint, de ijs uerba facere aggrediemur. Luxatio igitur est, ut summatim dicam, quum articulus à proprio sinu, ad insolitū excidit, in qua motus arbitrarius impeditur. differentias ipsius alias dicere non habemus, nisi eam dūtaxat quæ ex maioris minorisq; ratione sumitur quum enim articulus in totum exciderit, communi generis uocabulo affectus Græcis exarthrema, latinis luxatio dicitur: quum aut aliquatenus duntaxat emotus est, aut usq; ad superficiem è sinu elapsus, pararthrema.

*De maxilla. Cap. CXII.*

**R**ursus à superioribus incipientes de maxilla dicamus. Nam quum maxillæ sint immobiles, luxatione non periclitantur.



ellicantur. maxilla autē toto loco non mouetur, quod capita ipsius malis firmiter ac tutò insinuata sint: modicam uerò peruersionem quam pararthrema uocauimus, subinde experitur, quòd ob mūsculos qui ipsam continent ex continuo mandendi loquendiq; exercitio in mollitiē elanguescenteis, qualibet de causa faciliè laxetur, quod uerbū apud Hippocratē *σχῆτα* dicitur, in quibus sine aliqua difficultate articulus spōte in proprium locū reuertitur. uerū de maxilla in totū luxata, satis est illius uerba exponere, quæ compendiosa, integra, & perspicua existunt. Scribit itaq; hunc in modū. Excidit quidem maxilla rarò, laxatur autē subinde oris hiatu, quomodo etiā aliæ plures mūsculorū neruorumq; peruersiones, id efficiunt. Clarū itaque hinc potissimum est, quodocunq; exciderit. Nam maxilla in anteriora prope litur, & ad contraria eius unde prolapsa est, peruenit, ossisq; tuberculum iuxta malas tumidus apparet, difficulter ægri maxillam cōmittunt. Qualis autē repositio ipsi congruat, manifestò liquet. alium. n. continere caput oportet, alium comprehendentē ab interiore parte & euitiore digitis iuxta mentum hiantē hominē quā mediocriter potest, primū quidem maxillā commouere aliquādiu, & huc, illuc manu diducere, ipsiq; homini iubere, ut laxam maxillam habeat, simulq; remittat, & concedat, ut repentē potissimum laxetur. tribus pariter figuris, mente adhibita. Ratio siquidem est illam ex peruersione in naturalem statū reducere. Oportet autem maxillam in posteriora propellere, item cōsequenter his committere, neq; hiare. Insertio igitur hæc etiā in aliis figuris fieri non poterit. medicina autē modica sufficiet, spleniū, appositum ceratum fascia laxiore deligare. Sed tutius est, resupinato hominē firmare caput ipsius puluinis subiectis quā plenissimis, ut quā minime cedat. Cæterum ulnerati caput aliquis continebit. Sin autē utraq; eadem maxilla eluxata fuerit, curatio quidē adhibebitur: uerum cōmittere minus hi os possunt, ut quibus prominentiores maxillæ sint. rectitudinem autē in deflexam maximè cognosces. dentiū & superiorū & inferiorū terminis, secundū horū directam aciem confert illas quā citissimè inferere. quomodo autem inferentur, expositum est. Quòd si locis suis non insinuentur, & periculū de anima subsequetur ex febribus continentibus, & torpido. Caro. Nam mūsculi hi dum alterantur, & præter naturam intenduntur, Carū inducunt.



inducunt, uenter solet his biliosa deijcere, uel syncera pauca, & si etiam uomant indiscreta eijciunt. hi igitur decimo die potissimum moriuntur. ac hoc modo iniectionis nos subinde usi sumus, fomentis prius ex hydrelæo calido per spongiam super luxatam maxillam adhibitis, quando potissimum ægrè potest restitui, homineque humi collocato, post ipsum nos sedentes, quemadmodum ab Hippocrate traditum est, operamur.

*De clauicula & summo humero. Cap. CXIII.*

**C**lauicula interiori quidem extremo nō excidit, ut quo pectori committatur. unde ne mouetur quidē in ipso. At si uiolentia cuiusdā acuti extrinsecus ferientis auelatur, quemadmodum fractura ipsius instaurari debet. Extremum autem, ipsius quod humeri articulo inferitur, non admodum sanè excidit, à bicipiti musculo summoq; humeri tuberculo prohibitum imò neq; uiolento quodam motu clauicula priuatim agitur, propter solam thoracis factam separationem. Vnde homo solus inter animantia clauiculam obtinet: quam si in palæstra, ut uerisimile est peruertere contingat, conformatione per manus dirigitur, & splenijs multiplicibus accommodatis unā cum deligatura decenti: eadem curatione etiam summus humerus peruersus in propriam sedem reuertitur. Est autem ossiculum cartilagineum quod clauiculam scapulis colligat, in resiccatis mortuorum cadaueribus occultatū, quod loco motum, imaginem imperitis exhibet, brachij caput excidisse, etenim in hoc exterior humeri pars acutior apparet: concauum autem, id unde excidit. uerum notis quas deinceps subiungam ipsa discernentur.

*De humero luxato. Cap. CXIIII.*

**B**rachij caput scapularum sinui insertum, excidit quidē frequenter, uerum neq; in superiorem partem, ut quod scapularum processus ancoræ similis impediatur: neque in posteriorem, propter ipsas scapulas: neq; tamen in anteriore, ob muscoli bicipitis tendinē, ipsumq; humeri fastigium. Sed raro quidē in interiorē exteriorēq; prolabitur, continuè uerò præsertim macilentioribus, ad ima atq; his sanè facillè & excidit & rursus inferitur: multa autem carne præditis contra, raro quidē elabitur, sed ægrè in sedem suā compellitur. Quibusuā itaq; etiam nō luxatis, ex icū frequenter elapsi loco membri



suspicio oritur. eo quod ualida inflammatio subsequatur. Porro quibus in imam partem luxatus humerus est, hoc modo agnoscas: affectus humerus si cum sano conferatur, multum differt, quum exterior eius pars unde excidit, concava appareat, ut in summo humero eluxato diximus, quod acutius quam naturaliter esse debet, apparet, & brachij caput elapsum in ala manifestò occurrit, ac manus huius cubitus à costis magis recessit, quibus quidem costis si ipsum adigas, cum dolore admouetur, neque aegri manum extenso cubito ad aurem possunt reducere, neque alium motum multiplicem per eam moliri. In pueris itaque uel in quibus recens nec ampla facta est eluxatio, et nodo medij digiti flexi eminente medici manus, uel ipsius affecti, sanæ manus, si non puer sit, frequenter restituta est, ut inquit Hippocrates. ualentius autem hoc modo luxata inseruntur. Homo lotus & superfusionibus laxandi uirtute præditis usus, resupinari humi debet, & pila mediocris uel coriacea, uel alia quæpiam non admodum mollis alæ accommodabitur, ac sedes medicus aduersus ægrum, iuxta latus affectum, si quidem dexter humerus luxatus sit, dextri pedis calcem superponet pilæ alæ suppositæ, si sinister, sinistri. ac affectam manum prehensam ad pedes trahet, simulque calcaneo alam in diuersum propellet, ita ut aliquis post caput ad alterum humerum resistat, ne corpus circum diuellatur. Est & alia ratio immittendi, quæ humero subnixo perficitur, quod Græci κατωμίζεν dicunt. Adolescens, aut longior ægrotate, aut altius consistens iuxta affectum latus, ægri indidem collocari alæ suam ipsius humerum subiiciet, & manum eleuatam ad uentrem suum attrahet, ut reliquum ægri corpus post eum qui humerum suum alæ subiecit sublime pendeat. At si æger leuior fuerit, alius quispiam puer leuis ex ipso suspēdetur. Nam manu ac reliquo corpore in contraria detractis ad ima, subiectus alæ humerus facile elapsum articulum reponit. atque hoc et ligno quod Græci hyperon dicunt, efficiamus. Est autem id lignum oblongum, rectum, quod in paucum extremo super aliud quoddam solidum ponitur. huius igitur summum extremum rotundum, quod non admodum crassum neque tamen tenue est, alæ ægri aut stantis, aut sedentis, subiicietur, iuxta totam ipsius longitudinem. Ac manu per lignum istud porrecta & detracta, reliquo autem corpore contra inferius uergente, uel sua sponte, uel alio quodam trahente, restitutio fiet. atque hoc in scalæ gradu fieri debet, quemadmodum in confracto brachio per tensionem fieri dicebamus.



dicebamus, hic autem rotundum quoddam corpus super gradum deligatur, quod ægrotantis alæ possit adaptari & brachii caput propellere. Porro si ob uetustatē affectus, aut corporis duritiem, repositio nobis facessat negotiū, utemur ēt ratione quæ per spatham ligneam, amben appellatā sit. Est autē ambe lignū quod longitudinē duorum cubitorum habet, latitudinē quatuor digitorum, crassitudinem instar digiti, alterum extremum rotundum, quod etiā promptē in alæ sinum ingreditur, perinde ut ligni quod hyperon uocatur, extremum. hoc itaq; extremum panniculo circundatum, quō lenius existat, capitulo brachii iuxta alam accommodabimus, totam uero manum ad lignum intensam cū eo deligabimus, iuxta brachium, cubitum, & eius extremum, deinde ligno obliquo inter duas columnas rectas adaptato, uel rursus supra scalæ gradum manu traiecta cum ligno, ut ala per trāuersum gradui accommodetur, manum infra trahentes, sinemus in alteram partem reliquum corpus in sublimi pendere, tunc n articulus ingreditur. Vbi fuerit repositus, mediocris ex lana pila si quidem inflammacionem pars non sentiat, sicca: si sentiat, oleo madens alæ iniecta, deligabitur. per hanc autem alam & humerum & alteram alam uinculi deligationes literæ X figuram potissimum apparebunt. ita ut in hunc modū facta deligatura super affectum humerum accommodetur, brachium autem costis colligetur, ipseq; cubitus & summa manus, ex ceruice deuinciantur, ne rursus de integro articulus excidat. Post septimum diem uel tardius ubi fascias dissolueris, mediocri uti frictione præstat, eo q corpore solidiore facto, articulus ita firmetur, ut nō facilē prolabatur. Quod si aut crebro prolabatur, aut humiditatis uitio, aut ob aliā quampiam iam diu factā elabendi uiam, ad uestionē ueniendum est, sicut supra comprehendimus. Quum autē uel infantibus in utero aut æditis quidem in lucem, sed adhuc incrementibus, particula fuerit luxata, necdum reposita. in humero quidem carnes nihil à naturali figura deficiunt, neq; enī manus quodcunq; opus perficere impeditur, os autem brachii breuius permanet, non augetur, ac tales nominantur galiancones. In femore etiam os incrementum non sentit, & totum crus contabescit, quum enim pondus corporis ferre nequeat, non exercetur, ac in aliis membris luxatis manentibus quæ subijciuntur partes, omniū iniuriis expositæ sunt.



**Q** Vanto cubiti articulus humero magis uarius creatus est, tanto plus negotii prolapsus exhibet, & tardius quidem existit, sed difficilior reponitur, propter tuberculorum sinuumq; frequentiam. Nonnunquā igitur solum aliquatenus detorquetur, quem casum pararthrema dixi, saepe uero etiam ex toto in omnem partem probabitur, praecipue in priorem & posteriorem, quod facile dignoscitur, eo quod excidit oculis & tactui obiecto, in quodcunq; prolapsus sit, & sinu unde excidit apparente. Hæc uerò potissimum sani cubiti inspectio coarguit. Conuenit autem protinus membrum reponere priusquam inflammatione occupetur: siquidem eam expertum, difficulter curatur. Quædam etiam nullam prorsus curationem recipiunt, maximè si in posteriora prolapsa sint. Hæc enim luxatio omnium quæ in cubito sunt maximè dolorifica est & periculosa. Quod si modicè articulus inuersus sit, moderata etiam intensione restituitur. sic ut ministri manum exporretam iuxta brachium cubitumq; contineant, & in aduersa retrahant, medicus autem suæ manus palma quod excessit in suam sedem compellat. Hippocrates in priora luxationem subito manus inflexu instaurat: ut palma ipsius humerum iuxta rectum pulset: in posteriora uerò, subita rursus & diutius facta extensione, quoniam luxatio in priorem partem, uiolenta potissimum extensione efficitur: quæ in posteriora, flexu similiter uehementi. Quod si luxatio perseveret, etiam ualidam magis intensionem usurpabimus, eiusmodi uero est potissimum quam Hippocrates in brachio cōtracto exposuit, ubi ligonis maunbrium adhibebat. Porro recentiorum aliqui hunc in modum adaptant, ministris duobus manum ut dictum est, intendentibus, ita ut alter sursum ad alam contineat, alter deorsum iuxta brachiale, medicus aduersus ægotanti consistens, duabus palmis iuxta articulum, brachium circundat, ac ubi iusserit uestimentum cōtractum in oblongum uel latam fasciam manibus ipsius simul & ægotantis brachio circundare, & in exteriora imaque propter summam manum retrahere, ipse deinceps cum tensione constrictas ipsas trahit, donec cubiti articulum excedant. Cæterum manus prius oleo illini debet, ut lubrica fiat & facile medici palmis deducatur. Sic enim prolapsa, si pertrahentiū manum



manum uī premantur, in propriam sedem reuertuntur. Postquam sunt reposita, in anguli modum figurata manu, ex splenijs & conuenienti deligatura curationem petemus.

*De brachiali & digitis luxatis. Cap. CXVI.*

**B**rachialis digitorumq; luxatio nullum facessit negotiū per se, nisi cum ulcere facta fuerit de hac igitur in capite de luxationibus quæ cum ulcere sunt tractabitur. At si ne ulcere luxatis, mediocri intentione, & remedijs quæ inflammationem pellunt, medebimur.

*De uertebri spina. Cap. CXVII.*

**V**ertebrae spinæ si ex toto prolabuntur exciduntq; præsentaneam mortem inferunt. Medulla siquidem ipsius spinæ uel quamlibet cōpressionē nō sustinet, quum & solus ex ipsa neruorum processus si cōtundatur, hominem in periculum perducere sufficit. Peruersionibus aut subinde affligitur, nūc in priorem partem distorta, ac uitium lordosin Græci appellant: nunc in posteriorem, & cyphosin à loco gibbato uocant: interim uero in latera, quod scoliosin nūcupant. Quū igitur multæ simul uertebrae paululum adeo peruersæ fuerint, plurium simul peruersio ex circulari flexus rotūditate fieri apparet, ac putant nonnulli decepti, ab una uertebra ampliter peruersa id fieri. Nā magna distortio non rotundum, sed angularem spinæ flexum molitur, quando etiam magis periculum subsequitur. Si igitur introrsum spina est peruersa, restitutionis spes nulla est, eo q̄ per uentrē, anterieus oppositio fieri nequeat. qui. n. in scala sic affectos intendūt, aut cucurbitulas admovent, aut sternutamenta aut tussim, aut flatus excitāt, quid tandem promouere putati sint, Hippocrates abundē ostendit: Quoniam uero subinde cuiusdā ossiculi spinæ refractione facta, cauum locū repræsentat, quemadmodum in capite de fracturis cōprehensum est, aliqui uitium lordosin esse crediderūt, deinde hoc celerius persanato (promptē. n. callo firmatur) lordosin curatu facilem existere pronuntiarunt, & si nullam curationem, aut certē difficilem recipiat. his etenim urina supprimitur, alius nō respondet, corpus inhorrescit, postea etiā sine uoluntate excrementa prorumpunt. Hæc autē eueniunt, neruis & musculis consortij lege lacescitis, ac celeriter ægri moriūtur: præsertim si superiores & ceruicis uertebrae affectum fuerint



runt expertæ. Cui uerò iam inde à paruulo potissimum uertebrae gibbatae protuberant, uitiū longum esse neq; celeriter morreni, sed morbū accersire, & insanabile Hippocrates prodidit. At quibus recens hic gibber ex casu prouenerit, machinae quidem per scalam, & rectam ægri suspensionem ac uteri inflationem adhibitæ, ridiculae sunt. sola autem Hippocratis adaptatio sufficiet. Conuenit enim, inquit, lignum magnum quod tantā longitudinem, ac latitudinem habeat, ut hominē excipiat, aut scamnum huic æquale, prope parietem deponere, ac iuxta hūc ita extendere, ut in longitudinem pede non amplius abūt, & uestimenta quædam super ipsum explicare, ne hominis corpus infringatur, (erit autem hic lotus antequam super lignū scamnum uē insideat,) deinde loro pectus ipsius bis circumdatum, per alas iuxta dorsum uincire, initia lori ligno oblongo pistillo simili deligare, atq; hoc super pauimentum iuxta ligni, aut scamni subiecti extremum constituere, & ministro post ægri caput stanti ex superiore parte continendum tradere, ut imo quidem extremo contra fixo, altiore supra caput tracto, opportuna fiat intentio: altero autē loro pedes simul & superiores talorum partes deligantes, & rursus alio, superiora ilium & lumbos ita ut huius in lumbis fiat connexio, iterum extrema horum ligamentorum cōiungemus: alii autem ligno pistillo respondenti, similiter prædicto illigantes, statuemus in ligni aut scamni extremo quod iuxta pedes est, lignum pistillum repræsentans, ad prioris similitudinem, deinde famulis iubebimus ut per ligna retractionem in diuersa moliantur. Quidam uero asellis dictis hanc efficiunt. sunt autem hi axes qui contra rectum lignum uertuntur: utroq; huius magni ligni, aut scamni latere iuxta extrema ad pedes, caputq; sita, lora inuoluantur. Quum aut sic intentio ipsa administratur, manus palma gibberum constringemus: si aut usus postulat, etiam super ipsum insidebimus, nullum ueriti periculum. At si ne sic quidē spina instauretur, & æger pressionem ferat, utile est parietem adiacentem in longum canalis modo exculpere è regione gibberi, ut sculptura cubiti longitudinem habeat, neq; altior sit ægrotantis spina, neq; multo humilior, imò sculpturā prius præparatā esse oportet. huius enim causa etiam lignum ab initio prope parietem poni maluimus. deinde assèris mediocris alterum finem ad ima comprimemus, donec sensibilibus spina dirigatur.

uerum,



uerum, ut inquit Hippocrates, sola intensio citra asserem, rursusq; per asserem sola curatio, id quod requiritur potest efficere. Quod si hoc uerum est, non alienum etiam in lordosi & scoliosi per initia intensiorem prædictam, sine cōstrictione uidelicet, moliri: post adaptationem uero, lamina lignea quæ latitudine treis digitos æquet, longitudine gibbero respondeat & aliquam ex sanis uertebis comprehendat, loro linco, aut fluppa propter duritiē inuoluta, uertebis ipsis imponi & conuenienter deligari debet, uictus adhibebitur tenuis. At si post hæc quædam gibberi reliquæ remanserint, laxantibus emollientibusq; remediis cum laminæ appressu per diu utendum est. alii uero plumbeam laminam usurparunt.

*De coxa luxata.**Cap. CXVIII.*

**Q**Uum alia corporis ossa interim paulum excedant, interim toto loco excidant, coxæ humeriq; articulus soli luxationi opportunus est, qua tota se de promouetur, atq; ex his, magis coxæ articulus, quoniam sinum & rotundum, & profundum possidet, ad hæc, q̃ elatioribus marginibus munitus sit. At si quandoq; articulus ob uim quandam uehementē sinu suo exciderit, etiam multæ luxationis secundum minoris, maiorisq; rationem dñæ, proueniūt, quatuorq; modis, imò locis coxa luxatur, uel enim in interiorē partē, uel exteriorē, uel priorem, uel posteriorē, prolabitur: uerum intrò quidē & extra continuē, & multo frequentius intrò: in anteriora autem & posteriora, rarius. Quibus itaq; in interiorē partem coxa prolapsa est, iis crus affectū, si cum sano conferas, longius spectatur, & genu prominentius, & ad inguina crus inflectere nequeūt, & in regione scroti & ani intermedia tumor manifestus occurrit, tanquam femoris capite illic desidente. Quibus aut in exteriora promota est, iis contrariæ notæ eueniunt, siquidem crus breuius apparet, & inter scrotum & anū in sinum dehiscit, iuxta clunes in tumorem attollitur, & genu interius demergitur, crus inflectere ægri possunt. Si in priorē partem prolapsa est, crus sine dolore genu extendunt, non aut ad interiorē partem inclinare possunt, incedere conantes. Vrina his supprimitur, inguina intumescunt, nares rugosæ ex-carnesq; apparent, calci inter ambulandum innituntur. Porro quibus in posteriora excidit, nō aut poplitem, aut genu extendunt,



dunt, neq; inflectere possunt prius quàm inguina flexerint, atque his crus breuius, inguina laxiora apparent, & per nares femoris caput eminet. Quibus sanè iam inde à pueritia, aut certe longiore tēporis spatio articulus prolapsus curæ non fuit, et præsidium nihil promouerit, mēbro iam in orbē coacto. Quibus autē continenter excidit, hi curationem Hippocratis assument, quapropter statim reponi luxata debent, uetustæ siquidē coxæ luxationes, nullo modo cōsanescunt. Communiter itaque in quatuor luxationibus instauratio congruet, tum quæ conuersione articuli & circumductu fit, tum quæ intensione. Si enim affectus recens fuerit, & æger iuuenis, nonnunquam femur continentes circumagentesque huc illuc, articulum reposuimus. Quod si in interiorem partem luxatio declinauerit, etiam crure tantum subito & ualenter ad inguina quàm intimè flexo, id quod requiritur effecimus: sin autē his non cesserit, intensione utendum, primū per manus adhibita, quæ crus ab inferiore parte trahant ac per femur tibiamq; constringant, ex superiore autem parte, sub alis corpus circumdēt. Quod si etiā ualentior desideretur intensio, funibus contextis aut implicitis, uel loris crus deligare, omnino quidem supra talum: ut autē genu nihil patiat, hoc quoq; superius, oportet: at pectoris regionē uincire necesse non est, uerum, ut dictū est, manibus subter alas cōprehendatur, loriq; mollis & ualidi medium iuxta regionem inter scrotum & anum adaptatum in humeros reducemus anterius per inguina & clauiculam: posterius, per summas partes, duoq; lori initia ministro trademus, deinde oēs simul trahentes, ut ægrotantis corpus eleuetur, intensiōnem molientur. hic quidem intendendi modus cōis est quatuor femoris luxationū differentijs, priuatim autē in singulis modus quo ossa uectē in sedē suam cōpelluntur, Græci molliam dicunt, euariat. Intensio enim homine si quidem in interiorem partem articulus exciderit, lori per regionē quæ scrotū & anum interiacer, traiecti medium inter femoris caput ipsamq; regionem à scroto ad anum tendentem dispensari conuenit, referri autem lorum per inguina adiacentia & clauiculam expedit. Ad adolescens quidā duabus ulnis affectū femur, qua crassius est, circumdatum, in exteriora ualenter extrahet. Atque hic modus inferendi aliis expeditior est, cui si articulus non cesserit, aliis quoq; utēdum, uariis quidem magis, sed hoc efficacio-



efficacioribus. intendi etenim hominē super lignū grādius aut scānum oportet, in quo ēt spinæ gibbero uitiatos intendimus. Insculpētur aut per totū ferē oblongæ quædā ceu fossæ, quæ latitudinē altitudinemq; triū digitorū, non maiorē habeāt, distindentes inuicē nō magis quā digitos quaternos, ut uecte iuxta extremū in ipsis resistēte, in quancunq; partem cōueniat restitatur, membrū. Per mediū autem lignū aut scamnum, aliud impingatur lignū pedalis lōgitudinis, ligonis manubrij modo crassum, ut sub hoc intētio homine, lignū mediū inter regionē à scroto ad annm porrectā & femoris caput cōsistat. Simul. n. corpus iis qui à pedibus trahūt porrigi prohibebit, eoq; ne usu quidē sæpe uenit in contraria ex superiore parte intētio: simul aut intensio quoq; homine ipsum lignum femoris caput foras propellet. ac intētio ad superius dictū modū administrabitur, præsertim pedis. Quòd si ne sic quidē in sedem suam redierit, impactum lignū rectum auferri debet ex latere autem huius sit utrinque singula ligna infigentur, tanquam postes, nō minus quā pedalis longitudinis. his aliud lignum adaptabitur gradus scalæ modo, ut tritum lignorum figura H literā repræsentet, nam paulò inferius summis, medium lignum accommodabitur. Deinde in sanum latus iacente homine sanum quidē crus inter hos postes subter gradum quodammodo ducemus, affectum autem crus ex superiore parte super hunc ponemus, ut ipsi femoris capiti accommodetur, substrato prius ei multiplici uestimento, ne femur contundatur. aliud autem lignum mediocriter latum tantam habens longitudinem ut à femoris capite usq; ad talum subiectum pertineat, intrinsecus cruri alligabitur. Vbi iam facta est hæc intensio, aut per pistillum, ut in gibbero prius diximus, detrahare ad ima crus cum alligato ligno oportet, ut niolentia hac femoris caput in propriam sedem reuertatur. Cæterum est & alius reponendi modus sine intensione per lignum, ab Hippocrate commendatus. Manus enim, inquit, ægrotantis molliter costis alligare oportet, & pedes utrosq; ualido loro molli per talos & super genu deuinci- re, ut quatuor digitorum spatio inuicem distent: intenso autē affecto crure duobus digitis magis quā alterum, hominem suspendere, ut caput cubitos duos à terra ab sit. Adolescens uero aliquis peritus ulnis suis femur affectum cōprehendens quā crassissimum est, ubi & caput femoris, subito pendere ex homine



mine cogetur. facile nanque articulus ingreditur. Hic reponendi modus aliis quidem simplicior est, ut qui non multo apparatu peragatur, sed ueluti miserabilem ipsum, plerique medici auersantur. Porro si in exteriora membrum fuerit laxatum, homo superius intendi debet, lorum autem iuxta regionem inter scrotum & anum per oppositas parteis ferri conuenit, inguina dico & clauiculam, medicum autem ab exteriori parte introrsum agitare iuxta conuenientē foueam ex iis quæ insculptæ sunt, ministro quodam uectem ad sanum clunem ne cedit, obijciente. Sin autem in priora promotus est articulus, homine intenso uir quidam ualidus dextrę manus palmam affectis inguinibus imponens, altera comprimet, simul ad ima, genu uersus constringet. At si in posteriora prolapsus est articulamentum, non opus est quidem hominem in sublime usque intendi, sed in solido iacere, quemadmodum etiam si in exteriora articulus exciderit. Sicuti autem in gibbero dicebatur, super lignum aut scamnum homo pronus intenditur, uinculis non perilia, sed in crure, ut nuper dictum est, porrectis. Iam uerò uti conuenit constrictione per asserem adhibita, iuxta clunium regionem, ubi & articulus excidit. atque hæc sanè de coxendice ex causa foris adueniente luxata, dicta sint. quoniam uero propter copiam humiditatis, ueluti humurus, sic etiam coxa prolabitur, uestione utendum est, quemadmodum in capite ipsius comprehendimus.

*De Genu articulo.*

*Cap. CXIX.*

**G**enu in treis parteis promouetur, anteriorem nimirum anteriorem, & iuxta poplitem. in priorem enim prolabi opposita patella prohibetur. Eiusdē igitur intentionis utentes modis, interim per manus solas, interim etiā funibus decenter deligabimus, reliquamq; adferemus curationem, hoc spectantes ut particula dilutius immobilis conseruetur.

*De tali articulo, ubi etiam de pedis digitis agitur.*

*Cap. CXX.*

**T**ali articulus si paulum excessit, modica etiam intentione curatur: si toto loco mutatus est, uehementiore indiget auxilio. Tentandum itaq; & hic per manus ualidiore intentione uti. Quod si non reponitur, homine humi resupinato extensoq; longum aliquem & ualidum palum inter



ter duo femora iuxta regionem scroto & ano interiectam humi per ima rectum defigemus, ut corpus aduersus eum renitens, ad pedis intentionem non cedat, imò prius defigetur, quam homo decumbat. Quòd si magnum illud lignum adest, quod pedale aliud lignum per medium habere defixum diximus, super hoc intensionem moliemur, ministro uno femur continente retrahenteq; alter manibus aut loro pedem trahet, medicus luxatum manibus dirigit, alterumq; pedem alius ad ima continet. A repositione deligari tutò per debet fasciis, ad superiorem pedis partem, alijs ad talum distributis, cura adhibita ne posterior tendo iuxta calcem constringatur. In hoc casu usq; ad dies quadraginta in quiete homini perseverandù est. nam incedere ante absolutam curationem tentantes, particulam reddunt inutilem. At si quis ex saltu, ut fieri solet, calcis os peruerterit, uel etiam aliam quampiam inflammationis affectionem excitarit, blanda quoadam intensione, conformatione, fomentis inflammationi contrariis, & fasciis firmis id dirigendum est, homine similiter usque dum consanuerit, in lectulo perseverante. Cæterum digitorum peruersio, ut in manibus dicebamus, non difficulter moderata tensione emendatur. In omnibus autem luxatis peruehisq; postquam instaurata sunt & conquerint, inflammationem in articulis, ut uerisimile est, remanentem, aut tumorem, quæ etiam diu membra à functionibus impediunt, mollientibus remedijs persanabimus, quorù materiam nullius qui in artis operibus uersatur, ignorat.

*De luxatis cum ulcere.**Cap. CXXI.*

**I**N luxatis cum ulcere multa requiritur prudentia. Dum enim hæc inferuntur, extrema pericula, nonnunquam & mortem inferunt. inflàmatis enim extensione iis qui adiacent neruis & musculis, dolores ualidi, conuulsiones, & febres acutæ oboruntur, præsertim in cubiti gibbero, genu, & superpositis partibus. Nam quo principalibus sunt uiciniora, hoc maius periculum concitant. Hippocrates itaq; horù repositionem, ualentiorémq; deligaturam omnino auersatur. solis autem quæ inflammationem abigunt leniuntq; præsidis, per initia ut præcipit. Sic enim ipis superesse forsan licebit. Quod autem ipse in solis digitis consulit, id nos reliquis etiam articulis facere tentabimus, ac inter initia statim quæ pars adhuc inflammationem



inflammatione caret, prolapsum articulum mediocri intensio-  
ne reponemus. quod si secundum auium institutum euenerit,  
perstitemus, sola ratione quæ inflammationem arcet, utentes  
si inflammatio quæpiam, aut conuulsio, aut aliquid prædicto-  
rum contigerit, rursus eijcere ipsos necessarium est, siquidem  
citra uim porrigantur, at si hoc quoque discrimen metuamus,  
(non enim porrigentur forsan inflammata) satius est per ini-  
tia in maioribus quidem articulis repositione superfedere. ubi  
uerò inflammatio declinauerit, (id autem fit post septimum  
nonum uel diem) præfati etiam periculum, quod ex repositio-  
ne futurum sit, tum quod si non repositum fuerit, claudi omni-  
no superuiuent, conabimur tunc, administrationē obire, uten-  
tes, propter comoditatem, etiam uelle. Porro ulceris curatio-  
nem ut in fracturis cum ulcere dictum est, administrabimus.

*De luxatione cum fractura facta. Cap. CXXII.*

**A**T si luxatio sine ulcere cum fractura euenerit, commu-  
ni intensio & per manus conformatione utendum  
est, ut in simplicibus fracturis docuimus: cum ulcere  
autem rursus ex fracturis cum exulceratione & luxationibus  
priuatim expositis, congruam administrationem petemus.


FINIS LIBRI SEXTI IOANNE  
GVINTERIO ANDERNACO MEDI-  
CO INTERPRETE.



## PAULI AEGINETAE

LIBER SEPTIMVS,

IOANNE GVINTERIO

*Andernaco Medico Interprete.*

De temperamentis, quæ per gustatus qualitates deprehenduntur. Cap. I.



SENSILIVM corporum temperamento, coniecturam ex odoratu aliquam sumere, haud est securum. Nam inodora, substantijs crassa quidē sunt, sed quanto sint calore, & frigiditate prædita non ita constat: odora uerò, & tenuia quodāmodo sunt & calida, sed quatenus id sint, neutiquā ostenditur, eo q̄ substantiā habeant inæqualem.

Multo adhuc minus ex coloribus exactè quid licet colligere, cum in singulis calida, frigida, humida & sicca reperiantur. Verum in gustatu omnes similiter particulæ corporū gustabiliū, ut hoc uocabuli usurpē, linguæ obijciuntur, sensumq; mouent: ut manifestò ex ipso quoq; temperamentorū uires deprehendamus. Quod igitur astringit, cogere, obturare, dēsare, repellere, incrassare. atq; ante hæc omnia, refrigerare, siccareq; est idoneum. Acidū incidere, diuidere, extenuare, aperire, & perpurigare citra calefactionē potest. Acre, similem acido effectū præstat, extenuando purgandoq; sed acidum refrigerando euariat: acre, calefaciendo: præterea illud repellit, hoc attrahit, dissipat, rumpit, crustas inducit. Pari modo etiam amarum, meatus ex-

PAULI AEGIN.

G purgar,



purgat, abstergit, extenuat, incidit succorum spissitudinem, si-  
ne calore manifesto. Aquosum frigidum, in crassat, cogit, con-  
trahit, obturat, sensum aufert, stuporemq; inducit. Salsum con-  
trahit, stringit, condit, siccatur, citra insignem caliditatem frigidi-  
tatemve. Dulce laxat, concoquit, emollit, rarefacit: oleosum  
humectat, emollit & laxat.

*De ordine & intervallo temperamentorum.*

*Cap.*

*II.*

**M**oderatum sanè medicamentum ita ut temperatura  
ei respōdeat cui admouetur, inde quod nec siccet, nec  
humectet, nec refrigeret, nec calefaciat, ipsum neque  
siccum neq; humidum, neq; frigidū, neq; calidū nominare con-  
uenit. Quod autē siccus est, aut humidus, aut calidus, aut fri-  
gidus, à præpollente appellatur facultate. Præstat autem in  
unoquoq; excessu, quatuor, quantū ad usum spectat, ordines sta-  
tuisse: calidum quidem nominantes in primo ordine quod uti  
que nos calefacit, sed non euidenter, ut illius rationali quadā  
demonstratione indigeat. Simili ratione, frigidum, & siccum,  
& humidum quodcunq; demonstrationem requirat, nondum  
actionem ualidam neq; euidentem sortitum. At quæ manife-  
stò iā siccare uel humectare uel calefacere uel refrigerare pos-  
sunt, ad secundum huiusmodi ordinem referentur. quæ uehe-  
menter iam sed non summè id faciunt, tertio annumerantur.  
quæ uerò sic calefaciunt ut crustas inducant, quarti sunt ordi-  
nis similiter quæ refrigerant, ut iam sensu priuent, hæc quoq;  
ad quartum relegantur. Porro siccus medicamentum nullum  
est inuenire quarti ordinis, si non urat. Nam si quod summè  
exiccat, id planè urit: huius notæ sunt, chalcitis, misy & calx.  
Tertij uerò ordinis siccantium potest aliquod esse etiam non  
urens, quemadmodum quæ uehementer astringunt omnia, è  
quorum numero est omphacium, rhus, & alumen.

*De particularium simplicium medicamentorum  
facultatibus.*

*Cap. III.*

*Abrotanum.*

**A**brotanum & calefacit & siccatur in tertio abscessu, di-  
scutiendi incidendiq; facultate præditum, modicè uerò  
astringit, totiq; corpori cum oleo infricatum, rigores  
circu remeantes persanatur, stomacho minus amicum est. cre-  
matum



matum maiores in siccando vires acquirit, quàm quòd ignem non est expertum. Capillorum defluuia quas alopecias uocant cum tenui quodam oleo inunctum explet.

*Agallochum.*

**A** Gallochum, lignum est Indicum Thuia ligno similæ, odoratum. Mansum animæ suauitatem commendat. Item in suffitum adhibetur. Radix eius pota drachmæ pondere, flaccidum ex superflua humiditate stomachū resolutumq; cōfirmat. Ad hæc iocinorosis, dysentericis, pleuriticisq; opitulatur.

*Agaricum.*

**A** Garicum radix est, in arboris trūco prognata, corpore fungoso, quæ ex aëria terrestriq; substantia coaluerit, uis eius est discutere & crassos humores incidere. Viscerum maximè obstructionibus purgando medetur.

*Ageraton.*

**A** Geraton uim habet discutiendi, & leniter etiam inflammationem quodammodo arcet.

*Agnus, qui uitex dicitur.*

**V** itex qui græcè agnus uel lygos appellatur, in tertio ordine tum calefacit tū liccat, substantia tenuis est, eoq; flatus abolet, castitati conseruandæ facere creditur, non modo cōmanducatus potusq; uerū etiam in cubitū substratus. Semen ipsius etiam iocinoris & lienis infarctus liberat epotum. Frixū autem minus est flatulentum, & facilè in membra distribuitur.

*Agrestis, gramen.*

**G** Ramen Parnasi admodū utile est. Siccat & modicè refrigerat: tenuiumq; partium & subacerbū existit. eoq; cruenta uulnera glutinat: Decoctum eius calculos confringit.

*Anchusæ quatuor.*

**Q** uatuor sunt anchusæ, non eiusdem omnes facultatis. Nam onocleæ appellatæ radix astringendi uim habet & quiddam subamarum, ad lienis renumq; dolores efficax, cataplasmatibus autem modo cum polentis applicata erysipelatis succurrit: folia minus radice refrigerant desiccantq; hinc ad alui profusiū bibuntur. Quæ dicitur lycoplis, astringens quodammodo efficacius, similiter erysipelatis conuenit. Onocelos uerò seu Alchibiadios nuncupata medicatior quodammodo,



uiperarum moribus succurrit forma cataplasmatidis adhibita, alligata, & comesta. Quarta omnibus alijs breuior, sine nomine propemodum, maiore quàm Alcibiadios, amaritudine donata: latis alui lumbricis instar acetabili pota benefacit.

*Adarce.*

**A** Darce ueluti spuma quædam est aquæ sanæ in cremis & arundinibus concreta, tantum uerò acrimoniæ habet & caloris, ut extrinsecus cum alijs imposita ferè urat. intrò eam assumere nulli licet.

*Adiantum.*

**A** Diantum siccatur, extenuatur, & modicè discutitur, calore ac frigidityte medium quodammodo est: Alopecijis igitur medetur, tumores discutit, calculos potu confringit, è pulmone reiectiones deficcatur, alui profluuium sistit.

*Aizoon, semperuiuum.*

**S** Emperuiuum duplex, refrigerat quidem ex tertio abscessu, deficcatur autem astringitq; mediocriter. Hac ratione igitur ualet erysipelatis, & ad herpetas inflammationesq; ex fluxione concitatas conuenit.

*Aetonychon.*

**D** E Aetonycho in capite de lapibus pertractabitur.

*Athera.*

**A** Thera pulticula est sorbilis è zea molita, aut è frumento confecta infantibus accommodatur. Item cataplasmatidis uice illinitur.

*Aegilops.*

**A** Egilops discutiendi facultate prædita est, unde etiam indurascens inflammationibus & ægilopi quæ oculorum fistula est, opitulatur.

*Aegiros populus nigra.*

**P** Opulus nigra in primo ordine calefacit, modicè siccatur, & tenuis est substantiæ, cuius folia cum aceto cataplasmatidis instar applicata, podagricos dolores sopiunt. Quæ uerò ex ea distillat resina, floribus calidior miscetur acopis: & malagmatis, fructus cum aceto potus comitiales auxiliatur.

**P** *Aedaon, hoc est pudendum masculi cerui.*

Vdendum cerui masculi siccaturum tritumque ex uino potum,



tum, uiperarum moribus subuenit, miscetur autem compositionis remediis.

*Aethale, fuligo.*

**A**ethale & lygnys in litera L. exponetur.

*Aethiopsis.*

**A**ethiopsis similia uerbasco habet folia, radice decoctum, potu datur ischiadicis, pleuriticis & sanguinem reijcientibus, & arteriarum asperitates cum melle lenit.

*Aima sanguis.*

**S**anguis frigidus nullus est, uerum suillus, humidus est, & minus calet, humano maximè temperamento similis. Columbarum uero, palumbi & turturis, temperatus quodammodo, oculorum liuores ex ictu, hyposphagmata dicunt, medicatur, si calidus instilletur. Item crassiori cerebri membranæ infusus, in his quorum calua perforata est, inflammationem arcet. Noctuae sanguis cum uino, aut aqua potus, spirandi difficultatem adiuuat. Vespertilionum, uirginum mammillas tuetur, & pilorum incrementa illitum prohibere dicunt. Similiter sanguis ranarum, chamelæontis, & ricinorum qui in canibus hærentes inueniuntur, sanguis facit. Galeus autem hæc facto rei experimento falsa esse pronunciat. Caprarum uero siccitatis nomine aquas cutem subeuntes cum melle potus iuuat, renumque calculos conterit. Gallinarum cohortalium sanguinis è cerebri membrana profluvia coercet. Agnus comitialibus prodest: hædinus nuper coagulatus circa hemina dimidium cum pari aceto contra cruentas pectoris excreationes bibitur. Ursorum, syluestrium caprarum, hyrcorum, & taurorum, abscessus maturare fertur. Terrestris crocodili, oculorum claritatem efficit. Equarum quæ sunt expertæ admiscitur, remediis exedentibus, ἡπτι-κὰ Græci uocant, admiscetur. Antidotum ex sanguinibus quod in lethalia medicamenta efficax est, anatis, hædi, & anseris, sanguinem recipit.

*Aera, lolium.*

**L**olium calore & siccitate ad tertium ferè ordinem pertinet, iridi facultate simile.

*Acacalis.*

**A**cacalis fruticis, in Aegypto nascentis fructus est, cuius dilutum collyriis claritati oculorum efficacibus miscetur.

G 3 Acacia



*Acacia.*

**A**caria tertii quidem desiccantium ordinis est, primi uero refrigerantium, at si elota fuerit, secundi. Est autem acerbata & terrestris.

*Acalyphe, urtica.*

**U**rticæ & fructus & folia tenuem habent substantiâ, citraque rofionem ficcant, tumores discutiunt, abstergunt, uentrem subducunt, mediocriter flatulenta, quare et ad uentrem incitant.

*Acanthus.*

**A**canthum alii à nigro colore foliorum melamphillo appellant, alii pædeteron, nis eius est discutere & siccare.

*Acanthium.*

**A**canthium tenui calidaque natura præditum, conuulsis auxiliatur.

*Acantha leuce, spina alba.*

**S**pina alba radicem siccantem & modicè astringentem obtinet, eoque & stomachicis, & sanguinem expuentibus, dentiūque doloribus succurrit: semen tenue calidumque est, qua uiconuulsioni quoque medetur.

*Acantha, id est, spina Aegyptia, uel Arabica.*

**S**pina Aegyptia, secundum alios Arabica, astringit siccataque impenſè, unce & sanguinem, & alias defluxiones retinet.

*Acinos.*

**A**cinos ocymo similis, mediocres astringendi uires habet, ideoque aluum & menses pota sistit, applicata uero panos & sacros ignes persanat.

*Aconitum.*

**A**conitum, quod quidem pardalianches dicitur, exedentem lethalemque uim habet, quam ob causam intrò non assumitur: extrinsecus tamen in carnibus quas exedi oporteat, uti licet. quod uero à lupis lycoſtinon dicitur, similes priori uires fortitum, priuatim lupos, ut illud pantheras enecat.

*Acoron.*

**A**coron in tertio abscessu calefacit & desiccatur, radice ipſus ad ciendam urinam, lienisque scirrhum utimur: cæterum membræ oculorum, ob cornus similitudinem ceratoidis dictæ, crassitiem extenuat.

Acrides



*Acrides, locustæ.*

**L**ocustas urinæ angustis præsertimq; mulierum, odoris suffitu profunt. At quæ alis caret, contra scorpionis morsus cum uino salutariter bibitur.

*Æte, hoc est, sambucus & chamaæctæ, id est, ebulus.*

**S**ambucus, & ebulus qui chamaæctæ dicitur, quasi humilis sambucus, uterque deliscendi facultatem obtinet: modicè discutit & conglutinat, potus autem & manducatus, aquâ per aluum educit.

*Als, sal.*

**S**al quilibet uim habet uehementer siccam & astringentem unde quicquid in corporibus humidum est, id omne depascit, reliquum astrictione leuiter contrahit, qua ratione ad condimenta omnia adhibetur, putredinemq; arcet: crematus uero sal magis discutit.

*Althæa.*

**A**lthæa seu ebiscus species est maluæ syluestris, uis eius discutit, laxat, inflammationem abigit, lenit, & phymata concoquit, radix autem & semen reliqua sanè intensa habet, uerū exterit etiam uirilignes abstergitq; præcipuè autem semen calculos quoq; confringit.

*Alimon.*

**A**limon dissimilariū partiū est, salsum gustu & leuiter astringens, maxima ipsius pars calore temperata cum humiditate insuperabili est, lactis itaq; & seminis uberratem conciliat.

*Alcæa.*

**A**lcæa syluestris maluæ & hæc genus est, in uino pota intestinorū torminibus & eruptionibus medetur, multo magis ipsius radix.

*Alcyonium.*

**A**lcyonij genera omnia quidem abstergunt discutiuntq; acri qualitate prædita, sed milesium (est autem uermiculū purpureumq;) cæteris præstat: quare combustum, pilorū defluuia, quæ alopecie dicuntur, impetigines, uirilignesq; abstergit. Porro, q̄ in superficie laeuorem habet & uehementer acie est, nō modò abstergit, uerum etiam excoriat. Postremò, quod lanis succidis respondet, omnium est imbecillimum.

G 4 Alme,



*Alme, quæ muria dicitur.*

**M**uria nulli alteri miyta substantiæ, similes habet salis vires, sed imbecilliores aqua cōtemperata: at salforum piscium oliuarumq; colymbadum muria ualentius abstergit, contra intestinorum tormina & coxendicum dolores clystere inijcitur.

*Aloe.*

**A**loe calefacit in primo, siccatur in tertio ordine, stomacho etiam amica est, abstergit dissipatq; aluū subducit, lota uero minus detergit, sed stomacho gravior est, inflammationem prohibet, & ulceribus cicatricem inducit, præsertim sedem & naturalia infestantibus.

*Alos Anthos, id est, salis flos.*

**F**los salis liquidum est medicamentum sale concremato tenuius, acre, & abundè discutiens.

*Alos achne, id est, salis spuma.*

**S**alis spuma lanugo salis spumosa est, tenuior quidē illo magisq; discutiens, sed minus contrahit.

*Alsine, auricula muris.*

**A**lsine, quam alij muris auriculam uocant, uim habet helxinæ similem quæ refrigerat humectatq; quapropter ad feruentes inflammationes conuenit.

*Alypon.*

**A**lypi semen bilem atram per inferiora purgat pari epithymo mensura sumptum cum sale & aceto, ueruntamen intestina leuiter exulcerat.

*Alysson.*

**A**lysson quod à cane rabido morsos iuuat, sic appellatum est, cæterum siccatoria, discussoria, abstersoriaq; ui præditū, renum meatus aperit, ephelidem, quæ aspera discolorq; cutis est, exterit.

*Alopes, uulpes.*

**V**ulpes uiua aut mortua, tota in oleo decocta, discutiendi uim oleo conciliat, adeo ut humores altè fixos in cutē extrahat hinc articularij in solio eo repleto diutius immorari, incipientem quidem affectum finierunt, inueteratū uero moderatiorem reddidere.

Amaracus



*Amaracus.*

**A**Maracus tertio in ordine calefacit, secundo desiccatur.

*Amarantus.*

**A**Marantus extenuat, incidit, mensis cum uino potus educit, sanguinis grumos dissolvit cum mulso omnesque fluxiones desiccatur, stomacho inimicus.

*Ambrosia.*

**A**mbrosia cataplasmatibus modo imposita vim habet astringendi repellendique.

*Ami.*

**A**mi ad tertium calefacientium siccantiumque ordinem refertur, tenue, discutiens, & urinæ movendæ efficax, semen ipsius longè utilissimum est.

*Amiantum.*

**A**miantum in Cypro nascitur alumini scisso simile, quod in ignem coniectum accenditur quidem inflammaturque, sed non cõburitur, utuntur eo nonnulli in desiccantibus psilothris.

*Ammos, arena.*

**A**rena littorū maris affatim desiccatur, feruefacta Sole aquas subter cutem exhaurit, corporibus hydropicorū in ea cooptis: torrefacta autem ad ricas fomenta in salis, & milij vicem adhibetur.

*Ammoniacum thymiana, quod latinis ammoniacum suffimen, & ammoniaci gutta dicitur.*

**A**mmoniaceum thymiana liquor est tanta molliendi virtute præditus, ut scirrhus & tophos discutiat.

*Amurca.*

**A**murca secundi calefacientium siccantiumque ordinis est, eiusque intensi, hac etenim ratione ulcera in siccis quidem corporibus curat: in aliis autem intendit, irritatque.

*Ampeloprasum, agreste porrum.*

**A**mpeloprasum, seu porrum sylvestre acerrimū est calidissimumque in summo ordine, quamobrem etiam exulcerat, inciditque, viscerum meatus recludit, stomacho inimicum.

*Ampelos agria, vitis sylvestris.*

**V**itis sylvestris racemi & germina ipsa abstergendi facultate pol-



te pollent, item nonnihil astringens obtinent.

*Ampelos humeros, uitis sativa.*

**V**itis sativæ facultas respōdet sylvestri, sed imbecillior est.

*Ampelos leuce, uitis alba, quæ & bryonia dicitur.*

**V**itis albæ, quam & bryoniam & psilothron appellant, germina sanè ceu stomacho grata eduntur, urinæque ciendæ sunt, radix abstergit, tenuis natura & mediocriter calida, unde fit ut lienes etiam potu consumat, extrinsecus autem cū ficis applicata scabiei & lepræ medetur.

*Ampelos melæna, uitis nigra.*

**V**itis nigra, quæ & ipsa bryonia nuncupatur, superiori consimilis est, nisi quòd inefficacior.

*Amygdala.*

**A**mygdala quæ quidè amara sunt extenuant, uiscosos crassosq; humores altius hærentes euellunt, tum cutis uitia abstergunt: arbor eandè uim repræsentat: dulcia uero amygdala moderato calore donata sunt.

*Amylon.*

**A**mylon ex puro tritico aqua sub caniculæ æstu macerato conficitur, quæ (aquam dico) quinquies in die mutatur: quum autem tenerrimum euaserit, colo traiecta aqua quâ superfuderis, furfures secernere siccareq; ad solem oportet protinus antequam ace scat. Cæterum uis eius est refrigerare mediocriter, & siccare, & acria lenire.

*Amomum.*

**A**momum acoro uirtute, respondet, sed hoc quidem siccatur magis: illud autem expeditius concoquit.

*Anagallis.*

**A**nagallis utraq; uim habet abundè abstergentem subcalidam quoq; nonnullam & attractricem, ut etiam aculeos euellat, item succus ipsius naribus instillatus caput purgat.

*Anagyris.*

**A**nagyris frutex est grauis odoris, acrisq; calefacit & discutit, semen tenuius, & uomitui ciendo est.

*Andrachne, portulaca.*

**P**ortulaca tertio quidem abscessu refrigerat, secundo autem humectat,



humectat, qua de re etiam caufone laborantes uentriculo imposita, iuuat, & fluxiones repellit, lentore suo dentium stuporem ex acidis contractum corrigit: ob astrictione uero, & intestinorum tormina & sanguinis profluvia coerces.

*Androsamon.*

**A**ndrosæmi duplex genus est, alterum ascyrrhon uel ascyrhoides nominatur specie hyperici, alterum dionysias, semen ipsorum purgat, folia autem magis desiccant.

*Androsarces.*

**A**ndrosarces amara acrisq; herba est uis eius est discutere & desiccare potum ipsa, tum semen ipsius urinam promouet.

*Anemonæ.*

**A**nemonæ omnes uim habent acrem absterforiamq; item extrahendi, & oris uasorum recludendis, idonea qua pituitam illiciunt, lepras tollunt appositu, & lac in mamas suggerunt.

*Anethum.*

**A**nethum calefacit in secundo ordine intenso siccatur paulo remissius, quod in oleo excoctum discutit, dolorem sopit, somnum conciliat, & crudos tumores maturat, uisum tertii calefacientium siccantiumq; ordinis efficitur, ex humiditate nimia flaccidis ulceribus applicatum confert: uiride autem humidus minusq; calidum est, & concoquit.

*Anthyllis.*

**A**nthyllis duplex quidem est, sed utraq; ulcera perficit, quæ chamæpityi respondet, tenuior est, quare etiam comitialibus competit, cæterum efficacius eadem abstergit.

*Anisum.*

**A**nisi semen acrius est, in tertio abscessu calefaciens, siccaturque, hinc utiq; & urinam mouet, & flatu discutit.

*Antirrhinon, uel anarrhinon.*

**A**ntirrhinon siue anarrhinon persimile inguinariæ uim obtinet, sed minus efficacē, atq; ex illo hoc quoq; cognosces.

*Anonis, uel ononis.*

**A**nonis siue ononis calida facultate est, præsertimq; eius radix, cuius succus cum uino potus urinam ducit, calculos conterit, crustas rumpit & dentes mitigat.

Aparine



*Aparine.*

**A**Parine, quam alii philantropon, alii omphacocarpon appellant, modicè abstergit & desiccatur, item tenue quippiam in se continet.

*Apios, pirus.*

**A**Pios tēperatura inæqualis est, terrestre aliud sortita, aliud aquosum ob quod manducata stomachum iuuat sitimque arcet, admota uero forma cataplasmatum, siccatur refrigeratque mediocriter.

*Apocyon, aut cynocrambe, canina brassica.*

**A**Pocyon aut cynocrambe, dicitur autem & cynomoron quod celerrimè canes enecet, eademque ui maleficium & lethalis homini est, foedi admodum odoris, & calida citra siccitatem unde etiam discutiendi facultatem applicata repræsentat.

*Apochyma.*

**A**Pochyma pix est uetus quæ à nauigiis deraditur, tumores diffundit, siccatur & discutit.

*Arachne, araneus.*

**A**Raneus cum emplastro subactus, impositusque fronti, & temporibus tertianarum febrim circuitus finit, ut Dioscorides memoriæ mandauit, tela ipsius applicata sanguinis fluores sistit, & ulcera in summa cute ab inflammationibus tuetur.

*Argemone.*

**A**Rgemonæ facultas est abstergere simul & discutere.

*Arisarum.*

**A**Risarum multo breuius est aro, acriusque, radicem oliuæ magnitudine obtinet.

*Aristolochia, malum terræ.*

**A**Ristolochia omnis calida, tenuis, abstergens, amara, & subaris, ad medicinas utilissima. At Rotunda, tenuior, & in omnibus efficacior est. Clematidis hoc est sarmentacea, odorata quidem, sed imbecillior. Longa uerò præter alia, media harum est, sed non minus calida, quam rotunda.

*Arceutos, Iuniperus.*

**I**uniperus calefacit & siccatur in tertio ordine, fructus autem calefacit quidem similiter, sed in primo gradu siccatur.

Arction



*Arction.*

**A**Rction, prosopites, folia habet cucurbitæ similia, maiora autem & duriora, discutit quidem siccatur, & astringit, quapropter & folia ipsius uetusta ulcera perfanant.

*Arction.*

**A**Rction uerbasco simile est, radicem habet teneram, candidam, & dulcem, uis eius est tenuis, siccatur, & mediocriter astringens.

*Armeniacum.*

**A**Rmeniacum, uim habet absterforiam simul cum modica acrimonia & minore astrictione, hinc etiam oculariis, medicinis miscetur, & augendis palpebrarum pilis usum habet.

*Arnabo.*

**A**Rnabo, odoramentis adnumeratur, ob quod unguentis potissimum expetitur, calida siccaque potentia præditum in tertio ordine, cassiæ & carpesio simile, unde Posidonius ubi cinnamomi copia non datur, hoc utendum esse censet.

*Arnoglossum, plantago.*

**P**lantago refrigerat pariter & desiccatur in abscessu secundo, temperata ex aquea & terrestri substantia, cui etiam astrictiōnis nonnihil adsit, quare ad maligna ulcera, fluxiones, putredinesque, temperamenti moderatione accommodata est, sanguinis quoque profluvia cohibet & plurimis congruit, etenim siccitatis quæ nequaquam rodit compos est, & frigiditatis quæ nondum stuporem inducit.

*Aron.*

**A**Ron calore & siccitate primi est ordinis, ex terrestri calida & absterforia substantia & hoc generatum, radices ipsius calidiores sunt diacunculus autem efficacior.

*Arsenicum, auripigmentum.*

**A**Rsenici uis est caustica, utuntur eo & in pilis abolendis, quod si diutius adhæserit, etiam cutim ipsam attingit, uisum uerò tenuius redditur.

*Artemisia.*

**A**Rtemisia utraque secundo in ordine calefacit, siccatur in primo, tenui substantia prædita, coque renum calculos comminuit, & uteri fomentis accommodatur.

Artos



*Artos, panis.*

**P**anis illius magis discutit quàm triticum, ceu & salis & fermenti particeps. Nam ad extrahendum ea quæ altè hærent, fermentum idoneum est.

*Asarum.*

**A**sarum similem acoro uirtutē habet, sed magis intensam.

*Asbole, fuligo pictorum.*

**F**uligo qua pictores utuntur, ex uitrarijs officinis sumitur, uim habet discutientem, adeoq; acrem, ut & urat, & exedat, cæterum fracta cum rosaceo cerato ad cicatricem perducit.

*Ascalabotes, stellio transmarinus.*

**A**scalabotes animal ad reliqua sanè inutile est, sed scorpiorum ictibus impositum opitulari ipsum tradunt: expetitur etiam naturalia intendentibus medicinis.

*Asclepias.*

**A**sclepias calida, sicca, & tenuis substantiæ, torsionibus cum uino pota competit, uenenatorum autem moribus & maleficis mammarū muliebriumq; locorū uitijs applicatur.

*Ascyrrhon.*

**A**scyrrhon in adrosæmo expositum est.

*Aspalathus.*

**A**spalathus dissimili constat uirtute, acri & astringēte, & ob utramq; siccatur, idcirco & putredini, & fluxionib. utilis est.

*Asparagus.*

**A**sparagus petræus, aut myacanthinus abstergit utiq; sed calore, & frigidityte medius est, renes & iecur obstructa recludit, præsertimq; radices & semen. Itē dētiū doloribus medetur.

*Asplenon.*

**A**splenon tenue quidē est uirtute, non tamē calidū, hac utique ratione, & calculos confringit, & lienes consumit.

*Asstaphis, uua passa.*

**A**staphis domestica sanè concoquit simul & astringit, & leuiter discutit, syluestris autem acris adeo est, ut pituitam per os educat, & uehementer abstergat.

*Aster atticus, siue inguinalis herba.*

**A**ster atticus, quam alij herbam inguinalem uocant, ob hoc ipsum



ipsum quòd non tantum emplastri modo imposita, uerum ad-  
alligata etiam bubonibus prodesse creditur, mixtæ est uirtutis,  
discutientis, & refrigeratoriæ.

*Astragalus.*

**A**stragalus frutex est exiguus cuius radices astringunt, ipse  
non ignauiter deficcatur: ulcera itaque uetusta ad cicatricem  
perducit, & aluum fluentem radix in uin pota sistit; plurimus  
in Phæneo Arcadiæ nascitur.

*Asphaltus, bitumen.*

**B**itumen siccatur, calefacitque in ordine secundo, quare ulce-  
ra cruenta glutinat.

*Asphodelus, hastula regia.*

**A**sphodeli radix uim habet detergentem discutientemque,  
concremata autem ipsius cinis calidior, siccior, & tenuior  
euadit, quo fit ut alopecijis medeatur.

*Atractylis.*

**A**tractylis seu cnicum syluestre ex spinosorum genere ha-  
betur, ui siccante, & mediocriter calida.

*Atriplex.*

**A**triplex humectat sanè in secundo, refrigerat in primo or-  
dine, qua de causa etiam uetrem celeriter permeat: semen  
ipsius ui pollet absterforia, unde ictericis ex iocinoris obstru-  
ctione accommodatum est.

*Aphace.*

**A**phace lenticulæ modo astringit, sed māducata ægrius con-  
coquitur, ualentius siccatur, mediocriter calefaciens.

*Aphronitrum.*

**A**phronitri uis est discutere & abstergere, ut non solum for-  
dida exterat, sed etiam pruritui, quippe saniem dissipat, me-  
deatur, potum uerò stomacho nocet.

*Aphros, spuma nitri.*

**S**puma nitri proximam nitro facultatem obtinet, sed tenuior  
substantia, ob quod & læuis, farinæ, modo existit.

*Achras, pirum agreste.*

**P**irum agreste eandem piro domestico uirtutem habet, sed  
magis intēsā, quapropter magnis uulnerib. glutinādis est.

Abfinthium.



*Absinthium.*

**A**bsinthium calidum primo abscessu est, siccum tertio, astringenti, amara, & acris simul donatum qualitate: qua biliosos in ventriculo humores per aluum & urinas inanit: quibus autem pituita redundat, hos propter astringentem nihil iuuat: succus ipsius, herba multo calidior est.

ENUMERATIO EORVM QVAE  
AB INCIPIUNT.

*Balanus myrepfica, glans unguentaria.*

**Q**uod intra unguentariam glandem ueluti carnosum est, abstergeredi incidendiq; cum astringente uim habet, eamq; ob causam drachmae unius pondere cum mulla pota, facile uomitones ciet, & inferiorem uentrem subducit, cum posca uero ad uiscerum obstructions conuenit: item cutis uicia cum aceto perunctum abstergit cortex uero ipsius ualde astringit.

*Baccharis.*

**B**accharis odorata est herba similis cinamomo, coronaria & acris: huius radices decoctum meatus obstructos aperit, urinam & menseis citat, folia ipsius quum sint astringentia, fluxionibus opitulantur.

*Balaustium.*

**B**alaustium, syluestris punice flos est, ualide astringens, sicca & frigida facultate praeditum, itaque summæ cutis ulcera ad cicatricem perducit, & fluxiones cohibet.

*Balsamum.*

**B**alsami, quod ueluti lignum est, siccatur & calefacit in secundo ordine, subtilēq; habet substantiam, liquor autem multo tenuior est, fructus proximē hunc uirtute accedit, sed minus tenuis est.

*Ballote, marrubium nigrum.*

**B**allote quod alij marrubiū nigrū dicūt, acris est & abstersorie facultatis, impositū cum sale rabidi canis moribus medetur.

*Batus, rubus.*

**B**ati fruticosum, abundē astringit & siccatur, qua de causa & uulnere committit, & defluxiones sistit, radix autem praeter astringentem, non parū etiā subtilis est, unde renū calculos confringere est



re est idonea. fructus si maturus est, magis calefacit, simulq; me-  
diocriter astringit, ac ideo cibo idoneus est, immaturus autem  
& acerbus est & ualide siccatur, præsertim retorridus. Eadem  
etiam flos efficit.

*Batrachion, ranunculus herba.*

**R**anunculi quatuor sunt genera, omnia excellenter calida,  
sicca, acria, urentia, adeò ut ulcus cum dolore excitent: qui-  
bus si modicè utaris, cutis uitia tantum exterunt, radix autem  
arida sternutamentis ciendis est medicamentum.

*Batrachi, ranæ.*

**R**anæ aduersus uirulentorū morsus in iusculo eduntur. Cre-  
matarum ranarū cinis maximè siccans redditus, sanguinis  
eruptiones sistit & alopeciis cum pice liquida medetur.

*Bdellium.*

**B**dellium tum Scythicum tum Arabicum scirrhos emollit,  
præsertimq; recentes, Arabicum uerò urinæ ciendæ est, cal-  
culos comminuit, & cruda concoquit.

*Betonica.*

**B**etonica herba est ramulis exilibus pulegio similibus sed te-  
nuioribus, & propemodum si gustes, nullā qualitatem refe-  
rentibus. Nasciutr potissimū locis petrosis, qua & in renū medi-  
cinis utuntur. Est autē apud Romanos alia quædam betonica  
dicta, quam Dioscorides nominat cestron, alii uerò psychotro-  
phon, eò q̄ frigidis locis gaudeat, nihil simile cū prædicta habet  
præter actionē: at ultrà quòd urinā ciet, etiā aliis multis bene-  
facit, potissimumq; radix ipsius, cum hydromelite pota uomi-  
tionem mouet, folia autem aluum subducunt.

*Bechium tussilago.*

**T**ussilago, quæ Græcis bechion siue bechion inde dicitur,  
quòd ruses & recta ceruice spirantes, suffitu iuuat, constat  
ex calida aquosaq; substantia.

*Blitum.*

**B**litū esculētū olus est, humidū frigidūq; in abscessu secūdo.

*Bulbus.*

**B**ulbus esculētus amari simul & astringētis modicè compos-  
est, siccatur glutinatq; uulnera, & abstergit. Qui autem uo-  
mitum cit, calidiorem quàm alter repræsentat.

PAULI AEGIN.

H

Botrys



*Botrys.*

**B**otrys, quam alii ambrosiam, alii artemisiam dicunt, planta est insigniter odorata, hæc cum uino pota, subrecta ceruice spirantibus quos orthopnoicos appellant, succurrit.

*Bubonium, inguinalis herba.*

**B**ubonium in attico altere dictum est.

*Buglossum, lingua bubula.*

**B**uglossum humidum calidumq; temperamento est, eamq; ob causam uino iniectum lætitiā animi conciliare dicitur.

*Bunium.*

**B**unium quod alii arction appellā, calidū est, urinæ & mensibus educēdis accōmodatū, huic respondet & pseudobuniū.

*Buprestis.*

**B**uprestis animalculum est cantharidi simile, reponitur itaque sicut & illa.

*Butyrum.*

**B**utyrum concoquit & modicē discutit, in teneris corporibus, bubones igitur & parotides iuuat, gingiuas extenuat, & præsertim in infantibus dentientibus, item humores in pectore fixos, linctum concoquit.

*Buphthalmon.*

**B**uphthalmon similem habet chamæmelo florem, sed multo maiorem acrioremq; ideo & discutientem, adeò ut cerato mixtum duritias remolliat.

*Brathy, herba Sabina.*

**S**abina, cupressio similis calefacit siccātq; in tertio ordine, tenuissimaq; est, extenuat & discutit pota, tum in putredines cupressio similiter efficax est.

*Britannica.*

**B**ritannica astringit & conglutinat, syluestri lapathio specie similis, succus ipsius putredines os infestantes perlanat.

*Bromus auena.*

**A**uena similem hordeo obtinet facultatem, siccatur autem & modicē citra, corrosionem discutit, iam & nonnullius astringentis compos est, unde & alui profluuiis subuenit.

*Bryonta.*



*Bryonthalassion, muscus marinus.*

**M**uscus marinus, refrigerat simul & astringit; eoq; feruentibus inflammationes cataplasmate admotus, iuuat.

*Bryon, muscus.*

**B**ryon, quod alii splanchnon dicunt, in quercubus & populis albis, piceisq; inuenitur, discutiendi simul & molliendi uim moderatam obrinet potissimum quod cedris adhæret.

*Bryonia.*

**B**ryonia dicta est uitis alba.

Initium literæ G.

*Gala, lac.*

**L**ac omne tribus constat substantiis, caseosa, serosa, & pingui, quam copiosissimam bubulum obtinet, unde etiam butyrum efficitur. Serum ipsius uim habet abstergendi, unde & aluum subducit, si ipsum per decoctionem secernas. id uerò quod caseum refert & crassum est, magis obstruit, atque ideo acrimoniam obtundit: coctū uerò lac aut marinis calculis ignitis in ipsum iniectis, aut alio quodam modo, præsens fit remedium dysenteriae, & acrium in uentrem defluxionum. Cæterum lac totum ad acres oculorum fluores, aliasque acrimonias conducit. At temperatissimum lac, muliebre est, mox caprillum, hinc asininum, ouillumque, postremo uaccinum.

*Gale, mustela.*

**M**ustelæ concremata cinis abundè discutit, ex aceto igitur illitus podagricos, & articulares dolores iuuat: inarefacta autem inueteraq; mustela comitialibus auxiliatur.

*Galion.*

**G**alion à coagulando lacte dictum est, a parinæ simile, siccan di uim, mediocremq; acrimoniam habet: flos eius ad sanguinis eruptiones & ambusta, congruit.

*Galopsis, uel galiopsis.*

**G**alopsis, quā alij galibdolon appellant, urticæ similis herba est, læuior aut, & foedi odoris, scirrhosos tumores dissipat & emollit, itē ad ulcera serpentina facit in cataplasmate imposita.

*Garum.*

**G**arum calefacit, exiccatq; efficaciter, ac ideo aduersus ulceras putridas

H 2



ra putrida extrinsecus eo utitur, p̄terea contra intestinorū tormina & coxendicis dolores ex partibus inferioribus iniiciunt.

*Genciana.*

**G**entiana radix efficax admodum est extenuare, perpurgare, abstergere, & meatus infarctos aperire.

*Geranium.*

**G**eranium id quod foliis respōdet anemonæ, radicem habet esculentā, quæ cū uino drachmæ modo pota uteri inflationes dissoluit. altera geranii species ad medicinam inutilis est.

*Ge, terra.*

**O**mnis terra desiccat, quæ uero alterius substātiæ expers est, etiam sine morſu id facit. at si ignea quædam ipsi qualitas admixta sit lotione hanc quoq; deponit. Inter cultas igitur terras quælibet pinguis omnium particularū quæ sicccari postulant curationi accommodata est, Aegyptio igitur luto uruntur contra aquas cutē subeuntes, & lienosos affectus, item ad fungos laxoq; tumores euidenter proficit. Ex terris medicatis lemnium miniū, quæ sphragis dicitur, siccat pariter & astringit mediocriter, contra lethalia medicamenta præsentis antidoti vires habet, ulceribus malignis cum aceto aut uino medetur, sanguinis profusionē quamlibet sistit, & depascentē dysenteria intestino mulsa prius, deinde muria per clysterem eloto, coercescit. Miniū rubricū uehementius, quàm lemnii obstruentibus quæ emplastica dicuntur, miscetis medicinis, & pota lumbricos interimit, sed multo lenior est. Samia quàm Lemnia terra, ceu glutinans & uiscosa, quare utendū ea est in his quæ leniri oporteat. & sanguinis reiectiones, quacunq; ex parte fiāt, compescit. Selenusia & Chia maiore abstergendi uirtute pollent, ideoq; mulieribus ad nitorem cutis & læuorem in facie utilis est, ulceribus carnē & cicatricē inducit, præsertim ambustis. Cī molia mixtæ facultatis est, refrigerantis discutientisq; idq; illota. lota uerò magis refrigerat, & ambustis ex posca medetur. Ampelitis, est aut ea quæ uitibus inungitur, quòd innascentes ipsis uermes enecet, siccat & discutit egregiè citra erosionem. Cretica, aëria est, & sine rosionē abstergit. Eerethrias euidenter astringit, cōcremata uerò & elota sine rosione desiccat, præstantior uerò est cinerea, Pnigitis similes cimoliz vires repræsenrat, sed colore nigrescit. Armenia, quæ etiam bolum nominant,



nant, summè desiccant, unde dysentericis, alui fluxionibus, putro cruento, tabi, spiritus difficultati ex humiditate, ulceribus humidis, & pestilentialibus uitiis strenuè opitulatur. Cæterum cum uino tenui diluto bibitur: si febris adsit, cum aqua. Alana autem gleba Armeniæ uim obtinet. Ochra uim habet discutienti exedendiq; reprimi igitur supercrescentia ulcera, & caua cum cerato mixta replet.

*Geras, senecta, anguis.*

**S**enecta anguis affatim siccatur: aceto igitur subseruefacta, dentium doloribus medetur. Aspidis exuuium cum melle tritū delitumq; oculorum aciem maximè iuuat.

*Ges enteræ, terræ intestina, seu uermes terreni.*

**L**umbrici terræ detriti neruorum uulneribus impositi, repente euestigio mirabile adferunt præsidium.

*Gigarta, nuclei acinorum uuæ.*

**N**uclei acinorum uuæ, desiccant ordine secundo, refrigerant primo. quum itaq; abundè sint acerbi omnibus alui uitiis fluidis, conueniunt.

*Gingidium.*

**G**ingidium calorem non adeò manifestum sortitum est, cæterum siccatur in abscessu tertio, & astringit, qua de causa & stomacho utile est.

*Glaucium.*

**G**laucium astringit, sed ita ut etiam nonnihil gustanti sit ingratum, manifestè refrigerat, eaq; uis erysipelatis non tam ualidis succurrit.

*Glaux.*

**G**laux herba calida & humida temperamento est, unde ad lac generandum efficax est.

*Glecon, pulegium.*

**P**ulegium calefacit, & extenuat uehementer, unde si cataplasmate applicetur ruborem excitat, & crassos uiscososq; humores è thorace & pulmone emolitur.

*Glæos, sordes balneorum.*

**S**ordes balneorū calefaciunt modicè, emolliunt, discutunt, rhagadibus ani & condylomatis accommodatæ.

H 3 Glycyrriza.



*Glycyrriza. dulcis radicula.*

**G**lycyrriza tepidi humidique temperamenti est, alicuius etiam astrictionis particeps, unde & asperitates laeuigat, non arteriarum tantum, sed etiam uesicae scabiei medetur, eadem sitim arcet.

*Glycyfide, pæonia.*

**G**lycyfide quam alii pentameron, nonnulli pæoniam uocant, radicem habet acrem & leuiter subamaram & siccantem, cui etiam astrictionis nonnihil inest, quapropter mensis ciet, renes & iecur purgat, instar amygdalae pota cum uino: at si hoc austerum fuerit,alui quoque fluores coercet, ad alligata uero puero, morbum comitalem abigit.

*Gnaphalium, centunculus.*

**C**entunculus dictus est gnaphalium quod folijs ipsius tenebris loco tomenti, gnaphalon dicitur, utamur sunt autem calida & modice astringentia, atque hinc ad dysenterias cum uino austero bibuntur.

*Gongylis, rapum.*

**R**api & radix & semen flatulenta & semini creando sunt, ueneremque excitant.

*Gordilion.*

**G**ordylion alii seseli appellant, calidum est, urinae & mensibus educendis habile, radix ipsius cum melle linctae, quae in thorace haerent, educit.

*Gyris, pollen farinaceus.*

**P**ollen uirtute respondet amylo, sed calidior est.

*Gypsum.*

**G**ypsum uim habet siccantem opplentemque, propter quam ad sanguinis eruptionem conuenit temperatum cum polli-ne candido oui liquore, ustum uim opplendi non similiter retinet, uerum magis siccatur & repellit, praesertim cum posca.

*Quae à D incipiunt.**Dades, tedæ.*

**T**edæ acre quiddam habent, item uim concoquendi, & abstergendi nonnullam, unde aceto incoctae dentium doloribus si hoc aceto colluantur, succurrunt: at si mel adiectum fuerit, pituitam per os educunt, mixtae etiam eclegmatis faciles è thorace excreatus reddunt.

Damascena



*Damascena.*

**D**Amascena, quum ad pruna uentum erit, exponam.

*Damasonium.*

**D**Amasonium absterforiam quandam uim obtinet, qua calculos conterit, & quæ per aluû diffluû, ad urinas deriuat.

*Daucus.*

**D**Aucus, quod & staphylinus dicitur, duplex est, cuius radix flatulenta est, & uenerem mouet. Syluestris dauci semen minimè flatus creat, sed urinam & menseis citat, quemadmodum & herba ipsa.

*Daphne, laurus arbor.*

**L**Auri arboris folia siccant & calefaciant insigniter, magis quoq; fructus: radicis cortex amarus & leuiter astringens calculos comminuit, & iocinorosis opitulatur cum uino, odorato triobolari pondere potus.

*Daphne herba, laurus alexandrina.*

**D**Aphne herba, quæ & Alexandrina dicitur, calida, acris, & subamara est, deirco menseis & urinas commouet: laureola uerò, quæ daphnoides græcè nuncupatur, eiusdem facultatis est: tum chamædaphne, quasi dicas homilem laurum, quæ & ipsa commanducatur.

*Derma, pellis.*

**P**Ellis ouina recens detracta, calens adhuc ijs qui flagris cæsi sunt circumposita, mirificè auxiliatur. At hippopotami pellicula cõbusta & cû aqua leuis imposita phymata discutit. At uiperæ pellicula detrita impositaq; alopeciis mirabiliter pilos reficit.

*Dermata, hoc est, pellos seu coria ueterum calceamentorum.*

**C**Oria ueterum calceamentorum crematorum cinerem reddunt siccatoriû, unde ex calceis pedum attritibus nondum inflammatis, ambustis, intertriginibus, & tuberculis medentur.

*Distamnon.*

**D**Ictamnû tenuius est uirtute pulegio, cætera simile, quod autem uocatur pseudodictamnon imbecillius est.

*Dionysias.*

**D**Ionyfias dicta est in audrosæmo.

H

4

Diphry-



*Diphryges.*

**D**iphryges mixta est facultatis: habet enim quippiā astringens & mediocriter acre, ideoq; malignis ulceribus praesens est remedium.

*Dipsacus, quod labrum ueneris dicitur.*

**D**ipsaci spinæ radix in secundo ordine desiccatur, nonnullam uera abstergendi uim simul obtinet.

*Dorycnion.*

**D**orycnion simile temperamento est papaueri & mandragoræ, immodicè refrigerans: siquidem modicum, stuporē inducit: copiosius assumptum, interimit.

*Dracuntium, dracunculus.*

**D**racunculus simile quidam aro habet, sed eo acrius, amarior, calidius, tenuiusq; est. Itē astrictionis nonnihil habet coniunctum. Radix ipsius pota uiscera purgat, & peruiacium seu malignorum ulcerum excellentissimum est remediū: folia respondent: semen ualentius est.

*Dryopteris, filicula.*

**F**illicula dulcis, actis, & leuiter amara est: radix acerba est, cæterum uim habet exedentem, qua & pilos abolet.

*Drys, quercus.*

**Q**uercus & folia & fructus siccante & tepida ui pollent, quamobrem uulnera recentia glutinant, inflammationibus incipientibus medentur: at quod sub glandis corio membranosum, fructus carnē ambit, cum ualentius astringat, ad fluxum muliebrem, aliosq; fluidos morbos exhibetur.

*Quæ ab E incipiunt.**Ebenus.*

**E**beni ligni uis est excalectoris, deterforis, & subtilis: unde etiam caliginem oculorum abstergere creditur, aliisq; oculariis miscetur medicinis.

*Encephalos, cerebrum.*

**C**erebrum leporis coctum detritum, comistumq; infantium centionibus utile esse fertur: nonnulli uero tremoribus succurrere manducatum, literis prodiderunt. At galli cerebrū cum nino potum ad uenenatos morsus efficax esse Dioscorides pro-



des pronuntiat, & sanguinis è cerebri membranis eruptionem cohibere Cameli cerebrum Galeno autore siccum cum aceto potum, comitiales persanat. Idem facit mustelæ cerebrum. Hirundinum cum melle in oculorum suffusiones efficax est. Cerebrum ouillum similiter præparatum, infantium dentitionibus exactè opitulatur.

*Elæa, olea.*

○ Leæ ramusculi quantum astringunt, tantum etiam refrigerant, fructus qui exactè ematuruit, moderatè calidus est immaturus maiorem tum astringendi tum refrigerandi uim repræsentat.

*Elea, hoc est olea, Aethiopica.*

○ Leæ æthiopica lachryma ammoniaco tenui similis, uires habet extensorias, quare ad cicatrices, albugines, hebetudinesq; oculorum ea utuntur, & ad dentium dolores, si cauis ipsorum iniiciatur, efficax est: nonnulli uero syluaticam esse hæc oleam asserunt.

*Elæon, oleum.*

○ Leum ex oliuis drupis dulce calidumq; mediocriter est magis humectans: at quod ex immaturis oliuis exprimitur, Græci omotribes appellant, tantæ astrictionis particeps est, quantæ etiam frigiditatis. Elorum uero oleû morfu ac rosione caret. uetus quato diutius reseruatum, tanto magis calefacit, discutitq; præsertim si iam inde ab initio tenue extiterit: iudicatur autem id, si purum sit, pellucidum, si paucum magnam corporis partem inungat, & ex facili cutem penetret combibaturq; huiusmodi nimirum est Sabinum: quod autè ex agrestis olea funditur, abstergit simul & astringit, squalidissimumq; id est, pro oleorum ratione. ricininum uerò æquales ueteri uires obtinet: reliqua uerò nempe sesaminum aut raphaninum & quæ eius sunt generis pro substantiis ex quibus constant, uires quoq; diuersas præ se ferunt.

*Elæomeli.*

○ Leum in Syria ex trunco quodam arboris emanat crassius melle & dulcius, quod instar duorum cyathorum potum cū aquæ hemina, crudos humores biliososq; ex aluo educit: qui uerò id bibunt, torpescunt, quod extimescendum non est, sed excitari ipsi debent.

Elate-



*Elaterium.*

**E**laterium succus sylvestris cucumeris fructus appellatur, in secundo ordine calefaciens: quod menseis prouocat, fetus appositum propter summam amaritudinem necat, euacuatione etiam ex naribus cum lacte instillatum molitur: ab inferioribus partibus inditum, pituitam, nonnunquam etiam sanguinem extrahit.

*Elate, abies.*

**A**bies arbor calefacit siccaturque; ut nigra populus similiter: de resina ipsius in resinarum sermone agemus.

*Elatine.*

**E**latine herba est parietariae similis, mediocri frigiditate & astringitione donata.

*Elaphoboscus.*

**E**laphoboscus uirtutis est calefactoriae & siccae in secundo abscessu, substantia tenuis.

*Elelisuacus, saluia.*

**S**aluia euidenter calefacit & leuiter astringit.

*Helenium, inula campana.*

**H**elenium calidum est & siccum cum excrementitia humiditate, quare & eclegmatis temperatum infarctos thoraci humores educit, ac ex eo in particulis ruborem excitant.

*Eleoselinon, palustre apium.*

**E**leoselinon in aquosis natum locis idem potest quod hortense apium, licet maius ipso existat.

*Ebur.*

**E**boris ex ungue ramenta si obducantur, reduuijs profunt: item ossium dentiumque; ipsius quum sint siccae facultatis & absterforiae, huiusmodi miscentur medicamentis.

*Helcysma, argenti recrementum.*

**H**elcysma, argenti est excrementum, uiribus plumbagini respondens: quippe astringit, simul atque extrahit, quo fit ut emplastris quas phaeas appellant & iis quae cicatricem ducunt, admisceatur.

*Helleborus, ueratrum.*

**V**eratrum utrunque; calefacit & desiccatur in tertio abscessu, item acre est & absterforium, unde etiam ad leprosa curis uitia



uitia conuenit: nigrum uerò si fistulis inferatur tribus diebus callum exteric.

*Helechryson.*

**H**elechryson alii chrysanthon, alii amaranthum appellant, coronarius est frutex, coma aurum referente, quæ cū uino pota urinæ angustis, serpentium moribus, coxarum dolori, & ruptis accommodata est, ex mulso pota mensis educit, sanguinemq; concretum dissoluit, & destillationibus auxiliatur.

*Helxine, paritaria.*

**H**elxinem alii perdicium, alii parthenium, quidā sideritim, quidam heraciam nuncupant, uis eius est abstergere, ac leuiter astringere, cum humiditate subfrigida.

*Helxine.*

**H**elxine quæ & cisampelus dicitur, uim habet discutiendi.

*Elymus, quæ & meline dicitur, panicum.*

**P**anicum simile est milio, siccans refrigeransq; extrinsecus inductum, cæterum & alui fluores desiccatur.

*Empetron.*

**E**mpetron, quod ab aliis prasoides nominatur, pituitam & bilem purgat, est etiam salsum, quare absterisionibus accommodatur.

*Epithymum.*

**E**pithymum in tertio abscessu siccatur & calefacit, thymo efficacius.

*Epimedium.*

**E**pimedii uirtus est mediocriter frigida cū humiditate aquosa, quod si obducatur, mammas erectas conseruat, dicitur etiam sterilitatem potu facere.

*Epimelis.*

**E**pimelis, quæ etiam ab Italicis rusticis uocatur unedon, malus est syluestris, cuius fructus acerbus & stomacho inimicus est, capitiq; dolorem mouet.

*Epipactis.*

**E**pipactis, quæ & elleborine appellatur, aduersus uenena & iocinoris affectus bibitur.

*Erebinthus, cicer.*

**C**icer quod quidem cōsuetum legumen est, flatus creat, ualentis



lentis materiæ, aluum facilem reddit, urinam mouet, lacti seminiq; generando accommodatum, idem mensis elicit: ac crios appellatum, hoc est, arietinum, aliis magis urinæ ciendæ est decoctum ipsius præsertim nigri calculos quoq; in renibus conterit: quod autem orobæum ab eruo uocatur, calidius his est & subamarum. Syluestria quouis modo domesticis sunt ualidiora.

*Eria, lanæ.*

**L**Anæ quidem sordidæ fomentis utiles sunt, nam pinguitudo ipsarum, quam œsypon Græci appellant, buryri modo, concoquit: at quæ sordibus carent, materiæ rationem duntaxat obtinent: concrematæ uero uim habent acrem, calidam, ficcam simul & tenuem, ut etiam flaccidas ex uligine ulcerum carnes protinus absumant.

*Erice.*

**E**Rice ui pollet discutiente citra rosionem, sed flore ipsius potissimum, & foliis utendum est.

*Erinon.*

**E**Rinon aquatica herba est, cuius seminis drachmæ duæ cum mellis drachmis quatuor illiti, oculorum fluxiones sistunt, succus aurium doloribus benefacit.

*Hermodactylus.*

**H**ermodactyli radix & per se, & ipsius decoctum uim habet purgandi, priuatim etiam arthriticis tunc quum humores defluunt exhibetur, uerum stomacho nimis quam aduersatur.

*Herpyllum, serpillum.*

**S**erpillum calefacit, ut & urinam, & menstrua commoueat.

*Erythrodanon, rubia.*

**E**Rythrodanon rubia tinctorum radix est, acerbamaraq; lienem, iecur & renes ita purgat, ut cruenta quoq; per urinam & mensis euocet: ac cutis uitia quæ absterisionem postulant, exterit.

*Erysimon.*

**E**Rysimi semen igneum calefactoriumq; est, uti nasturtium, quare in fermento tostum, thoracem purgat in eclegma-  
tis assumptum, duritiasq; emollit, & cæcos cancos inductum adiuuat.

*Euzomon,*



*Euzumon, eruca.*

**E**Ruca, & ipsa priori similis temperamēto, flatulenta est, ob quod ad uenerem instigat, semen ipsius urinam quoq; mouet. Cæterum syluestris domestica ualentior est.

*Eupatorium.*

**E**Vpatorium tenuem uim & incidentem sine conspicuo calore habet, qua iecur obstructum expurgat, est & nonnullius astrictionis particeps.

*Euphorbium.*

**E**Vphorbium adurentem uim sortitum est subtilemq; , aliis liquoribus similiter.

*Ephemeron.*

**E**Phemeron, non uenenū illud sed quod iris syluatica nominatur, mistæ potestatis est, & repellentis, & discutientis.

*Echidna, id est, uipera.*

**A**Iperæ carnes calidæ & siccæ tēperatura euidenter existūt, quæ corpus totum per cutem expurgant, hinc multi quos elephantia malè habebat, esu potuue ipsarum consanuerunt: quæ in maritimis, alijsq; locis aridis degunt, magis ad sitim faciundam sunt efficaces.

*Echinus herba.*

**E**Chinus herba quidem, acerbæ est, quæ repellat, & siccet.

*Echinus, erinacius.*

**E**Rinacei autem terrestres, caro inueterata siccataq; ualidè discutit exiccatq; : pota igitur elephantis, malo habitu præditis, & alijs plurimis auxiliatur: pellis ipsius cōcremata uehementius siccatur & discutit, alopecias cum pice liquida peruncta sanat. Marini erinacei quod esui idoneum est, urinā citat, & aluum reddit facilem: testa cremata, terrestri responderet.

*Echion.*

**E**Chion, alii doriada, nonnulli alcibiadion uocant, spinosa herba est, quæ non modo à serpente commotis cum uino pota auxiliatur, sed præsumentes quoq; percuti non patitur.

*Hepsema, sapa.*

**E**Epsema mustum decoctum, quod alii siraxon appellant, calefacit modicè & concoquit, est autem medicamentum & empla-



& emplasticum, & rosionis experts.

Quæ à Z incipiunt.

*Zea.*

**Z**ea tritico uiribus respondet, medium inter calorem, & siccitatem obtinens, leuiter exiccat, necnon uim opplendi quàm uocant emplasticen, obtinet.

*Zingiber.*

**Z**ingiberis radix impensè quidem calefacit, sed non primo itatim occursum, quòd inuictæ cuiusdam & crassioris humiditatis particeps sit, propter quam etiam facilè perforatur, firmam autem conseruat caliditatem.

*Zythus.*

**Z**ythus compositæ est substantiæ, etenim acris est, ceu ex putredine procreatus, & frigidus, ex qualitate acide, eoquæ prauis succi habetur.

*Zyme fermentum.*

**F**ermentum & ipsum contrariis constat qualitatibus, quippe acoris cuiusdam frigidi, ac è putredine nati caloris, tum eius qui ex salis & farinæ natura contrahitur, compos est: quare non mediocriter calefacit atque discutit.

*Zomos, Piscium ius.*

**R**ecentium piscium ius esculentum aluum per se, & cum uino potum deijcit, priuatim uerò in hunc usum conficitur ex phycidibus, scorpionibus, iulidibus, percis, & saxatilibus aliis teneris simpliciter cum aqua, oleo, anetho, & sale. Item eorum quæ testacea cute integuntur, tellinarum, hiatularum, conchularum, & ueteris galli cum sale diutissimè excocti iusculum, uentrem subducit, e contrario gallinæ ius comprimit.

Quæ ab H incipiunt, quod Latini in E longum uertunt.

*Hediosmus, Menta.*

**M**enta in tertio ordine calida, tenuis, acris cum humiditate semicocta existit, cuius causa etiam in uenerè incitat: sed amari quoque non nihil obtinet, quo lumbricos enecat. Quæ uerò acerba est recentes sanguinis reiectiones coercet.

*Hedysarum.*



*Hedysarum.*

**H**edysarum aut pelecinos amarum est, leuiterque astringit, unde potum stomacho gratum redditur, cæterum uiscera obstructa repurgat.

*Helitropium.*

**H**elitropium maius, quod & scorpiurum uocant, calidam, siccam, & abstergentem uim præ se fert, cuius decoctum potu educit pituitam, bilemque: applicatum uero semen ipsius myrmecias & huius notæ uitia perficcat. Minus autem heliotropium, & hæc abolet & latas tineas interimit, si cum semine suo adiecto, nitro, hyssopo, & nasturtio bibatur.

*Electrum, Succinum.*

**E**lectrum populi albæ lacrymā dicunt, quæ iuxta amnē Eridanum destillat, & in spissitudinē coit, aureo colore, quod si leuigatum bibatur, stomachi & alui fluxiones, & sanguinē cōpescit.

*Hemerocalles.*

**H**emerocallis radix uiribus lilio respondet, perinde ac illud ambustis opitulatur.

*Hemionitis.*

**H**emionitis astringens simul & amara est, idcirco lienosis cum aceto pota succurrit.

*Hepar, Iecur.*

**I**ecur rabidi canis tostum comestumque, ijs qui ab eo commorbi sunt subuenire fertur. Capilli iecoris inassati sanies iusciosos iuuare instillata: uaporemque eius decocti oculis recipi iubent: idem quoque iecur esse: manducatum uero comitiales coarctare. Idem præstare & hircinum ferunt. Adhæc lacertæ iecur dentibus corrosis impositum, dolorē sopit. Item lupinum, medicamini hepatico quod constat eupatorio inijcitur. Asinum tostum comitiales, si ieiuni id manducant, adiuuat. Apri iecur recens inarefactum tritumque cum uino, ad serpentium morsus bibitur. At mergi iecur siccum epotum, calculos eiicit.

*Erigerum, senecio herba.*

**S**enecio mixtas habet uires, refrigerat & modicè discutit.

*Eryngium.*

**E**ryngium calefacit quidem non manifestò, siccitatis autem haud obscuræ, nec modicæ particeps.

Quæ



*Thalassion hydor, marina aqua.*

**A**qua marina acris, calfactoria mediocriter, desiccans, & pota stomacho quidē contraria est, uentrem autē turbat, pituitamq; educit: si calida superfundatur, extrahit, & discutit.

*Taliethrum.*

**T**haliethrum siccandi uim sine rosione habet, hinc ulcera inueterata cicatrice obducit.

*Thapsia.*

**T**hapsia acris est, & ualenter cum humiditate calefacit: ex alto igitur trahit insigniter, attractumque eadem discutit.

*Theion, sulphur.*

**S**ulphur trahendi & ipsum uim obtinet, calidum & substantia tenue, ut aduersus pleraq; uirulenta animalia resistat, præsertim turturem marinum draconemque, uel siccum inspersum, uel saluæ quoque mistum, uel urinæ pueri, uel oleo, uel melli: item scabiosa corporis uitia mirificè persanat.

*Thermos, lupinum.*

**L**upinum, esculentū quidē opplēdi uiribus pollet: amarum uerò, abstergit, dissipat, & sine rosione desiccatur, tineas occidit inductū, & potū, itē uiscera purgat cū ruta & pipere potum. nam cutis uitia extergit, tumores dissipat, cū oxymelite applicatū: syluestre aut amariū est & omni ex parte satiuo ualētius.

*Thelypteron.*

**T**helypteron, quam nonnulli nympheam uel ptelein appellant, filici similis facultate, quæ cum uino pota latas & teretes uentris tineas interimit, fœtum in utero corrumpit: folia ipsius manducata aluum emolliunt.

*Thlaspi.*

**T**hlaspi semen est uiribus acre, ut intestinos abscessus potu rumpat, menseis prouocet: ab inferioribus partibus inectum coxarum dolores finit, cruenta uacuans, ac alioquin supra infraq; biliosa instar acetabuli potum, expurgat.

*Thridax, lactuca.*

**L**actuca olus est non summè frigidum humidumve, sed pro fontanæ aquæ temperamento, quapropter calidis inflammationibus



mationibus conuenit, præterea sitim potu restinguit, & genituræ fluorem uenerisquæ insomnia cohibet: Syluestris lactuca hac minus & refrigerat & humectat, uerū succulentior existit.

*Thymus.*

**T**hymus in tertio ordine calefacit & desiccatur, glutinosos crassosque humores incidit.

*Thymbra, satureia.*

**S**atureia agrestis quidem eadem quæ thymus præstat, hortensis aut in omnibus quidē imbecillior, sed ad cibū laudatior.

*Thymelæa.*

**T**hymelæa, unde granū cnidiū fit, simileis ei uires obtinet.

*Quæ ab I incipiunt.*

*Idea radix.*

**I**dea radix gustu acerba & uiribus, sanguinis eruptionibus & rheumaticis affectibus, tum pota, tum extrinsecus imposita accommodatur.

*Hidros, sudor.*

**S**udor per se contrahere efficax est, miscetur autem in palæstris exercitantium sordibus, quibus astringendū uis duntaxat inest, ac redditur totum discussorium. Mammis igitur inflammatione tentatis efficax est remedium, & feruori ipsarum restinguendo: benefacit etiam bubonibus: at si fuerint sicciores, cum cyprino, aut rosaceo emolliri debent.

*Ixos, uiscum.*

**V**iscum calefacit cū acrimonia, humores ex alto ualidè elicit, & thapsiæ modo discutit, hac tamē multo est ignauius.

*Ion, uiola.*

**V**iolæ folia aquea frigidaquæ substantia præpollenti constāt.

*Ios, ærugo.*

**A**ërugo acrem gustu qualitatem præ se fert, item discutit, consumit, inciditquæ non teneram modò, sed duram quoque carnem: at si momentum ipsius cerato copiosiori misceas, medicamentum fiet quòd citra rosionem abstergat.

*Hippocampus.*

**H**ippocampus marinum animal est, cuius concremati cipavli ægin.

I nis



nis cum liquida pice alopecias explet.

*Hippolapathum, grandis rumex.*

**H**ippolapathum in palustribus locis nascitur, lapathum simile.

*Hippomarathron, grande fœniculum.*

**H**ippomarathrum cachryi proximum, magis quàm fœniculum desiccatur, unde & aluum, fluentē sistit, & calculos confringit, menseisque mouet semen ipsius coriandro simile, respondet quidem ei uiribus, sed imbecillius est.

*Hippopotamus.*

**H**ippopotami quod est equi fluuiatilis, testiculus aridus potus ad serpentium morsus efficax est.

*Hipposelinon, grande apium.*

**H**ipposelinon cum apio domestico uirtute conuenit, nisi esset imbecillius.

*Hippuris, cauda equina.*

**H**ippuris astringentem cum amaritudine qualitatem possidet, eoq; ualenter simul & sine rosione desiccatur, ac uulnera maxima committit, intestinorum ramicibus opitulatur, & uitis fluidis cum uino pota medetur.

*Hippophaes, lappago.*

**H**ippophaes, quod alii hypophyes uocant, quo uesticis expoliunt surculosus frutex est, è cuius radice thapsiæ modo liquor colligitur, qui cum erui farina instar drachmæ datus, bilem ac pituitam purgat: item totus ipse frutex siccatus ad purgationes accommodatur.

*Iris.*

**I**ris affatim calefacit, extergit, & maturat, tenuis substantia, tussi utilis, humores in pectore contumaces faciles ad excretionem facit, torsionibus uentris medetur, sordida ulcera purgat, eum mulsa pota aluum inanit.

*Isatis glastum.*

**I**satis domestica qua tinctores utuntur, siccandi uireis & astringendi habet. his etiam magna uulnera in duris glutinat corporibus, sanguinem erumpentem compescit, laxos cedenteq; tumores discutit, ac omnibus malignis ulceribus resistit. Syluestris autem quum magis rodat, magisque ideo siccet, ualenti-  
rius



tius aduersus humiditas putredines pugnat, ad cætera deterior.  
ut quæ mordeat : cæterum ob uirium uehementiam lienosis  
quoque utiliter adhibetur.

*Isopyron, aut phasiolum.*

**I**sopyrum phasiolumve semen amarum ac modicè acerbum  
occupat, ob quod crassos glutinososq; humores & abstergit  
& incidit, sic ut corpora contrahat stringatq; hinc etiã quæ al  
tè desident expurgat, excreationibus sanguinis nō aduersatur.

*Itea, salix.*

**S**alici & folia & flos facultate constant quæ citra rosionem  
siccet, habent etiam nonnullam astrictionem, cortex autem  
paulo siccior est cuius perusti cinis ex iis habetur quæ uehe  
menter exiccet, quippe clauos & myrmecias, cū aceto exterit.

*Ichthyocolla, gluten piscium.*

**I**chthyocollæ uis est opplere & siccare. rectè miscetur em  
plastris capitis & glutinantibus, & iis quæ ad lepras tollen  
das & erugationem faciei conficiuntur.

*Quæ à C incipiunt.*

*Cancanus.*

**C**ancaui radix modicè siccet, & sine rosione ad opplendum  
infarciendumq; accommodata, quare ex uino linctâ man  
sæque tragacanthæ & dulcis radiculæ modo, arteriæ scabri  
ciem iuuat.

*Cancamum.*

**C**ancamum lachryma est arboris in arabia, myrrhæ similis,  
odore grato, qua etiam ad suffitum utuntur. uis eius est ob  
scos extenuare, abstergere, & aperire obstructa.

*Cadmia.*

**C**admia utraq; siccet, sed quæ botrytis, quasi acinosa appel  
latur, tenuioris est substantiæ, placitis autem dicta crassio  
ris. Cæterum concremata cadmia sine morfu desiccet, abster  
git, caua ulcera tum in oculis tum in toto corpore explent, &  
præsertim humidiora in naturis mollioribus, in durioribus  
efficacium magis usus est.

*Cacalia.*

**C**acalia uiribus & usu cum cancano conuenit.

I 2

Calamagrostis,



*Calamagrostis, gramen arundinaceum.*

**C**alamagrostis siccatur, hinc succus decoctumque radicum ipsius oculariis miscetur medicinis, semen urinam cit, & stomacho benefacit.

*Calamintha, nepita.*

**N**epita tertio ordine calida & sicca temperamento, est tenuis acrisque, menta longè ualentior, siquidem est uelut syluestris menta: facile igitur quæ altè hærent ad se trahit, eoque sudores mouet, totum corpus digerit, ac rigores febrium qui circuitu remeant, finit, extrinsecus cum oleo infricata strenuè. quinetiam ad coxarum dolores ab inferioribus iniiciunt, & uiciosos humores in cutem erumpentes abstergit.

*Calamus.*

**C**alamus odoratus in secundo ordine calefacit, & siccatur, inest ei quippiam & subtile & astringens, urinam itaque citat, & stomachicis, tum quæ utero & iocinori faciunt medicinis temperatur. Calamus autem phragmites extergit, folia, ipsius uiridia mediocriter refrigerant, cortex crematus calefacit siccaturque in tertio fere abscessu: radicem cum bulbis applicatam spicula & aculeos extrahere prædicant.

*Campe, eruca olerum.*

**E**rucæ olerum cum oleo inunctæ, rutos à uirulentorum animalium moribus conseruare dicuntur.

*Cantharides.*

**C**antharides quæ in tritico reperiuntur luceis transuersim cingulis inuolutæ, aceti feruescentis uapore suffocatae, ad plurima utiles redduntur, quippe ungues scabros cum cerato eiiciunt, clauis scabiosisque affectibus opitulantur, iam uerò & exedentem urentemque uim habent: nonnulli uerò etiam medicamentis urinam prouocantibus momentum ex ipsis admissum exhibuerunt.

*Cannabis.*

**C**annabis semen flatum discutit, & siccatur, ut & genituram exarefaciat, succus ipsius uiridis ad aurium dolores ex obstructione creatos efficax est.

*Canapon.*

**C**anapon sambuci flos est, de quo prius eictum est.

Capnion,



## LIBER VII.

501

*Capnion, secundum alios capnos, fumaria.*

**F**umaria inde nomen sortita est, quod succus ipsius copiosas lachrymas eliciat, etenim oculorum facit claritatem: acris amaraque est, unde urinas biliosas liberaliter prouocat, iocinoris obstructioni languori que medetur, stomachum confirmat & aluum emollit.

*Capparis.*

**C**apparis radix extergit, probe purgat, incidit, discutitque tum amaritudine, tum acrimonia: at acerbitate contrahit, stringit & densat, quapropter lienes induratos & pota & extrinsecus imposita, iuuat, mensis promouet, pituitam per os educit, maligna ulcera sanat, dentium dolores sopit, tumores discutit, & uirilgines, quas alphas dicunt, aurium uermes enecat: folia autem & fructus similem quidem, sed imbecillio rem uim possident.

*Cardamomum, nasturtium.*

**N**asturtij semen sinapis modo urit, unde etiam inductum ruborem in cute excitat: ceterum crassos humores, cum aliis potum incidit, herba uero arida uiribus respondet, humida moderatior, ideoque crudam ipsam assumunt,

*Cardamomum.*

**C**ardamomum acre quidem & ipsum est, uerum nasturtio inualidius: compositus est etiam nonnullius amaritudinis, qua tineas alui interimit, & scabiem cum aceto exterit.

*Caris.*

**C**aris in pollinem detrita & cum radice bryoniae pota tineas occidit.

*Cancris.*

**C**ancrorum co crematorum cinis, fluuiatilium sane siccatur, erinaceorum & cochlearum modo, at totius substantiae proprietate, canis rabidi moribus potu mirabiliter efficax est: ut in aliis dictum est, marinorum cinis eximia donatus siccitate his quidem non conuenit, sed ijs qui magis siccari desiderant, proficit. fluuiatilis cancer tritus si inducatur, spicula & aculeos eiecit.

*Caros.*

**C**ari semen & siccatur & calefacit in tertio fere gradu, flatus discutit,

I 3



discutit, urinam mouet, idq; non semen duntaxat: sed etiam tota planta.

*Carpesium.*

**C**Arpesium odoratum est tenue, uiscera obstructionibus liberat, urinas mouet, & renes calculo laborantes purgat,

*Carya, nuces.*

**N**Vx arbor tum in coliculis tū in foliis aliquid habet astringens, plurimum autem in nucū coriis existit. succus itaq; eorum decoctus cum melle, stomaticum fit medicamentum: interius inde putamen carinatum uisum extenuandi uim acquirit, & sine rosione siccatur, quod in eo clauditur edendo aptū, natura oleosum, facile in bilem conuertitur, confectumq; ex eo oleum extenuandi tumores, & putredines, quas sepedonas dicunt, discutiendi uim obtinet. Flaccescentes autem uerustate nuces, cutis uitia abstergunt. At auellanæ, quas & ponticas uocant & leptocarya, frigidiores sunt & austeræ, in cæteris, inglandibus æquales.

*Caryophyllon.*

**C**Aryophyllon, quasi dicas nucifolium, non eam habet substantiam quæ nomine prætenditur, sed ex India ueluti flores cuiusdam arboris festucacei & nigri sunt, longitudine ferè digitali, odorati, acres, subamari, calidi & sicci in tertio prope modum ordine: qui multiplicis usus sunt, tum ad obsonia, tū ad alia multa medicamenta.

*Cassamum.*

**C**Assamum hoc nōnulli balsami fructum esse dicunt, de quo suprā egimus.

*Cassia.*

**C**Assia calefacit & siccatur in tertio ferè abscessu, tenuis abunde, acris & modicè astringēs. incidit igitur simul & discutit, roburq; instrumentis adijcit, postremo & mensis euocat.

*Castorium.*

**C**Astorium calefacit siccaturq; cum extenuandi uiribus eximiiis, quibus præter alias actiones, etiam neruorum qui ex copia humorum malè habent, affectibus, congruit, & refrigeratos facile recalfacit, & extrinsecus applicatum & potui datū, idq; ita, ut nullam aliam offendat particulam etiamsi medio-

criter



riter febris affligat, quemadmodum in uerernis & lethargis, sed & mensibus retentis proficit, & secundas expellit, at in cerebri & pulmonis uitiis etiam suffitus castorii inspiratu haustus, præclare opitulatur.

*Caucalis.*

**C**aucalin alii daucum syluestrem appellant, nam dauci modo calefacit, siccaturinam mouet, & fassamento ad repositionem conditur.

*Cenchros, milium.*

**M**ilium refrigerat in primo abscessu, siccatur, in secundo habet etiam modicam extenuandi facultatem extrinsecus igitur in sacculis ad fouendum & cataplasmatismodo adhibitur, desiccare consuevit.

*Cedrus.*

**C**edrus & quæ fruticosa est iunipero similis, & quæ arbor, calefaciunt, siccantq; in tertio ordine, confectum ex eis oleum quod cedream appellant, etiam quartum attingit, subtilis admodum substantiæ. hinc teneras carnes expedit & citra dolorem exedit, duras autem præsertimq; demortuas siccatur & à putredine asserit, pediculos, pulices, ascaridas, & aurium uermis interficit, aliaq; plura facit.

*Centaurium.*

**C**entaurij maioris radix acris, calida, & terræ astrictionis compositus est, mensis itaq; promouet, foetus corrumpit, eiicitq; uulnera glutinat, sanguinem spuentibus, & reliquis pectoris uitijs præsens est remedium. Minoris centaurij radix inefficax, est, coliculi ualide & citra morsum siccatur unde non solum ad quæ maius centaurium ualet, sed etiam coxendice labosantibus, ipsius decoctum inferius iniectum, biliosa uacuat, nonnumquam & cruenta, ac ualide proficit.

*Ceras, cornu.*

**C**ornu caprillum hircinumq; concrematum denteis nitidos reddit, gingiuas nimia humiditate flaccidas compositis. Cerui autem cornu cum uino maceratum tritumque, deinde circumlitum mobileis sistit denteis. Crematum, mox lotum, dysentericis, celiacis, sanguine expuentibus, & arquaticis, duorum cochlearium instar auxiliatur: miscetur etiam oculariis medicinis. Taurinum cornu cum aqua potum, sanguinis eruptiones cohibet.



*Cerasia.*

**C**erasia dulcia quidem citius per aluum descendunt, austera stomacho utiliora sunt, acida uerò ob incidendi uim quam habent pituitosis excrementosisq; stomachis profunt, gummi uerò cerasi arboris arteriam exasperatam læuigat, & calculo laborantibus cum uino potum succurrit.

*Ceratonia arbor.*

**C**eratoniae fructus quæ ceratia dicuntur, siccandi & astringendi uirtutis, nonnullus etiam dulcedinis particeps est.

*Cephale capita.*

**M**enarum sale conditarum capita cremata, uim siccandi non admodum acrem acquirunt, hinc sedis rimas & guttur diu induratum Scyrro sanant. Smaridis caput totum combustum ad alopecias cum adipe ursino proficit. Idem præstat etiã muris caput crematum cum melle. Milui aridum sine plumis, modo qui tribus digitis comprehendi queat, cum aqua potum anidolores finit. Lacertæ uerò caput aculeos educere traditur, myrmecias, uerrucas, & clauos exterere.

*Cecis, Galla.*

**G**alla, omphacitis, quidem medicamentum est assatim astringens, eamq; ob causam siccatur, fluxiones repellit contrahitque, laxa stringit, & partes imbecillas firmat, fluidisq; omnibus affectibus accommodata est: ponitur autem in tertio siccantium ordine, secundo refrigerantium. Altera quæ flauo colore, inanis magnaq; est, non tantam in siccando & astringendo habet efficaciam, sedis inflammationes & procidentias excocta iuuat: gallæ uerò combustæ & aceto restinctæ, sanguini supprimendo sunt.

*Cepæa.*

**C**epæa portulacæ similis est, folia ipsius contra uesicæ scabies utiliter bibuntur, radix cum asparago, quem myacanthinum, hoc est, corrudam appellant, pota, urinæ stillicidia, quæ ex obstructione fiunt, abigit.

*Cera.*

**C**era quum temperata sit, reliquorum medicamentorum materia efficitur, ipsa uerò per se ex ijs est, quæ læuiter obsterunt, nam & discutientem & calidam uim exiguam obtinet.

Ceryces,



*Ceryces, buccina.*

**B**Vccinorum testa concremata excellenter deficcat citra ro-  
sionem, unde ulceribus maleficis accommodatur, at in ijs  
quæ putredinem experiuntur, cum aceto, aut uino, aut oxyme-  
lite ipsis utendum est, oleum in quo ueluti caro ipsorū adhuc  
uiuentium excocta sit, aurium dolores si instilletur, discutit.

*Cici, ricinum.*

**R**icini fructus quemadmodum purgat, abstergit, discutit, sic  
etiam folium, sed imbecillius: de oleo tractatum est.

*Cinnabaris.*

**C**innabaris acris mediocriter uires habet, item nonnihil  
etiam astringit.

*Cinnamomum.*

**C**innamomi uis est summè tenuis, nō item æquè calida, sed  
tertiū ordinis, nihil autem ex iis quæ parem ipsi calorem re-  
ferunt adeò siccatur, propter substantiæ tenuitatem. Cinnamo-  
mis autem ueluti inualidum quoddam cinnamomū est, quod  
nonnulli pseudocinnamomum uocant.

*Circaea.*

**C**ircaea radix calida est & odorata, quæ cum uino pota foe-  
minarum locos purgat: semen in sorbitione sumptū lac  
generat.

*Cisseris, pumex.*

**P**umex absterforius est præsertim dentium, non modò uiri-  
bus, sed etiam scabritie, coniicitur autem in medicamenta  
quæ carni ulceribus inducendæ sunt, item in ea quæ cutis la-  
bes exterunt, Crematus tenuior quidem, sed mordax redditur:  
lorus, id quod mordet, deponit.

*Cisthos.*

**C**isthos, aut Cissaros frutex est astringens & modicè frigi-  
dus uirtute, folia ipsius & germina adeò siccant, ut etiā uul-  
nera conglutinent: at flores quum in secundo ferè gradu sic-  
ciores sunt, dysenteriiis, aliisq; fluidis uitiis accommodati sunt:  
extrinsecus illiti, putrida ulcera compescunt.

*Cissos hederæ.*

**H**ederæ contrariis constat uiribus, ut quæ astringat & refri-  
geret. Item acris est & calida, aqueæ substantiæ & repidæ  
quum



quum uiridis est, particeps : cuius folia uino incocta uulneribus glutinandis, ambustis, & lienosis salutariter adhibentur, succus ipsorum naribus ad pituitam educendam infunditur. item diuturnis aurium defluxionibus succurrit: lachryma hederæ, ut quæ acrior sit, pediculos enecat, & pilos abolet.

*Citrium, quod & malum medicum dicitur.*

**C**iprij medium acidum, aut qualitatis expers est, in quo semen tertij refrigerantium siccantiumq; ordinis habetur, cortex siccatur in secundo quidem abscessu, sed non item refrigerat, acri uirtute præditus, caro ipsius crassi succi est pituitæ generandæ apta, & frigida: semen discutit, & in secundo ordine desiccatur, folia arboris siccandi discutiendiq; uim repræsentant.

*Cichorium, intybus syluestris.*

**C**ichorium picrisue tanquam syluatica seris est, refrigerans siccansq; in primo abscessu: habet etiam uim astringendi, qua ad hepaticas dysenterias conuenit.

*Clematis.*

**C**lematis quibusdam daphnoides, aliis myrsinoides, nonnullis polygonoides, sarmenta habet oblōga, crassitudine iunci quem holoschoenum dicunt, folium uerò lauri, siccandi uirtute pollet, qua alui fluores, quam diarrhiam dicunt, dysenteriam, & dentium dolores finit: contra uenenatorum morsus rectè imponitur.

*Clematis altera.*

**C**lematis altera arboribus similacis modo circumuoluitur, acri & caustica facultate donata, huius semen cum aqua potum, pituitam & bilem per inferiora educit, folia autem ad lepras arcendas inducuntur.

*Clinopodion.*

**C**linopodij uis est calida siccaq; nondum uero adurens, sed tertij ferè ordinis.

*Cnicus.*

**C**nici semine ad purgandam aluum duntaxat utimur, si quis extrinsecus eo utatur, tertii siccantium ordinis erit.

*Conchylia.*

**C**onchylia buccinis facultate proxima sunt.

Cœlia,



*Cælia, uenter.*

**V**Enter mergi, aut recens coctus, aut inarefactus, esu stoma-  
cho utilis esse dicitur: similiter etiam gallinarum interior  
alui membrana sicca potui data: uerum Galenus experimēto  
falsum utrunq; se inuenisse scribit. Palumbi uerò auis uentrem  
paulatim potum calculos per urinam elice, testis est Dioscori-  
des. Mustelæ alius pota contra quælibet uenenata amule-  
tum dicitur.

*Coccus cnidios, granum gnidium.*

**G**Ranum gnidium semen est thymelæ, non chameleæ, ut  
quidam opinati sunt, acri & adurentæ facultate præditum,  
hoc epotum, per inferna aquas detrahit.

*Coccus baphicos, granum tinctorium.*

**G**Ranum tinctorium leniter siccatur, unde magnis & neruo-  
rum uulneribus, cum aceto aut oxymelite læuigatum, cō-  
modè imponitur.

*Coccymlæa, prunus.*

**P**Runi fructus uentrem subducit, recens magis, aridus mi-  
nus: decocto ipsius, gutturis inflammationes utiliter col-  
luuntur. Gummi quod ex arbore destillat, incidendi uim exte-  
nuandiq; testatur, ob quod nonnulli frangendis uesicæ calculis  
esse cum uino potum affirmant: ex aceto, puerorum impetigi-  
nes persanare. Syluestrium prunorum baccæ euidenter astrin-  
gunt, uentremq; reprimunt. Nominatur hæc planta in Asia  
prumnum. Domestica uerò pruna siccata apparent, quæ nunc  
Damascena appellantur, quemadmodum Galenus memorie  
mandauit.

*Colla, glutinum.*

**G**Luten quod ex simila & polline conficitur, emplasticam  
uim & concoctricem repræsentat.

*Colocyntha, cucurbita.*

**C**Vcurbita humidi, frigidiq; in secundo abscessu tempera-  
menti est, unde tota si applicetur, calidas refrigerat in-  
flammationes.

*Colocynthis, cucurbita syluestris.*

**C**Vcurbita syluestris ualidam purgandi uim obtinet: uiridis  
ipsius succus infricatus, coxendicum doloribus auxiliatur.

Comaros,



*Comaros, arbutus.*

**A**rbutus, & arbor, & fructus acerbæ qualitatibus est, uocant eū  
m̄ emyrcoelon: cæterum stomacho aduersatur, & capitis  
dolorem facit.

*Commi, gummi.*

**G**ummi siccante ui & emplastica pollet, & nimirum asperi-  
tatibus medetur.

*Conia, lixiuium.*

**L**ixiuium ueluti cineris lotium nominatur: omnium maxi-  
mè absterforium & siccans est, quod ex fici & tichymalli ci-  
nere præparatur, ac ferè iam exedens: q̄ si calx etiam cineri  
addatur lixiuium redditur adurens: quod iam etiam protosta-  
cton nuncupant, clysterium potissimum medicinis miscetur.  
Vehementissimū uero omniū est, quod ex sola calce cōficitur.

*Conyza.*

**C**onyza utraq; siccatur & calefacit in tertio ordine, hinc etiā  
oleum in quo decoquitur rigores febrium circuitu remeā-  
tes discutit: flores idem præstant, quorum decoctum menseis  
citatur, & fœtus extrahit: quæ uero in humidis regionibus nasci-  
tur, odore grauior & inefficacior est.

*Copros, stercus.*

**S**tercus quodlibet calefacit, maximè siccatur & discutit: uariat  
autem pro animantis quod ipsum reddit temperamento, &  
uictus ratione. itaq; canum quum ossa uorauerint fimus in are-  
factus, dysenterias cum scisso lacte, quod Græci schiston uocāt  
potius, sanat: idem uerusta ulcera reficit, si medicamentis in  
ea efficacibus misceatur. Hoc anginae, tonsillarumq; inflamma-  
tiones cum melle inunguntur. At puerorum qui uictu non su-  
perfluo educati sunt stercus, huic malo magis prodest. Lupo-  
rū quod & ipsum candidus in fructibus reperitur, coli doloribus  
strenuè succurrit, non potum modò, sed corpori etiam ad-  
alligatum: alligetur autem ex lana ouis à lupo enectæ, aut  
pellē ceruina. † Caprillum stercus acius, magisq; discutiens,  
scirrosos tumores applicatum dissipat, præsertim in duris cor-  
poribus: crematum uerò ualentius abstergit, extenuatq;.  
Bubulum extrahendi quamquam uim obtinet, ideoq; uesparum  
& apium ictibus medetur: quinetiam toti corpori in sole obli-  
tum aquas inter cutem præclarè iuuat. Onium uerò cū aceto  
myrmecias,



myrmecias, acrochordonas, furunculos & clauos, persanat. Colubarum syluestrium, quas palumbes latini dicunt, aliis longè acius cum nasturtij semine cutem exulcerat. Gallinarum ex oxymelite, aut aceto, aut mulso potum, uomitione strangulantes fungos educit, præsensq; est remedium: hoc quoq; colico dolore conflitantibus potui quidam exhibebant. Nonnulli uerò & ciconiarum simum orthopnoicos potum auxiliari affirmant. Murium simus reliquis abstergit efficacius, eoq; alopecias curat, & infantium sedi appositus, ad excretionem proritat. Sturuorum qui oryza pasti fuerint, abstergendi uim præ se fert, qua cutis asperitates, quas ephelidas Græci uocant, exterit. Terrestrium crocodilorum simu, uutiligines, quas alphos dicunt, extergit: quemadmodū fluuiatilium, oculorum albugines extenuare creditur.

† In Cod. antiquis, hoc uerba ita leguntur. κόπρος αἰγῶν, σπύραθαι δὲ ἰδίως ὀνομάζονται, δριμύτας καὶ διαφορητικῆς ἐστὶ δυνάμεως τοῖς σκιρῶσιν ὀγκοῖς ἀρμόττεσθαι, οὐ σπληνὸς μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων μερῶν. ἐγὼ γὰρ ἐπὶ γόνατος ἔχοντος ὄγκον χροῖον, δίστυτον, ἔχρησάμην αὐτῇ δι' ὀξύκράτους καταπλάττεσθαι κελεύσαι ἀλδύρον κριθῖνον ἐμβαλλομένης τῆς κόπρος. Quæ uerba qm̄ conuersa sunt in latinum sermonem ab interprete Aetij, ex quo huc tralata, tu apud eum auctorem lege.

#### *Corallium.*

**C**Orallium ueluti arborea planta est in lapidis duritiæ coalescens, crescit non in terra, sed in alto maris, colore rubrū, lapidi simile, siccandi ualidam, astringendi mediocrem uim possidet, ideoq; cruentis sputis, & dysentericis utile.

#### *Coris animal, cimex.*

**C**Imex acri uirtute pollet. Scribunt igitur quidam cum aceto potum hirudines eiicere.

#### *Coris herba.*

**C**Oris herba, quam alij uocant hypericon, acris est, & odorata, semen eius ad urinam & menses ciendos bibitur: succurrit & phalangiorum moribus, item ad opisthotonon cum oleo inungitur.

#### *Corianum seu corium, coriandrum.*

**C**oriandrum ex contrarijs uiribus compositum est, tenuis substantiæ, terrenæ, amaræ, aquosæ autem humiditatis tepidæ



pidæ particeps, habetque, modicam uim astringendi, quapropter inflammationibus, erysipelatis non admodum feruentibus conuenit, tumores molliusculos cum quodam in id efficaci discutit. Semen modicè quidem cum passio bibitum, tineas pellit: liberalius autem sumptum mentem tentat.

*Corydalis, aut corydallus, Galerita siue alauda.*

**A**lauda auis simplici iure elixa, coli cruciatibus opitulatur: assumi autem continuè & sæpe cum ipso iure debet.

*Coronopus, pes cornicis.*

**C**oronopodis radix & ipsa ad colicos cruciatus proficere manducata creditur.

*Costus.*

**C**ostus modicum quidem amaritudinis, plurimū uerò acris & calidæ qualitatis habet, unde in quibus uel calefacere particulam quampiam cogites, uel ex alto in summa humorem aliquem elicere, ad costum confugiendum est: urinam igitur & menses ducit, tineas enecat. Quum uerò & flatulenti cuiusdam particeps sit, uenerem cum mulso potus stimulat, coxendicum doloribus, resolutis, febrium rigoribus ante accessiones, cum oleo infricatus, conducit.

*Cotyledon, acetabulum.*

**A**cetabulum refrigerat, repellit, abstergit, & dissipat: folia ipsius cum radice manducata calculos comminuere, & urinam ciere creduntur.

*Cochlea.*

**C**ochleæ concrematæ impense siccant, & mediocriter calefaciunt, conferunt dysenterijs, quas nondum putrelago obedit, si misceantur harum partes quatuor, piperis albi pars una, gallarum partes duæ. At quæ ignem non sunt expertæ, si cum tegumentis in pollinem coactæ uentri imponantur, aquâ subter cutem exinaniunt, prosunt item articularijs doloribus applicatæ, quoad sua sponte deciderint: in uniuersum humorem altè insertum ualidè deficcant.

*Crania, cornus.*

**C**orni arboris fructus acerbus, si edatur, ualidè uentrem astringit. folia autem & germina acerlitate uehementer siccant,



siccant, adeò ut etiam maxima durorum corporum uulnera conglutinent.

*Crambe, brassica.*

**B** Brassica quæ edendo est siccat, & manducata, & à foris imposita, non tamen acrem conspicuè uim ostendit, eoq; uulnera glutinat, & dolosa malignaq; ulcera, ac tumores solui cōtumaces persanat: habet etiam nonnihil absterforium, quo lepras exterit. Semen ipsius potum tineas occidit, præsertim Aegyptiæ: caulium crematorum cinis adurente ui cōstat, cum adipe longis laterum doloribus utilis. Syuestris autem brassica, satius in omnibus ualidior est, unde nec intra corpus citra noxā sumitur. Marina, subsalsa leniterq; amara, aluuū solent.

*Cratægonos.*

**C** Ratægoni herbæ semen & acre gustanti deprehenditur & frigidum, milio simile.

*Crethmon.*

**C** Rethmon falsum est simul & amarum, sed modicè, quare & uis ipsius est asterforia & desiccans.

*Crithe, hordeum.*

**H** Ordeum refrigerat siccâtq; in primo abscessu, uerum non nihil etiam extergit: cæterum fabarum lomento siccitate præcellit, minus flatulentum est, polenta hordeo multo magis siccât, prisana præterquàm quod largius humectat, etiam † abstergit uehementius.

† In altero manu scripto his uerbis hæc sunt adscripta, οἱ δὲ ἐκ τῶν κριθῶν γινόμενοι ἄρτοι ἀτρεσώτεροι τῶν ἐκ τῶν πυρῶν εἶναι, i. panes qui ex hordeo conficiuntur, minus alunt quàm qui ex tritico. Quæ huc traducta sunt ex Aetio.

*Crimnon.*

**Q**uod in tritici & zeæ & farina crassius est, crimnon apellatur, ualidius nutriens quàm polenta: ægrius autem conficitur.

*Crinon, lilium.*

**L**ilij flos temperamento mixtus est, ex tenui substantia, terreftri & nonnulla aquosa temperata: quapropter oleum quoque ex eo confectum discutiendi uireis, mollendique representat, uuius inflammationibus accommodatum. Radix ac folia



ac folia siccant, abstergunt, discutiuntq; mediocriter, quò sit ut ambustis conferant: succus ipsorum, & neruorum uulneribus cum oxymelite prodest.

*Crocodilion.*

**C**rocodilij semen & succus calidam, siccam & discutiètem uim præ se fert, urinas itaque & menseis mouet: radix excreationes è pectore iuuat, item sanguinem per nareis ducit.

*Crocus.*

**C**rocus ad secundum calefacientium ordinem, primum siccantium refertur astringit & concoquit.

*Crommyon, cepa.*

**C**epa ex quarto calefacientium ordine habetur, substantiæ crassioris, quam obrem hæmorrhoidas appositu aperit: item abstergit: utiligines, alphas dictas, cum aceto exterit, & alopecias ocus alcyonio pilos restituit, succus oculis suffusis aut crassi humoris uitio hebetibus auxiliatur.

*Cyamos, faba.*

**F**aba non multum à medio temperamento recedit, siue refrigerando, siue siccando: caro ipsius nonnullius etiam absterforiæ qualitatis est, excreationibus è thorace & pulmonibus utilis: quum autem cortex fabæ nonnihil quoq; astringat, tota ipsa faba in posca decocta cœliacis, & dysentericis conducit, inducta uero cataplasmatibus modo inflammationibus & tumoribus medetur, lac in mammis extinguit.

*Cyanos,*

**C**yanos acrem habet uim detrahendi, & discutiendi maiorem quàm cinnabaris: astrictionis quoq; particeps est.

*Cyclaminus.*

**C**yclaminus varias uireis habet: etenim extergit, incidit, aperit, attrahit, & dissipat: succus itaque ipsius hæmorrhoidas sedi admotus aperit, duritias cum aliis discurit: cum melle, suffusis proficit, per nareis purgat, abdomini inunctus aluum subducit, foetus corrumpit: radix autem tota succo quidem est imbecillior, & sed & ipsa uehemens adeò est, ut cum mulsâ instar trium drachmarum pota, interanea expurget: cæterum cutis uitia exterit. Altera cyclaminus, quam etiam cissanthemon uocant,



uocant, radice donata inutili, semen habet efficax, ut potum priori similia faciat.

*Cyminum, cuminum.*

**C**Vminum in tertio ordine calefacit, urinam mouet, & flatus discutit.

*Cynosbatos, rubus caninus.*

**R**ubi canini fructus non instrenuè astringit: folia id præstāt mediocriter. at quod in fructu lanæ speciem præ se fert, ceu arteriæ inimicum caueri debet.

*Cyparissus, cupressus.*

**C**Vpressi galbuli & turiones siccandi uiribus pollent, nullo calore conspiciuo: quapropter uulnera magna in duris corporibus conglutinant, & superfluis putridinibus in alto fixas humiditates, citra noxam depascuntur, intestinorumque ramibus opitulantur.

*Cyperus, iuncus angulosus.*

**I**uncus angulosus calefacit siccaturque; citra morsum, hinc etiam humidioribus ulceribus cicatricem mirabiliter inducit, ac oris ulcera per sanat: habet & uim quandam incisoriā, qua calculos comminuit, urinam & menstrua promouet.

*Cypros.*

**C**ypri folia & surculi mixtis constant uiribus, discutiente & astringente, tum ea quæ sine offendiculo & morsu siccet: ideoque decoctum ipsorum ambustis superfusum prodest, ac igneis inflammationibus congruit. Item oris eruptiones, quas aphthas uocant, commanducata, per sanat: item medicinis leni dicatis miscetur.

*Cytisus.*

**C**ytisi folia discutiētis leniter, & tepidæ naturæ sunt, quemadmodum & maluæ.

*Conium, cicuta.*

**C**icutæ uires summè refrigeratorias esse omnibus constat.

*Conos.*

**C**oni cortex & folia, pinum uiribus repræsentant, sed aciora efficacioraque sunt: fructus, quem etiam strobilon appellant, uiridis, amarum quiddam & acre, cum humiditate possidet, quare thoracis affectibus ad facilem expleatū accom-

PAULI AEGIN.

K modatur



modatur esculentus in aqua maceratus ut acrimoniam exuat  
temperatus redditur, rosionis expers, opplens obstruensque,  
ut etiam asperitates lauiget.

Quæ ab L ordiuntur.

*Lagopus.*

**L**agopus siccae facultatis est, qua alui fluores desiccat.

*Ladanon.*

**L**adanon à cistho ladone dicta gignitur, quam depascentes  
capellæ barbis suis & uillosis cruribus succulentum & pin-  
guis ex herba deferunt, quod congestum ladanon est medica-  
men præstantissimum, in secundo ferè abscessu calidum, natu-  
ra tenue, emolliens mediocriter, discutiens & concoquens, eoq;  
uteri affectibus peculiariter conuenit: habet præterea nonnul-  
las astringendi uireis quibus defluos capillos confirmet.

*Lathyrus.*

**L**athyrin & ipsam rithymali speciem esse dicunt, quod eius  
succus, illius modo purget, semen autem huius præcipuam  
purgandi uim habet.

*Lapsana.*

**L**apsana māducata stomacho nocet, inducta uero cataplas-  
mate nonnihil abstergit discutitque.

*Lapathum, rumex.*

**R**umex mediocriter discutit: acuta rumex, quæ oxylapa-  
thum dicitur, præter id etiā pauxillum repellit: semen aut  
præsertim oxylapathi, astringens, alui profluvia, diarrhoeas dicunt  
& dysenterias persanat, folia uerò semini cōtraria faciunt: hæc  
etenim comesta aluū mouent, illud potū ipsam comprimit.

*Lemonium.*

**L**emoni fructus: austerus cum uino cœliacis, dysentericis, &  
sanguinem spuētibz datur item ad fluorem muliebrem  
acetabuli mensura.

*Lichen herba.*

**L**ichen herba in petris nascens muscum representat, uis ei  
est exterendo purgare, mediocriter siccare, & refrigerare:  
imperi-gines sanat, inflammationes arcet, & ut Dioscoridis uer-  
bis utar, sanguinis eruptiones sistit.

Lichenes



## LIBER VII

515

### *Lichenes equorum.*

**L**ichenes equorum triti cum aceto, comitialibus, & omnium uenatorum moribus mederi feruntur.

### *Leontopetalon.*

**L**eontopetali radix & sicca & calfacientis in tertio ordine facultatis est, necnon discussoria.

### *Lepidion.*

**L**epidion, quam & hiberiada uocant, ex quarto calefacientium gradu est, nasturcio proximum uiribus, minus autem eo desiccatur.

### *Lepis, squama.*

**S**quama omnis ualide siccatur, astringit, nec ignauiter mordet. Sed æris amplius siccatur, extenuaturque, cui nonnihil æruginis adest, magisque ea quæ ex Cypriis clauis raditur, quam propterea etiam helitum quasi clauarem appellant. At ferri squama, liberalius astringit, atque hac magis stomomatis, quapropter ad contumacia malignave ulcera præstantior est, sed æris, carnem magis purgat & consumit.

### *Leucacanthum.*

**L**eucacanthi, quod alii polygonatum, alii ischiada uocant, radix incidit quidem, & in tertio ordine siccatur, in primo autem calefacit.

### *Leucas.*

**L**eucas calfacit siccaturque in tertio ordine, acrimonia uero præpollet.

### *Leucoion, uiola alba.*

**A**lbæ uiolæ totus frutex abstergerendi extenuandique uireis possidet, magis autem flores, & ex eis, sicciores: idcirco & mensis stimulant, foetus corrumpunt expelluntque, ac si quis aquæ mistura uim ipsorum obtundat, etiam inflammationibus conducent, præsertim uteri: radices eadem præstant, crassiore magisque terrestri natura præditæ: aceto inflammationibus in scirrhum indurescentibus imponuntur.

### *Leuce. populus alba.*

**P**opulus alba aquosa, tepida, terrestrique constat substantia, uiribus absterforiis.

K 2

Libanotides,



*Libanotides, rosmarinus.*

**L**ibanotides tres numerantur, una sterilis, duæ fructum ferentes, vires illis extergendi, incidendi, discutiendi, & emolliendi, succus earum oculis & humorum crassitie hebetibus salutariter ex melle imponitur: coronariæ uerò libanotidis decoctæ ius regio morbo laborantibus rectè bibitur.

*Libanotos, thus.*

**T**hus in secundo ordine calefacit, in primo siccatur, habet & modicam quandam vim leuiter astringentem: cortex ipsius manifestò astringit, siccaturque in secundo abscessu absolutè, crassior thure & minus acris, hinc sanguinem spuentibus, dysentericis, coeliacis, & stomachicis, tum foris impositus, tum intro assumptus, salutaris est. Surculus ipsius calefacit siccaturque; tertio in abscessu, atque nonnihil extergit: quocirca oculorum ulcera, & purgat & explet.

*Lygnis, fuligo.*

**F**uligo specierum quarundam concrementarum, nempe thuris, myrrhae, terebinthi, styracis, picis liquidæ, cedri, ueluti tenuissimus quidam pulvis est, qui Græcis æthale dicitur, cum fumo ascendens obtinet quidam siccantem & terrestrem tenuemque substantiam particulares autem ipsius differentiae secundum materiae combustionis rationem sunt. Utuntur ea potissimum in medicinis oculariis, & ad honestandas palpebras accommodatis. at thuris fuligo omnium est utilissima, ut quæ mitior: contra pini, coni, & piceæ ualentior est, quo fit ut ad glabrescentes palpebras, destillantes & erosos oculorum angulos, illachrymantesque, rectè adhibeatur.

*Ligypticum, ligusticum.*

**L**igustici & radix & semen adeò calefaciunt ut mensis cicerent, flatusque probè discutiant.

*Lithargyros, argenti spuma.*

**A**rgenti spuma medijs inter metallica ordinis est, eoque; ceu materie ipsa alijs medicinis mista subinde utimur, siccatur tamen mediocriter, abstergit & astringit: inde femorum attritus per sanat.

*Litthi, lapides.*

**L**apides omnes terræ modo desiccant, sed hæmatites astringit & abundè siccatur. quare etiam oculorum asperitates ex terit,



exterit, quum quidē inflammatione carent, ex aqua: quum uerò illa tentantur, ex ouo: ceterū ad spūta cruenta bibitur utiliter; ulcera supercrescentia compescit. Schistos lapis superiori quidē confimilis est, sed imbecillior, mox galactites, i. lactarius sequitur. Melitites cuiusdam ē calor compos est. Moroxus, quem etiā, leucographida uocant, quò prædictis omnibus mitior est (nullas. n. habet uireis efficaciores) eò moderatior, magisq; dolorē lenit, eamq; ob causam in teneris corporibus cū cerato ad cicatricē ulceribus obducendam illo utuntur. Iaspis qui subuiridi colore est, quū efficacior sit, oculorū cicatrices & pterygia extenuat: uiridis autē Iaspis adalligatus & in anulo gestatus stomachū adiuuat. Iudaicus dictus, renū calculos conterit, unde ē recentiores recolithon appellāt. Pyrites ex eorum numero est, qui ualidē discutiunt tumores, sanguinemq; in grumos concretū: cuius quum facultas nō est, molari utuntur. Phrygius præter quam q̄ ualenter desiccāt, nonnihil etiā astringit roditq; unde & repellere & discutere potest, eoq; oculariis miscetur remediis. Ageratus astringendi discutiendiq; uirtutis cōpos, gutturis inflammationē iuuat. Asiæ petra flos tam subtilem naturā habet, ut carnes humiditate flaccidas citra rosionem absumat. Gagates affatim siccans inflationibus præsertim diuturnis expedit. Magnes, quem & Heracliū lapidē uocant, æquales hæmatiti uireis repræsentat. Arabicus ebori similis, siccandi detergendiq; uireis habet. Alabastritæ combusti cinerem stomachicis nonnulli bibendum exhibent. Smyris extergit, dentibus purgandis accommodatus. Qui in spongiis inueniuntur lapilli, renum calculos frangūt. Similes his uireis habent qui in Argæo Cappadociæ monte nascūtur. Similiter & ophites dictus, qui adalligatus contra uiperarū morsus confert. Ostracites, hoc est, crustaceus, & geodes à terra quam intra se cōplectitur appellatus, abundē siccare feruntur, ideoq; inflammationis tumoribus mederi. Naxiæ cotis detrimentū refrigeratorium esse dicunt, ut & uirginum mammas & puerorum testiculos ne crescant, reprimat. Quod uerò ex olearia cote detritum fuerit, absterforia ui donatum alopecias explet. Hieracitin & Indicum lapidem alligatum contra hæmorrhoidas ualere perhibent. Sapphyrus potus, scorpionum ictibus aduersatur. Aphroselenes, comitialibus potui datur. Armeniacus, inferiorem uentrem purgat, sed stomacho nocet.



*Lithospermon.*

**L**ithospermon, quod alij Liosporon, alij heraclion uocant, herbae ætonychi dictæ, semen est lapidosum, album, quod cum uino albo potum calculos frangit, & urinas eijcit.

*Linospermon, lini semen.*

**L**ini semen ex primo gradu calidum est, inter humectantia siccantiaq; medium manducatum flatibus creandis est, etiã si frictum fuerit.

*Linoxostis, herba mercurialis.*

**H**erba mercurialis aluum liberaliter subducit, inducta cataplasmatibus modo discutit. Sciendumq; est eius semen infricatum corporis excrescencias præter naturã, quas uulgus uocat naphia, abolere, sicut experientia cõprobatũ est. Sed uiride semen esse oportet, & frequenter ipsum tuberculis illis infricare.

*Litrum, nitrum.*

**L**itrum mediũ inter aphronitrũ & salem uirtute est: crematum magis extenuat discutitq;, & si intro sumat, crassos uiscososq; humores plus cæteris incidit & extenuat. Chalastreũ uerò (est aut Calastra Thessaliæ locus) acri<sup>9</sup> siccãtiusq; ẽ, quare ad capitis destillationes & articulares cruciatus eo utũtur.

*Lenchitis.*

**L**enchitidis, cui semen triangulum est, cuspidis modo, radix dauco æqualis urinam mouet: eius uerò quæ scolopẽdrio respondet, folia uiridia, uulnera glutinant, sicca uerò cum acetoso pota lienibus scyrrho induratis, medentur.

*Lycopsis.*

**L**ycopsis radix quum sit astrictoria, cum polenta admota in cataplasmate. Erysipelatis authore Dioscoride cõuenit: si lauis cum oleo iungatur, sudores elicit.

*Lycium.*

**L**ycium ex diuersis genere substantijs constat, calida, tenui, & discutiente, terrestri uerò frigida & leuiter astringente, ut in secundo abscessu desiccet, calefaciendo refrigerandoque medium est, hac de causa ceu absterforio, in oculis obscuratis eo utuntur: tanquam astringenti, in coeliacis, dysentericis, & maleficis ulceribus: at contra inflammationes, ut discutiendi cæterum primas obtinet Indicum.

Lyfima-



*Lyfimachum.*

**L**Yfimachum uim habet excellenter astrictoriā, quā & uulnera glutinat, & sanguinem compescit, tum ipsum, tum ipsius succus, dysentericos & potum & ab inferioribus partibus injectum, sanat.

*Lychnis.*

**L**Ychnidos coronariæ semen calidum est & siccum in secundo abscessu, eoq; absoluto.

*Lotus herba.*

**L**OTUS domestica, quam nonnulli triphyllon appellant, absterforias uireis obtinet & modicè siccanteis, calore temperata est. At syluestris loti semen ad secundum calefacientium ordinem refertur, habet autem nonnihil etiam absterforium. Aegyptiæ semen in panes quoq; effingitur.

*Lotus arbor.*

**L**OTUS arbor extenuat, siccatur, & mediocriter astringit, quā de causā ad fluxum muliebrem, alui fluores pota cū uino aut aqua, aut et in aluū data, salutaris est, pilos defluos confirmat.

## Quæ ab M auspiciantur.

*Macer.*

**M**ACER cortex est q̄ ex India importat, tertio ordine siccatur inter calorem & frigiditatem mediū obtinet: est etiam astringens tenuisq; unde celiacis & dysentericis auxiliariis habetur.

*Malobathron.*

**M**ALOBATHRI foliū æquales spicæ nardi uireis repræsentat.

*Malache, malua.*

**M**ALUA syluestris mediocriter discutit & emollit: hortensis autem, ceu humidior, etiam imbecillior est: semen tantò uiribus præstat, quanto & siccior est.

† Huic capiti addita sunt quædam in ueteribus manuscriptis de dendromalache, quæ quia totidem uerbis apud Aetium leguntur, adscribenda non putaui.

*Mamiras.*

**M**AMIRAS ueluti radícula herbæ cuiusdam est ceu geniculis frequētibus nodosis, quæ cicatrices & albugines extenuare creditur, exterendi ninurum facultate prædita.



*Mandragoras, mandragora.*

**M**Andragora tertii refrigerantium ordinis est, mala ipsius caliditatem quampiam & humiditatem referunt, unde soporem grauem homini possunt accersire: at radicis cortex uehementissimus, non refrigerat modo, sed etiam siccatur: interior eius pars imbecillior est.

*Manna thuris.*

**M**Anna thuris simileis thuri uireis habet, sed remissas & sensim altringentes.

*Marathron, fœniculum.*

**F**œniculum calefacit in tertio ordine, in primo siccatur. hinc etiam lacti generando est, & suffusis auxiliatur.

*Mastiche.*

**M**astiche, Chia quidem calefacit, siccaturq; in secundo abscessu, cæterum compositæ est facultatis, attrictoriæ simul & emollientis: hanc ob rationem stomachi, uentris, intestinorū & iocinoris inflammationibus cōuenit. Aegyptia, nigriore colore quodāmodo, siccatur magis & discutit, minus astringit, hinc furunculos quoq; dissipat.

*Melan, atramentum Indicum.*

**A**tramentum Indicum auctore Dioscoride in genere leniter astringentium est, quæ inflammationes laxosq; tumores, œdemata uocant, rumpunt, ulceraq; purgant.

*Melantheria, creta sutoria.*

**C**reta sutoria impensè astringit extenuatq;.

*Melan, atramentum scriptorium.*

**A**tramentum quo scribimus abundè & ipsum desiccatur, solutum uerò poscæ ambustis si illinatur, præsentis est remedio.

*Melanthion.*

**M**elanthion in tertio ordine calefacit & desiccatur, est etiam tenui natura præditum unde destillationibus in fauces, olfactu prodest, intus assumptum discutiendis flatibus singulare: est etiam amarum, unde tineas interficit: abstergit & incidit, hinc orthopneis quoq; conuenit, item lepras exterit, myrmecias eiicit, & menstrua incitat.

*Meli, mel.*

**M**el calefacit & siccatur ordine secundo, abstergitq; insigniter: coctum



costum uerò minus quidem acre redditur, deterforium, & uentri subducendo accommodum, sed magis nutrit. Amarū mel, sicut & id quod in Sardinia fit, mistas habet uireis, terrestrem & calidam. At mel, sachar quod ex felici Arabia conuehitur, minus dulce nostro est, sed æqualeis uireis obtinet, præter q̄ qđ nec stomacho noceat, nec sitim faciat, quēadmodū hoc Nostras.

*Melia, fraxinus.*

**F**Raxinus nota arbor est, folia eius porta uiperarum moribus succurrunt, cortex crematus, illitusq; ex aqua lepras separat, ligni uerò ramenta si bibantur, lethalia esse ferunt.

*Melilotos, sertula Campana.*

**S**ertula campana mixtis facultatibus pollet: astringendi, discutiendi & concoquendi.

*Melissophylon, apiastron.*

**A**Piastrum uiribus marrubio per omnia respondit.

*Memacylos.*

**M**emacylos arbuti fructus, in litera C comprehensus est.

*Mespila.*

**M**Espila, alii triocca quasi trigania uocāt, fructus est affatim acerbus, & uix esculentus, aluumq; continēs: germina foliaq; mespili impensē acerbata sunt.

*Medion.*

**M**edij radix uireis semini contrarias præ se fert, quippe austera est & fluxiones comprimit, ideoq; muliebre fluxū sistit: semen quum tenuis incidentisq; sit facultatis, menseis quoq; proritat.

*Necan, papauer.*

**P**Apauer multiplex est, hortensis quidem, quod etiam thylacitin ceu utricularium uocant semen est esculentum, si cū pane assumatur, mediocriter somnum concilians. Athrœas appellatum, inde qđ semen ipsius celeriter defluat, ualidius hortensi est: manducatur itaq; non per se, sed momentum copiosiori melli mixtum. Quod ueluti decidenti, ac depressio calyce est, nigrum semen habet, & medicatum, nimis quā frigidum. Quod prolixiore & proceriore constat calyce, medicacius quā cætera omnia existit, ut etiam stuporem inducat, quousq; interimat. Nā & ipsum & eius lachryma, quam per excellentiam opion



opion nuncupant, quarto refrigerantium abscessui ascribuntur. Cornicularum papauer abstergendi uireis sortitur, ideoq; radicis ipsius decoctum potu iocinorosis auxiliatur: folia autē & flores perquam sordida ulcera expurgant, crustasq; tollunt. Heraction & aphrodes, id est spumofum papauer dictum, semē habet pituitæ purgandæ accommodatum.

*Mela, mala.*

**M**Alis omnibus frigida & excrementitia inest humiditas: & quæ in eorū censu resoluta & aquosa sunt, frigiditate cæteris & humiditate præstant: dulcia, aquosa quidem, non tamē manifestè frigida sunt austera dulcibus quidem frigidiora, sed minus humida: acida frigida quidem & ipsa, uerum incidendi humores uentriculo inhaerentes uim testantur: acerba, cuiusmodi cotonea & struthia sunt, frigido & terrestri donata temperamento, uentrem supprimunt, uulnera glutinant pari modo folia, succi, & cortices arborum inter se differunt.

*Melea, malus, persica.*

**M**Ali persicæ surculi & folia euidenter amara sunt, eoq; concisa tritaq; umbilico imposita, tinea s enecant: fructus autem ipsius nempe persicum hoc esculentum, in secundo ordine frigidum humidumq; existit.

*Melea, malus Armeniaca.*

**M**Ali armeniicæ fructus, quæ nunc uocant mala præcocia, con similes persicis uireis refert.

*Meon.*

**M**Ei radices in tertio ordine calefaciunt, in secundo siccant, ideoq; urinam & menseis cient: liberalius meon assumptum, capitis facit dolores.

*Milax.*

**M**Ilax tam læuis, quam aspera, arbores amplexa, calidam acremq; facultatem possidet.

*Misy.*

**M**Isy medicamentum est ex ijs quæ crustam faciunt & adurunt, ualenterq; astringunt, minus autem quam chalcitis erodit, quoniam tenuius ea est: cæterum chalcitis & fori uetustate in misy mutantur, ut ait Galenus; à superficie incipiente statim mutatione.

Molibdena,



*Molybdena, plumbago.*

**P**lumbago argenti spumæ uireis habet à medio temperamento ad frigidius digressa.

*Molybdos, plumbum.*

**P**lumbum refrigeratoriæ uirtutis est, habet & humidæ substantiæ plurimum, quod ex frigore coaluerit. Quod si id perfundatur teraturq; aut uino, aut immaturo oleo, aut quodam succo refrigerante, ad naturalium & sedis ulcerosas inflammationes excellentissimum erit remedium: lamina uero plumbæa super lumbos gestata, ueneris insomnia cohibet. Item bractea tenuis ganglio imposita, ipsum dissipat. Concrematum plumbum ualidius quidem siccat, sed & acrimoniæ nonnihil obtinet: si eluatur, tum sine rosione siccat, tum maleficis ulceribus præsentaneum est remedium.

*Moræa, morus.*

**M**ori fructus maturus quidem aluum subducit, & medicamentis stomaticis aliis quæ moderatam requirunt astringentem utiliter miscetur, immaturus ubi exaruerit, per quam obstruens fit medicamentum: cortex aut radicis arboris etiâ amaritudinis cuiusdam particeps, purgare potest, eoq; latas uetris tineas occidit: foliorum autem surculorumq; uis, subducentium & comprimentium media quodammodo existit.

*Myagros.*

**M**yagri semen pingue est, quod in eo oleosum habetur, opplendi uireis repræsentat.

*Myaces, mituli.*

**M**ytuli cõbusti, eundẽ cû buccinis effectum præstant, propriè uerò eloti palpebrarû asperitatẽ & albugines cum melle exterû, caro ipsorû canû morsibus utiliter imponitur.

*Myaron.*

**M**Yaron, quam alij melampycon appellant, herba ferulacea est & pinguis, uidetur autem ipsius pinguitudo corporis asperitates læuigare.

*Myelos, medulla.*

**M**edulla facultatis est quæ indurata ac in scirrhum concretis corpora emollit. Laudatissima est ceruina, mox uitulina: taurina uero hircinaq; acrior est, magisq; siccat, & quæ



quæ in artubus continetur, pinguior est magisq; emollit: quæ de spina elicitur, durior squalidiorq; est.

*Mycetes, fungi.*

**F**ungi frigidi & humidi admodum temperamento sunt: nonnulli ipsorum manducati, etiam exitium adferunt, præsertim qui inter ipsos natura constant putridæ qualitatis participi.

*Myosote, muris auricula.*

**M**uris auricula dicta est albine.

*Myxa.*

**M**Yxa arboris fructus est minor quidem prunis, facultate uero consimilis.

*Myrica, tamarix.*

**T**amarix incidit extergitq; ita ut manifestè non siccet, habet autem astrictionem nonnullam, quæ de causâ decoctum ipsius potum lienes adiuuat, item dentium doloribus medetur: fructus autem & cortex ipsius gallæ uirtute proximus est. cinis arboris uehementius exiccat.

*Myriophillon, millefolium,*

**M**illefolium tantam siccandi uim possidet, ut uulnera conglutinet.

*Myrrha, uel myrrhis.*

**M**Yrrha in secundo ordine calefacit, ac nonnihil etiam extenuat, radix ipsius odorata dulcisq; est, mensibus mouendis, & humoribus & thorace & pulmone repurgandis idonea.

*Myrrhine, seu myrsine, myrtus.*

**M**Yrtus ex diuersis cõposita est substantiis, pollet in ea terrestris frigiditas, quæ ualenter siccatur: at myrtula quæ folioles myrti est, tuberosa, caudicem ipsius & ramos amplexa, uehementius astringit & siccatur. iam uero & folia aridiora uiribus magis siccant: item fructus succusq; tum foris applicatus, tum intus assumptus persimileis uires præ se fert.

*Moly.*

**M**Oly, quod nonnulli rutam syluestrem, alii zarmalam dicunt, Syriæ besasam, tertio calefacientium ordini annumeratur, substantia tenue, hic crassos humores uiscososq; incidit, discutit & urinam promouet.

Quæ



Que ab N incipiunt.

*Nascaphthon.*

**N**Ascanthon, sunt qui nascaphthon dicunt, Indicū est odora-  
mentū, qđ ad astrictos fœminarū locos suffitu uaporetur.

*Napy, sinapi.*

**S**inapi calefacit siccaturque in quarto abscessu.

*Nardostachy, spica nardi.*

**S**picæ nardi radix calfacit in primo, siccatur in secundo ordine,  
particeps est etiam astringentis cuiusdam qualitaris, acris, &  
subamaræ, iocinori igitur prodest & stomacho extrinsecus ad  
motā & ebibitā, urinam mouet & interaneorum fluxiones de  
siccatur: sed Indica ualentior est quā Syriaca, & nigrior.

*Nardus Gallica.*

**N**ardus gallica superiori uireis habet similes quidem, sed  
imbecilliores, præterquam ad urinam ciendam: calidior  
enim est quā illa, minusq; astringit.

*Nardus montanus.*

**N**ardus montana, quæ nonnullis thylacitis, pyritisque di-  
citur, commemoratis est infirmior.

*Nartex, ferula.*

**F**erulæ semen extenuat calfaciturque medulla ipsius uiridis  
adhuc, astringit, eoq; sanguinem spuentibus & cœliacis  
accommodata est.

*Narce, torpedo marina.*

**T**orpedo marina uiuens capiti imposita dolores eius arcet,  
idq; forsan eodem illo torpore quem membris eam con-  
tingentibus inducit: oleum in quo uiua decocta fuerit, ad acio-  
res articulorum cruciatus leniendos inungitur, eadem torpe-  
do anum procidentem coercere apposita fertur.

*Narcissus.*

**N**arcissi radix adeo desiccatur, ut maximis uulneribus sit glu-  
tinandis, imò etiam tendinum præcisionibus confert, cæ-  
terum abstergendi & attrahendi uim quandam habet.

*Neuras, seu poterion.*

**N**euras, quod alij poterion uocant, sine rosione desiccatur, ut  
& ipsa neruos præcisos glutinet: radices autem potissi-  
mum hunc effectum præstant, & impositæ, & potæ.

Nerion



*Nerion, aut rododaphne.*

**N**erion extrinsecus applicatum uim refert discuttoriam : si  
intus assumatur, occidit.

*Nymphaea.*

**N**ymphaea uireis habet sine rosione siccās, quibus & uentrē  
reprimat, & genituram arefaciat: uerum alba radice donata  
ualentior est, eoque fluxum muliebrem cum uino nigro & au-  
stero pota persanat: quæ nigram refert, deterforia quoque ui  
nonnulla pollet, eaq; utiligines, alphas dictas cum aqua exte-  
ritialopicias cum pice liquida illita replet.

*Quæ ab X ordiuntur.*

*Xanthion, aut phasganion.*

**X**anthion phasganumve fructum fert discutiendi uiribus  
præditum.

*Xiris, aut Xyris.*

**X**iris naturæ tenuis est, discutforiæ, & extrahentis, ac nimi-  
rum siccatoriæ, præcipuè semen, quod & urinam cit, & lie-  
ni in scyrrhum indurescenti medetur.

*Xiphion, gladiolus.*

**G**ladioli radix trahit, discutit, & siccatur.

*Quæ initium habent ab O,*

*Oe, sorbus.*

**S**orbus arbor cuius fructus oa, à nonnullis & dicitur, astrin-  
gendi uim obtinet, sed minorem mespilo.

*Othonna.*

**O**thonnam, alii herbæ esse succū in Arabia ad Aegyptū na-  
scentis affirmant, alii lapidem Aegyptium: detergit autem  
eroditq; omnia quæ claritati oculorum officiant, exterens.

*Oenanthe.*

**P**urimus sanè usus syluestris uitis: florem abundè astrin-  
gentem esse fatetur: & uentrem potissimum corroborare.  
Dioscorides autem aliam describit œnanthen contrariis dona-  
tam uiribus, unde secundas eam eiicere, & urinæ stillicido, mor-  
boque regio mederi tradit.

*Ocnos, uinum.*

**V**inum ex ijs est, quæ in secundo ordine calefaciūt, siccantq; :  
quod



quod admodū uetustum est, in tertio: Mustum uerò in primo.

*Oesypus, lanæ pinguitudo.*

**O**Esypus in sermone de lanis explicata est.

*Olynti, grossi.*

**G**Rossi acrem & discussoriam uim obtinent, liquoris gratia qui in ipsis continetur. cocti igitur duros tumores dissipant: crudi myrmecias & thymos exterunt.

*Olostium.*

**O**lostium siccatur astringitq; . hinc eo ad rupta utuntur.

*Omphacium.*

**O**mphacium succus est uuæ immature, astringens egregiè & siccans in tertio abscessu: eoq; fluidis affectibus & præsertim stomachicis, accommodatur.

*Onagra.*

**O**Nagra, quā nonnulli onotheram, alii onothurin dicunt, frutex est arboreus, cuius radix inducta, ferocientia ulcera mitigat.

*Onoma.*

**O**Noma, uel onomis, uel phlomitidis, uel ononis, acrem, amarāque uim obtinet, eamq; ob causam folia eius cum uino pota foetus occidunt expelluntque.

*Onobrychis.*

**O**Nobrychis ui rarefaciendi & discussoria, tubercula, quæ phimata dicuntur, dissipat, urinæ stillicidio medetur, & sudores prouocat.

*Oni, asini seu multipedæ.*

**M**ultipedæ quæ sub aquarijs uasis agunt, & in orbem se con duplicant, discutiunt siccantq; , potæ cum uino urinæ angustis & arquato medentur, anguinæ itidem cum melle iisdem illinuntur. Item detritæ cum rosaceo calfactæq; in mali punici cortice, auribus dolentibus salutariter, instillantur.

*Onyches, conchulæ Indicæ.*

**O**Nyches conchyliorum Indicorū opercula sunt, quæ suffitu, strangulatione uuluarum concidentes foeminas excitant, item comitiales: potæ uerò aluum turbant.

*Ononis.*

**O**Nonis radice constant quæ in tertio ferè gradu calefacit, cortex



cortex ipsius extergit, & incidit, unde etiam calculos conterit.

*Oxos acetum.*

**A**Cetum mixtæ est naturæ frigida & calida, sed utriusq; tenuis, frigida tamen calidum excellit. cæterum in tertio ordine siccatur.

*Oxiacanthos.*

**O**Xycanthus arbor piro sylvestri & figura & uiribus similis est, habet & subtile quippiam coniunctum: sed fructus ipsius myrti baccis respondet.

*Opos, liquor.*

**L**iquores, & Cyrenaicus, & Medicus, & Syriacus per excellentiam dicuntur, calidi natura, & spirituosi insigniter: uerum Cyrenaicus cæteris est calidior tenuiorque.

*Origanum.*

**O**Mnia origani genera incidendi, extenuandi, siccandi, & calefaciendi uireis in tertio abscessu ostendunt.

*Oreoselinum, apium montanum.*

**A**Piū mōtanū uiribus domestico æquale est, sed inualentius.

*Orobanche.*

**O**Robanche sicco & frigido temperamento est, secundum primum ordinem.

*Orobos, eruum.*

**E**Ruū calefacit in primo gradu, siccatur in secundo, amarumque est, quapropter incidit, detergit, obstructa aperit: liberalius sumptum sanguinem per urinam expellit.

*Orminon.*

**O**Rminon marrubio specie simile est, calidū, mediocriter siccum & abstergens, uenerem igitur stimulat, & oculorum crassities cum melle repurgat, tumores laxos quæ œdemata uocant, discutit, & extrahit aculeos. Sylvestre domestico est ualentius.

*Oryza.*

**O**Ryza uim quandam astringentiam præ se fert: qua etiam uentrem mediocriter cohibet.

*Orchis herba.*

**O**Rchis herba (nominatur autem etiam cynosorchis, id est, testiculus



testiculus canis, radicem habet bulbosam & duplicem: uis autem maioris, humida & calida, eoq; ueneri incitanda est: minoris, calida & sicca, contra igitur uenerem coarctet.

*Orchis, serapias.*

**O**rchis, quæ & Serapias dicitur, aliis triorchis, priore ualentius desiccatur, quare laxos tumores cedentesq; dissipat, ulcera sordida & putredini obnoxia repurgat, herpes abigit: inarescens autem magis siccatur. Quoniam uero substringere idonea est, aluum quoque cum uino pota retinet.

*Osyris.*

**O**syris, ex qua medicamenta ad exterendam, læuigandamque cutem, Græci coremata uocant, fieri solent, amara est, & iecoris laxandi uireis habet.

*Ossa, ossa.*

**O**ssa concremata uehementer discutunt siccantque: præsertim id facere dicuntur humana: atqui sui illis talus com bustus inflationibus & circa umbilicum torsionibus mederi dicitur, quinetiam ossa cremata si potui quis exhibeat, morbum comitalem, & articulares dolores abigunt. Bubulus talus uetus, mobileis firmare dentes prædicatur, cum melle potus teretes tineas educit, cum oxymelite lienem consumit, & uirilignes, quas uocant leucas, illitus abolet, item ad uenerem commendatur: femora bouis cremata potu sanguinis eruptiones, & alui fluxum compescunt.

*Ostraca, testæ.*

**T**estæ fornacium tritæ siccant exterguntque, hinc dentifricis accommodantur, illitæ cum aceto prurigini, pustulis, quæ appellantur exanthemata, conferunt, cerato exceptæ strumas discutunt.

*Ostrea.*

**O**streorum testa cremata æqualem buccinis uim, sed minus crassam repræsentat, abstergit igitur faciei labes, & dentibus nitorem conciliat: elota rosionem amittit, ad carnem cicatricemque humidis ulceribus induendam accommodata.

*Ouron.*

**V**rina quælibet calida est & acris, sed humana omnium aliorum animalium, exceptis maialibus, infirmior est. cæterum

PAULI AEGIN.

L uehe-



uehementer abstergit, quapropter nonnulli, potione eius in pelle usi, mortem euaserunt, eadem lepras, ulcera putredinem experta, capitisq; manantia ulcera, quæ uocantur achores, & furfures perlanat. item pedum attritus, nondum inflammatione occupatos. At pueri uenerem non experti urina omnium efficacissima est, unde etiã chrysocola conficitur. Mulorum, articularibus doloribus congruit. Caprarum & chamelorum, aluum deiicit. ideoque contra aquam subter cutem bibitur.

### Quæ à P incipiunt.

#### *Pancration.*

**P**ancration & specie & uiribus seyllæ simile est, uerum imbecillius.

#### *Paliuron.*

**P**aliuri folia & radix astringunt, eoq; aluū fluentem sistunt, tubercula, quæ dicuntur phymata, non nimis calida discutunt: Semen eius tam uehementi incisoria uirtute ualet, ut & calculos conterat, & excreationibus è pectore auxilietur.

#### *Panaces.*

**P**anaces Herculeum est ex quo opopanax dictus cōficitur, in tertio ordine calefaciens, in secundo siccans, emolliens, discutiensque: radicis cortex liquore imbecillior, habet nonnihil & abstergens, & carni ducendæ idoneū: semen ipsius mensis quoque citat. Asclepion panaces & Chironium priori calidiora sunt, hinc floribus ipsorum & semine ad malefica ulcera & phymata utuntur.

#### *Papyrus.*

**P**apyrus ignem non experta, materia quædam efficitur: usta, siccatur chartæ crematæ modo, uerum papyri cinis uiribus inferior est.

#### *Paronychia.*

**P**aronychia inde nomen accepit quod digitorum reduuiis, quæ græcis dicuntur paronychiæ, medeatur, uis eius est ex tenuare & siccare, idque citra rosionem.

#### *Pentaphyllon, quinquifolium.*

**Q**uinquefolium in tertio ordine desiccatur, minimè acre, eoque in multos usus accommodatur.

Peplon,



*Peplon, herba.*

**P**Eplon nonnulli papauer spumeum dicunt: & hic frutex liquorem habet, & tithymalorum modo purgat.

*Peplion.*

**P**Eplion quoque liquorem habet & magna ex parte maritimis locis nascitur, cætera quidem inutile, semen autem ipsius feruidi saporis ut peplum expurgat.

*Peperi, piper.*

**P**Iperis radix costi uireis refert: fructus nuper quidem germinantis arboris, oblongum est piper, humidius natura & calidum: fructus ueluti acerbus immaturusque, album est piper, nigro acrius, ut quod impendio magis assatum sit: utrumque uerò & calefacit & desiccatur.

*Pepon.*

**P**Epon absterforiæ facultatis est, inde ueluti caro ipsius epheidas & consimilia faciei uitia exterit, semen renes obstructione liberat.

*Periclymenon.*

**P**Eryclimeni folia & semen incidendi simul & calefaciendi uireis obtinent, quapropter urinam cruentam excernunt, ad sex dies pota: semen autem ad quadraginta dies potum lienosos & ægregiè spirantes adiuuant.

*Peristereon, uerbenaca.*

**V**Erbenaca adeò desiccatur astringiturque, ut uulneribus glutinandis, † & sanguinis eruptioni sistendæ sit.

† Totus hic locus in antiquis sic legitur. περιτερεων εἰς τοῦτον ξηραίνει τε καὶ σίφει ὥστε δύνασθαι κολλᾶν τραύματα, ὁθεν ἐπὶ τῶν κακῶν δυνάμις τε καὶ φαρμακικῶν αὐτῷ χρῶνται. Id est. Peristereon usque adeò siccatur & adstringit ut possit glutinare uulnera. Itaque eo utuntur in malignis ulceribus & ad partes uicinas serpentibus.

*Persæa seu persica.*

**P**ersæa arbor est, Aegypti, cuius folia & siccant & astringunt eoque sanguinis eruptionem compescunt.

*Petasites.*

**P**etasites tertio siccantium, ordini ascribitur, unde & malefica & phagedenica ulcera eam usurpant.



*Petroselinon.*

**P**etroselini semen calidum siccumque est in tertio abscessu, ut incisoria praeditum, urinam, mensesque copiose trahit, flatibus discutiendis accommodatissimum.

*Peucedanum.*

**P**eucedani liquore & succo affatim calefacienti, discutienti, extenuanti que utimur, tum naribus admoto, tum in potione assumpto, ad pulmonum & pectoris vitia ex humorum crassitudine contracta: item ad lienem scyrrho induratum: dentibus autem perforatis impositus, dolorem protinus sopit, nervorumque affectibus idoneus est: radix squamas ossium separat, maleficis ulceribus succurrit, in tertio ordine & calefaciens & desiccans.

*Peuce, pinus uel pinafter.*

**P**inus piceae uiribus respondet, sed moderatior est.

*Peganum, ruta.*

**R**uta sylvestris ad quartum calefacientium siccantiumque ordinem refertur: satiuia, ad tertium, cuius uis est crassos lentosque humores incidere, & dissipare, urinam mouere, attenuare, & flatibus discutiendis, unde & uenerem coercet.

*Pissa, pix.*

**P**ix arida quidem in secundo abscessu desiccet, minus calefacit: liquida e contrario, imò etiam extergit, maturat, discutit, acrisque est, eamque ob causam unguentis scabros educit, impetigines exterit, tumores maturat. Valentior autem est liquida, ut etiam suspirosis & purulenta excreantibus, lincta subueniat: sed arida uulneribus magis glutinandis est.

*Pisselæon, oleum picinum, seu picis flos.*

**P**icinum oleum ex liquida sic pice, qua natura tenuius existit

*Pistacia.*

**P**istaciorum fructus esus stomacho mediocriter conducit, iecur obstructum laxat, praecipue summi & odorati eorum operimenti ex uino decoctum, prosunt etiam contra serpentium morsus.

*Pityides.*

**P**ityides fructus sunt picearum, mixtae facultatis, astrictoriae & acris, quam ob rem reiectionibus pectore opitulantur.

Pityocampæ,



*Pityocampæ, picearum erucæ.*

**P**Icearum erucæ eiusdem sunt uirtutis quam cantharis & buprestis obtinet.

*Pityos plæos, piceæ cortex.*

**P**Iceæ cortex astringendi uim eximiam possidet, qua intertrigines & ambusta illitus persanat, uentrem potus reprimat: folia etiam uulnera conglutinant.

*Pityusa.*

**P**ityusam quoque nonnulli tithymalli speciem affirmant, quoniam & liquorem habet, & perinde ut illæ purgat.

*Platanus.*

**P**latanus ui humidior & frigidior pollet, eaq; de causa folia uiridia ad inflammationes nascentes proficiunt: cortex & pilulæ quoniam mbiorem siccandi potentiam habent, in aceto decoctæ dentium dolores sopiunt, ambusta cum adipe persanant. Cortex autem crematus siccatur uehementius & abstergit, eoq; lepras pellit, & humidis ulceribus medetur.

*Pneumon, pulmo.*

**P**ulmo agninus, suillusq; attritus pedum ex calceis curare credit: uulpinus sale inueteratus si bibat, suspitiosis proficit: marinus recēs detritus podagris & pernionibus succurrit.

*Polemonium.*

**P**olemonium, quod aliis phileterion dicitur, tenue est, & siccandi uiribus donatum, inde nonnulli contra coxendicis dolores, dysenterias, lienem scyrrho induratum, radicem eius, cum uino propinant,

*Polium.*

**P**olium minus, quo & in antidotis utimur, tertii calefacientium siccantiumq; ordinis est, itaq; omnia uiscera obstructa laxat, urinam mensisq; trahit: uiride adhuc, magna glutinat uulnera, aridum maleficis inspersum ulceribus proficit.

*Polygalon.*

**P**olygalon folia habet gustu mediocriter acerba: potum, lac quoq; generare putatur, calidi humidiq; temperamenti compos.

*Polygonaton.*

**P**olygonatum uariæ particeps est facultatis, astrictioris,  
L 3 acris,



acris, amaræ, & cuiusdam gustu ingrata, quæ uerbis nequeat exprimi: quapropter in multipliceis usus haud est accommodatum: radicem ipsius nonnulli uulneribus inducunt, & faciei labes, quas pilos dicunt Græci, eo abstergunt.

*Polygonon sanguinaria.*

**S**anguinaria habet sanè uim quandam astringend, sed humiditas in secundo ordine frigida in ea præpollet, stomachi feruori frigida inspergitur utiliter, erysipelatis, inflammationibusque calidis illinitur, ac talis quum sit, fluxiones repellit, atque hac ratione siccatoria esse putatur: scemina autem mas efficacior est.

*Polycnemon.*

**P**olycnemon in secundo ordine calefacit & desiccatur, eoque uulnera glutinat.

*Polypodium, filicula.*

**P**olypodium siccatur abundè citra morsum: potum, inferius purgationem molitur.

*Pompholyx.*

**P**ompholyx sine rosione siccatur, ideoque cancris ulceribus aliisque maleficis opitulatur, item cum oculariis medicinis miscetur.

*Porphyra, purpura.*

**P**urpura cremata testis similem uim sortita sunt, opercula ipsarum cum oleo incocta pilos fluidos confirmant, cum aceto pota lienes tumidos sanant: suffitu sceminas locorum strangulatu concidentes excitant secundasque eiiciunt,

*Potamogeton.*

**P**otamogeton refrigerat & astringit, perinde ut herba sanguinalis iisdem uirtutibus præditum.

*Poterion.*

**P**oterion, quod alij phrynon dicunt, radices, concisæ neruos præfectos & uulnera conglutinant, decoctum ipsius epotum neruorum affectibus auxiliatur.

*Prasion, marrubium.*

**M**arrubium in secundo ordine calefacit, amplius autem siccatur, iecur lienemque obstructum laxat, excreationes è thorace & pulmonibus, mensisque promouet: in cataplasmate uerò inductum



inductum extergit, discutitq; præcipua exterforia incisoriaq; ui præditum,

*Prason, porrum.*

**P**Orrum mali succi est & acris. ut autē Dioscorides memoriae prodidit, graua facit insomnia, aluumq; bonam, urinā ciet, & extenuat: habet & abstergendi uim aliquam, qua pectoris excreationes elicit ptisanæ incoctum, semen uerò ipsius nephriticis temperatur medicinis: folia etiam non nihil astringunt, ac eam ob causam succus ipsorum sanguinem supprimit.

*Prinos, ilex.*

**I**lex simileis quercui uireis habet, sed multò ea est ualidior.

*Propolis.*

**P**ropolis calefacit quidē in secundo abscessu, abstergit autem mediocriter, tenuisq; naturæ est, & meatuū apertoriq;.

*Ptarmicæ.*

**P**Tarmicæ folia sternutamenta mouent, totus autem frutex uiridis sugillata, liuoresq; alios disijcit, est enim herba calida & sicca, uiridis secundi ordinis, arida tertii:

*Ptelea, ulmus.*

**V**lmus siccare nalet & abstergere, eoq; uulnera glutinare, cortex autem magis, si recens fasciolæ modo uulneribus circumuoluatur, cum aceto lepras quoq; tollit: radices idem præstant, si ossa fracta quæ solidari tophacia cicatrice, quæ poron dicunt, desiderant, decocti ipsarum iure perfundantur.

*Pterix, filix.*

**F**ilix uim siccandi & amaram repræsentat, eaq; fœtus corrumpit, latasq; tineas enecat, instar quatuor drachmarum cum mulsâ pota: quoniam uerò modicè cōstringit, ulcera citra rosionem desiccare potest.

*Pycnocomon.*

**P**Ycnocomon discutiente ui extrahēti acriq; donatum est, folia igitur panos & furunculos dissipant, semen præterea infixâ corpori spicula extrahit, radix flauam bilem purgat.

*Pyrethron.*

**P**Yrethri radix adurentem potestatem occupat, dentiū qui frigori patuerunt dolores lenit, item ad febriliū rigores ante accessionem infricatur cum oleo, adhæc iis quorum corpo-



ra stupent, & resoluta sunt, efficacissimè; adhibetur.

*Pyros, triticum.*

**T**riticum in primo ordine calefacit, uerùm siccando hume-  
ctandoq; medium est, nonnihil etiam glutinosum, & ob-  
struendi efficax obtinet.

*Pytia, coagulum.*

**C**oagulum omne naturæ acris est, tenuis, discutientis, & ni-  
mirum siccantis sed leporinum comitialeis sanare cū ace-  
to potum, literis mandarunt: fluoremq; muliebrem emēdat,  
lac in uentre concretum soluit, similiter etiam sanguinē non-  
nulli uero cruentas pariter è thorace excreationes cohibere  
ipsum tradunt, equinum uerò coagulum cœliacis & dysente-  
ricis prodesset: phocæ autem castorii uireis præ se ferre.

*Quæ ab R incipiunt.*

*Rhacos, attritæ uestis fragmentum.*

**A**ttritarum è lana uestium fragmenta concremata, simileis  
eidem lanæ uireis repræsentant. Linei autem panniculi  
quum adhuc uruntur, tenuem ex se fumum reddunt, qui etiam  
destillationes in guttur liberet, & uulvæ sursum recurrenti sa-  
lutaris sit: cremati iam ad lanæ uirtutem accedunt.

*Rhamnus.*

**R**hamnus siccatur in secundo, refrigeratur in primo abscessu,  
quare herpetibus & erysipelatis nō admodum calidis me-  
detur, sed teneris eius folijs utendum est.

*Raphanus.*

**R**aphanus in tertio abscessu calefacit, in secundo siccatur: syl-  
uestris efficacior est, in ambrosius autem semen ualentius.  
itaq; sugillata, aliosq; liuores dissolvit.

*Rheon, rha.*

**R**heon, quod alij rha dicunt compositum est ex terrestri fri-  
gida & tenui substantia, aereaq; calida & leniter acris, eaq;  
ob causam conuulsis, ruptis, orthoputeis opitulatur: q̃ discuti-  
endi uim habeat, liuores emendat: q̃ astrictoriam, cruentas  
excreationes, cœliacos, & dysentericos sanat, utaq; uero facul-  
tate, iocinorosos iuuat.

*Rhetina, resina,*

**R**esinæ omnes & calefaciunt & desiccant, uerùm terebin-  
thina



china principatum obtinet, discutientis naturæ, emolliētis, tenuis & absterforiæ, eoq; scabiem corrigit : & larix huiusmodi est. Quæ uerò è pinu destillauerit, atq; hac magis adhuc strobilina, acrior est, non tamen aut discutit magis, aut attrahit: medium inter ipsas locum tenet, & quæ de picea, & quæ de abiete raditur.

*Rhoda, rosæ.*

**R**osæ mixta constant substātia, aquosa scilicet, calida, astringenti, & amara : flos autem ipsarum magis adhuc astringit, eoq; desiccatur.

*Rhodia radix.*

**R**hodia radix calefacit in secundo abscessu, tenui & discutiente ui prædita.

*Rhœa siue rhoe, malum punicum.*

**M**alum punicum omne astringendi uireis eximias habet, quibus refrigerat siccantq; : uerum dulce aliis minus : austerum magis refrigerat siccantq; est & stomacho amicum, acidum refrigerat quoq; & maiorem quandam incidendi uirtutē repræsentat, uerum acini succo magis astringunt siccantq; efficacius his adhuc malicorium quod sidion Græci uocant : huic uirtute respondet mali flos qui cytinus appellatur.

*Rhus.*

**R**hu coriariæ à medicis dictæ fructus præcipuæ & succus magno in usu sunt, quum illa astringendi siccantq; uim ex tertio ordine, habeat, detergendi è secundo.

*Rypos, sordes.*

**S**ordes ex statuis æreis, aut uasis in quibus multum olei inherescit, detractæ sic ut nonnihil æruginis admixtum sit, discutiendi uireis habent, siccantq; mediocriter & emolliendi, eiusq; immatura phymata discutiunt. At de sordibus quæ in palæstris habentur, quas nonnulli etiam patos uocant, in sudore dictum est. Aurium sordeculæ reduuiis mederi dicuntur.

*Quæ ab S incipiunt.*

*Sagapenum.*

**S**agapenū, ceu ferulæ liquor est, calidus & tenuis, cui & absterforia quædam uis inest, qua & oculorum cicatricibus & suffusionibus prodest.

*Salaman-*



*Salamandra.*

**S**alamandræ uisæ cinerem nonnulli medicinis exedentibus, cum iis quæ ad lepram & scabiem componuntur, admiscet.

*Sampsuchum.*

**S**ampsuchum calefacit siccâtq; in tertio abscessu, est etiã tenuis naturæ & discussoriæ.

*Sandaracha.*

**S**andaracha adurentis est facultatis, quemadmodum & auripigmentum.

*Sandyx, uel siricum.*

**S**andyx, aut siricum extenuat & siccât, non tamen calefacit.

*Saprotes, caries lignorum.*

**L**ignorum caries, præsertim ulmi, humentia purgat ulcerâ & explet.

*Sapo.*

**S**apo abstergendi uim habet.

*Sarcocolla.*

**S**arcocolla perficæ arboris lachryma est, opplendi & citra rogiem siccandi uireis sortita, a tq; ideo uulneribus est glutinandis.

*Saxiphages, saxifraga.*

**S**axifraga urinam mouet, & calculos conterit.

*Satyrion, trifolium.*

**S**atyrion, aut triphylion humidum est temperamenti & calidi, item flatuosum, unde ueneris appetentiam facit: nonnulli opisthotonis cum uino austero potum salutare esse tradunt. Galenus in commentario de theriaca trifolium ait hyacintho simile esse, quum aere inturgescens, semen syluestri cnico æquale habet: decocti ipsius ius superfusum phalangii, aut uiperæ morsus sanare: sano idem potui datum, similem animalium horum ictibus affectum conciliare.

*Saura, lacerta.*

**L**acertæ iecur & caput suo loco exposita sunt: totum autē caput dissectum impositumq; scorpionum ictibus medetur.

*Selinon, apium.*

**A**pium tanti caloris est, ut & urinas & menses eliciat: cæterum



rum flatus discutit, præsertimq; eius semen.

*Seris, intybum.*

**S**eris subamarum olus est, admodum refrigerans humectās-  
que, habet etiam nonnihil astringentis.

*Seriphum.*

**S**eriphum calefacit quidem in secundo, siccatur autem in pri-  
mo ordine, consimile absinthio, minus tñ eo astringit, magis  
calefacit, aī alia uentris occidit, mediocriter stomacho aduersat̃

*Seseli.*

**S**eselis radix magisq; semen insigniter calefacit, tenuisque  
substantiæ est, urinā quoq; ciet, comitialibus, & orthopnœæ  
accommodatum.

*Sepiæ testa.*

**S**epiæ testa persimilis est ostreo quod ad uireis attinet, sed te-  
nuior substantia & abstergens, eoq; in cinerem redacta, un-  
gueis cum sale fossitio extenuat: ignem non experta si infri-  
cetur, sicut exierit, & cutis labes abstergit.

*Sesamoides.*

**S**esamoidis albi semen calefacit, detergit, & rumpit.

*Sesamum.*

**S**esamum non parum lencoris, pinguisq; obtinet, idcirco op-  
plere, mollire, & mediocriter calefacere idoneum est.

*Seps.*

**S**eps, quam nonnulli chalcidicam lacertam dicunt, in uino  
spota, propriis moribus succurrit.

*Sialon, salina.*

**S**alina hominis ieiuni maximè discutit & abstergit, eoq; in-  
fantium impetigines illicita exierit & furunculos cum triti-  
co, nimirum manso imposita, maturat, & sugillata delet, feris  
hominem occidentibus maximè aduersatur.

*Sideritis.*

**S**ideritis Heraclia & helxine dicta est, Achillea autem sideri-  
tis illi quidem consimilis est, sed magis astringit, eoq; fluidis  
affectibus accommodata.

*Sidero, ferrum.*

**F**errum aqua restinctum subinde, uehementem desiccandi  
uini



uim aquæ conciliat, quæ pota lienosis conducit: uinum autem in quo id restinctum est coeliacis, dysentericis, cholera infestatis stomacho resolutis, auxiliatur.

*Sicyos, cucumis.*

**C**ucumis esculentus quidem uiridis, refrigerat humectatq; in secundo ordine, caro ipsius feruidas solatur inflammaciones, semen abstergerendi incidendiq; uirtute præditum, urinas mouet, & corpus nitidum efficit, aridus fccat in primo ordine, magisq; abstergit, & semen, & radix.

*Sicyos agrios, cucumis syluestris.*

**C**ucumeris syluatici seminis succus elaterium dictus est, qui autem è radice & foliis premitur, elaterio similis est, sed imbecillior: radix detergit, dissipat, emollit: succus fccandi uiridis habet.

*Silybon.*

**S**ilybon spinosus frutex est, albo chamæleoti persimilis, esui accommodatus: radicis liquor drachmæ pondere cum multa potus, uomitiones excitat.

*Silurus.*

**S**ilurus sale conditus si edatur arteriam humectem expurgat, applicatus corpori spicula educit.

*Silphe, blatta quæ in pistrinis inuenitur.*

**B**lattæ quæ in pistrinis inuenitur interanea decocta contritaq; aurium dolores perfanant.

*Silphium, laferpitium.*

**L**aferpitium probè calefacit, flatulentum est etiam & concoctu perucax: à foris corpori applicatum efficaciusprehenditur, magisq; liquor ipsius, extrahendi potens, item & superexcrecentia amoliendi uim quandam obtinet.

*Sison.*

**S**ison calidus est, urinam mouet, concoctionem adiuuat, mensis educit, & uiscera obstructa aperit.

*Sion.*

**S**ion calidum, urinam citat, & discutit, renum calculos frangit, menses euocat.

*Sisarum, siser.*

**S**iseris radix cocta stomacho utilis est, & urinæ ciendæ, calida in



da in tertio ordine: semen tenue est, discussorium, ualidum  
que, idcirco ijs quos singultus & torsiones circa umbilicum  
malè habent, cum uino exhibetur.

*Sisymbrium.*

**S**isymbrium sunt qui cardaminem uocant, cardamo, hoc est,  
nasturtio assimilatum: aridum quidem calefacit siccaturque in  
primo abscessu: humidum autem in secundo.

*Scammonia.*

**S**cammonia calfacit, discutit, & biliosa extergit, magisque  
eius liquor, qui iam & phymata dissipat, foetus appositu cor-  
rumpit, lepras exterit, diuturno capitis dolori cum oxyrhodi-  
no superfunditur: radix autem tum ipsa, tum decoctum eius po-  
tum, purgat: cum aceto autem & farina hordeacea decocta, co-  
xendicum doloribus applicatur.

*Scandix.*

**S**candix syluestre olus est, calefaciens siccansque in secundo  
gradu, urinam propellit, & uiscera obstructione liberat.

*Scingos, terrestris crocodilus.*

**S**cingi carnes renibus proximæ, naturalibus arrigendis bi-  
buntur. rursus semen lactucæ cum aqua potum eadem con-  
traria uirium lege uidetur remittere: item lentis decoctum  
cum melle.

*Scylla.*

**S**cylla incidit, calefacit & desiccatur in secundo ordine: præstat  
autem eam assam aut elixam sumere.

*Scolopendra marina.*

**S**colopendra marina in oleo elixa inunctuque pilos abolet,  
usta etiam prurium excitat.

*Scolopendrion.*

**S**colopendrion asplenon est.

*Scolymon, carduus.*

**S**carduus calfacit, siccaturque in ordine secundo, radix eius  
uino decocta, urinas foetidi odoris liberaliter educit, & ala-  
rum totiusque corporis graueolentias corrigit.

*Scordion trixago palustris.*

**S**cordium uarijs pollet facultatibus, ut quod amarum, acer-  
bum, & acre sit, purgat igitur simul & calfacit uiscera, urinas  
& menstua



& menstrua cōcitat, refrigerata omnia excalfacit, uulnera glutinat, repurgatq; aridum inspersum cicatricem inducit.

*Scordon, allium.*

**A**llium calefacit siccaturque in quarto abscessu: at syluestre allium quod ophioscordon, quasi anguinum allium, & agrioscordon dicitur, domesticum ualentius est.

*Scordoprason.*

**S**cordoprason porri & alij mixtas habet uireis, & gustatum.

*Scorpioides.*

**S**corpioides excalfacit abscessu tertio, siccatur secundo.

*Scorpius.*

**S**corpius terrestris crudus impositus, aut tostus in cibo, proprii ictus remedium efficitur: marinus autem fel habet oculorum suffusionibus utile.

*Scoria, recrementum.*

**R**ecrementum omne ualide exiccat: ferri stercus alijs amplius, quod excoctum & in tenuissimum pollinem detritum cum aceto auribus suppurantibus mirifice proficit, item iis qui aconitum biberunt: cum oxymelite potum remedio est. Plumbi recrementum eidem respondet, sed magis astringit.

*Smilax, aut cactus arbor taxus.*

**S**milax uel cactus arbor est uirosae uirtutis.

*Smyrna, myrrha.*

**M**yrtha è secundo calefacientium siccantiumq; ordine est: capitis igitur uulnera inspersa glutinat, item amarā uim obtinet, qua tineas, & foetus occidat: adhuc abstergit, eoque ocularijs medicinis temperatur, & humores pectori infixos expurgat, ita ut guttur non exasperet. Bœotica myrrha uireis habet calefaciendi, emolliendi, & dissoluendi.

*Smyrnion.*

**S**myrnion, quidam hipposelinon, quidam apium syluestre nominat, calefacit & siccatur tertio ordine, apio quidem fortius, petroselino autem inualidius, urinæ & mensibus educendis accommodatum.

*Sonchus.*

**S**onchus astringit, & manifestè refrigerat, tū corpori admodum, tū manducatus: exarefactus autē mediocriter calefacit.

*Sparganium.*



*Sparganium.*

**S**parganium siccandi & hoc uireis refert.

*Spartos, genista.*

**S**parti quo uireis ligant, & semen & flos cum mulsâ instar  
quinque obolorum pota, per superiora purgât, ueratri albi  
modo sine periculo: semen autem per inferiora quoque pur-  
gat: uirgulæ ipsius ad coxendicum dolores proficiunt.

*Specularium, lapis specularis.*

**S**pecularium, alij per ph scribunt spheclarium, quo nonnulli  
loco uitri in fenestris utuntur, eoque diaphanes à perspicui-  
tate appellatur, substantia gypseum, uireis habet concrematis  
testis aut oltreis simileis.

*Spongios, sponsia.*

**S**pongia recens quæ marinû odorē adhuc reseruat, si cū aqua  
aut uino, aut posca imponatur, uulnera glutinat, cremata  
acris est uirtutis, & discussoria: cum bitumine autem & pice li-  
quida uisita, appositaq; ex igne, sanguinis eruptiones cōpescit.

*Spodium, cinerula.*

**S**podium pompholygi uiribus æquale est.

*Staphylinus, pastinaca.*

**P**astinaca urinas mouet, menseis proritat, præsertim semen  
ipsius & radix, folia autem abstergendi uiribus prædita pha-  
gedænicis affectibus congruunt, & uiridia cum melle: sylue-  
stris autem pastinaca ad omnia ualentior est domestica.

*Stachis.*

**S**tachys marrubio similis frutex tertium in calefaciendo or-  
dinem occupat, menseis itaque excitat, fœtas occidit, & se-  
cundas expellit.

*Steata, adipēs.*

**A**deps omnis humanum corpus & humectat, & calefacit,  
sed pro diuersis animalium temperamētis uirtus eius eua-  
riat. Suillus igitur omnium humidissimus est, ut ad olei natu-  
ram accedat, unde etiam rosiones obrundit. Caprillus, siccior  
est, & celeriter concrescit, eoque ijs qui in longanone rosio-  
nes experiuntur, ab inferiori parte inicitur. Anserinus cali-  
dior est, maioremq; tenuitatem obtinet. Inter utrunq; hunc  
gallinæ, gallorumq; adeps consistit. Leoninus calore om-  
neis,



neis, & tenuitate superat, & propterea etiā ui discussoria. **Bu-**  
**bulus** inter suillum & leoninum medius temperamento exi-  
 stit. **Vrsinus** alopeciis medetur, **uulpinus** aurium doloribus,  
 quemadmodū **uiperinus** pilos abolere, & oculorū suffusiones  
 impedire fertur. In omni aut adipū specie calidior, sicciorque  
 est **mariū**, atq; ex his corū animalū quæ testes habent, magis  
 quàm illorū quibus hi sunt execti, & uigentiū ætate efficacior  
 quàm aliorū cæterū uetustate omnis **adeps** redditur calidior.

*Stimmi.*

**S**timmi præter quàm quòd siccatur, etiam astringionem habet,  
 ob quam ocularijs collyrijs miscetur.

*Stæbæ.*

**S**tæbæ semen & folia in tertio ordine desiccant, ui ribus do-  
 nata astringentijs, eamque ob causam uulnera magna con-  
 glutinant: decoctum ipsorum dysenterijs, sanguinis eruptioni-  
 bus, auribus pirulentis auxiliatur: folia applicata oculis ex ictu  
 suffusis conferunt,

*Stæchas.*

**S**tæchas adaperit, extenuat, detergit, & uiscera omnia, to-  
 tumque corporis habitum confirmat.

*Stratiotes.*

**S**tratiotes aquaticus frigidus est natura: terrestris etiā astringendi uim habet, qua ulcera committit: nonnulli eo & ad sanguinis eruptiones & ad fistulas utuntur.

*Strychnon, solanum.*

**S**olanum hortense esculentumque astringit, & in secundo ordine refrigerat. **Solanum halicaccabum** hortensi simile, urinæ ciendæ idoneū semen habet acino uuæ æquale. hypnorigici, id est, somnifici solani radice cortex, cum uino denarii pondere potus, somnum conciliat, semen habet ad urinā mouendam accommodatum, ex tertio refrigerantium ordine: unde corymbi eius plures duodecim epoti furorē accersunt. Quartum uerò genus solani intus assumptum, inutile est, à foris autem applicatum ulcera depascentia curat, refrigerando, siccandoque ad secundum ordinem relatum.

*Strypteria, alumen.*

**A**lumen omne, maximè acerbum est, substantiaque crassum  
 tenuius



tenuius autem reliquis est quod uocatur scissile, mox rotundum, & astragaliote. Crassum admodum est liquidum, & quod placites & plinthites appellatur.

*Styrax.*

**S**tyrax calefacit, emollit, & concoquit: tussi, destillationi in fauces, & grauedini utilis, mensis idem & potus, & appositus extrahit.

*Syca, ficus.*

**F**icus aridæ in secundo ferè ordine siccant: pingueis autem duos tumores magis maturant, acriores detergunt, discutuntque, decoctum ipsarum mellis speciem referens, quod iam non nulli siron appellant, uiribus melli respondet: uirides autem ficus, imbecillioris uirtutis sunt, utraque tamen & uirides & aridæ aluum subducunt. At ficus caprifici, acres & discussoriae sunt, quemadmodum ex domesticis grossi.

*Syce, ficus arbor.*

**F**icus arbor calidi tenuisque temperamenti est, adeo ut liquor & foliorum succus non rodat modò, aut abstergat uehementer, sed etiam exulceret, ora uenarum aperiat, & myrmecias exterat: iam uerò & purgandi uim obtinet. At syluestris ficus, quam caprificum uocant, in omnia efficacior domestica est.

*Sycomorus.*

**S**ycomori fructus nullius nutrimenti est, & stomacho noxius: liquor arboris ui pollet emolliendi, glutinatoria uulnere, discussoria tumorum: bibitur inungiturque ad serpentium morsus, lienes scyrrho induratos, stomachi dolores, & in accessionibus febrium horrores sanat.

*Symphytum petraeum.*

**S**ymphytum petraeum contrariis constat uirtutibus, habet. n. aliquid quod incidat, pus in thorace & renes expurget: habet etiam aliquam contrahendi uirtutem, qua sanguinis excretionibus medeatur, conuulsis, ruptis, mulierum fluori rubro, in testinorum ramicibus. item calida quaedam humiditas ei inest, qua sitim arcet, & arteriae asperitates sanat. Symphyton, alterum nempe magnum, uiscosum quippiam & quod pruritus excitet, representat, scyllae simile. Utuntur eo, ut superior i.

PAULI AEGIN.

M Spon-



*Spondylion.*

**S**pondylii semina & radix uirtute acri & incisoria, suspiriosis, comitialibus, & arquatis succurrunt, radix autem circumfusa, fistulisque imposita illarum callos tollit, succus è flore ipsius expressus, uterrimis aurium ulceribus instillatur.

*Schinos, lentiscus.*

**L**entiscus in omnibus sui partibus siccatur secundo ordine ab soluto, calefaciēdo autem & refrigerando medius est, adeo astringens, ut ad hypocistidis succum astrictione accedat.

*Schæni anthos, iunci odorati & rotundi flos.*

**I**unci odorati & rotundi flos modicè calefacit, minus astringit, tenuem naturam sortitus, qua urinam mouet & menseis trahit, obstructaque reserat in fomentis, potu & cataplasmatibus adhibitus: radix adhuc magis flore astringit, sed ille calidior.

*Schænos elia, iuncus palustris.*

**P**alustris iuncus duplex est, sed eius qui uocatur oxyschænos, semen est somnificum: holoschæni autem dicti, minus idem & capiti dolorem facit. utriusque semen frixum si cum uino bibatur, alui fluores desiccatur, & mulierum fluxiones cohibet.

*Sori.*

**S**ori uireis misceat equalis obtinet, longè illo natura crassius. Quæ à T incipiunt.

*Torichos salsamentum thynni.*

**C**onditanei thynni caro acris est & desiccatoria: morsis igitur à uipera, quam præsterem dicunt, quamplurimum eius esui datur, uinumque superbibitur liberalius, & uomitus excitatur: eadem ad acrimonias esitatorum ualet, item rabidorum canum aliorumque serpentium moribus utiliter applicatur.

*Taurocolla, glutinum bubulum.*

**T**aurocolla aliis xylocolla dicitur, ex bouum coriis confecta, uim habet insigniter abstersoriam, eoque aceto subacta, impetigines & summæ cutis lepras exterit: ambustis, si aqua calida soluatur, inflammationem oboriri non sinit: eadem oxymelite soluta uulneribus accommodatur.

*Tellina.*

**T**ellinae conditaneæ crematæ, adurentem cinerem reddunt, qui cedrino liquori mistus euulsio radicibus palpebrarum pilos,



pilos, si instilletur nasci iterum prohibet.

*Terminthos, terebinthus.*

**T**erebinthus calefacit in ordine secundo, siccatur autem si uiridis est in primo, si aridus secundo, fructus ubi inaruerit, ad tertium siccantium ordinem refertur. hac igitur ratione & urinam mouet, & lienes adiuuat.

*Tettiges, cicada.*

**C**icadae crudae siccatae ad colicum dolorem potui dantur, aut tres, aut quinque, aut septem, cum totidem numero piperis granis. quidam tostas contra uesicae dolores potui exhibent.

*Teutlon, beta.*

**B**eta nitrosam uim habet, qua abstergit, discutit, & per nares purgat, sed alba elixa plenius, inflammationi arcendae fit idonea, & modice discutit.

*Teucrion.*

**T**eucrium calefacit in secundo, siccatur in tertio ordine, uiridiora tenuisque, lienibus medetur.

*Tephra, cinis.*

**C**inis non omnis idem exacte habet temperamentum, sed pro materiae combustae differentia euariat: acerbarum sane arborum cinis, nempe quercus & ilicis, astringendi uim non modicam obtinet, qua sanguinis eruptionem compescit, quam nullius alterius datur facultas: acrium uero, puta fici & tithymali cinis, acrior & magis deterforius efficitur.

*Telephion.*

**T**elephium in primo abscessu calefacit, secundo autem desiccatur: est itidem astringens, quapropter ulceribus putredinem expertis conuenit, & uiriliginis, tum leucas, tum alphas, cum aceto abolet.

*Telis, fenugracum.*

**F**oenugracum ex secundo ordine calidum est, è primo siccum, idcirco feruidas inflammationes irritat: minus autem calidas & induratas scyrro magis discutiendo persanat.

*Tithymalus, herba lactaria.*

**T**ithymali omnes è quarto calfacientium ordine sunt, acrimoniae & ualidae amaritudinis participes: sed radix quum sit quodammodo imbecillior, aceto incocta dentium erosorum

M x dolores



dolores finit: liquores uehementiore donati uirtute, dentium cauis imponuntur, reliquum corpus si attingant, adurunt, quare etiam pilos modicè delitos auferunt, item myrmecias, uerrucas & huius generis alia tollunt: & cutis labes abstergunt, maligna ulcera, & phagedænica, curant. Cæterum ex septenario ipsorum numero ualidissimi sunt, appellati characias, myrsinites, & qui in petris arboris modo nascitur: hos sequitur qui uerbasco similis est, & cyparissias, deinde paralys, quasi dicas maritimus, postremò helioscopius.

*Titanus calx.*

† **C**Alx uiua, quidem uehementer adeò urit, ut crustā inducat: restincta uerò crustam quidē subito excitat, sed post diem unū non amplius, calefacit tamen & consumit carnis: si lauetur, idq; aqua marina, ualidas discutiendi uires acquirit.

† Hæc uerba sic leguntur in uerbis libris, τίτανος ἡ μὲν ἀσβεστος καὶ ἐσφοδρῶς, ὥστε καὶ ἐσχάρῃ, σβεθεῖσα δὲ παραχρῆμα μὲν ἐσχάρῃ, μετ' ἡμέρας δὲ ἔκτετι, θερμαίνει δ' ὅμως καὶ διατρίκει τὰς σάρκας, εἰ δὲ πλυθεῖν, ἀδνηκτος γίνεται, καὶ μάλιχα, ὁ τλεοιάκισ πλυθεῖν, διαφορητικὴ δὲ ἱκανῶς γίνεται, θαλάσσιον πλυθεῖσα. Id est. Calx uiua urit multum, ut crustam inducat, extrincta autem statim crustam efficit, sed post aliquot dies uis eius remittitur, calefacit tamen & tabefacit carnes: Si autē leuetur sine morfu redditur, præsertim si sæpius loca fuerit: marina uerò aqua abluta uim digerendi habet. Qua esse huius loci uerā scripturā, ex Galeno & Aetio facillè intelligi potest.

*Tragacantha.*

**T**ragacantha persimiles gummi uires repræsentat.

*Tragium.*

**T**Ragium frutex est in Creta lentisco similis, uirtute calida in tertio abscessu, attractoria, discutiente, & tenui: aculeos igitur educit calculos cōminuit, mensesque citat, instar dracmæ potum. Sed alterum tragium, hoc amarius est, scolopendrio assimile, nascitur multis in locis, tanta astringendi uirtute præditum, ut fluidis affectibus commodè faciat.

*Tragoriganum.*

**T**Ragoriganum origani uirtutes habet, & nonnullā etiam attritionem.

Tribolos,



*Tribolos, tribulus.*

**T**Ribulus mediocriter refrigerat: sed terrestris siccando ualentior est, aquaticus leuiter et humectat: uterque contra inflammationum generationes, omnesque influxus conuenit: terrestris fructus quum tenuis existat, renum calculos conterit.

*Trigossitodes, tragus frumentaceus.*

**T**Ragus frumentaceus zeæ respondet, sed difficilior in stomacho conficitur, & aluum emollit.

*Trigle, mullus.*

**M**Vllus piscis continuè esus claritati oculorum nocet, crudus dissectus & impositus marini draconis, scorpionis, & aranearum moribus succurrit.

*Tripolium.*

**T**Ripolij radix calida est in tertio abscessu & acris.

*Triches, crines.*

**P**ili combusti persimilem lanis concrematis uim obtinent.

*Trigon, pastinaca marina.*

**M**arinæ pastinacæ aculeus impactus denti infirmo, ipsum conterit excutitque.

*Tryx, fax.*

**F**Aex uini ignem non experta compositis uiribus constat, ut quæ abundè desiccet discutiatque, astrictoria autem facultas ei ex uini unde confit specie, accedit. Utendū igitur est ea tum in humidioribus, tum in fluidis affectibus, phygethla discutit, lac, mammis eo refertis imposita, extinguit: cremata uerò quæ etiam spheclen appellant, adurentem uim acquirit, quapropter & medicamentis quæ adurunt, ipsam miscemus, ungueis igitur scabros cum resina eiicit: pilos cum oleo lentiscino per noctem totam inuncta, flauos efficit. Lota oculorum medicinis absterforijs temperatur. Aceti fax in omnibus ualentior est iam dicta, magisque astringit.

*Troglodytes, passer.*

**T**Rogiodytes passer est, omnium auium excepto regulo minimus, in sepibus potissimum degens, qui & tostus & crudus salsus manducatus renum calculos conterit: cremati ipsius cinis epotus, idem præstat.

M 3 Tyros,



*Tyros, caseus.*

**C**aseus recens & mollis repellendi uim obtinet, leuiter refrigerans, quare & uulnera impositus conglutinat: at qui oxygalactinus dicitur, præter hanc facultatem etiam discussoriam modicam possidet, magisq; uulnera conglutinat: uetustus, isq; pinguis magis discutiendi uirtutem præ se fert, quæ articulariorum quoq; tophis accommodatus est, præsertim cū suillæ carnis & salsæ & pinguis decocto.

*Quæ ab Y incipiunt.**Hyacinthus.*

**H**Yacinthi radix bulbi speciem repræsentans, primi in siccando ordinis est, secundi refrigerando, pueros itaq; impuberes diu conseruare cum uino inducta creditur: semen leuiter abstergit astringitq; idcirco arquatis cum uino datur, ut qd deficet magis quàm refrigeret.

*Hyalos, uitrum.*

**V**itrum leue cum uino tenui & albo potum, uesicæ calculos comminuere dicitur.

*Hydnon, tuber terræ.*

**T**uber terræ terrestri constat substantia cum modica quadã uirtute tenui.

*Hydrargyros, argentum uiuum.*

**A**rgentum uiuum in medicinæ usum non adeò accommodatur, quod uenenum repræsentet: nonnulli uerò concrematum ipsum in cinerem, mixtumq; alijs speciebus, colicis & iliosis potioni exhibuerunt.

*Hydropeperi, aquaticum piper.*

**H**Ydropiper, herbula est calida, sed non piperis, modo, uiride cum semine suo inductū, sugillata, & tumores scyrrho induratos discutit.

*Hydor, aqua.*

**A**qua præstantissima & alterius substantiæ expers, refrigerat, humectatq; ex peculiari sua natura: ubi autem ascitizium calorem assumpserit, quamdiu eum seruat, calfacit: frigida autem facta, refrigerat. Porro quæ non nihil mixta est, ut nitrosa aut bituminosa, adiunctæ substantiæ uireis acquirit. Pluuiialis autem nonnihil etiam astrictionis habet, ob quam ocularijs



larijs miscetur medicinis. Qualem uerò conueniat laudatissimam esse aquam, in primo libro comprehensum est.

*Hyoscyamus, altercum, seu herba Apollinaris.*

**A**ltercum cuius semen nigrum est, item cuius flauum, ueniosum est: accommodatissimum uerò curationibus, quod & semē & florem candidū habet ex tertio refrigeratiū ordine.

*Hypericum.*

**H**ypericum duplex est, alterum quod androsæmon & ascyrhon appellatur, expositum est: alterum uerò calefacit & siccatur, tenui substantia præditū, eoq; urinas elicit & menstrua citat, totū ipsius semen, q̄ si cum foliis inducatur uiride, cicatricem uulneribus obducit, † arida uerò folia inspersa ulceribus medentur, dantur etiam potioni aduersus coxarum dolores.

† Hic locus ita descriptus est in ueteribus libris, ξηρὰ δ' ἐπιπαττόμενα τὰ πλατὰ τῶν ἐλκῶν ἰώνται, id est, sicca autem inspersa, præhumida ulcera sanant.

*Hypocoon.*

**H**ypocoon refrigerat in tertio ordine, papaueri uiribus proximum.

*Hypoglossum.*

**H**ypoglosson frutex pusillus est, cuius radix & succus emolliendi uirtute pollent.

*Hypocistis.*

**H**ypocistis eorū quæ ad radices cisti & cistari appellati subnascuntur, nempe dytinorum, succus est, medicamentum ad omneis fluidos affectus efficacissimum, ut quod particulas siccet corroboretq̄ue.

*Hypophæston.*

**H**ypophæston species est spinæ fulloniæ, quemadmodum & hippophaes, ex huius capitulo, folijs, & radicibus, succus expressus siccatusq; trium obolorum pondere, cum mulsapituitam & aquam euacuat, maximè congruit orthopnæis, comitialibus, & neruorum affectibus.

*Hyssopum.*

**H**yssopum in tertio ordine & calefacit & desiccatur, tenuisq; substantiæ est.



*Phaci, lentes.*

**L**entes in secundo ordine siccant, medio caloris & frigiditatis temperamento donatæ, sed astrictiōis quoq; non nihil habent Totum uel ò lentis corpus siccatur, aluumq; sistit: decoctum ipsius prorit, ideoq; prior aqua defunditur, quum comprimendi gratia lentes assumuntur.

*Phacos, lenticula, palustris.*

**L**enticula palustris humectat refrigeratq; in scdō abscessu.

*Phalaris.*

**P**halaridis succus, folia, & semen pota, uesicæ doloribus auxiliantur, habet eadem herba & tenuem quandam uim, naturamq; calidam.

*Phalangites.*

**P**halangites q̃ phalangiorum moribus medeatur, nomen hoc inuenit: est & tenuis naturæ compos, qua torsionibus circa umbilicum auxiliari putatur.

*Phellos, suber.*

**S**uber præsertim ex uinorum cadis, combustum, cinerem reddit siccando uehemētissimum, qui medicinis ad dysenterias inscriptis admiscetur.

*Philyras, tilia.*

**T**iliæ arboris folia, syluestri oleæ similiter astringunt, quibus commanducatis, oris ulcera iuuantur, eorumq; decocto colluuntur: quod etiam potum & urinam & menses trahit.

*Phlomos, uerbascum.*

**V**erbasci genera plura sunt, inter quæ est & dicta tryalis: cæterum folia omnium siccantem & mediocriter astrictoriâ uim referunt: præcipuè eius quod aurei coloris est, & quod acerbæ sint, fluidis conferunt affectibus: nonnulli & dentes ex eis colluunt.

*Phœnix herba.*

**P**hœnix, aliis rhu, herba est lolio consimilis, astringendi uiribus donata, in uino aultero pota, omneis fluidos affectus sistit.

Phœnix



*Phœnix arbor, palma.*

**P**almæ fructus qui iam ematuruit, calidus mediocriter est, uisceribus roborandis & stomacho idoneus, tum intus assumptus, tum foris applicatus: reliqua palmæ portio uehementer attringens est, quamobrem stomachicis, & hepaticis medicinis temperatur: longè magis, astringit quod fructus enascens ueluti inuolucrum est.

*Phermion.*

**P**hermion tenuis, absterforiæ & attractricis facultas est: semen igitur cum melle albugines extenuat, & spicula è corporibus extrahit.

*Phu.*

**P**Hui radicem habet nardi persimilem, quæ tamen ad pleuraque infirmior sit, sed urinas magis quam ea elicit, nardi gallicæ modo.

*Phyllum folium.*

**P**Hylion, Malabathri folium est, de quo in illius capite diximus.

*Phycos, fucus.*

**P**Hycos refrigerat, siccaturque in secundo abscessu, ac mediocriter etiam astringit.

*Phylites.*

**P**Hylites cum acerba quadam prædita sit qualitate non immerito alui profluuijs pota auxiliatur.

*Quæ à Ch auspicantur.**Chalbane, galbanum.*

**G**albanum calore tertium ferè ordinem accedit, siccitas secundum, molliendi & discussoria ui donatum.

*Chalcitis.*

**C**halcitidis uires astrictoriæ, acres, adurentesque sunt, & crustam inducunt, tenuitate media inter misy & fori consistit, uista tenuior redditur.

*Chalcanton, atramentum sutorium.*

**C**halcanthum aqua est in Cypri metallis coalescens, ualentiſſimæ astrictionis cum calore non ignauo: quod omnium efficacissimè humiditas carneis conseruat suo condimento desiccaturque.



siccatur; longiore temporis processu in chalcitidem mutatur.

*Chalcos, es combustum.*

**A**Es combustum acre quiddam habet & astrictionis particeps est, quapropter ad cicatricem ulceribus obducendam in sic-  
cioribus corporibus praestantissimum est: si eluatur, teneris  
utilius est, quam illorum.

*Chalcu anthos, æris flos.*

**A**Æris flos tenuioris naturæ est, quam æs cōcrematum, eius-  
que squama: mixtus itaque collyrijs palpebrarum & asperi-  
rates, & flicus exterit.

*Chamædrys.*

**C**hamædrys in tertio ordine calefacit siccatur; lienes igitur  
consumit, urinas & menstrua elicit, uiscerum obstructio-  
nes expurgat.

*Chamæcissus, hederæ terrestris.*

**H**ederæ terrestris flos quum amarus insigniter existat, ieco-  
ris meatus adaperit, item contra coxendicum dolores  
exhibetur.

*Chamæleuce.*

**C**hamæleuce in tertio abscessu calefacit, in primo desiccatur.

*Chamæleon.*

**C**hamæleontis nigri radix calefacit siccatur; propemodum  
in tertio ordine, est & absterforiæ facultatis particeps, qua  
cutis labes exterit, item duros tumores dissipat emollitque, &  
phagedenica ulcera admota in cataplasmate per sanat: si autem  
intra corpus sumatur, ueneni loco est. Albi radix superiori pro-  
portione responderet, sed amarior est: quæ si cum uino austero  
instar acetabuli bibatur, latas uentris tineas enecat: facit etiam  
ad aquam inter cutem.

*Chamæmelon.*

**C**hamæmelon siue anthemis calefacit siccaturque in primo  
abscessu, præterea uirtute tenui, discussoria, laxanti, &  
odorata constat.

*Chamæpitys.*

**C**hamæpitys secundo gradu calefacit, tertio desiccatur, quam  
ob causam & purgare & abstergere uiscera, potissimum ier-  
cur potest, item urinas mensis; trahit, magnam uulnera cō-  
glutinat,



glutinat, putredinem expertis medetur, duritias discutit, decoctum ipsius etiam coxendicum doloribus salutare est.

*Chamadrops.*

**C**Hamadrops, quiddam & hoc chamedryn uocant, alii etiam teucrion, uiribus chamedryi respondet.

*Chamæsyce, humilis ficus.*

**C**Hamæsyce absterforia & acri facultate pollet, quapropter & surculi ipsius & liquor myrmecias, uerrucasq; abolent, crassas oculorum cicatrices cum melle abstergunt, hebetudini, & suffusioni incipienti medentur.

*Chamelæa, oleago.*

**O**leago absterforia facultate, sordida ulcera & crustas cum melle purgat.

*Chelidonium, herba hirundinaria.*

**C**helidonium in tertio ordine calefacit, ualenterq; abstergit: succus ipsius claritati oculorum utilis est: radix arquatos cum uino & aniso pota, obstructione liberat: māducata dentium doloribus auxiliatur. Minus chelidoniū quarto calefacientium ordini ascriptū, acrius est, ut in ductum cutem exulceret: ungueis scabrosos eiicit: succus autem ipsius per nareis purgat.

*Chelidones, hirundines.*

**H**irundinum crematarum cinis cum melle illitus, anginarum inflammationes persanat: idem oculorum claritati benefacit.

*Chole, fel.*

**F**el omnium aliorum animatis humorum calidissimum est, colore tamen inter se differt: siquidem quod flauum, pallido calidius: & flauo, æruginosum. præterea uariat pro animantium quæ id habent ratione, quatenus suillum omnibus aliis infirmius est, eoque citra rosionem aurium ulceribus medetur. Ouillū maioris acrimoniæ est quàm suillum, & ouillo caprillū efficacius. caprino æqualia ursorū & boum existūt. taurinum uehementius: hoc, fel hyænæ superat, rursus hyæna uincitur à pisce callionymo dicto, & scorpione, cuius animatis fel suffusionibus oculorum, hebetudini, & albuginibus accommodatur: item marinæ hirundinis. at capræ syluestris fel etiam lusciosis conferre dicitur. cæterum omnium uolucrum fel, rum acrius,



acrius, tum siccando uehementius est quàm quadrupedū: inter has ipsas autem gallorum & perdicum aliis est prastātius: accipitrum & aquilarum acrimonia & rosione quodammodo superat, æruginoso colore, nonnunquam etiam nigro.

*Chondrilla.*

**C**hondrilla intybi species subamara gustu est, propterea etiam maiorem siccandi uim quàm illa obtinet.

*Chondrus.*

**C**hondrus tritico persimilis est, nisi quod glutinosior.

*Chrysocolla.*

**C**hrysocolla altera in metallis reperitur, altera in rubri æris pyla ac tali pistillo in urina pueri uenerem non experti, sub caniculæ æstu contrita, præparatur. hæc igitur abstergit, discussoria, siccanteque ui prædita maiore, quàm ea quæ in metallis inuenitur, ut etiam carnem absumat citra rosionem: ob quod ulceribus maleficis accommodata est: concremata uero minus erodet.

*Chrysocome.*

**C**hrysocomæ, quæ etiam chryfitis dicitur, radix acris simul & astringente ui existit, quare non multi in medicina usus est, quanquam peripneumoniacis & iocinorosis in mulso elixa exhibeatur: cæterum menseis educit.

*Quæ à Ps ordiuntur.*

*Pseudobunium.*

**P**seudobunium bunii speciem repræsentat, calefacit, discutit & abstergit: torsiones igitur circa umbilicum, stillicidia & laterum dolores soluit: strumas etiam cum sale & uino inductum dilucit.

*Pseudodictamnion.*

**P**seudodictamnion imbecillis dictamni uires habet.

*Psimmythion, cerusa.*

**C**erusa refrigerat & opplet.

*Psyllium, herba pulicaris.*

**H**erbæ pulicaris semen secundi refrigerantium ordinis habetur, siccando humectandoque medium est.

*Psoricon*



*Psoricon.*

**P** Soricon, chalcitide duplicata, argenti spumæ mixta, efficitur, utrisque tamen aceto prius detritis, ac in recentem ollam coniectis, quæ diebus quadraginta sub fimo delitescet: sic enim maiorem siccandi uim, tenuiorem & minus rodentem quàm chalcitis, acquireret.

Quæ ab O magno incipiunt.

*Oon, ouum.*

**O** Vi candidum & tenue, nullius planè rosionis compos mediocriter refrigerat, utendum igitur eo in oculis, pudendorum ulceribus, alijsque omnibus malignis: miscetur etiã medicamentis emplasticis, quæ sanguinem supprimunt: luteum uerò pari facultate præditum medicamentis temperatur ad inflammationem arcendam efficacibus: tostum uerò magis siccatur, minus lenit. Porro totum ouum aceto incoctum si assumatur, uentris fluxiones desiccat: si acerbum aliquod adiunxeris, ut, gallam, aut rhum, aut balauitium, ac frixeris, multò redditur efficacius: ambustis autem crudum impositum, protinus auxiliatur. Sorbile assumptum, pectoris uitia concoquit lenitque, & arteriæ asperitates læuigat. Præponetur autem recens ueteri: & gallinaceum reliquorum animantium ouis.

*Ocimum.*

**O** Cimum secundo calefacientium ordini ascribitur: habet & humiditatem quandam excrementitiã, propter quam neque utile est intus assumptum: extrinsecus autem inductum discutit, & concoquit.

*Ocimoides.*

**O** Cimoides, nonnulli philæterion nuncupant, inutilis quidem radix est: semē uerò tenue est, & sine rosione siccatur.

*De medicamentis simplicibus quæ flauæ bili purgandæ sunt.*

*Cap. IIII.*

**A** Loes drachma, cū aqua mulsa mane datur, qui uespeream exhibent, aut secundum cibum, noxam inferunt, quippe alimentū in membra digerit, flauam bilem uacuat minus, trium obolorum instar assumpta, ut quæ crassiora tantum excrementa abundè educat. Cæterum qui omnia purgantia medicamina stomacho aduersentur, sola, aloe conducit



cit. qui uero amaritudinem eius non sustinent, in catapôtiâ coactum assument. Sciendum uerò est, medicamenta ea non simplici quodam temperamento, uerbi gratia, caliditate purgare, (omnia siquidem calida, quale piper est, uacuationē molirentur) uerum totius substantiæ proprietate, quo modo lapis magnes ferrum attrahere demonstratus est. Porro ex purgantium medicaminum numero ea quæ uentrē duntaxat emolliunt, primo libro sunt exposita: efficacioribus autem utimur uel ad materiam deriuandam, uel ad affectum induratum agitando remouendumque, aut ad corpus reficiendum, mutandumque ipsius temperamentum, aut ad noxium humorem eliciendum. Iam uerò sunt nonnulli etiam mixti ex prædictis modi, inuicem connexi. Cæterum purgationibus hos uti conuenit qui uiribus pollent, & mente constant, primosque ætatis limites euaserunt, nondum uerò ad extremos peruenerunt item qui stomacho robusto sunt, & copiosam materiam inutilem in corpore collegerunt, non multi adeò, sanguinis compotes. Tempus autē purgationis, si nulla urgeat necessitas, uerum maximè & autumnale opportunum est.

*Quæ bil em uacuent.*

**Q**uæ bilem educūt, quouis anni tempore præterquàm in hyeme rectè usurpantur: ætate uerò florida, & declinante: habitu sicco, musculofo, nigri coloris, uel rubri: uiris magis quàm mulieribus: item in quibus cibi continuè corrumpuntur, aluus astricta est, amara bilis redundat, iracundis, paucam urinam reddentibus, cibo usis sicco & calido. In affectibus, arquato, iecoris imbecillitate, pleuritide, phrenitide, angina, insania, cephalæa, lippitudine, erysipelate, lepra, febri, & quibus bilis superat. Datur aloe capite grauatis, lippientibus, siticulosi, & qui per somnum imaginibus torquentur sine febre, adhæc qui horroris discursum in corpore sentiunt, flatus acreis ædunt, intestinis roduntur, quibus stomachus immodicè æstuat, aut nausea humoribus os eius rodentibus eueritur postremo, quibus ob recrementorum abundantiam clyster nequit injici: abundè siquidem inanit, sic ut totū corpus non commouet, nisi copiosa admodum fuerit exhibita: bilem autem in testinis, aluo & stomacho inherentem educat. Veratrum conuenit & acuto & longo morbo laborantibus. qui medicamentum bili ducendæ idoneum requirunt, quales sunt qui insania,



nia, altera capitis parte (heterocranici dicuntur) humorum impetu in oculis decumbente, & pectoris affectibus torquentur: accommodatissimum est uisceribus, uteri & uesicæ uitis medicina in requirentibus. Laudatur etiam ad longam asperæ arteriæ affectionem, arquat, eruptiones quæ exanthemata dicuntur, impetigines, uel herpetas, uel erysipelata, uel lepras! Veratrum nigrum bilem flauam potissimum è toto corpore citra molestiam educit, quam ob causam iis qui non grauitè febricitant, magisq; febris carentibus instar drachmæ exhibetur, radicibus in mulsæ & aqua maceratis, aut cū melle catapotiorum modo: uerum ita exhibetur, ut ieiunium præcesserit. Sunt qui misceant ei pulegiū, uel satureiam, uel aliquod ex iis quæ subito transeunt, stomacho non inimica. Scammonia perinde ut ueratrum purgat, magis flauam bilem: cæterū inter omnia quæ purgationem moliuntur, aduersissima stomacho est. datur igitur iis, qui febris carent & stomacho sunt meliori, ad pōdus quatuor obolorum cum sale aut pipere, aut zingibere, aut quodā stomacho utili, quod protinus corpus permeet, aut etiam cum melle: item cum gūmi quoq; fiunt catapotia. Colocynthidis, hoc est, cucurbitæ syluestris medulla bilem potissimū uacuat, & mucosa non à sanguine tantum trahit, quemadmodum ueratrum & scammonia, sed etiā à nervis & nervosis partibus instar drachmæ in aquæ mulsæ cyathis duobus, quibus & ruta in cocta sit, epota: læugetur autē accuratè, quoniam asperitates ipsius interaneis adhærentes, ulcera concitant, & nervos confortii lege afficiunt. Exhibetur rectè, capite dolentibus, nempe quū cerebri membrana, uel ea quæ caluariam cingit, uitata fuerit, ut, uertiginosis, heterocranicis, cephalæa infestatis comitialibus, apoplecticis, conuulsis, ut in utramlibet partem deprauata sit facies, qui cynicus spasmus dicitur, diuturno in oculos fluxu uexatis, orthopnoicis, suspirosis uetusta tussī conflantibus, præterea iis quos articulares dolores, & renum uesicæ affectus malè habent. Elaterium scammonia modo euacuat deligendū uerò porraceū, leue, & anno non uestustius, triobolari pondere cū lactis hemina læuigatum exhibetur! Tithymalus bilem elicit, non aliter quā elaterium & scammonia dantur liquoris guttæ quatuor aut quinque cum polenta macerata, quæ statim deglutientur. Nam in ore diu retentæ, linguā exulcerant, eiusq; uicinam. Lathyrides bilem purgant sicut ueratrum



ueratrum & scammonia : offerentur igitur septem octo ve , & usque ad quindecim : robustis sanè & qui liberaliore indigent purgatione, manducari præcipe, imbecillioribus & malo prædictis stomacho, integras ipsas deuorare. Peplii turionum qui semper sicci existunt, instar octo obolorum in mulsâ datum bilem educit, ueratri modo, & flatus diffrigit. Agaricum simileis cucurbitæ syluestri uireis habet, tardum ad functionem obeundam, non autem stomacho admodum inimicum: datur læuigatum drachmis duabus cum mulsâ, sit autem albidissimum, uehementer fragile, non adeò lignosum, neq; teredinibus obnoxium. Iris illyrica simili modo purgat octo obolorum instar ex mulsâ assumpta. Sit autē nec uetusta, nec teredines experta. Centaurium minus bili & mucus purgandis aptum, coxendicū doloribus peculiariter cōuenitiū ipsius drachmæ & semissis pondere in aquæ hemina decocti ad dimidias bibitur. Tragorigani flos cum semine instar duarum drachmarum ex mulsâ datur, quibus etiam ueratrum nigrum, uerum flos ille, gratior quidem stomacho existit quàm ueratrum, minus autem purgat. Chamælææ drachmæ quatuor in mulsæ heminis duabus ad quartas decoctæ, per inde ut ueratrum, purgant. Nonnulli uero chamælææ & absinthii dupla portione catapotia fingunt, exhibentq; Aristolochiæ clematidis, hoc est sarmētariæ seminis drachma in mulsâ pota, colocynthidis more purgat. Polypodii radix arida, si læuis mulsæ inspergatur, aut cum ea conteratur, eundem quem colocynthis effectum præstat.

*Quæ bilem atram uacuent.*

**M**edicamentis atram bilem ducentibus utemur præcipuè in melancholicis, furibundis, iracundis, hominum consortia exosis, aut secessu gaudentibus, item in his qui dum à morbo reficiuntur, purgationem desiderant, autumno feruidiore, habitu sicco & parum musculofo. Epithymū laudatissimum est remedium inter ea quæ atræ bili uacuandæ sunt. dantur ipsius drachmæ quinque læuigatæ ex lactis hemina. Epithymbrum quod thymbræ supernascitur, ut epithymum similiter euacuat, sed imbecillus est. Pulegium atram ducit bilem instar acetabuli in mulsâ potum. Tragorigani heracleotici idem modus, uti pulegium uacuat, cæterum ambo deficcant. Alypi semen inferius atram purgare bilem pari epithymo mensura cum sale & aceto dictum est, intestina uero si fidem Dioscori



di accommodamus, leuiter exulcerat. Est autem meo iudicio, quæ nunc alypias uocatur: exhiberi debet in mulsâ. Parthenium similiter siccum si poterit eadē solet extrahere. Alysson cum sale epotum non aliter quàm superiora expurgat.

*Quæ pituita uacuanda sint.*

**E**orum quæ pituitam educunt usus est in habitu frigidiorē & senio confectis perque hyemem, in resolutis, apoplecticis, inturgescens tumore laxo fungosusq; quod œdema dicunt, insuper in his qui multum pituitæ in uentriculo, aut pectore, aut stomacho collegerunt, & in mulierum fluore. congruunt etiam copiosa emungentibus, crassâ excreantibus fastidiosis, & coxendicum cruciatu detentis, quum mucis articulis incubuerint, aut elephanticis: maximè autem conueniunt iis qui aqua inter cutem laborant, cui nomen est anasarca. Styracis albi drachmæ pondus cum resina terebinthina æquali modo deuoratum, pituitam euacuat. Oleæ radices cortex drachmæ instar cum uino aut aqua. Pyrethri oboli nouē ex aqua. Lychnidis seminis drachmæ duæ. Cyclamini radices drachma cum hydromelite. Scordij drachmæ duæ cum melle Chamæpytis in pollinem detrita, exhibitaq; in catapotiiis. Squamæ Cypriæ drachma semis cum resina pari in catapotiiis ualentius purgat pituitam. Lauri foliorum uiridiū sesquidrachma. Cucumeris syluestris radices corticis oboli duo. Ricini grana quadraginta, crotones dicti, putaminibus detractis eduntur, similemque effectum præstant. Apii dimidium quod ad radicem est manducatum: nonnulli id chamæraphanon appellât, hoc est humilem raphnum. Bdellij drachmæ duæ ex hydromelite. Peculiariter autem gummi oculis defluentibus idoneum.

*Quæ aquam educant.*

**A**quam elicientibus uti conuenit in his quos aqua subter cutem, ab utre ascites dicta, malè habet, in mulieribus albo fluore infestatis, item in ijs quos ulcera fluida torquent. Squamæ Cypriæ drachma cum mulsâ pota aquam educit: acciti uerò momentum superforbere oportet, ne par uomitum reddatur. Coccum gnidium cortice detracto læue cum melle cocto potum ne fauces attineat, aquas trahit. dantur autem grana aut uiginti, aut uiginti quinque, aut triginta: ualentiori-

PAULI AEGIN.

N bus



bus quadraginta . Euphorbij drachma cum melle cocto pota  
picturam emolitur, magis autem aquas . Lonchitidis seminis  
oboli octo cum mulla aquas purgât . Cneoron similiter aquas  
trahit cum polenta potum . Cnici seminis drachmæ quinque  
læuigatæ ptisanæ incoquantur cum salis momento, sorbentur  
que . Ammoniæ suffiminis drachma in mulla pota educit .  
Nonnulli uerò lienosis id cum posca exhibent . Sambuci cor-  
ticis radice succus instar unciam duarum potus cum uino  
aquas educit .

*De compositis medicamentis purgantibus. Cap. V.*

*Catapotia ex aloe .*

**C**Olocynthidis medullæ pars una , absinthij succi pars  
una, aloes partes duæ, scammoniæ partes duæ : ex aqua  
granula ad erui magnitudinem finguntur . dantur un-  
decim numero .

*Oxymeli Iuliani .*

**R**Utæ, origani, singulorum , quadrans , thymi cometriens ,  
anethi fescuncia, iridis uncia , mandragoræ radice fescun-  
cia, agarici sextans, tedarum pinguium uncia duodecim, cocci  
gnidij triens, lathyridum, alypiadis, singulorum quadrans , po-  
lypodii sextans, phylli, costi, spicæ nardi singulorū uncia, rheu-  
pontici fescuncia, scillæ, sambuci turionū, canopi, (qui est sam-  
buci cortex) singulorū quadrans, asari uncia, pulegii quadrans,  
epithymi, ueratris, acori, singulorum sextans, sij, amomi, hyperi-  
ci, cumini, singulæ uncia, anisi sextans, aceto sextarij decē, mel-  
lis sextarij quinq; : herbæ per triduum in aceto madescunt, de-  
inde excoctis dum amplius dimidio consumptum fuerit , mel  
adijcitur ubi unita fuerint, & illis abiectis admiscantur lathy-  
rides, costus, coccum gaidium , spica nardi læuigata , & si uoles  
postquam perfectè coctum fuerit oxymel, illa impones . Modus  
summus est uncia, aut pro uirium ratione : benefacit podagri-  
cis affectibus & comitialibus, ac in quibus uacuare simul &  
crassos humores educere opus est .

*Purgatio ad ducendum aquas quæ constat caryophyllo .*

**A**Loes, epithymi, caryophylli, cocci, gnidii, petroselini, rheu-  
pontici, singulæ semuncie , euphorbii scrupuli , quatuor ,  
mellis quod satis est . datur cochlearis mensura .

Purgatio



*Purgatio ex rhodomelite confecta, Alexandri.*

**R**osarum succi sextarii duo, mellis sextarius, scammonia uncia quatuor, summus modus est quinque cochlearia: leuior, duo: medius tria. *ALITER.* Mellis libra, rosarum succi libra, piperis drachmae duae, scammonia drachmae octo, mastiches drachmae quatuor, zingiberis drachmae duae. *ALIO* modo, quo ego utor, Spicae nardi, asari, epithymi, singulorum semuncia: macerantur in aqua hemina per triduum: ubi mediocriter incoxeris, misceto aquae rosarum succi sextarii dimidium, mellis tantundem. Postquam ad usque spissitudinem fuerint incocta, scammonia sescuncia admiscetur.

*Purgatio ex malis cotoneis.*

**M**alorum cotoneorum tostorum uncia quatuor, piperis uncia sex, scammonia drachma, mellis uncia quinque: trita exhibentur cochleario instar unciae, aut pro uiribus.

*Compositio dia citrii, quod est, ex malo medico, stomacho utilis.*

**M**Ali medici corticis, carnisque pondo in aquae sextario uno & dimidio ad tertias decoquitur, mellis sextarius dimidius adiicitur: ubi mellis spissitudinem ex coctione acceperint, inspergitur laeuigati piperis longi uncia, scammoniae tostae in fermento tantundem.

*Buccellatus purgans.*

**S**cammoniae tostae uncia, piperis, apii semini, singulorum scrupulum, foeniculi, anisi, singulae uncia mellis libra: tosta mediocriter instar unciae dantur in condito.

*Oliua purgantes.*

**S**cammoniae uncia, piperis tantundem, epithymi, cumini torrefacti, petroselini, rutae, foliorum menthae uiridis, singulorum drachmae quatuor, laserpii drachma, palmularum unciae quinque, mellis tantundem, aceti heminae duae, oliuarii cymbadum sextarius, scissarum uidelicet: quidam & gari momentum addunt. Modus est quinque scrupula aut septem aut nouem.

*Castillus purgant.*

**S**cammoniae drachmae quatuor, euphorbii tantundem, phylli, piperis, singulorum drachmae duae, mellis libra. datur instar unciae.



*Fusca purgans, & stomacho grata.*

**C**Vmini, foeniculi, singulorū uncia, pulegii, apii, anisi, singulorum semuncia, epithymi, scammoniae, singulorum uncia, scilicet unciae duae. Summus modus datur scrupulis duobus in posca, nonnulli etiam euphorbij scrupula quatuor adiiciunt.

*Vinum purgans in hydropicis.*

**S**Cillae tres unciae, apij seminis unciae sex, piperis drachma, Scapparis radice drachmae quatuor, cocci gnidii cortice exuti drachma, folii malabathri galbuli duo, uini heminae duodecim, mellis sextarii tres. Scilla contusa uino superfunditur, reliqua laeuigata miscentur.

*Halatia, quasi dicas ex sale confecta, purgatio.*

**S**alis communis torrefacti drachmae sex, api seminis, zingiberis, panis siccis, singulorum scrupula sex, anisi, piperis singulorum semuncia, scammoniae, epithymi, singulorum uncia. datur circiter cochleare.

*Compositio dia Hermodaetili, ad podagram.*

**H**ermodaetili quadrans, anisi, cumini aethiopici, ameos, thymi summitatum, piperis albi, zingiberis, singulorum scrupula tria, epithymi semuncia: exhibentur scrupulis quatuor. quidam scrupula sex dant mane cum condito, aut mulla, aut aqua calida. **ALITER** eadem purgatio. Hermodaetili uncia, cumini aethiopici, anisi, agarici, zingiberis, singulorum scrupula sex, mastichae, spicae nardi, singulorum scrupula duo, musci siliqua, cnici scrupula duo, datur quatuor scrupulis cum hydromelo, Scammonia, quod stomacho sit inutilis, auersatur. Si autem liberaliore uacuatione opus sit, scammoniae siliquas treis mensurae admiscebis: lotum exhibetur.

*Catapotia, quae constant lapide armenico, arthriticis potissimum exhibenda.*

**A**Loes unciae quatuor, scammoniae semuncia, agarici uncia, epithymi tantundem, lapidis armenici scrupula duodecim, cassiae uncia, spicae nardi uncia, scillae tostae sextas, croci scrupula duodecim: rhodomelite excepta duobus scrupulis exhibetur.

Compositio



*Compositio dia Coronopodii, ad eadem efficax, ad quæ ex Hermodactylo confecta. stomacho utilis.*

**Z** Ingiberis scrupula duo, piperis scrupulum, agarici scrupula decem, cnici partis interioris scrupula quatuor, coronopodij radice scrupula sex. dantur scrupula tria: quibus alius est difficilis siliquæ viginti tres, quæ faciunt omnino obolos septem, aut ferè octo: ubi uenter inanitus est, ad lauacrum duces inde ouis & pane enutries.

*Medicamentum ex Cyrenaico liquore ad febrem quartanam.*

**L** Actis cyrenaici, piperis, zingiberis, rutæ foliorum, singulæ drachmæ, datur ad nucis auellanae magnitudinem.

*Puls ad purgandum, tumoribus laxis, & elephanticis singulariter efficax, & in quibus humorem crassum glutinosumque emoliri uoles.*

**C** Vcurbitis duabus syluestribus circuncisis semen eximitur, interiore ipsarum carne relicta, dulci oleo ipsas replebis, & propriis operculis obtectas pernoctare sines, in sequenti die uacuato oleo cucurbitas in aqua decoques dum tabescant, deinde ipsis proiectis oleo aquæ temperato nigri uerritri triobolum adiunges, scammonia drachmam: ubi iam cum his puliculam è simila, aut panem siccum læuigatum incoxeris, inde ægroto dabis tenui pridie usò uictu, ad nucum auellanae, octo aut decem, aut plurimum quatuordecim magnitudinem, & portioni aquam calidam exhibebis.

*Quomodo eos qui purgantur tueri conueniat, quidque faciendum ubi medicamentum purgans assum-*

*ptum nihil profecerit, Cap. VI.*

**S** Vmmatim in omni purgatione efficaci, medicamentum homini quem certa prius uictus ratione alueris, ieiuno & coctione obita trades, ac à somno quoad in totum purgatus fuerit, arcebis, motu mediocri si fieri potest adhibito, cibo omni & potu abstinere usque ad consummatam purgationem compellet.

*Ex commentarijs Philagri.*

**A** T si in ediam non tulerit, aut quod uentriculi os ad bilem contrahendam expeditum ex longa penuria præcedente

N 3 habeat,



habeat, aut alia eiusmodi de causa, dabitur ipsi panis ex uiuo aquoso, aut ptisanæ cremor aut chondri, idq; nõdũ incepta uacuatione, (ut ne cibus corrumpatur) sed protinus ubi medicamentum fuerit epotum, sic enim nõnunquam ad celerem medicaminis motionem pondere suo opitulatur. Si uerò quocunque medicamento ad aluum emolliendam assumpro quis non purgetur, neque uacuetur, nullo accedente periculo nihil molliendum est. At si magnitudo morbi urgeat, aut æger uellicetur, distendatur, & lincinationem expertus fuerit, clyster statim necessariò iniicietur. Si ne sic quidem uenter respondeat, corpore rofionem & ueluti euerfionem sustinente, lauare liberaliter, inungendo oportet: ubi repletũ est grauaturq;, sanguinis dimissio congruet, præsertim ubi multi compos sanguinis homo fuerit, oculos rubros habeat, & emissitios, nõ ex natura, sed acquisitò ex medicaminis potione. Vbi horũ nihil infestat, sed morsus & uellicatus affligit, à balneo cibũ protinus offeres, uinũ liberalius potui dabis, atq; interea clysterem inseres, nisi subsistat cruciatus, rursusq; lauabis. Esto aut oleũ quod in aluũ dabis rutaceum, aut ex alio quopiam flatus experte præparatũ.

*Si purgatio modum excedat.*

*Cap. VII.*

**S**I purgatio maior sit impendio, cutis infricari debet, & lauari calida: ante balneum uinum tenue, fuluum & flauũ dari, tale siquidem celerrimè in totum corpus distribuitur: item panis ex eo madens, & malum punicũ. Quòd si euacuatio perseueret, artus uinculis excipientur, quæ è summo deorsum distributa, constringant, & nonnihil sanguinis & spiritus excipiant: dabiturq; potui theriaces ex carnibus uiperarum momentum. deducit enim in cutem subitoq; reuellit humorum in uentriculum confluxum, obtunditq; medicinæ purgantis quod ceu uirosũ est & medicatũ: huius penuria pastillos theriacos, præterea compositionem diaspermaton, & Philonium appellatam: imò etiam cucurbitulis supra stomachum, & cataplasmatibus ex polenta & mulso uti, prodest, deinde epithematis astringentibus: maximè uerò ex totius corporis frictione, & medicaminum potu, adiuuantur. Aer ipsis uitandus qui frigidus nimium aut calidus existat: ille siquidem materiam à foris intro compellit, fluoremq; auget: hic discutit, & uireis resoluit. At si ex intestinorum quæ medicamento  
irritantur



irritatur, erosione, uacuatio augeatur cataplasmatibus obducere commemorata oportet, & in aluū dare quæ acrimoniā retundūt, adipem anserinū scilicet, uinum dulce, nardum & consimilia.

*De Hieris antidotis.*

*Cap. VIII.*

*Hiera Antiochi.*

**C**Hamædryos, agarici, colocynthidis medullæ, stœchados, singulorū drachmæ decē, opopanacis, sagapeni, petroselinī, aristolochiæ fermentacæ, piperis albi, singulorum drachmæ quinq; , cinnamomi, spicæ nardi, myrrhæ troglodytidis, croci foliorum, singulorum drachmæ quatuor, mellis quod satis est, **A L I T E R.** Colocynthidis carnis drachmæ viginti, scillæ tostæ, agarici, ammoniaci thymiamatis, ueratri nigri corticis, scammoniæ, hyperici, singulorum drachmæ tres, epithymi, polypodii, aridi, bdellij, aloes, chamædryos, marrubij, cassiæ, singulorum drachmæ octo, myrrhæ troglodytidis, opopanacis, sagapeni, petroselinī, piperis communis & longi & albi, cinnamomi, croci, castorii, aristolochiæ longæ, singulorum drachmæ quatuor mellis, quod sufficit.

*Hiera Iusti.*

**E**pithymi drachmæ duodecim, marrubij, stœchados, chamædryos, ueratri nigri, scammoniæ, agarici, piperis longi, scillæ tostæ, singulorum drachmæ sedecim, euphorbij, colocynthidis carnis, aloes, croci, gentianæ, petroselinī guttæ ammoniaci, sagapeni, singulorum drachmæ octo, opopanacis, pollij, cinnamomi, myrrhæ, spicæ nardi, iunci odorati floris, pulegii, singulorum drachmæ quatuor, aristolochiæ longæ & rotundæ, utriusque drachmæ duæ, mellis quod satis est, datur scrupulis duobus, aut tribus, aut quatuor cum mulsâ & sale.

*Hiera Galeni.*

**C**hamædryos, piperis longi, piperis albi, stœchados, ueratri nigri, scammoniæ, spicæ nardi, scillæ tostæ, (nonnulli etiam epithymi) singulorum drachmæ sedecim, myrrhæ, croci, ammoniaci suffiminis, euphorbij, singulorum drachmæ octo: excipiuntur melle.

*Hiera Ruffi.*

**C**ucurbitæ sylvestris, quæ sicyonia uel colocynthis dicitur carnis, drachmæ octo, chamædryos drachmæ decem, sagapeni drachmæ octo, petroselinī, aristolochiæ rotundæ,

**N 4** piperis



piperis albi, singulorum drachmæ quinque, cinnamomi drachmæ quatuor, uel cassiæ octo, spicæ, croci, polij, myrrhæ, singulorum drachmæ quatuor, mellis, quod satis est.

*Hiera Archigenis.*

**M**Arrubii, agarici, chamædryos, colocynthidis carnis, stæchados, singulorum drachmæ decem, opopanacis, sagapeni, petroselini, aristolochiæ rotundæ, piperis albi, singulorum drachmæ quinque cinnamomi, spicæ nardi, myrrhæ, polij, croci, singulorum drachmæ quatuor. arida tunduntur simul & incernuntur, opopanax autem, sagapenum, & myrrha contusa, mulsæ per noctem unam in pila macerantur, deinde læuigantur, & sicca his admiscuntur: melle optimo excepta reponuntur in uitreo uase aut plumbeo. hæc ratio omnium hierarum communis est. Summus ipsarum modus est drachmæ duæ: assumatur & salis drachma, mellis heminæ duæ, aquæ quantum satis est. Quod si uehementiores ad purgandum uoles efficere, quibus scammonia non inest, iniicietur, & his singulis ex illa obolus.

*Quæ sedi & umbilico illita purgent. Cap. IX.*

*Illito sedis ad flatum excutiendos.*

**R**Vta cum melle in tenuissimum pollinem redigitur, ut unus succus fiat, & penitissimè intra sedem delinitur. Efficacissimum uerò est si cumini momentum & nitri assumat, uel cyclamini succum: stappa exceptum imponitur, aut glandis forma melle apposito, flatum siquidem multi erumpunt, uentrem leuant.

*Perunctio sedis uentrem mouens, Chezanance.*

**A**Lumen cum melle læuigatum coquitur quoad fuluū redatur, atque hoc sedes perungitur, facile enim copiosa citra laborem subducit.

*Medicamentum quod umbilico illinitur epomphaliū dictum, ad aluum subducendam.*

**C**yclamini drachmæ quatuor, nitri drachmæ tres, ueratri nigri & albi, singulorum drachmæ duæ, colocynthidis drachmæ tres, scammonia drachmæ duæ, elaterii succi drachmæ quatuor, cocci gnidii totidem, caricarum pinguium uncia duæ, felis taurini uncia.

Aliud



*Aliud laudatissimum.*

**E**laterij, lathyridis, galbani, cyclamini, ueratri nigri singulorum drachmæ quatuor, colocyntidis carnis drachmæ octo, cucumeris syluatici recentis, scammonia, cocci gnidi, tithymali, singulorum drachmæ duæ, terebinthinæ drachmæ tres: excipito hæc felle taurino, & unguinis modo uritor. Quidam uerò ad unguentes faui uncias septem & sicyonij quod satis est, emplastri modo imposuerunt.

*Quæ medicamenta uomitum citent, & quomodo ueratrum exhibetur. Cap. X.*

**V**omitum utuntur & sani, qui ciborum humorumve copia grauantur: & acuto morbo laborantes quum à pituita aut eiusmodi quodam infestantur. At medicamentis uomitum facientibus neq; sani, neque acuta ægritudine occupati uti permittentur: sed in longis profunt affectibus & præsertim induratis, quæ ualidâ commotione desiderent, qualis est podagra, morbus comitialis à stomacho originem trahens, elephantia aqua subter cutem, melancholia, & per similes. Aduersatur uomitus sanguinem excreantibus, malo præditis stomacho, & ijs qui suffocationibus opportuni sunt. Promptissimum igitur ad uomitum ciendum est Cyprinum, digitis aut pinnis id intinctis, demissisq; in guttur. item nardi gallicæ radicum drachmæ septem ex mulsâ potest sursum ualenter purgant: similiter etiam radicum betonicæ, quæ cestron dicitur, quinque aut sex drachmæ cum mulsâ sumptæ & daphnoidis tria folia uiridia in læuoram coacta comestaq;. Item elaterii obolus in aqua assumptus sursum pituitam & bilem expurgat: & herbæ pediculariæ grana quindecim cum mulsâ crassiore, ex bulbis autem qui manducari solent, si crudi assumantur. Narcissi autem elixi sursum per uomitum purgant. idem facit apii radicis pars superior, aeris proprior comesta, uocant eam nonnulli chamæraphanon, inferior autem pars per inferna purgat, tota uero sumpta ntrinque: raphani prædictis minus quidem purgant, sed utilius: cæterum conuenit ipsas acris & recentis adhuc minutim concisas, ante duas tres uel horas in oxymelite maceratas quam fieri potest multas, assumere, ter quater uel à coena uomitu excitato: semel autem ieiuni uoment, & sæpe oxymel absorbeant: ubi duabus horis inambulauerint, egelidam bibentes



bentes aquam digitis aut pinnis in os demissis uoment.

*Quibus modis ueratrum exhibeatur.*

**V**eratrum dari debet, ubi longi ualentesque morbi sunt & spes ex aliis praesidiis adempta est, quod aegritudo omnibus ipsis fortior extiterit. Conueniet autem siue continuè infestauerit morbus, ut aqua inter cutem, elephantia malus corporis habitus, resolutio, & id genus alia: siue statis temporibus reperat, ut morbus comitialis podagra. Porro quum plures hellebori exhibendi modi existant, simplicior quidem & praeparatio potius ad id assumendum, talis est. Raphano arundine compuncto dissectoq; ueratri albi optimi radicū praesegmina inferuntur: ac ubi una nocte in eo permanserint, proiciuntur: raphanus minutim concisus, cum oxymelite in dictum modum aegro exhibetur, nimirum uomitionibus assueto, atq; is horis quot diximus interpositis ad uomitum cogendus est. At proprius ueratri exhibendi modus hic fuerit. Veratri optimi sextans in aquae hemina diebus quinque maceratus, ad aquae tertias incoquitur: ubi expressum ueratrum est, aquae miscetur tantundē mellis: excoctū usq; ad spissitudinē praedicto modo, laboranti exhibetur, praeterquā uomere prius exercitato etiam ieiuno, probeq; defuncto concoctione, & cui alius responderit, uel sua sponte, uel clystere semen bisve secundū uiriū rationē sollicitata. Omnium uero efficacissimus modus talis est. Diffectis ueratri radicibus in sesamini magnitudinē (nam in tenuissimum redactae pollinem uirium efficacia strangulationes pariunt) ueratri plurimū drachmas duas, modicē unam, imbecillioribus ptisanæ cremori aut alicæ, aut id genus alicuius incoctæ, potui dabis: ualentioribus ex aqua calida aut mulsæ. Incipit autem purgatio post tres quatuorue horas: quibus tardior est, si melius purgantur. Quod si uomitus lentè oborietur mulsæ potui data, uomere aeger cogendus est, pinnis oleo madidus in os demissis. si ne sic quidem proficiatur, in balneū deduci debet. Vbi iam uomere inceperit si uacuatio paulatim respondeat, nullum aegro negotium facessere oportet. sin autem uellicatum aut conuulsionem experietur, hydrelæum potui dabitur, simul & in aluū ab inferiore parte indetur: quod alioquin in his qui helleborum assument, nonnunquā fieri solet, unde medicamenti coaceruationē facilius ferunt. Si anima deficiat, naribus quæ odorem mouent admotis & consimilibus uireis recolligere,



recolligere, aliisq; ut uerissimile est superuenientibus casibus, eadem accommodare oportet. At multa facta inanitione, cibus dari somnusq; permitti debet, & alia sicuti in his qui nimium purgantur diximus, factitanda sunt. Si perseveret uacuatio, cucurbitulas stomacho defigere, & artus uinculis excipere conuenit: sin aut pro ratione facta sit, mulsæ iusta portio propinabitur, qua superfluitates è medicamēto reliquæ eluantur: mox cibus boni succi offeretur. Iā uerò in iis qui medicamenta per os abominantur, omnino aut hellebori potionē requirunt, Antyllus huiusmodi quodā usus est clystere: hellebori albi drachmæ duę in aquæ sextario per diē & noctem unā macerantur, sequenti die ueratrū in aqua ad dimidias coquitur, inde in aluum datur, ut uomitum concitet, superius purgat paulò imbecillius quàm ueratri potio. Vbi abundè purgatum est, glande acri imposita, aluus irritatur, ut quod iniectum est reddatur, & æger nō amplius uomat. Facta excretionē, mulsæ semel bisve intestinis abluendis iniicitur. ipse uerò Antyllus tradit fieri etiam glandem ex helleboro albo tuso cribratōq; deinde cocto melle excepto, ac clysteris modo ex helleboro præparati, superiorem uentriculum purgare, uerum hic est modus probatior. Nam purgationē partire in uices nobis licet: pondus igitur sit ueratri drachmæ duę, cæterū glans circumapertetur aut uinciatur stappa solidiore, cuius initiū extrinsecus per sedem recipiatur, quò glandem ubi satis purgando profecerit, auferre possimus. hic modus purgat, quidem absolutissimè, non autem suffocationem aut aliud quoddam periculum inducit.

*De differentia antidotorum. Cap. XI.*

**P** Ræfatio Galeni de antidotis in hunc modū habet. Medicinas quæ non extrinsecus impositæ, sed intra corpus assumptæ affectibus medentur, antidota ueteres nuncupant: cæterum triplex ipsorum est differentia, quædam enim lethalium medicamentorū gratia offeruntur, quædam ob bestias uirus iaculanteis, quas Græci *ἰωβόλας* appellant, quædā uerò morbis ex prauo uictu cōtractis auxiliatur: nōnulla treis hos usus promittunt, quemadmodū etiā quæ theriaca dicitur.

*Hedychroi quod theriacen ingreditur, confectio.*

**A** Spalathi radicis corticis, calami aromatici, costi, asari, xylobalsami, phu, amaraci, mastiches, singulorum drachmæ sex, carpobalsami drachmæ duę, mari drachmæ sedecimi



cin iunci odorati floris drachmæ duæ, cinnamomi drachmæ vigintiquatuor, amomi, cassiæ, rha, singulorum drachmæ octo, nardi Indicæ, phylli, singulorū drachmæ xij myrrhæ drachmæ vigintiquatuor, croci drachmæ xij. vino primi meriti exceptas; in pastillos coguntur, manu in opobalsamum intincta.

*Quomodo pastilli scillini præparentur.*

**S**Cilla luto aut crusta ex panificio & opere pistorio oblita, modicè torretur, inde carnis ipsius partes, duæ, cum erui farinæ una capiuntur, simulque læuigantur & finguntur pastilli.

*Quomodo pastilli theriaci fiant.*

**S**Vmuntur uiperæ quatuor aut quinæ, fului coloris & recens scaptæ, & quaternis digitis à capite & cauda amputatis, totaque cute detracta & interaneis exemptis, reliquum corpus in fictili nouo cum anetho & sale modico discoquitur, dū spinæ à carnibus segregantur: deinde his exceptis ablatisque accurate à spinis carnibus, & panis puri æquali modo addito, læuigantur omnia pariter, formanturque orbiculi manu in opobalsamum intincta: in umbra refrigerantur.

*Quomodo paretur theriace antidotum.*

**P**ASTILLORUM scillinorum drachmæ quadraginta octo, pastillorum theriacorū, pastillorum hedychroi, cinnamomi, piperis, communis, lachrymæ papaueris, singulorum drachmæ vigintiquatuor, rosarū siccarū drachmæ duodecim, scordii, napi buniados seminis, iridis illyricæ, agarici, dulcis radicula, opobalsami, singulorū drachmæ duodecim, myrrhæ, croci, zingiberis, rheu pontici, quinquefolii radice, nepitæ, iunci quadrati floris, marrubii, petroselinii, stœchados, costi, piperis albi & longi, dictamni, thuris masculi, terebinthinæ, mastiches, chie, cassiæ, nigræ, nardi indicæ, singulorū drachmæ sex, polii floris, styracis, apii seminis, seselis, thlipsis, ameos, chamædryos, chamæpityos, hypocistidis succi, malabathri, nardi gallicæ, nardi, meugentianæ, anisi, fœniculi seminis, lemnis terræ, chalcitidis tostæ, amomi, acori, carpobalsami, phu pontici, hyperici, acaciæ, gummi, cardamomi, singulorū drachmæ quatuor, dauci seminis galbani, sagapeni, bituminis, opopanacis, castorii, centaurii tenuis, aristolochiæ sarmentitiæ, singulorū drachmæ duæ mellis attici pondo decem, uini falerni sextarii duo: coniectis in pilam, liquore hypocistidis, myrrha, sagapeno, dulci radica styrace,



styrace, acacia, & opopanace, mellis momentū instillatur, confusaque dissoluuntur, deinde uino superfuso, ut illa superet per triduum madescent: inde reliqua confusa in unitatem coguntur, mel despumatum: cæterū in argenteo aut uitreo uase non adeò pleno medicamentum reponitur, frequenter operculum aufertur. Vſus eius est quum urget necessitas in iis qui à feris commorſi sunt & uenena aſſumpſere, poſt annum ætatis ſeptimum, ſic ut inſtar nucis auellanae, cum tribus uini cyathis, quotidie bis bibatur. Similiter facit ad eos qui ex quadam latente cauſa periclitati ſunt, corruptela quæ corpus conficit, lethaliſ medicamento qualitatē imitata, quemadmodum in peſtilentia correptis potiſſimum accidit, ſemel quotidie, in alijs uerò affectibus à decem annis uſq; ad uiginti, uſus eius celebratur in tuſſi, thoracis, doloribus aut laterum, ſi febris abeſt, cū mulſo: ſi illa urat, cum hydromelite, ſub noctem ad fabæ Aegyptiæ magnitudinem exhibetur. Sanguinem autem excreantibus omnibus, ſi morbus recens eſt, ex poſca: ſi uetuſtior, ex ſymphyti decocto, quantum faba Aegyptia explet, idque manè, & ueſperi. At quos inflationes & torſiones circa umbilicum, aut morbus coeliacus malè habet, ex aqua calida ad fabæ Aegyptiæ magnitudinem manè aſſument. cæterum appetentiā uehementem excitat, rigores, perfrictionem, & bilis uomitum, præſumptum ante acceſſiones diſcutit, menſtrua ducit, & fœtus mortuos eiicit, fabæ Aegyptiæ inſtar potum ex mulſa, aut paſſo in quo ruta aut dictamnium decoctum ſit. Item ad uocē abſciſſam ualet & per ſe, & cū duplicato tragacantho ex mulſo aut paſſo potum, atque ſub lingua retentum eliquatumq;: lienofiſ, iocinoroſiſq; ex poſca, ſcyrrhus adeſt, ex oxymelite, aut aceti ſcillini ſeſquicyatho: in nephriticis cum mulſo circa fabæ Aegyptiæ magnitudinem: dyſentericis tantundem cum decocto rhus, manè & ueſperi. Ad lippitudines autem ſummè etiam in hunc modum temperatum facit: antidoti & opobalſami uncia duæ, mellis cyathus: mixta paulatim unguntur. Itē denteis abſtergit. pleriq; uerò ut ſanitatē ab iniuriis uindicēt, noua Luna ad Græcanicæ fabæ magnitudinē ex eo ſumūt, concoctione bene obita cū uno mellis cochleari, & duobus aqua cyathis. Similiter etiam in peregrinationibus eo utuntur, quum prauī cuiuſdam aeris aut aquarum in itinere ſuſpitionem habent.

Sales



*Sales theriaci.*

**S**vmuntur uiperæ recens captæ numero quatuor, mox salis ammoniaci aut communis modius Italicus, deinde cū ipso in pilam coniecto tunditur in crassiores partes gentianæ sesquilibra, aristolochiæ rotundæ sesqui libra, centaurii tenuis comæ libræ duæ, cardamomi, marrubii, singulorū uncia sex, scordii, apii, chamædryos creticæ, singulorum libra, rutæ satiuæ seminis libra: melle attico in unitatem coguntur, & dimidia ipsorū pars in nouum fictile coniicitur, deinde quatuor uiperæ uiuæ, quibus adduntur etiam scillæ teneræ recentes quinque minutim concisæ, hinc reliqua misturæ portio dimidia superiniicitur: ac ubi olla cooperta diligenter fuerit, tribus quatuorve foraminibus operculum ipsius pertundes, ut per ea uapor tostionis modum significet. Primum enim uidebitur fumus exire copiosus, obscurus, admodumq; turbidus, qui ignem bestias iam inuasisse nuntiet, quando te animū diligenter aduertere conuenit, ne tandem fumi huius aerem è uiperarum exhalatu uitiatū inspires. Postea, ubi uapor cessauerit, & tenuem quādam flammam per foramina eiaculatam conspexeris, tunc ipsa tosta esse quā optime censeto, atq; ita fictili ab igne sublato tota die noctuq; refrigerantur. Deinde ollam aperito, exemptosque inde carbones diligenter tundito, & cum hisce misturis incernito: rutæ syluestris seminis, hyssopi cretici, singulorū unciiis nouem, fœniculi seminis, nardi gallicæ, stachyos Scythici, singulorum unciiis sex, petroselinī macedonici, malabathri foliorum, singulorum unciiis quatuor, amomi uuæ, hormini seminis torrefacti, singulorum unciiis tribus, origani summitatū, thymi summitatum, singulorum unciiis nouem, baccarum iuniperi, piperis albi, piperis nigri, fœniculi, singulorum libris duabus, laserpitii radici unciiis decem, coriandri seminis, zingiberis non perforati, satyrii seminis uel radici, pulegij montani, seselis massalioticici, tordyli mōtani seminis, menthæ, singulorū unciiis sex, cassiæ fistulæ unciiis duabus, cinnamomi uncia. Porro ego sales ipsos præparauī, nō combustis bestiis, sed ipsarum pastillis quemadmodum in theriaca, sic ut hos iis quæ eum bestiis cremantur ad admiscerem, quò si quā in se amarulentia haberent, eam per adustionem deponerēt: tantumq; pastillorū modum inieci, quantum uiperarū quaternionem habere coniciebam,



ciebam, atque hac ratione longè præstantissimi euaserunt.

*Antidotum Mithridatis, dia scincu.*

**M**Yrrhæ troglodyticæ, zingiberis, cinnamomi, singulorum drachmæ decem, spicæ nardi, thuris, thlapsis, opobalsami, iunci odorati floris, costi, stœchados, seselis, galbani, resinæ terbinthinæ, piperis longi, castorei, hypocystidis succi, styracis, mabathi foliorû, singulorû drachmæ quatuor, cassiæ nigrae, piperis albi, scordii, dauci seminis, carpobalsami, cyphios bdellii, nardi gallicæ, gummi, petroselini, opii, cardamomi, foeniculi seminis, gentianæ, foliorû rose, singulorû drachmæ octo, dictamni, anisi, acori, phu, singulorû drachmæ tres, meu athamantici, acaciæ, alui scinci, hyperici seminis, singulorû sesquidrachma, uini & mellis quod satis est Preparatur theriacæ modo. Galenus tradit ad eadem hoc ualere, ad quæ illa, præterquam ad uiperæ morsus, in eos enim Theriace efficacior est.

*Antidotum dia hæmaton, hoc est ex sanguinibus, ad omnia uenenata, & lethalia medicamenta.*

**P**iperis albi & longi, costi, acori, phu, anisi, dictamni cretici, singulorum drachmæ duæ, amomi, opobalsami, rutæ syluestris seminis, foeniculi seminis, cumini æthyopici, anethi, anatis masculi sanguinis sicci, hædi sanguinis, anserini sanguinis, anatis foeminæ sanguinis, napi syluestris seminis, singulorum drachmæ tres, gentianæ radicis, trifolii, iunci odorati floris, lachrymæ thuris, rosarum siccarum, singulorum drachmæ quatuor, cinnamomi drachmæ duæ, scordii drachmæ octo, petroselini, polii, myrrhæ, nardi, singulorû drachmæ sex, cassiæ drachmæ tres, lactis cyrenaici totidem, stœchados drachmæ quinque, asari drachmæ duæ, guttæ ammoniaci drachmæ tres, meu athamantini drachmæ duæ, agarici tantundem, carpobalsami grana uiginti, mellis cocti quod satis est.

*Oxymeli simplex.*

**A**Ceti quàm acerrimi albi sextarius, aquæ sextarii duo, mellis sextarius, ad liquidioris mellis spissitudinem incoquantur, sic ut mel interea dispumetur.

*Acetum scillites.*

**S**Cillæ albi coloris in taleolas concisæ libræ sex, quadraginta diebus in umbra siccantur, deinde ubi rursus purgatæ fuerint, in aceti generosi sextariis duodecim, diebus sexaginta



sexaginta in sole madescere sinuntur, uase bene operculato. post eum numerum dierum scilla ex aceto expressa proticitur, ipsum uero acetum defecatum transfunditur. Nonnulli uero scillae libram in aceti sextarios sex coniiciunt. alii uiridem scillam in acetum pari utriusque modo demittunt, sinuntque usque ad menses sex, atque hoc modo maiorem incidendi uim acquirit. Valet autem acetum scillatum collutum ad fluida oris uitia, & plerisque interaneorum affectibus potum medetur, quibus exulceratio coniuncta non est item aliis compluribus efficax est.

*Oxymeli Scillnium.*

**S**cillae partis internae tenerioris librae duae, aceti acris albi sextarii quindecim, piperis, petroselini macedonici, singulorum unciae duae, dauci cretici, ameos, anisi, nardi gallicae, ligustici, asari, cardamomi, spicae nardi, amomi, rheupontici, singulorum semuncia, foeniculi seminis, cumini, laseris, zingiberis, pirethri, hyssopti cretici, costi, pulegii, singulorum uncia, menthae uiridis fasciculus, rutae uiridis ruriones quinque, mellis attici sextarius, sapa sextarii duo, apij uiridis fasciculus: interior scillae pars alba contusa in acetum mittitur, finiturque diebus septem sub canicula aestu madescere, deinde scilla sublata, arida quidem iam contusa: uiridia autem non contusa in acetum coniiciuntur. Rursus post dies septem omnibus exemptis, mel & sapa aceto adiiciuntur, excoctaue usque ad spissitudinem in uitreum uas defunduntur. Caeterum praesidio hoc & ieiunus instar potionis utere, & cum cibo instar condimenti, est enim longe utilissimum.

*Medicamentum Galeni e scilla, comitialibus potissimum efficax.*

**S**cilla minutim manibus contusa in uas in quo mel solet colligi, demittitur, eoque diligenter operculato in loco ad meridiem spectante sub aestu caniculae reponitur, quadraginta diebus post caniculae sidus in superficie uase soluto scillae corpus effluxisse deprehendes, exceptus igitur ipsius succus melle optimo edulcoratur, daturque comitialibus quotidie cochleare, pueris exiguum, prouectis magnum. Ipsumque scillae corpus tritum cum melle datur cochleari, atque hoc uirtute secundum est.

*Philonis antidotum.*

**P**iperis albi drachmae uiginti, alterci drachmae uiginti, lachrymae



chrymæ papaueris drachmæ decem, croci drachmæ quinque, pirethri, euphorbij, spicæ nardi, singulæ drachmæ, mellis attici uel alterius generosi probè cocti quantum sufficit. datur pro- uectioribus ad nucis auellanæ magnitudinem: minoribus fabæ instar: pueris, ciceris. Medicamentum est, quod dolorem sopit, & somnum accersit.

*Athanasia dolorem leniens, pleuriticis accom-  
modata, authore Oribasio.*

**C**Assiæ drachmæ octo, spicæ nardi, amomi, croci, opij, styra- cis, myrrhæ, costi, singulorum drachmæ quatuor, mellis de spumati quod satis est. datur quemadmodum Philonium.

*Medicamentum ex duplici pipere, eiusdem effectus.*

**C**Ardamomi, castorei, opij, singulorum drachmæ tres, myr- rhæ, costi, piperis albi & longi, galbani, singulorum drach- mæ tres, croci totidem: excipiuntur melle decocto, & ad fabæ magnitudinem exhibentur.

*Medicamentum dia codion, id est, ex papaueris  
capitibus, & sapa.*

**C**Apita papaueris uiridia minimè aquosa octo decem uel die postquam decerpta sunt incoquantur cum dulcis radicu- læ uncia, madefacta in sapæ sextatio rursus incoquantur dū ta- bescant, ubi mediocris spissitudo facta est, ab igne sublata de- funduntur: usus medicamenti est in febribus ubi sopire opus est, & quum tenuis defluxio à capite in thoracem defertur.

*Medicamentum ex capitibus papaueris & melle.*

**C**Apita papauerum, ut dictum est, & dulcis radicu- læ uncia, in aquæ pluuiæ aut puteanæ sextario donec intabescant excoquantur. ubi expressa fuerint, semisextarius mellis deco- cto inijcitur: excocta usq; ad spissitudinem, dantur in quibus præterquam quod dolorem lenire, & somnum cōcialiare opor- tet, etiam purgatione opus est, & abstersione eorum quæ in pe- ctore aut pulmonibus renibusque inhærescunt.

*Dia codion, compositum.*

**A**Quæ, in qua papauerum capita decocta sunt ad prædictā commode rationem, sextarius, uini dulcis hemine dux, mellis libra, croci, hypocistidis succi, singulorum drachmæ  
PAULI AEGIN. O quatuor



quatuor, coquuntur usque ad spissitudinem, uerum stomacho utilius est medicamentum ex melle, capitum papaueris decocto, & malis cotoneis præparatum: efficacius si præter capita, sertula campana & dulcis radícula aquæ incocta fuerint.

*Eclegma ex marrubio, simplex, tabidis maxime accommodatum.*

**M**arrubii comæ libra in aquæ heminis sex decoquitur ad tertias, inde herba proiicitur, adiiicitur autem aquæ mel: ea incoquuntur usque ad mellis spissitudinem instar cochlearis exhibetur.

*Ex marrubio, compositum.*

**M**arrubii comæ, iridis illyricæ, hyssopi, pulegii, dulcis radiculae, apii, singulorum sextans, caricarum pinguum quadrans, nuclei pini resinati tantundem: crassius contusa, arida cum caricis in aquæ sextarios tres demerguntur, coquunturque usque ad tertias, illis exemptis, aquæ, mellis libræ duæ induntur, & ad crassitudinem melleam incoquuntur.

*Medicamentum ex eruiis.*

**A**mygdalarum amararum sextans, farinæ erui triens, hyssopi tantundem, iridis semuncia, nucleorum pini torrefactorum uncia duæ, mellis sextarius, uel quod satis est.

*Medicamentum dodecatheon.*

**I**ridis Illyricæ triens, erui triens, hyssopi, urticæ seminis, dulcis radiculae, scœnugræci, singulorum sextans, bulborum, seminis lini torrefacti, singulorum triens, melanthii scrupula octodecim, pulegii scrupula sex, nucleorum pini torridorum sextans, piperis scrupula sex, mellis quantum sufficit.

*Antidotum, soteria.*

**S**picae nardi scrupula trigintanovem, myrrhæ scrupula uiginti septem, croci scrupula triginta septem, castorii scrupula trigintanovem, opii scrupula triginta sex, petroselini scrupula quadraginta quinque, anisi scrupula nouem, apii scrupula septem, innci odorati floris scrupula triginta sex, cassiæ scrupula duodecim, piperis longi totidem, sinonis seminis scrupula sex, styracis scrupula octodecim, amomi scrupula duodecim, seselis totidem, hedychroi, costi, asari, singulorum scrupula octodecim, mellis quod satis est.

Ex



*Ex styrace bechicon, hoc est, tussi efficax.*

**A** Momi, cassiæ, singulorum sextans, styracis, spicæ nardi, singulorum fescuncia, croci, piperis albi, singulorum uncia, mellis sextarius: exhibetur cochlearium.

*Medicamentum Philoxeni, purulentis & longa defloxiōne infestatis idoneum.*

**R** Esinæ terebenthinæ drachmæ uigintiocto, nardi drachmæ sedecim myrrhæ stillatitiæ drachmæ sex, cardamomi, bulborum tantundem, croci drachmæ duodecim, galbani drachmæ sedecim, amygdala amara octoginta, mellis hemina: ex aqua potatur, quantum faba Aegyptia explet.

*Esdra, multiplicis usus, uehementer enim desiccatur.*

**A** Momi scrupula sex, croci scrupula octodecim, dauci seminis scrupulum unum & dimidium, fœniculi seminis scrupula tria, cassiæ sesquiscrupulum, iunci odorati floris scrupula quatuor & dimidium, cinnamomi scrupula tria, hypocistidis succi scrupula quatuor & dimidium, sulfuris uncia quinque, papaueris seminis scrupula quinque, pyrethri scrupula tria, petroselinis sesquiscrupulum, iridis illyricæ scrupula septem & dimidiū, alterci seminis scrupula tredecim & dimidiū, spicæ nardi scrupula septem & dimidium, rutæ seminis sesquiscrupulum, anethi scrupula tria, cardamomi uncia tres, rosarum siccatū scrupula quatuor & dimidium, nerii floris sesquiscrupulum, est aut ueluti fibra ex qua oritur rosa, rhododaphanes! & rosæ ipsius singulorum scrupula tria, rheu scrupula sex, gentianæ scrupula sex, hedychoi sesquiscrupulum, tragacanthæ scrupula quindecim: lycii scrupula sex, citri arboris foliorum scrupula sex, ocimi seminis sesquiscrupulum, anisi scrupula tria, costi, myrrhæ, singulorum scrupula sex, bdellii scrupula sedecim, artemisiæ succi scrupula tredecim, rhu syriaci scrupula uiginti quinque & dimidium, asari, uteri mergi, lapidis iaspidi, singulorum scrupula tria, piperis scrupula quindecim, cattorii sesquiscrupulum, cimolix scrupula sex, sisonis scrupula nouem, styracis totidem, opobalsami scrupula duodecim, seselis herbæ sesquiscrupulū, mellis, uncia uigintiocto, uini quantum satis est.

**M** *Medicamentum ex malorum cotoneorum carnibus.*

Alorum cotoneorum purorum libræ tres, coquantur in

○ 2 uini



uini pernetusti sextarijs tribus, deinde conteruntur: quibus, piperis, anisi, significi, singulorum contritorum uncia admiscetur. Nonnulli etiam zingiberis semunciam indunt. quidam in uicem uini, aceto usi sunt.

*Medicamentum ex succis malorum, ad appetentiam abolitam & agram concoctionem probatum.*

**M**Alorum cotoneorum maturorum succi sextarij duo, mellis laudati tantundem, aceti sextarius, zingiberis unciae tres piperis albi unciae duae incoquuntur ad spissitudinem. hoc Galenus ad eos qui perfrixerunt preparat: in quibus autem bilis redundat, sine pipere & zingibere conficitur.

*Quomodo paretur melaplacontium.*

**M**Alorum cotoneorum purorum librae sex in uino coquuntur quousque; intabescant, inde exemptae conteruntur. nonnulli mellis libras octo adiciunt, coquuntque; igne lento, ferula agitantes. ubi tam spissum totum euaserit, ut manus quodam modo non inquinat, etiam tunc addunt contusi piperis uncias tres, anisi tantundem, petroselini unciam. Sunt qui zingiberis unciam & mastiches tantundem misceat: deinde mixta instar semunciae formant, & cum lauri foliis componunt.

*Cydonatum contusum fragmentis saluis.*

**M**Alorum cotoneorum purorum frustulatim concisorum librae octo, in uini sextariis totidem incoquuntur temperate, ut non dissoluantur, deinde mellis despumati librae octo, piperis unciae octo, petroselini, anisi, singuli quadrantes. zingiberis quincunx, spicae nardi fescuncia, caryophylli uncia, ipsis admiscuntur: omnia contusa ac modice incocta usque ad iusculi spissitudinem auferuntur, quibus refrigeratis fragmenta simul cum iure componuntur.

*Medicamentum diatrion pipereon ex triplici pipere.*

**P**iperis communis, albi, & longi, singulorum drachmae septem, zingiberis, anisi, thymi summitatum, singulorum drachmae duae, mellis quod satis est.

*Aliud, Oribasii.*

**P**iperis albi unciae duae, piperis nigri, & longi, spicae nardi, cinnamomi, ameos, caryi, hyssopi, feselis, dauci, petroselini, singulae unciae, zingiberis drach. quatuor, mellis librae tres.

Aliud.



*Aliud.*

**P**iperis communis quadrans, albi uncia, longi tantundem, petroselini, cinnamomi aut cassiæ duplicatæ, zingiberis, singulorum uncia, mellis uncia una & uiginti, uel quod satis est. ego etiam thymi comæ unciam miscui.

*Diospolites.*

**C**Vmini aceto macerati torrefactique uncia piperis, zingiberis, singulorum uncia duæ, rutæ uiridis fescuncia, nitri drachmæ duæ, & semis: melle excipitur.

*Medicamentum dia Calamynthes, id est,  
ex Calamintha.*

**P**etroselini, pulegii, seseleos, calaminthæ, singuli quadrantes, apii, seminis uncia.

*Medicamentum dia citriu, hoc est, ex malo medico, tardè concoquentibus efficax.*

**A**Ceti heminæ tres, mali medici carnis libra, hyssopi, rutæ, singulorum fasciculus: per noctem in aceto madefacta ad tertias decoquuntur, expressaq; proiciuntur: aceto miscetur: mellis sextarius, rursusq; incoquuntur ad mellis spissitudinem: ubi incrassata fuerint, insperguntur asari, meu, piperis albi, singuli sextantes: exhibetur cochleare mane, & dormituro.

*Picra, hoc est amara, compositio Galeni.*

**A**Loes drachmæ centum, xylobalsami, mastiches, croci, spicæ nardi, asari, cinnamomi, singulorum drachmæ sex. Quidam addunt etiam iunci odorati floris & cassiæ utriusq; drachmas sex. exhibetur drachma ex hydromelite.

*Picra ex oxymelite, ad stomachicos, uterum,  
& aquam inter cutem.*

**A**Loes uncia quatuor, phylli uncia duæ, costi, cassiæ, amomi, iridis singulorum drachmæ, fœniculi radice corticis libra, mastiches, nardi gallicæ, zingiberis singulorum drachma, piperis drachma, meu drachma, aceti, mellis, utriusque sesqui sextarius: fœniculum in aceto prius excoctum proicitur, deinde mel additur. Vbi usque ad melleam, spissitudinem incoxeris: reliqua detrita insperges.

O 3

Medicamentum



*Medicamentum ex lupino iecore præstantissimum.*

**G**entianæ, chamæpityos, petroselini, marrubii, succi arcii, sinapis, scolopendrii radices, panacis, minii, erythrodani, brassicæ feminis, aristolochiæ longæ, piperis albi, spicæ nardi, costæ erucæ feminis, eryngii radices, polii, echii, eupatorii, baccarum iuniperi, lupini iecoris, helenii, pares modi: melle discocto excipiuntur, mulsoque probè cocto, ad nucis auellanæ magnitudinem dantur.

*Theodoretus dia anacardion.*

**A** Nacardiorum fescuncia, croci, crassiæ, philly, spicæ, nardi, cariophylli, meu, agarici, iunci odorati floris, rheu, epithymi, singulorum drachmæ quatuor, acori, piperis, singulorū fescuncia, aloes uncia tres, saxifragæ, mastiches, iridis illyricæ, singulorum fescuncia, myrobalanorum uncia, mellis libræ sex, uel quantum sufficit.

*Theodoretus altera dia anacardion.*

**A** Loes drachmæ sexaginta, agarici drachmæ uiginti quatuor croci, cassiæ, rheupontici, acori, cinnamomi, mastiches, singulorum drachmæ decem: costæ, rutæ feminis, piperis albi, singulorum drachmæ octo, spicæ nardi drachmæ tres, xylobalsami, asari, chamædryos, meu, singulorum drachmæ quatuor, mellis quod satis est. Nonnulli hic quoque addunt anacardia duo, datur drachmis binis cum mulsa.

*Medicamentū cyphoides, ad iecorosos & pectoris uitia.*

**V**æ passæ carnis drachmæ uiginti quinque, croci drachma, calami odorati drachmæ duæ semis, bdellii drachmæ duæ & semis, cassiæ sesquidrachma, cinnamomi tres oboli, spicæ nardi totidem, iunci odorati drachmæ duæ semis, myrrhæ, resinæ terebinthinæ, singulorum drachmæ quatuor, aspalathi ramenti oboli duodecim, mellis drachmæ sedecim, uini quantum sufficit.

*Aliud cyphoides, Alexandri.*

**C**Roci, cinnamomi, bdellii, singulorum drachmæ quatuor, myrrhæ, calami aromatici, singulorum, drachmæ duæ, aspalathi, iunci odorati floris, singulorum drachmæ tres, cassiæ, nardi, singulæ drachmæ, terebinthinæ resinæ drachmæ sedecim, uæ passæ carnis drachmæ centum sexaginta, mellis sesquihemina, uini Chii quod sufficit.

Dia



*Dia bacanu medicamentum, Hepatis accommodatum.*

**B**Acani uncia, costi tantundem, phylli scrupula octo, piperis albi scrupula sex, spicæ nardi totidem, mellis quod satis est, datur cochlearium cum temperatura conditi.

*Medicamentum Zopyrios.*

**M**Yrrhæ drachmæ quinque, croci, cassiæ, singulorum drachmæ quatuor, cinnamomi drachmæ tres, spicæ nardi drachmæ duæ, iunci odorati floris tantundem, piperis albi sesquidrachma, thuris drachma, costi drachma, mellis quod satis est.

*Compositio pæonia.*

**S**Tyracis calamitis drachmæ sex, thuris, amomi, croci, singulorum fescuncia, spicæ nardi drachmæ sex, phylli drachmæ duæ, piperis albi drachmæ sex, & communis octo, myrrhæ uncia, costi tantundem, mellis quod satis est.

*Catapotia Dositei ad iecur inscripta.*

**A**Loes uncia, spicæ nardi, phylli, costi, singulorum scrupula duo, agarici scrupula octo, mastiches scrupula tredecim, epithymi scrupula quatuor, rheu scrupulum.

*Oxymeli splenicum, hoc est, lieni dicatum.*

**C**Apparis radicū corticis, scolopēdrii, spicæ nardi, asari, iridis iunci odorati floris, iunci quadrati floris, anisi, cumini, fœniculi, acori, ericæ fructus, singulorū uncia, myricæ foliorū, salicis foliorū, apii radicis, thuris arboris, scillæ, singulorum uncia duæ, aceti sextarii tres, mellis tantundem, guttæ ammoniaci unc. tres. præparatum modo scillini, duobus cochleariis exhibetur.

*Oximeli, calculosis efficax.*

**S**Axifragæ, betonicæ, graminis, adiathi, spicæ nardi, carpesii, asari, eryngi, singulorū unc. petroselini macedonici, rutæ seminis, singulorū semuncia, fœniculi uiridis, iridis, scillæ tostæ, chamedaphnes, singulorū unc. duæ, capparis, capparis radicū corticis unc. tres, si unc. duæ, aq. aceti, mellis, singulorū sextarii duo.

*Phusca, ad conterendum calculos.*

**P**Vlegii, mastiches, apii seminis, menthæ siccæ, singulorum uncia, salis communis torrefacti libra, coriandri seminis. spicæ nardi, anisi, ameos, singulorum scrupula sex, phylli scrupula quatuor, piperis albi semuncia, uel communis uncia, lithospermi unc. sex, betonicæ totidem, aceti generosi

O 4 sextarii



sextarii quinq; omnia contusa, cribrata, & in tenuissimū polli-  
nem detrita, per triduum aceto madescunt, deinde diebus quā-  
draginta inuoluantur: ubi usus inciderit, nigrum cicer, aspara-  
gi radicem, apium, & adianthū decoquis, in huius decocti mi-  
turam heminas duas aceti superinfundis, & ægro in calido bal-  
neo solio propinas. Nonnulli uerò pulueris ex prædictis spe-  
ciebus, scrupula duodecim cum posca dictarum herbarum iuri  
temperata exhibent, & nihilo minus medicamentum proficit.

*Conditum calculos confringens.*

**P**iperis albi, saxifragæ, spicæ nardi, lithospermi, betonicæ,  
singulorum uncia, petroselini, phylli, singulorū sescuncia  
rutæ sylvestris seminis semuncia, mellis sextarius, uini ascalo-  
nitis sextarii sedecim.

*Medicamentum ex sanguine hircino.*

**Q**uum uua inceperit maturescere, hirci ætate florentis  
sanguinis in sole siccati cochlearia duo calculosis exhi-  
beto cum passo cretico. Quidā uerò amomi & phylli, utriusq;  
treis uncias miscent. Alii etiam myrrhæ quatuor scrupula.

*Excicadis medicamentum nephriticum.*

**L**ithospermi, raphidis piscis combusti, seselis, singulorū un-  
cia, ameos, cucumeris satiui, seminis, saxifragæ, uue passæ  
acinis exemptis, althææ seminis, phaseoli albi, lyncurii, singulo-  
rū semuncia, spicæ nardi, phu, meu, lapidū ex spongiis, singulæ  
drachmæ, adianthi, paliuri seminis interioris, si sicci, rubi radi-  
cis, graminis, polypodii: singulorum drachmæ tres, hircini san-  
guinis desiccati ut dictum est, scrupula sex, cicadērum siccarū si  
ne capite, pennis, & pedibus, triens, piperis drachmæ sex, mel-  
lis probè cocti quod satis est, datur instar nucis auellanæ in con-  
dito tribus obolis, aut decocto saxifragæ, aut sii, aut radicis a-  
sparagi, aut rorismarini, aut quinq; folii, aut struthii radicis.

*Medicamentum ex lithospermo.*

**L**ithospermi, betonicæ, saxifragæ, petroselini, piperis albi pa-  
res portiones cum melle excipiuntur.

*Medicamentum ex marrubij semine.*

**P**iperis albi & nigri, dauci cretici, cucumeris satiui, seminis,  
foeniculi, seminis, marrubii seminis, petroselini macedoni-  
ci, pyrethri, zingiberis, phylli, singulæ uncia, mellis qđ satis est

Medicamentum



*Medicamentū ex lapide Iudaico, qui tecolithos dicitur.*

**S**picæ nardi, hyssopi, lapidis Iudaici, singulorū scrupula octo piperis scrupula duodecim, zingiberis, petroselini, costi, saxifragæ, singulorum scrupula sex, cassiæ, apij seminis, singulorū scrupula tria, cyperi scrupula sex, ramenti eboris scrupula quatuor, cardamomi ligni scrupula sex, seminis lini scrupula quatuor, mellis quantum sufficit.

*Medicamentum ex sylvestris malæ semine.*

**C**ucumeris domestici seminis drachmæ duodecim, alterci seminis drachmæ sex, cicutæ seminis drachmæ tres, (alijs sex) opij, fœniculi, malæ sylvestris seminis, croci, singulorum drachmæ tres, apij seminis drachmæ sex, cassiæ drachmæ quatuor, amygdala basilica decem, nuces auellanae totidem, asari drachmæ quatuor: passo cretico excepta dantur tribus obolis, si febris abest, cum sapa. Nonnulli melle excipiunt.

*Medicamentum ex bellarijs nephriticis, vesicæ & renum exulcerationi idoneum.*

**V**æ passæ albæ cui acini sint exempti, nucleorum pini recentium, singulorum uncia duæ, cucumeris seminis cortice exuti, baccarum myrti nucleo ablato, amygdalarum amararum, pulmarum pinguium, apij seminis, papaueris seminis: croci, singulorum drachmæ, myrrhæ uncia duæ instar drachmæ ex passo ieiuno propinatur.

*Satyriacum antidotum.*

**Z**ingiberis, satyrij superioris, singulorū drachmæ octo, scinci caudæ, meu, asari, petroselini, cardamomi, seselis, singulorum drachmæ quatuor, erucæ seminis, cinnamomi, singulorum drachmæ tres, hormini, piperis albi, cnici seminis, singulorum drachmæ duæ, iunci odorati floris, spicæ nardi, singulæ drachmæ, sanguinis hircini mystrum. datur drachma imbecillioribus cum lacte.

*Catapotia ex xylomacere, dysentericis utilia.*

**X**ylomaceris, opij, rhen, singulorū scrupula sex, gallæ, myrrhæ, singulæ uncia, excipiuntur uino spathis.

Podagrica



*Podagrica remedia.*

*Medicamentum ex corallio, quod diacoralliu uocatur, podagricis idoneum.*

**R**heu barbarici, pæoniæ, myrrhæ troglodytidis, spicæ nardi, singuli sexrantes, phylli uncia, caryo phylli grana quindecim, anagallidis phœnicei coloris quam uocant corallion, semuncia, aristolochiæ longæ uncia quatuor, & rotundæ totidem, datur instar scrupuli quotidie, concoctione probè defuncto. Incipiendum uerò est ab æquinoctio autumnali, quod circa uigesimum quartum mensis septembris diem accidit, capiendumque deinceps ad dies quinquaginta, deinde relinquetur quindecim dierum interuallo, atque sic facere oportet quousque dies quibus assumitur abscreuatur treceteri sexagintaquinque. Sub caniculæ ortu omnino abstinendum est, hoc est, à uigesimo quarto die Iunij usque ad Augusti finem. Vitari debet uenus, carnes præsertim suillæ, salsamentum, garum, beta, daucum, menta, & lactuca non cocta, peponesque, piscium capita, cammori, tum qui molli, tum qui testacea cute præditi sunt, legumina omnia, & summatim quæ crassi succi sunt, uinum nigrum & liberalius. Balneum conuenit & quotidianum exercitium, uel pedibus, uel equo, uel gestatione obitum. Qui uerò habitu siccior sunt, etiam si plenius nutriantur, non offenduntur.

*Agapeti compositio ad podagram.*

**P**hylli, rheu barbarici, croci, spicæ nardi, myrrhæ troglodytidis, costi, chamædryos, singuli sextantes, aloes hepaticæ quincunx, hyperici, pæoniæ, singuli quadrantes, aristolochiæ longæ, phu, meu, damasonij, anagallidis, singuli trientes: utendi modus idem est qui in compositione dia coralliu.

*Compositio atactos ad podagram.*

**P**hylli, meu, damasonii, anagallidis cui flos est cæruleus, erythroduni, mastiches, croci, cassiæ aloes hepaticæ, gentianæ, chamædryos, singulorum uncia, caryophylli, asari, piperis albi & nigri, singulorum semuncia, spicæ nardi, myrrhæ, rheu barbarici, pæoniæ radices, aristolochiæ longæ & rotundæ, singulorum uncia duæ. Similis usus est.

Procli



*Procli compositio, podagra & coxendicum do-  
loribus accommodata.*

**C**Hamedryos uncia nouem, centaurij uncia octo, aristolochia, uncia septem, gentiana uncia sex, hyperici uncia quinque, petroselini macedonici uncia quatuor, meu uncia tres, agarici uncia duæ, phu uncia una, mellis attici hemina duæ.

*Medicamentum ex rebus septem constans, ad eadem,*

**H**yperici, aristolochia longæ, singulorū uncia, cetaurii, chamædrysos, agarici, singulorum tres uncia chamædrysos uncia sex, gentiana uncia quinque. Nonnulli etiā petroselini unciam addunt, mellis drachmas quinque. datur instar drachmæ.

*De pastillis.*

*Cap. XII.*

**P**astilli græcè trochisci à figura rotularum nominantur. Tres sunt eorum species, alij nanq; sunt potabiles, alij in aluum dantur, alij delinuntur. Ex his igitur qui potantur, alij comprimunt aluum, aut sanguinem, aut aliam quampiam fluxionem, refrigerando, aut astringendo, aut opplendo, aut desiccando eā cohibentes: quemadmodū qui cōstat. spina ægyptia, & q; seminibus, cōsimilem q;: alii dolorē sopiūt, uel q; sensum obstupefaciunt, ut crocodes dictus, uel q; humores diffundāt, ueluti ex aromatis cōfecti: alii lienem, aut renes, aut iecur obstructione liberāt, ut qui ex amaris amygdalis confit. Eorū uerò qui in aluū indūtur, nonnulli acrimoniā obtundūt, ut in dysenterijs, quemadmodū ex pompholyge, amylo, terra samia, cū cremore ptisanæ aut eiusmodi aliquo iniecti, nonnulli alui aut sanguinis profluuiū astringūt, sicuti qui alumine, acacia, & omphacio cōstant, qualis est qui Philippo ascribitur, uel ex spina Aegyptia, cū rosarū succo, aut plātaginis inditi: nonnulli adurentes, dysenteria quā ulcera depascētia exerce, idonei: ex sandaracha, auripigmento, calce: charta cōbusta, cōfecti. Inferentur aut cū succo lēticulæ aut oryza, sic ut intestinū prius muria elotū sit, ægerq; cibū & potū antea assumpserit, ne aliquid medicamenti uirtutis reliquū, ad stomachū rapiatur. Ceterū utiles sunt pastillii qui ab inferioribus partibus iniiciūtur, ad affectus potissimū qui infra umbilicū infestant. Nā superius uis ipsorū peruenire nō pōt. At q; delinunt simileis illis uireis obtinēt: uerū astringētes, in herpete, papulis, q; dicunt exāthemata, intertriginib. sāguinis eruptionib. & fluidis ulcerib. p̄ficiunt: cuiusmodi



modi est Andronius & Polyidæ qui uero obtundūt, carbūculis & maleficis ulceribus expediūt: utpote Leucus dictus. & dialorion. urentes, sicut iam comprehensi, cuius generis habentur, & Faustiani, serpentibus naturalium & sedis ulceribus, pre rygijs, & carnosis narium uitijs accommodantur.

*Pastillus aster dictus.*

**C**Roci, opii, castorei, spicæ nardi, cassiæ, myrrhæ, lemnis cretæ, mandragoræ corticis, singulorum triens, dauci, apij, anisi, fœlis, alterci, seminis, styracis, singulorum drachmæ octo: uino læuigantur.

*Pastillus trigonus.*

**A**Pii seminis, alterci seminis, singulorum drachmæ duæ, anisi drachmæ quatuor, opii drachmæ duæ, anisi drachmæ quatuor, opii drachmæ tres: aqua teruntur.

*Pastillus à seminibus diaspermaton dictus.*

**A**Nisi, ameos, fœniculi seminis, singulorum drachmæ quatuor, apii seminis, opii, alterci seminis, singulorum drachmæ duæ: aqua læuigantur.

*Pastillus crocodel hoc est croceous.*

**A**Nisi, dauci cretici seminis, singulorum drachmæ quatuor, myrrhæ, castorei, singulorum drachmæ duæ, croci, opii, singulorum drachmæ tres, apii seminis, styracis, singulorum drachmæ quatuor, alterci seminis drachmæ sex: ex aqua deteruntur.

*Pastillus diarbodon.*

**A**Caciæ, gummi, rosarum floris, balaustiorum, hypocistidis succi, gallarum, singulorum drachmæ tres, rosarum uiridis succi, plantaginis seminis singulorum drachma, lycii Indici tantundem.

*Pastillus dia coralliu.*

**A**Lterci seminis, thuris, singulorum drachmæ octo, terræ samiac, corallii, minii Sinopici, opii, singulorum drachmæ quatuor, amyli, balaustiorum, singulorum drachmæ duæ: succo polygoni excipiuntur.

*Pastillus dia electru, hoc est, ex succino.*

**H**erbæ pulicaris uncia quinque, mastiches uncia quatuor, succini scobis, iridis, croci, singulorum uncia quatuor, opii uncia duæ.

Pastillus



*Pastillus ex spinæ Aegyptia.*

**S**pinæ Aegyptiæ, rhu, thuris, acaciæ, aluminis scissi, hypocistidis, succi, gallæ, lemnæ cretæ, coralli, symphiti, terræ samia, aloes, ladani, pares portiones: uino subiguntur.

*Alius pastillus, quem Galenus aphrodisiasti-  
con calidion scribit.*

**S**atiuæ punicæ floris, spinæ Aegyptiæ, balaustiorum hypocistidis succi, acaciæ, singulorū drachmæ sex, lycii, rhu pontici, opii singulorū drachmæ quatuor, myrrhæ drachmæ duæ, excipiuntur uino myrteo, uel rosarū baccarumve myrti decocto.

*Clidion Oribasii, ad dysentericos & cæliacos.*

**G**allæ omphacitidis drachmæ octo, opii drachmæ quatuor. ex aqua finguntur catapotia. dantur terna aut quaterna.

*Pastillus ex cornu ceruino dysentericis & sangui-  
nem excreantibus salutaris.*

**C**ochlearū drachmæ duodecim, cornus ceruini cōbusti gal-  
læ torrefactæ, acaciæ inarefactæ singulorum drachmæ quin-  
que oboli duodecim, baccarum myrti nigre drachmæ quindecim, opii siccati, hypocistidis succi singulorum drachmæ quin-  
que, abruscæ floris drachmæ sex mandragoræ radicis succi, ter-  
ræ samia quæ aster dicitur, singulorū drachmæ duodecim, rhu  
obsoniorum drachmæ quatuordecim, malicorii torridi drach-  
mæ septē, thuris drachmæ octo, piceæ corticis exarefacti drach-  
mæ quatuordecim, alterci seminis siccati drachmæ decē, rhu  
coriarii sextarii duo, uini nigri quantum rhu incoquendo ut  
unum fias crassissimum, satis est, atque hoc percolato reliqua  
excepta in pastillos coguntur.

*Pastillus amazonum.*

**A**prii seminis, anisi singulorum drachmæ sex, absinthii comæ  
drachmæ quatuor, myrrhæ, piperis, opii, castorei, singulorū  
drachmæ duæ, cinnamomi drachmæ sex aqua subiguntur.

*Pastillus ex amygdalis amaris.*

**A**nisi, aprii seminis, asari, amygdalarum amararum, absinthii  
comæ, paria pondera: ex aqua finguntur pastilli, qui drach-  
mam pendeant: dantur febricitantibus ex mulso: febricitanti-  
bus cum hydromelite.

Pastu lis



*Pastillus ex erica, lieni dicatus.*

**E** Ricæ fructus drachmæ quatuor, piperis albi, nardi syriacæ, suffiminis, ammoniaci, singulorum drachmæ duæ: ammoniacum aceto soluitur, aridisque admiscetur. finguntur pastilli qui singuli drachmam expleant. exhibentur singulatim cum oxymelitis cyatho.

*Pastillus ex uesticarijs, diaphysalidon uocant.*

**C** Vcumeris satiui excorticati seminis uncia quatuor, alterci seminis, cicutæ, singulorum uncia duæ, fœniculi, rumicis seminis, croci, nucleorum pini, amygdalorum amarorum, opii, singulæ uncia, uesticariæ sextarii tres, uini quod sufficit.

*Pastillus Philippi, ad dysentericos.*

**B** Alautiorû, acaciæ, hypocistidis succi, opii, thu thuris, myrrhæ, croci, gallæ, aloes, rheu pontici, malicorii, baccarum myrti, singulorum drachmæ quatuor: excipiuntur uino austero, formanturque pastilli triobolares. dantur si febris abest, cum uino: febricitantibus, cum hydromelite,

*Pastillus musæ.*

**A** Luminis, aloes, myrrhæ, atramenti sutorii, singulorum scuncia, mali corii, croci, crocomagmatis, singulorû drachmæ sex. excipiuntur uino.

*Quomodo crocomagma paretur.*

**C** Roci uncia duæ, rosarû, amyli, myrrhæ, aloes, thuris, gummi, singulorum uncia, costi, spicæ nardi, singulorum drachma: uino subiguntur. At in capite de oleo crocino alia quoque crocomagmatis confectura dicetur.

*Pastillus neræ ex Heræ commentarijs.*

**M** Yrrhæ, aloes, croci, singulorum drachmæ octo, aluminis scissi drachmæ centum: aqua excipiuntur.

*Polyidæ sphragis.*

**A** Luminis scissi drachmæ tres, thuris drachmæ quatuor, myrrhæ drachmæ octo, atramenti sutorii drachmæ duæ, floris satiux punicæ drach. duodecim, fellis taurini drach. sex aliàs drachmæ sedecim, aloes uncia: uino austero excipiuntur.

*Passionis Pastillus.*

**S** Quamæ æris drachmæ duodecim, æris combusti, salis ammoniaci, aluminis rotundi, æruginis rasæ, thuris, singulo-

IUM



rum drachmę octo, uini quod sufficit.

*Pastillus Andronius.*

**S**Atiue punice florise drachmę decem, gallę drachmę octo, myrrhę drachmę quatuor, aristolochię rotundę drach. quatuor, atramenti sutorii, croci, aluminis scissi, crocomagmatis, misyos, thuris, singulorum drachmę duę: læuigantur in uino astringenti, uel aceto.

*Pastillus Faustini.*

**A**Vripigmēti drachmę duodecim, sandarachę drachmę sex calcis uiuę drachmę octo, chartę combustę drachmę myrti baccarū succo uel decocto excepta, in pastillos redigito, & cū myrti baccarū, lenticulę, & rubi radicum decocto immittito.

*Pastillus ex charta, dia chartiu appellatus.*

**C**Hartę combustę triginta duę, calcis, auripigmenti, sandarachę, singulę uncia: succo plantaginis excipiuntur.

*Pastillus cui nomen est thronus Marcellius.*

**C**Hartę combustę drachmę decem, sandarachę, auripigmenti, squamę æris, aluminis scissi, singulorum drachmę quatuor, balauftii drachmę tres, opii drachmę duę, calcis non restinctę drachmę tres, omphacii drachmę, hypocistidis succi drachmę tres: uino myrteo excepta coguntur in pastillos qui drachmas quatuor pendeant: ubi decoxeris in uino malicoriū, myrti baccas, & rosas usque ad tertias, dato pastillum unum aut in totum quatuor, ex sex uini cyathis.

*Pastillus à subere, dia phellon dictus.*

**G**Allę, chartę, fæculę uini, panis, singulorum concrematorum drachmę quindecim, in alio habetur etiam cornu cerui cōbusti drachmę quindecim, auripigmenti drachmę duę, sandarachę, calcis, utriusque drachmę quindecim, acacię, cerusę, singulorum drachmę quatuor, argenti spumę drachmę tres: uino læuigantur.

*Bithynus.*

**M**Alicorii drachmę decem, cadmię uncia tres, aristolochię gallę, panacis radicis, iridis, atramenti sutorii, aluminis scissi, chalcitidis, misyos, squamę æris, manne thuris (nonnulli etiam costi) singulorum sescuncia: aceto subiguntur.

Pastillus



*Pastillus dia castorin, ad ulcera, nomas  
& defluxiones.*

**C**Roci aloes, thuris, singulorū uncia, florū mali punicæ, aluminis scissi, castorii, mannæ thuris, æruginis rasæ, singulorum uncia, minii sinopici libra: excipiuntur uino ueteri.

*Pastillus dia castorin, colicis efficax.*

**M**Yrrhæ, castorii, singulorū scrupula sex, croci, opii, singulorum scrupula nouem, anisi, apii, seminis, dauci seminis, singulorum semuncia, alterci seminis scrupula octodecim.

*Pastillus dia œnelau, hoc est, ex uino & oleo mixtis, sedis & naturalium uitijis utilis.*

**C**eruse uncia decem, argenti spumæ uncie quinque, thuris, recrementi plumbi, aluminis scissi, singulorum uncia duæ uino maringæ experte læuigantur. in usu uino & rosaceo aut uino & myrteo soluuntur.

*Pastillus ex lapide phrygio, naturalium uitijis accommodatus.*

**L**apidis phrygii combusti restincti que ter primum butiro uel rosaceo, deinde uino, postea melle, uncie duæ, rosarum floris uncia quatuor, malicorii uncia.

*Pastillus dialotarion, quod est ex loto syluestri, ad sedis & naturalium uitia.*

**C**eruse, amyli, glaucii, croci, aluminis, æquales portiones: teruntur succo loti syluestris, aut uino.

*Pastillus leucas.*

**T**erræ samie triens, pompholygis, cerusæ, amyli, singuli sextantes, opii scrupula quatuor: aqua subiguntur.

*Pastillus dia alicacabu, hoc est, ex uesicaria.*

**S**pumæ argenti drachmæ uiginti quatuor, cerusæ drachmæ duodecim, aut una & uiginti, uesicariæ drachmæ octo, atramenti sutorii drachmæ quatuor, aluminis scissi tantundem, minii quod ad colorem satis est: aqua excipiuntur.

*Pastillus ex duplici ueratro, idem uerò ex duabus acacijs.*

**A**Cacie nigræ & fuluæ, glutini fabrilis (in alio piscium glutinis) singulorum uncia quatuor, guttæ ammoniaci, glaucii, aloes,



aloes, singulorum uncia duæ, thuris masculi, ueratri nigri & albi, singulorum uncia: aceto scillino excipiuntur, quum usus incidit eodem uel communi soluta, ante balneum, & rursus post id inunguntur.

*Pastillus Criogenes.*

**M**Yrrhæ, æris combusti, aristolochiæ rotundæ, æruginis rasæ, squamæ stomomatis, uerbenacæ rectæ, aluminis rotundi, singulorum uncia, aceti quantum satis est. decerpi autē debet uerbenaca, quum Sol est in ariete. Fit etiam emplastrum in hunc modum: pastilli, ceræ, colophonix, olei, par mensura, aceti quod ad læuigandum pastillum sufficit.

*Pastillus à nigro uiridique colore dictus melanchlorus.*

**M**Yrrhæ, aloes, squamæ æris combusti, auripigmenti, aluminis scissilis, & rotundi, iridis, chalcitidis, misyos, salis fossitii, atramenti sutorii, cerusæ, nitri, argenti spumæ, panacis radicis, cadmiæ, malicorii, gallæ, aristolochiæ rotundæ, squamæ stomomatis, æruginis rasæ, singulorum uncia, aceti quod satis est. Fit etiā hoc modo emplastrum: pastilli uncia duæ, colophonix, ceræ, olei, singulorum unc. sex, aceti qd̄ pastillo subigendo satis est.

*Pantolmius ad chironia maligna que ulcera, & defluxiones.*

**C**Assiæ, æris cremati, cerusæ, argenti spumæ, æruginis rasæ, aluminis scissi, rotundi, liquidi, & lateritii quod plinthicis dicitur, panacis radicis, aristolochiæ longæ & rotundæ, malicorii, atramenti sutorii, portulacæ, iridis astragalitidis, chalcitidis, misyos, guttæ ammoniaci, salis ammoniaci, æruginis ferri, squamæ æris, aloes, diphrygis, thuris gallæ, sarcocollæ, plumbi cremati, foliorum oleæ, sorios, myrrhæ, cretæ sutorix liquidæ, balustiorum, spinæ Aegyptiæ, sulfuris ignem non experti, nitri, rhu rubri, rhu syriaci, chrysocollæ, rhus coriarii, acaciæ, salis spumæ, omphacii, auripigmenti, singulorum pares modi: cum aceto diebus triginta, sub caniculæ lidere læuigantur.

*Pastillus Nymphodoti.*

**A**Phronitri uncia, nitri Alexandrini, saponis gallici, singulæ uncia, salis cappadocii, mastiches, gallæ, singulorum drachmæ quatuor, foliorum rosæ, amomi, amyli, singulorum uncia,

PAULI AEGIN.

P phylli



phylli drachma, aluminis scissilis, costi, singulorum drach. duæ,  
uini myrtei quod satis.

*Pastillus ex thapsia, hemicranico dolori efficax.*

**S**Vcci thapsiæ drach. sedecim, myrrhæ drach. octo, opopana-  
cis, euphorbi, singulorum drach. sex, nitri, liquoris patheni-  
ci, singulorum drachmæ quatuor, piperis, sagapeni, singulorum  
drach. duæ, aceti quantū sufficit. Vbi utendum est, aceto inun-  
ctum post horas sex abluito: at si uoles remissiore uti, cerato pa-  
ri exceptum illinito noctemque finito.

*Pastillus qui ano subiicitur, hypotheton dictus, ad  
dysenteriam, & ani dolores.*

**T**erræ samiæ, amyli, singulorum quadrans, croci sextans, aca-  
ciæ, tragacanthæ, singulæ unc. castorii, thuris, lycii, siagulæ  
semuncie: in calidioribus, etiam opii semuncia adicitur: her-  
bæ pulicaris succo excipiuntur, singunturque pastilli.

*De medicamentis quibus aridis utimur, & smeg-  
matis. Cap. XIII.*

**A**Ridorum medicamentorū quæ sanè & cataplasmata  
ab inspergendo uocantur, alia ulceribus congruunt,  
alia cuti applicantur: ex iis quæ ulceribus faciunt, quæ  
dam cauis carnem inducunt, quædam ex crescentia reprimunt,  
quædam cicatricem generant, quædam urunt exeduntq; nonnul-  
la sanguinem coercent. Quæ igitur carni generandæ sunt, uel  
repurgando sordida, carnem creant, ut quæ constant ex eruo,  
aristolochia, iride, panace, myrrha, thure, aloë: uel humiditatē  
circumfluam desiccando, ueluti quæ fiunt ex ære, diphryge, squa-  
ma, charta combusta, piceæ cortice, & spina, quæ & ipsa cicatri-  
cem obducunt: uel acrimoniam rosionemq; obtundendo, qua-  
liæ sunt ex pompholyge, amylo, cerusa, fece combusta, ostreis  
crematis, terra samia, & consimilibus, & quæ compositorū ex  
his uireis habent. Ex reprimentibus lenia quidē sunt, quæ con-  
stant squama æris, quæ misy, chalcitide combustis, & galla: ua-  
lentiora sunt, quæ atramento sutorio, ærugine, misy, chalciti-  
de, ignem non expertis. Vrentia uerò excedentiaque fiunt ex  
calce, auripigmento, sandaracha, & fæce uini combusta, quam  
uocant speclen, hoc est fæculam: atque hæc omnia compo-  
nuntur, cæterum in tenuissimū redacta pollinem, si ulceribus  
inspergantur



inspergantur minus rodunt: si spissiora, magis, idque urendo faciendūq; crustā. Sanguinē reprimētia aut astringendo, aut refrigerādo, aut siccando, aut opplēdo illum coercent, quorū materiam capite de pastillis sumus exequuti. At eorum quę cuti admouentur, alia abstergunt exteruntq; , ut ex cimolia, pumice, lomento, fermento hordei, peponū carne, & salis flore confecta: alia extenuant & discutiunt, qualia sunt ex ueratro, alcyonio, sulfure, herba pediculari, sinapi, pyrethro, semine roris-marini, terra lemnia, sepię testa: atq; hæc, assumpta calce & auri pigmēto cū liquore aliquo, pilis abolēdis idonea, & smegmata fiūt. Quædā capiti admouētur, ut fluxū ex eo ruētē desiccēt, cuiusmodi sunt ex nitro, sale, galla, malicorio, & id genus aliis præparata. oīa uerò smegmata cuti nō inūctæ accommodari debēt.

*Cephalicus paluis, capiti conueniens.*

**E**Ruorum quincunx, iridis fescuncia, manne thuris fescuncia, aristolochiæ, squamę eris, singulorum fescuncia.

*Alius.*

**P**Icæ corticis drach. sex, thuris drach. quatuor, pumicis tantundem, iridis drach. duæ, resinæ siccæ drach. sex, aristolochię drach. duæ.

*Ex aloe, dia aloes, dicitur.*

**A**Loes drach. sex, erui drach. octo, mannæ thuris drach. quatuor, gallæ drach. tres, aluminis scissi drach. duæ.

*Diaspecles, hoc est, ex face uini combusta, Mannethonis.*

**C**Admiæ combustæ & illotæ nncia, terræ samiæ uncia, facis uini combustæ unc. quatuor, lapidis specularis unc. quatuor, thuris unc. quatuor, quidā & amyli uncias quatuor addūt.

*Melitera Oribasii.*

**C**Halcitidis, squamæ æris, gallæ, balauftiorum, aristolochiæ longæ singulorum uncia, malicorii, aluminis scissi singulorum semuncia.

*Medicamentum ex ostreis, dia ostreon dicitur.*

**C**Admiæ, thuris, singulæ uncia ostreorum combustorum uncia tres.

*Medicamentum ex thure, dia Libanu.*

**A**Rgenti spumæ, thuris, squamæ æris, mali punici, amyli, cerusæ, pares modi.



*Aphroditarium.*

**T** Huris, squamæ æris, mali punici, amyli, cerulæ, paria pondera.

*Rhodia, ad suppressendum sanguinem, ulcera depascentia, & excrescentia.*

**G** Allæ crudæ drachmæ sex, gallæ cōbustæ restinctæq; uino aride drachmæ duodecim, squamæ æris nigri, si non sit, rubri, drachmæ octo, atramenti sutorii, drachmæ uigintiquatuor, aluminis scissi drachmæ uigintiseptem; teruntur diebus sat multis.

*Medicamentum xanthon, hoc est, flauum.*

**C** Halcitidis combustæ drachmæ quadraginta, atramenti sutorii usti drachmæ uiginti, misyos cremati drachmæ decem, æris usti drachmæ quinque.

*Medicamentum à murino colore psaron dictum.*

**M** isyos quincunx, gallarū triens, chalcitidis sextās, squamæ æris tantundē, atramenti sutorii uncia, æruginis, rasæ sextās.

*Medicamentum heliocæ, adurens.*

**A** Vripigmenti libra, calcis uiuæ libræ duæ: aqua læuigato per dies caniculæ, deinde siccatis utitor.

*Antheron.*

**C** Yperi drachmæ octo, myrrhæ drachmæ duodecim, sandarachæ drachmæ tres, rosarum floris drachmæ duæ, croci drachma, crocomagmatis, aluminis scissi, iridis illyricæ, singulorum drachmæ duæ.

*Medicamentum ex charta, quod Græci dicunt dia chartu ad nomas oris potissimum & naturalium ulcera.*

**A** Eris squamæ, chartæ combustæ, singulorum drachmæ octo, auripigmenti, sulfuris uiui, singulorum drach. duodecim, plumbi cremati drach. sex. Ad humidiores quidē sepedonas, sicco utitor: ad siccas, rosaceo macerabis, nonnūquā & melle cū rosaceo.

*Medicamentum ex myrto syluestri, dia oxymyr-sines appellatum, ad eadem.*

**R** Hus coriarii uncia duodecim, myrti syluestris foliorum, sandaraches, singulorum drachmæ octo, salicis foliorum siccorum, malicorii, singulorum drachmæ sex, aluminis scissi, chrysocolle, aloes, chalcitidis crudæ, squamæ, auripigmenti, salicis



lis communis, singulorum drachmę quatuor.

*Medicamentum Massalioti.*

**N**itri, opii, chryfocollę, lapidis afii, sandarachę, mifysos, chalcitidis, aluminis sciffi, diphrygis, æqualia pondera: sicco utitor.

*Smegma aridum, quod asclepios dicitur.*

**B**accarum lauri, nitri alexandrini, salis torrefacti, salis cappadocici, stillę ammoniacę, aphronitti, pumicis, singulorū libra, ueratri nigri, herbę lanarię, pyrethri, fęculę quę est uini fęx cōbusta, herbę pedicularię, sinapi, iunci rotundi, aluminis sciffi, iunci quadrati floris, iridis, gallę, singulorum uncia sex, sampsuchi libra, uiticis seminis, pulegii, farinę fabarum, & lupini, singulorum nncia sex, chamęleuntis nigri, sulfuris, gummi, thuris, piperis, cucumeris syluestris radice, marrubii, cimolię, pęonię, sepia testę, fęnugręci, phylli, costi, cumini, euphorbi, spicę nardi, singulorum uncia tres. Alexander autę pręter hęc adiicit salis ex nitri fontibus, salis Tragasei, singulorum libram, adarces uncia, aluminis liquidi. nardi gallici, cnici, cocci gnidii, graminis aridi, brionię siccę, singulorum treis uncias.

*Smegma peponatum.*

**T**huris, mastiches, stillę ammoniacę, singulę uncie, tragacanthi fęscūcia, succi uuę acerbę dodrans, peponis seminis recenti, quadrās, simile sextarii quinq;, ouorū unius & uiginti albumina, iridis triens. quidā & ueratri nigri sextantę miscent.

*Aliter Critonis.*

**L**omenti modius, simile sextarii quatuor, trifolii, glandis unguentarię, iridis illyricę, singulorū libra quatuor, guttę ammoniaci, costi, singulorum libra, ouorum tenuia aquata, peponū carnis sextarii duo, uuę acerbę succi tantundē: macerantur: redactęq; in pastillos siccantur, deinde contusa incretaq; in usum adhibētur. **ALITER.** Tragacanthę, thuris, mastichę, guttę ammoniaci, singulorū drachmę decē ompahcii drach. quinque, similaginis sextarii quinque, candidi ouorum liquoris uncia, peponū carnis uncia decem: pręparatur ut suprà dictū est.

*Smegma quod capitis defluxiones exiccet.*

**N**itri Alexandrini rufi uncia quinq;, salis communis torrefacti fęscūcia, salis cappadocii uncia: hęc aceto quām acer



rimo macerata in patinam fictilem coniiciuntur, atq; in furno uruntur, dum redigantur in carbones: inde refrigeratis læuigatisque ad abstergendum utitor, uinum in balneo instillans.

*Sapo Constantini.*

**R**osarum siccarum, aloes, gallæ, malicorii, malabathri, sarcocollæ, singulorum tres unc. balauſtiorum, myrrhæ, sandarachæ, spicæ nardi, singulorum unc. duæ, costi uncia, saponis gallici libra, excipiuntur iure lupinorum.

*Puluis pilos abolens, unde psilotrum dicitur, ad podagram.*

**M**astiches, thuris masculi, herbæ pediculariæ, ueratri albi spumæ argenti, singulorum unc. tres, phylli, amyli, ueratri nigri, lapidis asii floris, singulorum uncia, alcyonii, pumicis costi, cimoliæ, sampſuchi, singulorum unc. tres spicæ nardi uncia. Nonnulli etiam aloes, unciam addunt. contusum in uase puluerem reseruato: ubi necessitas inciderit, oryzæ cremor & ptisanæ in ollam coniicitur: postquàm inferbuerit, pulueris, saponis, gallici, auripigmentis, aluminis scissi, sandarachæ, singulorum, sescuncia additur, calcis uiuæ recentis libra. Utitor unguento mense ter. nono uidelicet lunæ die, decimonono, & uigesimalono, idq; usque ad annum: post hunc, semel mense, quum uigesimalonum luna diem agit.

*De medicamentis liquidis quæ illinuntur, ad oris uitia unde stomatica dicuntur, ac guttur accommodatis. Cap. XIII.*

**Q**vanto rarior molliorq; est summa oris tunica, cute quæ corpus totū obtegit, tanto est magis stomaticorū medicaminū usus euariat. Quū igitur inflāmatio incipit, ea requiruntur medicamenta quæ humoris influxū repellāt, cuiusmodi sunt, arida quidē, omphaciū galla omphacitis, succus rhu, hypocistidis, aluminis, cortex piceæ, & thuris, balauſtia, & generatim oīa quæ astringūt, ita ut insuauē ingratamq; & lethalē uim non repræsentent: liquida uerò, succus mororū tum quæ batina, tū quæ sycamina dicuntur, itē nucū uiridium corticis, & mali punici, præsertim acidi, & malorū cotoneorū, mustū aminæūq; mel aut per initia solū ut medicamenta adhæreant temperatur. at quū humor subſtiterit, misceri debēt quæ concoquant



coquant & mediocriter dissipēt, cuius generis est crocus, myrrha, & dulcis radiculae succus at per totū id tēporis quod statū & declinationē intercedit, rectē usurpatur mixtū aliquod ambobus, repellente puta & discussorio: & per initia quidē superbunt repellentia, deinde discutientia: in morbi declinatione solis uti discutiētibus absq; astrictione oportet, qualia sunt nitrū aphronitrū, organū, hyssopum, thymus, nepita, iris, belasa, con-fimilaq; . liquor tunc lapa esto, tū quæ ex mulso decocto, tum quæ ex caricis & palmulis conficitur, ipsumq; dulce mustū cū melle ubi uerò ueluti reliquiae quædā inflammationis remanserint, etiam sulfur ignē non expertum miscebimus: succū autē primum cū melle incoquemus, dū liquidioris mellis spissitudo fiat, inde sic arida in tenuissimū pollinē pertrita inspergemus, postea modicē coquemus, quoad oīa, exactē in unitatē cogan-tur, quo factō in uitreum uas medica mentum transfundemus.

*Dia moron simplex.*

**M**ororum succi sextarii tres, prius excoquuntur dum ter-tia portio fuerit absumpta, adiectoq; mellis sextario, rur-sus incoquuntur ad melleam spissitudinem.

*Dia moron compositum.*

**M**ororum succi heminae sex, usque ad strigmenti crassitudi-nem coquuntur, deinde admixto læuis croci drachma, myrrhæ duabus, succi uuæ acerbæ una, aluminis scissi ternis obolis, mellis hemina, quousque spissescant incoquuntur.

*De moris batinis, quæ rubi fructus sunt.*

**I**tem quod ex moris batinis constat, eodem modo prepara-tur maiore ui astrictoria præditum.

*Dia caryon, quod est ex nucibus, simplex.*

**V**iridium nucum corticis contusi succi heminae quinq; mel-lis hemina, coquuntur ad dimidias.

*Dia caryon compositum.*

**P**er initia quidem & in uigore oris inflammationū, misceri de-sceri debēt croci, & aluminis, singulę drach. myrrhæ duo, in declinatione uerò ad discutiendum, nitrī drachma, sulfuris tan-tundem, cum prædicta nucum corticis succi, & mellis mēsurā.

*Medicamentum ex succo mali punici.*

**M**ali punici cui nuclei sunt adēpti dulcis succi sextarii qua-



tuor, mali punici acidi succi sextarii duo, mellis sextarius, myrrhæ aminæ drachmæ octo, crocomagmatis, gallæ singulorum drachmæ octo, aluminis scissilis drachmæ quatuor, iridis illyricæ drachmæ octo, omphacij drachmæ octo: conficitur quemadmodum quod moris constat.

*Aliter idem,*

**M** Ali punici dulcis cum corio suo combusti succi sextarii sex, mellis generosi sextarius, aluminis scissi uncia, myrrhæ semuncia.

*Medicamentum è musto, dia gleucous dicunt.*

**M** Vsti sextarii sex, gallæ, aluminis scissilis, singulorū drachmæ duæ, croci, myrrhæ, singulæ drachmæ. Si lenire uoles, dulce esto mustum: si repellere, austerum. quod autem neutrum est, mediam inter hæc uim obtinet.

*Aegyptia stomatica.*

**M** Ellis pondo, olei bes, resinæ terebinthinæ sextans, croci drachmæ quatuor: in cacabo liquefiunt.

*Medicamentum dia besafa, ex ruta syluestri.*

**A** Nisi seminis, apii seminis, iunci odorati floris, ameos seminis, aluminis scissi, iridis illyricæ, besafa, quod nonnulli harmala uocant (est autem ruta syluestris) cinnamomi, myrrhæ troglodytidos, croci, gallæ, singulorū uncia, aristolochiæ longæ cassiæ, crocomagmatis, rosarum siccarum, singulorum uncia, costi, hirundinum cineris recentis, singulorum unciæ tres, nardi Indicæ, amomi, singulorum semuncia, mellis quod satis est.

*Dulces utilesque potiones.*

**D** Vlcium simul & utilium potionū aliæ ex uino conficiuntur, coniectis in id quibusdam speciebus, exempli gratia, pipere, absinthio, casamo, aliisq; compluribus, unde etiā appellationem nonnunquā sortiuntur, aliquando melle admixto, interim nō: aliæ ex aqua in qua decoquantur mala, uel rosæ, uel similia quædam, nempe uua acerba, mala punica, myrti bacca, eoq; mel optimū despumatum miscetur, tum quod firmum sit, tum quod dulce, interdum etiam utile: si illud excipias quod à cibyra in paruis uasculis asportatur, austerum: item hydromalum uinosum, quod etiā sine melle fieri nouimus. quemadmodum apomeli ex melle solo & aqua, citra alterius cuiusdā substantiæ



stantiæ misturam. Imo etiam ex uino confectæ potiones, quas & propomata Græci nominant, mellis despamati sextarium unum, ad uini quaternos recipiunt, componunturq; citra coctionem. At quæ ex aqua & liquore sunt, siquidem coquantur unū mellis ad treis liquoris, cuius duæ fere partes inter coquendum sint absumptæ, sextarios assument: sin minus, unum mellis ad binos liquoris, cæterū quæ non coquantur, diu satis insolare prorsus oportet, & præsertim omphacomeli. Ex aqua uerò temperatus potiones coquere conuenit, quod propter imbecillitatē facillimè mutantur. omnes autē in fictilia uasa exigua oblita transfundendæ sunt, iisq; turò operculatis in apricis locis usq; dum excoquantur reponendæ attenuantibus aut & probè aqua temperatis uti conuenit. Omphacomeli postquā multo modo inferbuerit crassumq; euaserit, tunc operiri uas debet. his igitur quæ uino constant, quū febris abest, potissimū utimur uel solius uoluptatis gratia, præter eas quæ scāmonia aut grano gnidio aut eiusmodi purgātibus medicamentis componuntur, uel propter eiusmodi affectus in quibus & medicamentis in illas coniectis, per os uti licet. Ex aqua aut aut succo aliquorū confecturæ febricitantibus cōueniunt, inter dum ceu hedysmata hoc est dulciaria, quū morbus uino uti nō permittit: interdū ceu affectui cōmodæ, quēadmodū apomeli ad saluam educendā, aut urinas citandas, aut aluū emolliendā, aut extenuandū humorē: hydromalū autem & hydrorofatum sicculosis, febre ardēti pressis, resolutis, & stomacho uitiosis. Omphacomeli, myrtites, rhodostacton, hoc est, mel rosaceum, & rhœtes, cœliaco affectui, dysenteriis, uomitionibus, alijsq; fluidis uitijs congruunt. Iam uero his collutionibus subinde in stomaticis affectibus utimur.

*Hydromalum ex malorum cotoneorum succo.*

**M**Alorum cotoneorū nucleis exemptis cōtusorū succi sextarij duo, mellis sextarij tres, aquæ sextarij sex, incoquantur despumando ad tertias. **ALIVD.** Malorū cotoneorū frustulatim concisoriū nucleis ablatis pondo quinq; in aquæ fontanæ sextarijs decē incoquuntur dū intabescant: ablata ab igne, refrigerataq; eximuntur, expressoq; succo proiiciuntur, aquæ modo dimidia mellis mensura temperatur, iterumq; incoquitur despumando, quoad octaua portio absumpta fuerit. Nōnulli uerò



li uerò ex dulcibus etiā malis similiter hydromalū cōponunt.

*Hydrorosatum.*

**R**osarum unguibus exemptis lib. quatuor, aquæ sextarii quinque mellis sextarii duo.

*Rhodomalum.*

**S**ucci malorum cotoneorum sextarius, rosarum trepondo, mellis sextarii tres, aquæ sextarii quinque. Verum quoniā rosæ non eodem tempore cum malis inueniuntur, conuenit eas cum melle quando colliguntur componere, ac ubi mala prouenerint, totam compositionem moliri.

*Omphacomelitis præparatio.*

**V**æ acerbæ succi sextarii, tres mellis sextariis: mixta diebus quadraginta insolantur, uel discoquantur.

*Quomodo myrtites fiat.*

**M**Yrti baccarum succi sextarii tres mellis sextarius, ad tertias decoquantur.

*Apomeli ex commentarijs Philagrii.*

**F**auorum melle scatentium alborum pondo, aquæ fontanæ trepondo & dimidium. contractis fauis unitisq; aqua cum melle incoquitur, dum & spuma ipsius & id quod ueluti cerosum supernatat, particulatim relinquatur, atque tunc refrigerata diligenter transfunduntur.

*Rhodoſtaſti compositio.*

**R**osarum quibus ungues sint exempti succi sextarios duos mellis sextarium incoquito desputans quoad quarta pars fuerit absumpta.

*Rhætis confectio.*

**M**ali punici succi sextarii tres, mellis unus, ad tertias decoquantur,

*De collyrijs & ad glutinamentis. Cap. XVI.*

**V**aria oculariū medicamentorū materias existit, etenim liquores, succi, semina, fructus, particulæ stirpium, & metallica his inferuntur. ex quibus alia acrimoniā leniunt, & ueluti oppolent ostruuntq; utpote pompholyx, spodium, amyliū, plumbū, terra samia, quæ aster dicitur, cadmia, ea que omnia lota, & cālidus oui liquor. Quibus ita utendū est, ut caput prius uacuationem experiatur: nam si repletū fuerit, metus



metus est ne oculorū tunicæ humoribus distentæ perrumpantur. Alia contraria his natura obtinent, nempe aerē, recludendis uacuandisq; iis quæ diu impacta fuerūt accōmodata, quæ admodū liquores Cyrenæicus, Medicus, sagapenus, euphorbiū, & consimilia. Nonnulla sordidis ulceribus abstergendis conueniunt, qualis est squama æris, psūm, æs, chalcitis, misy, fori, flos æris, stimmi, concremata omnia. Quædā his uicina sunt, smectica ab exterēdis sordibus appellata, cuiusmodi est auripigmentū, sandarachæ, & lapidis asij flos. Sunt & astringētia, atq; ex his quæ mediocriter id faciunt uehementē lippitudini, ulceribus, & defluxionibus eōducunt, nēpe rosarū folia, flores, fructus, spicæ nardi phyllū, crocus, glauciū, & hypocistis. Quæ uementiorē astringēdi uim repræsentāt, oculorū claritati conducantibus potissimū medicinis miscētur, cuius generis est omphacium acacia, balauistiū, satiuæ punicæ flos & galla. Alia concoquūt discutiuntq; ut myrrha, crocus, castoriū, lachryma thuris, fœnugræci succus. Porro ex compositis oculorū remedijs, alia delinuntur, simplicemq; appellationē habēt, alia hygrocollyria, alia hygrocollyria uocantur. Quæ igitur delinuntur, omnem cōprehensam materiā recipiunt, omnibusq; conferūt affectibus: cæterū uere præsertim præparari debent, æstate siquidem uirtus ipsorū perspirat euanescitq; hyeme species gelu rigidæ temperari nequeunt. Conterere autē ea oportet liquore non copiosè affuso, ne metallica subsidant, aromata supernatent, uerū modicè, ut sordiū modo cōterantur. Aqua uero pluuialis erit, tum quò tenuis sit, tū quòd modicè astringat. Si quidem uino aut succo aliquo læuigare oportet, ipsa quoq; terenda sunt, metallica sanè longo tempore, quæ autem succo constant, exiguo demū nbi satis læuia euaserint, gummi adicietur: in formam redacta, uasis maximè æris aut uitreis reponentur. Cæterum iis quæ è succo conficiuntur, protinus ut ilicet: metallica uetustate reddūtur meliora. Porro inter collyria arida quædam cōsumunt exteruntq; callos, ficos, ungueis, scabiofaq; uitia, è chalcitide, ærugine & misy composita: quædā lachrymas mouent, obstructionibus & hebetudini accōmodata, quæ tum ex his tum ex pipere & spica nardi fiunt. Sunt quæ præseruent, tueanturq; oculos ab humorum influxu, cuiusmodi ex lapide phrygio, sarcocolla, glaucio, aloë, cadmia, stimmi, croco: omnia in tenuissimū pollinem coacta oculis applicātur.

At



At liquida collyria fiunt ex melle attico, opobalsamo, oleo ob uetustatem tenui, fœniculi succo, diuersorum animalium felle, liquore cyrenaico, alijsque compluribus. Conferunt hebetudini, suffusionique incipienti, medicamenta quæ extenuent, calefaciant, purgentque. Utendum his est, & omnibus acribus, ubi caput repletionem caret, sub dio, aere, puro, austrino, non nimis frigido, neque item calido nimium. At agglutinamenta quæ anacolemata græcè dicuntur, ex medicamentis præparantur quæ obstruunt, opplentque, glutinant, stringunt, aut refrigerant, aut astringunt, siccantque, qualis est farinæ pollen, manna, terra samia, myrrha, cochleæ, acacia, opium, cum candido oni liquore. glutinantur fronti in quibus humor non intra caluariam delitescit, sed extrinsecus affligit.

*Collyrium, quod protinus dolorem sedet monohemeron appellatū, ad incipientē uetustamque lippitudinē.*

**A** Caciæ drach. triginta sex, gummi drach. triginta duæ, cadmiæ drach. niginquatuor, æris cremati & eloti drachmæ octo, opii, drachma: uino austero læuigantur. Medicamentum discutit & siccatur.

*Chiacum collyrium.*

**M** Inii suopici, gallæ omphacitidis, croci, rosarum recentium unguibus exemptis floris quem thylaca uocamus, gummi, singulorum uncie quatuor, opii, uncia: uino aminæo, aut falerno, aut chio austero teruntur. Sit autē uinum marinæ expers.

*Cygnarium.*

**C** Admiæ ustæ elotæque unc. sex, cerusæ lotæ unc. quatuor, pompholygis tantundem, amyli unc. duæ, tragacanthæ, opii torrefacti, gummi, singulorum unc. duæ: aqua pluuiali læuigantur.

*Rubens cygnus.*

**C** Admiæ crematæ elotæ sextans, terræ samiæ quæ aster dicitur tantundem, cerusæ triens, pompholygis bes, amyli sextans, opii sextans, acaciæ, tragacanthæ, singulæ unc. gummi triens: aqua cœlesti subiguntur.

*Albus cygnus.*

**C** Admiæ unc. quindecim, cerusæ unc. septemdecim, opii drach. octo, thuris drach. septem, amyli unc. septem, gummi



mi drachmæ tredecim : aqua cœlesti teruntur .

*Pelaron ad ulcera .*

**C**Admiæ, cerusæ, singulorum drach. uigintiquatuor, acaciæ, opii, singulorum drach. octodecim, gummi, tragacanthæ, amyli, singulorum drach. nouem, myrrhæ drach. tres, æris, croci singulorum sesquidenarius: aqua conteruntur .

*Phæon ad oculos sanguine suffusos, & magnos affectus.*

**C**Admiæ teneræ drach. uigintiquatuor, cerusæ drach. sedecim æruginis rasæ drach. duodecim, stimmi drach octo, aluminis scissi drach. tres chalcitidis ustæ drach. tres, nardi Indicæ drach. quatuor, omphacii drach. duæ, æris drachma, squama æris drach. octo, ericæ fructus drach. tredecim, lachymæ papaueris drach. uigintiquatuor, croci drach. quatuor, castorii drach. tres, myrrhæ drach. sex, lycii Indici, acaciæ, gummi, singulorum drach. quatuor, rosarum recentium drach. duæ & semissis: uino falerno aut surrentino, aut aminæo, aut chio austero perteruntur. inungitur per triduum, aquæ instar dilutum ex fœnugræci succo instillatum, deinde ex ouo aut lacte, postremo aqua crassius .

*Collyrium ex decoctis, dia zematōn dicitur .*

**C**Admiæ unc. sedecem, cerusæ unc. octo, amyli, opii, tragacanthæ, acaciæ, singulorum unc. duæ, gummi unc. sex: læuigantur decocto rosarum siccarum, meliloti, capitum papaueris dulcis radicula, pari singulorum modo ,

*Collyrium dia hydrias, repellens.*

**L**iquoris qui in uasis cerealibus tophi modo concretus reperitur, libr. tres, cadmiæ ustæ & elotæ libra, cerusæ, pompholygis, terræ samiæ, qui aster dicitur, singulorum elotorum unc. sex, thuris uncia, myrrhæ tantundem, succi lini seminis, herbæ pulicaris, ptisanæ, fœnugræci, singulorum libra tragacanthæ unc. sex, gummi libra.

*Collyrium Ilambonis .*

**C**Admiæ unc. octo, pompholygis unc. quatuor, cerusæ libra, tragacanthæ, gummi, opii, singulorum uncia quatuor: aqua pluuiatili teruntur .

Cinereum,



*Cinereum, quod spodiakon dicitur, ad inflammationes, defluxus, & chemosin.*

**T**Huris, stimmi, singulorum drach. centum, cadmiæ, cerusæ, utriusque drach. uigintiquatuor, terræ samia, papaueris lachrymæ, singulorum drach. tres, gummi drach. quindecim: læ uigantur oleæ coliculi succo. fit autem is in hunc modum: teneriora oleæ folia elota contunduntur in mortario, paululo aquæ superfuso, per linteolum exprimuntur.

*Collyrium ex oleæ turionum succo tenerum, dia thalias uocatur.*

**T**Huris drach. quatuor, stimmi drach. quindecim, cadmiæ drach. uigintiocto, cerusæ drach. quadragintanovem, terræ samia drach. octodecim, opii drach. sex, gummi drachma, plumbi usti eloti; drach. octo: excipiuntur oleæ turionū succo.

*Dia thalias, ruffum.*

**A**Eris cremati drac. duodecim, sandycis unc. uigintiquatuor, foliorum oleæ unc. duæ, opii tantundem, gummi unc. decem, uino spathite uel aminæo excipiuntur.

*Dia smyrnon claudiacum.*

**G**laucii, sarcocollæ, singulorum drach. quadraginta octo, croci drach. uigintiquatuor, opii, myrrhæ, lapidis hæmatitis, singulorum drach. sex, tragacanthæ drach. quadraginta octo, gummi drach. sedecim: uino Italico subiguntur usus est ex ouo.

*Aliud dia smyrnon ad rhyadas & ægylopas.*

**C**Admiæ lotæ, lapidis hæmatitis eloti, singulorum drach. uigintiocto, myrrhæ, spodij Cypriæ, singulorum denarii uigintiquatuor, opii drach. octo, croci drachmæ quatuor ( alij octo ) piperis albi grana triginta: gummi drach. sedecim: uino Italico teruntur, ex ouo adhibetur collyrium: si uicium sit recens, aquatum.

*Stacticum Prosechij.*

**C**Admiæ, gummi, singulorum drach. uigintri, stimmi, atramenti sutorij, singulorum drach. octo, opii drach. quatuordecim, æruginis rasæ drach. decem, piperis albi drach. sex, croci drachmæ octo, misyos crudi tantundem, opobalsami drach. quatuor: aqua conteruntur.

Hygidion



*Hygidion Ammonij.*

**C**Admiæ, æris, singulorum drach. sedecim, cerusæ, castorii, aloes, croci, singulorum drach. quatuor, squamæ drachmæ quinque, rosarum floris, plumbiusti, singulorum drach. octo, lycii drach. tres, lapidis schisti drach. quatuor, opii drachmæ decem, acaciæ drach. quadraginta, gummi drach. quadraginta octo: aqua excipiuntur.

*Olympos seu olympiacum.*

**A**Caciæ, spicæ nardi, thuris, singulorum drach. octo, æris cremati elotiq; stimmeos usti & loti, cerusæ concremata lotæque, cadmiæ, singulorum drach. duodecim, myrrhæ, opii arefacti, singulorum drach. quatuor, croci drach. quinque, æruginis rasæ drach. tres, lapidis, schisti, squamæ rubræ, lycii Indici, omphacii, singulorum drachmæ, castorii, rosarum floris, singulorum drach. duæ, phœnicobalanorum drach. quatuor, similiter ossea palmularum ustarum ligna numero quinque, gummi unc. quinque aqua pluuiali superfunduntur, in aqua commadescent tres dies totidemque noctis, calami odorati, alterci seminis, rosarum siccarum, singulorum drach. quatuor, phylli drachma.

*Nardinum.*

**C**Admiæ, croci, gummi, singulorum drach. triginta sex, æris usti drach. octodecim, stimmi, acaciæ, singulorum drach. triginta, nardi syriacæ drach. duodecim, opii, singulorum drach. sedecim: aqua subiguntur.

*Theodotium minus.*

**S**timmi, acaciæ, singulorum drach. uiginti, æris usti drachmæ octo, cerusæ drachmæ quatuor, myrrhæ totidem, æruginis drach. duæ, aloes, succi papaueris, lyci, singulorum drachma: pluuiatili aqua læuigantur.

*Rhinarium.*

**L**apidis hæmatitis, lapidis schisti, singulorum drach. sedecim, æris combusti, cadmiæ, æruginis, singulorum drach. octo, opii drach. quinque, chalcitidis drach. duæ, gummi drach. octo, uino excipiuntur.

*Xylter.*



*Xyster.*

**P**Vmicis, misyos, ostreorum, singulorum crematorum unc. sex, cadmiæ, opii, chalcitidis ustæ, croci, aloes hepaticæ, castorii, phylli, singulorum drach. duæ, stimmios, acaciæ, singulæ unc. æris combusti unc. quatuor, myrrhæ troglodytidis drach. quatuor, spicæ nardi drachma, cerusæ drac. octo, gummi drach. quatuor: aqua cœlesti superfunditur. Nonnulli etiam uinum miscent.

*Hecatombe, ad cicatrices crassas.*

**C**Admiæ ustæ lotæque, æris cremati & eloti, uniuscuiusque drach. octo, stimmios combusti, acaciæ rubentis, gummi, singulorum drach. quindecim, aloes, gallæ, æruginis vermicularis, castorii, lycii, spicæ nardi, croci, opii, myrrhæ, cerusæ, hebeni ramenti, chalcitidis, singulorum drachma, rosarū drach. sexaginta: aque pluuiali teruntur.

*Collyrium ex cornu, dia ceratos dicitur, Galeni.*

**P**Lumbi combusti, cornus ceruini cremati, singulorum unc. duæ, cerusæ, squamæ æris, amyli, thuris, sepia testæ combusti, æruginis, myrrhæ, gummi, singulorum uncia: aqua pluuiali excipiuntur.

*Collyrium è thure dia Libanu nuncupatur.*

**T**huris uncie sex, cadmiæ, pompholygis, terræ samie quæ aster dicitur, amyli, gummi, singulorum unc. tres, cerusæ unc. sex, squamæ æris unc. quatuor, tragacanthæ unc. tres, opii unc. sex: aqua cœlestis adicitur.

*Libanium.*

**C**Admiæ elotæ, amyli, singul. denarii duodecim, cerusæ tantundē, spodii, pompholygis, terræ samie quæ aster dicitur, plumbi usti & loti, tragacanthæ, singul. denarii octo, opii denarii duodecim, gummi denarii quatuor: aqua pluuialis additur, & ouorum uiginti albumina. Sunt qui etiam myrrhæ denarios

*Aster magni.*

**P**ompholigis, cadmiæ, cerusæ, singulorum drach. sedecim, plumbi drach. octo, amyli drach. octodecim, thuris drach. decem, terræ samie quæ aster dicitur drach. duodecim, myrrhæ drach. duæ, tragacanthæ gummi, singulorum drach. octo: aqua additur.

*Vranium.*



*Vranium,*

**T**Erræ samig piperis singulorum unc. tres, spodii eloti uncia, gummi unc. quatuor, stimmios cremati eloti que unc. duæ, squamæ lotæ uncia, opij drach. sex, cadmiæ combustæ & elotæ drach. duæ: aqua pluuiatilis admiscetur. Carnem inducit, repellit que.

*Collyrium ex succo fœnugraci.*

**C**Admiæ, tragacanthæ, singulorum unc. octo, cerusæ unc. triginta, amyli tantundem, opij uncia: leuigantur succo fœnugraci.

*Collyrium Cleonis.*

**P**Ompholygis, plumbi, singulorum unc. quinque, croci fescuncia, squamæ æris quod stomoma dicitur uncia, gummi unc. duæ: aqua pluuialis additur, aquatum illinitur.

*Dia rhodon, hoc est, ex rosis, quæ septuaginta duas uncias pendunt.*

**R**osarum uiridium unc. septuaginta duæ, cadmiæ & ustæ & elotæ drach. uigintiquatuor, æruginis rasæ drach. duæ, spicæ nardi drachma, squamæ æris elotæ drach. duæ, stimmios combusti eloti que, opij, myrrhæ, singulorum drach. tres, croci drach. octo, amyli drach. duæ, gummi drach. uigintiquatuor: aqua pluuialis admiscetur.

*Album dia Rhodon.*

**C**Admiæ crematæ & lotæ, cerusæ elotæ, singulorum libra, amyli, opii, tragacanthæ, singulorum unc. tres, aloes fescuncia, gummi unc. tres, croci fescuncia, rosarum unguibus detractis unc. sex: aqua miscetur.

*Collyrium ex aloe, dia aloes nuncupatur.*

**C**Admiæ, cerusæ, aloes, singulorum unc. decem, rosarum uiridium unc. sex, amyli unc. tres, opii uncia, tragacanthæ unc. duæ, gummi unc. tres: aqua pluuiatilis adijcitur.

*Crocium dia rhodon.*

**S**Picæ nardi, rosarum siccarum, aloes, singulorum drach. duæ, alterci albi sesquidrachma, croci drach. quatuor & semissis, glaucii sex, sarcocollæ tantundem, opij drach. duæ, tragacanthæ uncia: aqua pluuialis additur.

PAULI AEGIN.

Q

Nili



**R**osarum tenerarum drach quatuor, croci drach. duæ, papaveris obolus, gummi drachmæ quatuor: aqua cœlesti excipiuntur.

*Lynceus ad claritatem oculorum.*

**C**Admiæ, æris, cōbusti, guttæ ammoniacæ, singulorū drach. duodecim, myrrhæ, lapidis hæmatitis, opii thebani, singulorum drach. sex, aloes hepaticæ, fellis raurini, galbani, sagapeni, singulorum drach quatuor, æruginis rasæ, opopanax, salis ammoniaci, singulorum drachma, gummi drach. sex: aqua pluuiali teruntur.

*Proteus ad idem, cicatricesque extenuat.*

**C**Admiæ, cerusæ, chalcitidis crudæ, singulorum denarii quatuoraginta, piperis sesquidenarius, liquoris cyrenaici drach. octo, croci denarii duodecim, opii thebani denarii decem, sagapeni denarii duodecim, oliuæ æthiopicæ denarii duodecim, auripigmenti, aluminis scissilis, singulorum denarii octo, myrrhæ denarii duodecim, suffiminis ammoniaci denarii xx. opopanax denarii sedecim, opobalsami denarii decem, gummi denarii uiginti: aqua pluuiali excipiuntur.

*Collyrium ex succo fœniculi.*

**C**Admiæ drach. septemdecim, atramenti Indici drach. sedecim, piperis longi drach. tredecim, & albi duodecim, liquoris cyrenaici drach. octo, opobalsami drach. sex, spice nardi drach. sex, sagapeni, opopanax, singulorum drach. quinque, opii drach. quatuor, euphorbii drachma, gummi drachma: succo fœniculi laugantur.

*Collyrium ex opobalsamo.*

**C**Admiæ, cerusæ, singulorum drach. octo, omphacii drach. quatuor, piperis albi unc. sedecim, opii drach. quatuor, opobalsami, gummi, singulorum drachmæ sedecim: aqua pluuialis additur.

*Thalasseros.*

**C**Admiæ unc. octo, æruginis unc. duæ, atramenti Indici unc. octo, piperis albi unc. quatuor, liquoris medici uncia, opobalsami unc. duæ, gummi unc. sex: aqua adicitur.

*Harmation.*



*Harmation.*

**G**Vttæ ammoniaci, æris combusti, corticis thuris, singulorū drach. quatuor, æruginis drachma, gummi drach. quatuor aqua cœlesti excipiuntur.

*Collyrium malabathrinum, quod & Isotheon dicitur.*

**C**Admiæ drach. sedecim, æris usti & eloti drach. quatuordecim, opri, lycii Indici, malabathri, nardi Indici, croci, aloes, singulorum drach. duæ, cerusæ drach. octo, castorei drach. duæ myrrhæ drach. quatuor, acaciæ, stimmi, singulorum drach. quaginta: aqua teruntur usus ex ovo.

*Crassus ex uino.*

**C**Admiæ, lapidis hæmaritis, & schisti, singulorum drach. quaginta, æris usti drach. triginta, chalcitidis drach. trigintaduæ, papaueris seminis drach. tredecim: papaueris semen aqua decoquitur, succus expressus aliis adiicitur, quæ læuigantur uino spathite uel aminæo.

*Aliud ex uino.*

**A**Æris combusti, cadmiæ placitidis, singulorum unc. nouem, lapidis hæmatitis eloti unc. sex, croci, myrrhæ, aloes, suffiminis ammoniaci, singulorum unc. tres, lycii Indici, spicæ nardi, singulorum sescuncia, piperis albi grana centum quinginta, acaciæ rubentis unc. nouem gummi unc. tres: uino falerino aut aminæo teruntur.

*Collyrium ex duobus lapidibus ad aspritudinem.*

**L**apidis hæmatitis, schisti, cassiæ, singulorum drach. octodecim, æris, cadmiæ, opii, æruginis rase, singulorum drach. nouem, gummi tantundem, chalcitidis ustæ drach. sex: aqua reruntur.

*Aridum collyrium Galeni, quod oculos tuetur.*

**L**apidis phrygii minutim contuli usti, que in ollula quousque incandescat, & restincti butyro non ueteri, deinde iterum similiter cremati, extincti, que uino falerino, ac tertium usti & extincti, que melle siccati, que libra, æris cremati, piperis albi, phylli, singulæ unc. stimmi sescuncia: omnibus in laeuorem detritis quum medicamentum ab igne auferetur, liquoris balsami non crassi (id enim arefcere medicamentum

Q 2 prohibet)



prohibet) sed lucidissimi unclam iniicies. Vti autem eo conuenit in palpebris duntaxat, sic ut specillo illato tunicae non attinguntur, sed ut solum medicamentum palpebris apertis illinatur. Inungi autem debet non semel, uerum saepius, tum ante cibum, tum secundum ipsum, magisque ubi iam lippitudo sentitur. Mirum enim est, quàm omni alio medicamento securius ab iniuria uindict.

*Aridum dia crocu.*

**S** Arcocollæ drach. octo, croci drach. quatuor, glaucij tantundem inungitur frequenter die. Nonnulli uerò aloen quoque scint.

*Aliud aridum ad siccam lippitudinem quæ xerophthalmia dicitur, sycosin sepedonas, carnis excrescentias.*

**C** Admiæ drach. decem, chalcitidis drach. uiginti, piperis grana quindecim, nardi gallicæ drachma: teritur cadmia & chalcitis cum uino: ubi inaruerint, reliqua adiiciuntur, cogunturq; in tenuissimum puluerem.

*Hygra, hoc est, liquidum collyrium, ex Caucalide.*

**C** Aucalidis succi, chamædryos, coronopodis, interdum & othonnæ succi par mensura. Est autem othonna magnum chelidonium.

*Aliud ad syconsin, quæ est ueterrima palpebrarum asperitudo encanthidas, & excrescentiam carnis.*

**M** Isyos tosti drach. sex, atramenti satorii drach. quatuor, mellis attici sextarius.

*Erasistrati panchrestos hygra, mirifica est in ocularijs uitijs, tonsillis pudendis & auribus suppurantibus.*

**A** Eris drach. sex, misyos tosti, myrrhæ, singulorū drach. tres, croci sesquidrachma, piperis drachma, uini chii & passi cretici, utriusque sesquihemina: omnibus in uino læuigatis, dum inaruerint, passum superfunditur, & usque ad melleam spissitudinem incoquantur.

*Agglutinamenta oculorum qui defluxionibus infestantur.*

**T** Erræ samiae, mannæ thuris, myrrhæ, pares modi, oui aqua: toto excepti, in lintheumq; illiti fronti imponuntur. A L I V D  
Alterci



Alterci seminis drachma, opii tantundem, myrrhæ drach. duæ  
croci drachma, farinæ pollinis drach. quatuor, ouorum tosto-  
rum lutea duo, albumine oui excipiuntur.

*De emplastris, & medicamentorum quæ in illa mittun-  
tur coctione, tum quæ ceræ modus cū oleo esse debeat,  
ex commentarijs Antylli.*

*Cap. XVII.*

**M**edicamentum quæ emplastra ingrediuntur, alia sunt  
terrestria, utpote metallica, lapidumq; terræ species,  
flores, cinis, & conchyliæ, alia sunt oleamenta, alia la-  
chrymæ, alia liquari possunt: quædam liquores, quædam succi  
sunt: semina uerò, herbas, & radices pauca recipiunt. Cæterū  
ex ipsis emplastris nonnulla sunt uulneraria, quæ enæma græ-  
cis quod cruentis iniiciantur: colletica, quæ glutinent: & catag-  
matica, quod fracturis accommodentur, appellamus. Constare  
autem ex siccantibus non summè, uerum secundi ordinis abso-  
luti, & tertii incipientis, oportet cuiusmodi sunt salix, quercus,  
cupressus, piceæ & pini cortices, myrrha, thuris lachrima, bitu-  
men, aloë, aristolochia, cinis sarmentaceus, cerusa, spuma argen-  
ti, & pleraque ex metallicis. Coqui debent quousq; manus nō  
amplius inquinent. Porro quæ cicatricem ducunt emplastra  
& ipsa ex siccantibus componuntur, uerū efficacioribus quàm  
glutinatoria, quod genua est, æs combustum, squama tū æris  
tum ferri, ærugo, chalcitis, æris flos combustus, alumen, galla,  
plumbago, cadmia, pumex, & ostracea. Discutientia uerò & ca-  
lescentibus & siccantibus modicè fiunt, nempe aristolochia,  
thapsia, oleo ueteri, & raphanino, melle, opobalsamo, pice, resi-  
na terebenthina, galbano, sale cōbusto, salis flore. Quæ emol-  
liunt, ex argenti spuma, adipibus, medullis, oleo ueteri, propo-  
li, ammoniaco, styrace galbano, bdellio, mastiche, resina tere-  
binthina, uel radice althææ & cucumeris syluestris, præparan-  
tur. Siccantia, ex sulfure, nitro, sale, cinere, & bitumine. Ad ex-  
trahendum accommodata, fiunt ex sale, nitro, propoli, ærugi-  
ne, fermento, stercore, sulfure, terebinthina. Quæ concoquunt  
ex cera, ladanu, uua passa, amomo, croco, thure, pice, mastiche,  
Aegyptia, styrace, myrrha, galbano, butyro, æsypo, adipe, æru-  
gine. Pus mouentia, ex hydrelæo, polline, pane triticeo, chon-  
dro, butyro, adipe suillo & uitulino, thure, pice, resina. Quæ ue-  
rò leniunt, argenti spuma constant, cerusa, oleo, anetho, cha-  
memelo,



mæmelo, amylo, cera alba. Iam uerò enæma dicta, recentibus adhuc uulneribus & fracturis iniici debent, adiutoriꝫ; è summa spleniorum parte spongiis posca madentibus simul illigatis, solui tertio quoq; die, & rursus eadem splenia non alia accommodari oportet. At quæ emolliunt, extrahunt, discutiunt, concoquunt, & pus præterea mouent, post cataplasmatum ceratorumque usum adhibentur. Quæ leniunt etiam per initia statim, summis potissimum partibus applicantur. Coëterum quomodo coquantur, deinceps exequemur.

*Basilicum tetrapharmacum.*

**C**Eræ, resinæ colophonix, picis, seui taurini, pares portiones. *Emplastrum ex succo lini seminis discutiens detergēsq;.*

**O**Lei ueteris depondo, ceræ unc. uiginti, resinæ colophonix, adipis suilli, singulorum pondo & dimidium, argenti spumæ pondo, cerusæ unc. sex, succi lini seminis tantundem, farinæ pollinis uncia, thuris uncix quatuor.

*Emplastrum ex melle, dia melitos dicitur.*

**A**rgenti spumæ, ceræ, olei, singulorum lib. quatuor, cerebinthinæ resinæ lib. duæ, mellis, adipis suilli, singulorum libra. **A L I V D.** Argenteæ spumæ lib. sex, olei lib. quinque & semissis, resinæ colophonix lib. septem & semissis, ceræ lib. tres & semissis, mellis lib. tres.

*Emplastrum à succo dia chylon dictum.*

**A**rgenteæ spumæ pondo sex, olei, æstate quidem pondo septem, hyeme uerò pondo nouem, fœnugreci semisextarius, lini seminis tantundem, althææ teepondo: althæa, seminaque in uiginti aquæ sextariis discoquuntur, quousque paululū ex ea relictum fuerit, inde succi pondo quatuor, exprimuntur miscenturq; oleo ac incoquuntur dum ebullire desierint, post hæc argenti spuma in tenuissimum pollinem detrita inspergitur, postremo omnia igne non acri excoquuntur usque dum digitos intinctos non inquinent.

*Emplastrum ex polline farinaceo, dia gyreos appellatū.*

**F**arinacei pollinis, guttæ ammoniaci, singule lib. resinæ è picea derafæ, ceræ, adipis suilli, singulorum lib. duæ, succi lini seminis quod satis est.

Emplastrum



*Emplastrum ab herbis botanicum dictum.*

**L** Apathi rhepelæi, anchusæ chærospelethi, hoc est, onocleæ, heptanueri, plantaginis, singulorum unc. tres, olei lib. sex, adipis suilli tantundem: herbæ oleo excoctæ proiciuntur, reliqua cum oleo eliquantur.

*Emplastrum ex hastula regia, dia asphodelu dicitur.*

**H** Astulæ regię radicis succi libra; rosacei, chamæmelini, adipis anserini, singulorum unc. duæ, adipis suilli unc. tres, ceræ unc. quatuor.

*Emplastrum è fermento abscessus rumpens.*

**F** Ermenti, axungię, singulorum unc. sex, salis unc. quatuor, piceæ resinæ unc. tres, ceræ unc. quatuor, aphronitri uncia, guttæ ammoniaci unc. duæ, mellis unc. sex, saponis unc. duæ.

*Emplastrum dothiene.*

**S** Vffiminis ammoniaci pondo, nitri Alexandrini unc. sex, aphronitri tantundem, adipis suilli pondo duo, ceræ totidem resinæ terebenthinæ pondo, olei ueteris uncia aceti quod satis est.

*Emplastrum ex radice lanaria, dia struthiu dicitur, strumas discutiens.*

**A** Rgenti spumæ, radicis lanariæ, aristolochiæ singulorum triens, galbani, squamæ æris, aloes, singulæ unc. mannæ thuris sextans, stillæ ammoniacę se libra, resinæ è picea unc. se. decim, aceti scillini sextarii quatuor, ad aridorū læuigationē.

*Smilion ad abscessus.*

**O** Lei ueteris sesquilibra, argenti spumæ nitri rubri, salis ammoniaci, lixiuij è ficu cui calx sit admista: a protofactos dicitur, resinæ, singulorum libra, galbani, guttæ ammoniaci, singulorum unc. tres, atramenti sutorij unc. quatuor, ceræ unc. sex, æruginis, opopanacis, singulorum uncia, aceti quod satis est: argenti spuma & ærugo in oleo coquuntur dum manus non inquinant, deinde reliqua admiscuntur.

*Emplastrū dia scorodon, hoc est, ex alijs ad rumpendum.*

**C** Eræ uncia sex, resinæ colophonix unc. quatuor, resinæ  
Q 4 pityinæ



pityinæ hoc est ex picea arbore unc. tres, seui taurini unc. quatuor, nitri rufi fescunica, allia pura uiginti, olei dimidium sextarii: allia in oleo excocta proiciuntur, reliqua miscentur.

*Emplastrum dia apyranu ad discutiendum.*

**A** Dipis anserini, & fabanorum, singulorum uncia tres, olei ueteris uncia uigintisex, herbe pulicaris uncia tres, urticae seminis radices apyrani uiridis, singulorum libra, ceræ albæ uncia decem, emplastri quod dia chylon inscribitur uncia duæ, resinae terebenthinæ uncia. Radix apyrani minutim concisa cum herba pulicari in oleo madescit, semenque urticae per noctem & diem: ac ubi excocta fuerint, ipsa quidem proiciuntur: quæ liquari possunt, oleo mixta soluuntur.

*Emplastrum pyrine, & ad duritias & scirrhus.*

**A** Lthææ, palmularum, aut dactylorum qui nicolai dicuntur, singulorum libræ duæ, fœnugræci, lini seminis, singulorum sextarii dimidium, chamæmeli, meliloti, palmularum corticis singulorum unc. sex, uini aminæi sextarii dimidium, spumæ argenti libra, cerusæ, resinae colophonix, singulorum libræ duæ, ceræ resinae, terebinthinæ, singulorum libra, olei ueteris libræ quinque, aquæ libræ duæ, panis aridi contusi cribratiq; lib. quinque: herbae in uino decoctæ exprimuntur, succo, panis immadescit, sequent die læuigatur, argenti spuma, cerusaq; in aqua, deinde oleo iniecto incoquuntur, dum medicamentum digitos non coinquinet, inde reliqua adduntur, sublatis ab igne panis inditur, ualideque rudicula agitur. adiunguntur etiâ æruginis rasæ, & salis floris, singulorum unc. sex, iridis, aristolochiæ, singulorum unc. sex, terebinthinæ resinae libra.

*Pelarion ex scoria argenti, dia elcysmatos dicitur, ad similia abrasis.*

**C** Eræ, seui taurini, singulorum unc. quinque, scorix argenti unc. sex, resinae colophonix unc. quatuor, picis, olei, singulorum unc. duæ, scoria argenti arida læuigatur uino uel succo fœnugræci: quod si scoria desideretur, plumbagine utimur.

*Emplastrum ex althæa, podagricis alijsque duritijs accommodatum.*

**S** Vcci fœnugræci, & lini seminis, & althææ, singulorum trepondo, olei dupondo: incoctis usq; dum succus absumatur, colophonix



phonix resinæ pondo adiicitur, item terebenthinæ resinæ pondo, hederæ lachrymæ quadrans: ubi soluta fuerint, & ab igne sublata, ceræ pondo inicitur, galbani triens: utraq; simul confusa solutaque rudicula agitantur.

*Cissinum ad neruorum uulnera, punctus, & maxime diuturna.*

**S**Quamæ rubræ unc. quatuor & semissis, thuris uncia, misyos sescuncia, chalcitidis drach. quatuor, acetî sex: læuigantur æstiuo sole usq; dum acetû fuerit consumptum, deinde solutis ceræ uncias octo, olei octodecim misceto. Si autem diuisus fuerit neruus & nudus sit, in uicem galbani, resinæ terebenthinæ unc. duæ, induntur.

*Melanchlorum ad eadem, & cruentis aptum.*

**M**Alicorii, æris combusti, gallæ, aristolochiæ rotundæ, salis ammoniaci, squamæ æris, aluminis scissi & liquidi, (alii uice liquidi rotundum ponunt) iridis, misyos, attramenti sutorii, chalcitidis, eruginis rasæ, cadmiæ, aloet, myrrhæ, thuris, pnanacis radicis, argenti spumæ, cerusæ, pares omnium portiones, teruntur in sole æstiuo cum acato diebus pluribus, fingunturq; pastilli. Emplastrum uerò sit hunc in modum: medicamenti uuc. duæ, ceræ unc. sex, olei unc. octo, in neruorum uulneribus ueteris, in aliis communis, remuerantur.

*Emplastrum ex senetione, quod dia erigerontos dicitur.*

**S**Enetionis succi lib. duæ, olei ueteris sesquilibra, cyprini olei unc. quatuor, axungia ueteris libra, resinæ terebenthinæ uncia, galbani semuncia, resinæ piceæ sex, æruginis, thuris, hyssopi medicamenti, singulorum uncia, squamæ æris scrupula octo, ceræ unc. decem, apochymatis unc. quatuordecim: oleum & succus ad sordium spissitudinem incoquitur cum adipe suillo: arida cyprino læuigantur, galbanum cū cera contunditur & caccabo demittitur, apochyma si quidem siccum fuerit, læue incrementum ponderato inspergitoq;: q; si in læuorē deteri nequeat, portione olei solutum excipiatur, atq; tūc omnia misceantur.

*Emplastrum Mnasei discutiens.*

**C**Eræ, axungia porcina, singulorum libra, resinæ colophonix unc. sex, argenti spumæ lib. duæ: uini generosi lib. quatuor adiiciuntur.

Ariobarzanion,



*Ariobarzanion, ad eosdem affectus.*

**A**Rgenti spumæ fescuncia, cerusæ libra quincunx, aquæ marinæ unc. uiginti quinque, olei ueteris sesquilibra, buccinorum concrematorum unc. septem & semis, ceræ rufæ unc. nouem, resinæ terebentinæ unc. sex, thuris unc. tres, scrupula tria & dimidium.

*Emplastrum ex dracunculo.*

**C**Eræ, resinæ colophonix, picis aridæ, axungix, resinæ, singulorum lib. quatuor, guttæ ammoniacæ lib. duæ, dracunculi radices lib. quinque; radix arida læuis aliis solutis inspergitur.

*Psitacium.*

**C**Eræ, resinæ colophonix, adipis suilli, alterci foliorum teneorum, uel succi eorum, æqualis modus. In Alexandria autem ceræ lib. duæ semis, alterci lib. duæ, axungix lib. duæ semis, colophonix resinæ lib. decem miscentur, magisq; discutit medicamentum.

*Myrsinatum.*

**A**Rgēti spumæ, cerusæ, sandicis, plūbi cōbusti & eloti, singulæ nunc: ceræ unc. sex, olei myrtei libra, uini quod satis est.

*Emplastrum ex cerusa, uel ouis.*

**C**Eræ tractæ unc. sex, rosacei sesquilibra, argenti spumæ unc. duæ; cerusæ tantundem, amyli unc. tres, ouorum quinque aquata.

*Emplastrum, quod liquidum sit parygrum uocatum, Oribasii.*

**A**Rgentæ spumæ fescuncia, cerusæ tantundem, ceræ triēs, pinguis suilli septunx, resinæ colophonix dodrans, lini seminis succi, olei, singuli dextantes: mirificè facit ad calcanei rimas, in ulceribus aut (inquit) uitant, nā ea tetri odoris reddit.

*Emplastrum dia Cadmias, cicatricem inducent.*

**C**halcitidis ustæ unc. duæ, cadmiæ, mannæ thuris, singulorum uncia, ceræ, resinæ colophonix, olei myrtei, singulorum libra, uini quod satis est.

*Palmulatum, phœnicine dicitur.*

**A**Xungix ueteris lib. duæ, olei ueteris lib. tres, argenti spumæ tantundem, chalcitidis crudæ unc. sex: primum chalcitis cum oleo in pila cōmodiore læuigantur, uel in sole: ubi for  
dium



dium spissitudo facta fuerit, etiam spuma argenti prius detrita superiniicitur, postea adeps: postquam probe in polliuem redacta fuerint, leni igne incoques, quoad digitos non inquinent, palmarum radícula agitans.

*Emplastrum ex Anchusa, ambustis efficax.*

**C**eræ albæ unc. nouem, rosacei unc. octodecim: his liquatis porphyridos anchusæ radicis siccæ læuissimæ uncias quatuor inspergito. ALIUD. Anchusæ radicis uiridis, marrubii, gumi, singulorum unc. tres, decoctæ in olei uncis nouem proiciuntur, oleo ceræ albæ unc. quindecim superiniiciuntur, omniaque soluantur.

*Emplastrum ex Pompholyge, pompholygeron appellatum.*

**P**ompholygis unc. duæ, argenti spumæ unc. tres, læuigantur cum lini seminis succo, adiciuntur ipsis liquatæ refrigeratæque ceræ unc. sex, adipis anserini uel gallinacei unc. duæ, chamæmelini unc. sex.

*Phylocotiche, dolorem leniens, ad sedem utilis.*

**T**huris unc. septemdecim, myrrhæ unc. septem, opii drach. quatuor, aluminis scissilis drach. quatuor, aluminis scissilis drach. duæ butyri drach. quatuor, ouorum tenuium lutea quatuor, cadmiæ crematæ & elotæ drach. quatuor, pompholygis drach. sex, ceræ tyrrhenicæ drach. octo, adipis anserini drach. sedecim, medullæ ceruinæ drach. undecim, plumbi cremati eloti; drach. nouem, lapidis hæmatitis drach. hyssopi liquidi drach. quatuor: arida læuigantur cum uino Italico quæ liquari possunt, admiscuntur.

*Emplastrum Amithaonis, ad articulos recenti cicatrice contractos, conuulsoque, est etiam ad extrahendum efficax.*

**A**mmoniaci, ceræ, bdellii, singulorum drach. octo, resinæ terebinthinæ, iridis illyricæ, galbani, singulorum drach. uiginti:

*Emplastrum Aristophanium emolliens.*

**P**icis lib. quatuor, apochymatis lib. duæ, ceræ libra, opopanaxaeis uncia, aceti hemina.

*Emplastrum ex plumbagine ad calidas affectiones.*

**P**lumbaginis unc. quatuor, spumæ argenti unc. duæ, cerusæ tantundem,



tantundē, ceræ unc. octo, myrtei lib. duæ, uino læuigātur arida.

*Coracon ex oxymelite, ad naturalium uitia & nomas accommodatum.*

**G**Allæ unc. duæ, squamæ fescuncia, chalcitidis, thuris, singulorum uncia: teruntur aceto diebus cōplusculis, deinde mellis unc. quinque; miscentur, ubi uerò seorsim ceratum feceris, ex myrtei uel rosacei uncijs duabus, seui taurini unciis octo, ceræ unciis quatuor: resinæ terebenthinæ uncia, mixta simul læuigato & utitor, quemadmodum medicamēto quod charta constat, tum ex penicillo, tum ex linamento.

*Emplastrum ex oxeleo.*

**A**Rgenti spumæ pars una, olei, aceti, singulorū partes duæ, nonnulli treis ponunt.

*Emplastrum ex achathe, discutiens emolliensque.*

**L**Apidis achatis semiusti fescuncia, ceræ unc. quinque, resinæ frictæ unc. tres, olei uncia.

*Isis, cruentis, accommodata, ad glutinandum, carnem inducendum, & purgandum.*

**S**quamæ æris, æris combusti, aristolochiæ rotundæ singulorum drachmæ octo, aluminis scissi drach. sex, salis ammoniaci, thuris, guttæ ammoniacæ singulorum drach. octo, myrrhæ, aloes galbani, singulorum drach. duodecim, dracunculi radicis succi drach. octo, ceræ libra, resinæ colophonix lib. duæ, olei ueteris unc. tres, aceti quod satis est.

*Athena, ad ulcera sordida, impacta, neruorum uulnera.*

**M**Alicorii, æris cremati, gallæ, aristolochiæ rotundæ & longæ, salis ammoniaci, guttæ ammoniacæ squamæ æris, aluminis scissilis, & rotundi, iridis, misyos, atramenti sutorii, chalcitidis, æruginis rasæ, cadmiæ, aloes, myrrhæ, propolis, galbani, singulorum uncia, ceræ drach. ducentæ, picis tantundē, resinæ colophonix drach. centum, olei unc. sex, aceti quod satis est.

*Emplastrum dia dictamnu, glutinans, ad canum morsus & omnigena ulcera.*

**A**Rgenti spumæ pondo duo, squamæ æris uncias sex, æris cremati uncias octo, aloes uncias octo, galbani uncias duodecim, olei ueteris sextarii duo, diphrygis unc. tres, gentianæ fescuncia,



fescuncia, aristolochiæ, æruginis rasæ, singulorum unc. duæ & semis, dictamni tantundem, colophonix pondo, mannæ thuris unc. tres, guttæ ammoniaci unc. sex, propolis unc. duæ, ceræ unc. sex & semis, primum oleum cum argenti spuma incoqui debet dum incrassescat, nec digitos inquinet, deinde lebetes deposito æruginem & squamam iniicies, rursus incoques, dum manum non inficiant, iterumq; cacabum ab igne tollens, resinam & ammoniacum in cretum adicies mouens, donec feruere definant, mox in ignem repones, ac ubi modicè inferbuerint, æs & diphryges admiscebis, ac rursus coques usq; dum firma spissitudo facta fuerit, deinde ceram iniicies, eaq; discotta ut digitos non coinquinet, propolin immittes, his abundè refrigeratis, mox aloen, mannâ thuris, dictamnium, aristolochiam, gentianâ, singula læuissima insperges.

*Barbara, emplastrum quod cruentis protinus uulneribus iniicitur, & fracturarum callos firmat.*

**B**ituminis Iudaici, picis aridæ, ceræ, resinæ, singulorum libra terebentinæ unc. duæ, argenti spumæ, uncia, cerusæ fescuncia, mannæ thuris unc. duæ, opopanacis unc. duæ, zingiberis unc. duæ olei unc. tres, aceti quantum sufficit.

*Emplastrum ex salicibus, dia iteon appellatur, glutinans, cruenta excreantibus, & purulenti efficax: thoracis impositum.*

**M**isyos, chalcitidis, æruginis, cerusæ, gallæ, aluminis scissilis & rotundi, cretæ sutoriæ, singulorum unc. sex, ceræ lib. duæ, resinæ piceæ lib. duæ, picis tantundem, malicorii unc. sex, bituminis, lib. duæ, salicis foliorum totidem, olei rosacei unc. quatuor, atramenti sutorii unc. sex, aceti quod satis est. sunt qui terebentinæ uncias nouem addant.

*Emplastrum Nicolai ad recentia uulnera, & sinus glutinandos aptum.*

**S**quamæ æris unc. quatuor, æruginis rasæ fescuncia, argenti spumæ tantundem, aristolochiæ longæ & rotundæ, singulorum uncia, aluminis scissilis & rotundi, singulorum uncia, atramenti sutorii uncia, sulfuris uiui uncia, gallæ omphacitidis unc. quatuor, salis ammoniaci uncia, misyos uncia, origani unc. chamæleontis uncia, cadmiæ botrytidis uncia, ueratri albi uncia, peucedani



peucedani unc. tres, apii seminis unc. duæ, symphyti radice se-  
fscuncia, cerusæ fescuncia mandragoræ succi semuncia, chalciti-  
dis fescuncia, terræ samæ, quæ alter dicitur uncia, thuris mascu-  
li uncia, aloes uncia, bdellii unc. duæ, opii thebani tantundem,  
zingiberis troglodytici semuncia, stillæ ammoniacæ uncia, fœ-  
nugræci unc. sex, perdicii herbæ succi unc. sex, ceræ flauæ unc.  
tres, resinæ colophonæ lib. duæ, resinæ pityinæ hoc est è picea  
libra polentæ tantundem, mastiches unc. sex, picis nigræ lib.  
duæ, olei ueteris libra styracis unc. opopanax fescuncia, aceti  
quod satis est.

*Icesios ad strumas, abscessus, lienem, articulos,  
& coxendicum dolores.*

**A**Rgenti spumæ denarii ceneum uiginti, olei ueteris sexta-  
rii duo, aceti sextarius, æruginis sesquidenarius, piceæ cor-  
ticis denarii octo, chamæleontis radice, euphorbii, hypocisti-  
dis succi, propolis, zingiberis, heleni, pyrethri, singulorum de-  
narii sedecim, ceræ lib. tres.

*Emplastrum Neronis, ad ictus, omnemque parti-  
cularum carnosarum dolorem.*

**O**lei ueteris sesquilibra, argentæ spumæ libra, ceræ resinæ  
piceæ, singulorum unc. septem & semissis, guttæ ammo-  
niaci unc. quatuor, cerusæ tantundem, galbani, mannæ thuris,  
zingiberis, thuris, singulorum uncia.

*Oxera, multiplici usus.*

**P**icis aridæ lib. duæ, ceræ libra, guttæ ammoniacæ uncia, resi-  
næ terebinthinæ sesibra, galbani unc. duæ, mannæ thuris un-  
ciæ duæ, aceti sesquiseptarius.

*Aceratos, hoc est ceræ expers, emplastrum Galeni, glu-  
tinat, concoquit, ulcera ad suppurationem perducit,  
ex ricinino aut ueteri oleo, medicaminis in linteolos il-  
liti modo solutum.*

**A**Rgenti spumæ trepondo, olei ricinini, aut ueteris pondo  
quatuor, aceti quàm acerrimi dupondo, æris squamæ nigræ  
chalcitidis, æruginis, singuli sextantes: argenti spuma cū oleo  
incoquitur, dum strigmenti fiat spissitudo deinde metallica  
compluribus diebus ex aceto læuigata adiciuntur.

Emplastrum



*Emplastrum ex metallicis .*

**C**halcitidis uncia, misyos unc. duæ, squamæ æris unc. tres, thuris tantundem, colophonix unc. duæ, galbani fescun-  
cia, ceræ libra, olei quincunx, aceti quod satis est.

*Armenia, fracturis accommodata .*

**C**halcitidis unc. quatuor, squamæ æris un. duæ semis, æris cre-  
mati uncia, thuris unc. duæ, olei lib. aceti rātundē: coquuntur  
metallica in oxelæo, dū manū nō inquinēt, inde thus adiicitur.

*Melane Serapionis .*

**S**pumæ argenti libra, ceræ unc. septem, guttæ ammoniaci un-  
ciæ tres & semis, galbani, æruginis, singulorum denarii no-  
uem, resinæ colophonix unc. septem, myrrhæ drach. olei sesqui  
hemina: argenti spuma cum oleo incoquitur quousq; digiti in-  
tincti non inquinentur, deinde adiciuntur reliqua.

*Anicetos, ab insuperabili ui appollatum emplastrum,  
glutinat, discutit, squamas separat, & ad articu-  
los recenti cicatrice contractos ualet .*

**B**accarū lauri, iridis aridæ, thuris, singulorū drach. sexaginta, æris cōbusti drach. uiginti, nitri, salis, ammoniaci, singu-  
lorū drach. uiginti, pyrethri, herbæ pediculariæ, seminis roris  
marini, grani gnidii, sinapis, columbarū stercoris, aristolochiæ,  
cumini, æruginis, iunci quadrati, erucæ seminis, singulorū drac.  
octo, aceti hemina duodecim: læuigātur sub æstu caniculæ, quo  
usq; acetū cōsumatur, deinde decocti caricarū crassissimi unc.  
nouē adduntur, quibus mixtis pastilli fiunt, siccantq; ubi uten-  
dum est, pastillorum ipsorum unc. duæ læuigatæ aceto miscen-  
tur, resinæ unc. tres, ceræ tyrrhenicæ unc. duæ, olei tantundem.

*Emplastrum ex lolio, dia arcu dicitur .*

**P**icis lib. duæ, resinæ picæ unc. nouem, ceræ tyrrhenicæ unc.  
quinque, olei uncia tres, bituminis increti unc. duæ, lolii fa-  
rinæ sextarius, aceti quantum sufficit.

*Emplastrum ex liquore sycamino .*

**A**rgenti spumæ, picis aridæ, seu taurini, singulorum unc.  
octo, terebinthinæ unc. tres, ceræ unc. quinque, æruginis ra-  
sæ, opopanax, galbani, singulorum uncia, olei ricinini, aut susi-  
ni, aut admodum ueteris hemina, picis liquidæ tantundem, li-  
quoris sycamini cuius fructus sycomora dicuntur, hemina.

Emplastrum



*Emplastrum à duplici colore dichromon appellatum.*

**A**eris combusti, aluminis scissilia, guttæ ammoniacæ, singulorum uncia, ceræ libra, resinæ colophonix libra, seui suilli libra, aceti, quod satis est.

*Inde conglutinans ad ulcera quæ serpendo depascunt, & sanguinis sputum.*

**C**eræ, resinæ frixæ, picis aridæ, bituminis liquidi, zacynthi, singulorum libra, cerulæ, chalcitidis, misyos, cretæ sutoriæ, aluminis scissilis & rotundi, gallæ omphacitidis, singulorum unc. sex, aceti quod satis est.

*Emplastrum ex cinere aspidum, discutit strumas & podagras.*

**R**esinæ terebinthinæ, lapidis hæmatitis, bituminis Iudaici, singulorum drach. trecentæ sexaginta, ceræ, baccarum lauri, guttæ ammonicæ, aphronitri, seui uicini, singulorū drach. trecentæ quadraginta, lapidis pyritis, calcis uiuæ, singulorum drach. centum quadraginta, cineris aspidum totidem, olei ueteris heminæ duæ: refrigerato medicamento cinis inspergitur. fit etiam sine cinere, quod nonnulli eum auersentur, & nihilominus etiam efficit.

*Leæna, siccat discutitque.*

**S**affiminis ammoniaci, plumbaginis, singulorum drach. centum, sinapis drach. octo, chamæleontis radice drach. sedecim, resinæ colophonix drach. centum, squamæ æris, lanariæ radice, singulorum drach. quinq;, euphorbii, æruginis, singulorū drach. octo, aristolochiæ drach. sedecim, pyrethri drach. octo, olei ueteris hemina, raphanini quantum sufficit.

*Aliter leæna, noxia educit in superficiem, humorisque euacuat.*

**A**tramenti sutori unc. duæ, auripigmenti uncia, ueratri nigri, thoracum cantharidum, singulorum, sesquidrachma, sandarachæ unc. tres, ceræ sesquilibra, resinæ frictæ libra, olei heminæ duæ.

*Macedonium.*

**C**eræ, resinæ colophonix, picis, seui taurini, lachrimæ thuris, pares portiones: eliquatis, ac sublati ab igne lachrima thuris inspergitur.

Sphærien



*Spherion ad ardores.*

**C**eruse, argenti spumæ, calcis niuæ, singulorum unc. tres, ceræ fescuncia, aluminis berenicarij, rosacei, singulorum uncia: liquefacta aridis superfunduntur, ac orbiculi formantur, quum usus incidit, olei uncias sex liquato cum duabus ceræ, adiicitoq; medicamento uncia & agitato: refrigeratū ex aquæ uncis nouem contundito, ego etiā ternas rosacei uncias addo.

*Emplastrum ex ochra, inflammationem arcet, tum sponte, tum in iudicio tortis idoneum.*

**O**chræ atticæ lib. duæ, cretæ libra, argenti spumæ unc. octo, uino læuigatæ ceræ, resinæ colophonix, picis, resinæ piceæ, singulorum libra, resinæ terebenthinæ unc. octo, olei lib. duæ, hunc in modum soluntur: ceræ libra, olei ueteris lib. tres, medicamento libra uino contunduntur.

*Emplastrum ex cedria glutinat, discutit, abstergitque.*

**C**eræ, picis aride, singulorum libra, resinæ colophonix unc. octo, cedrini liquoris unc. sex: liquata simul incoquantur, dum digitos non coinquant.

*Aliud emolliens.*

**C**eræ, picis, singulorum unc. octo, resinæ colophonix drach. uiginti quinque, propoleos drach. semptemdecim, cedrini liquoris drach. uiginti.

*Emplastrum ex punice. ad cicatricem ducendam.*

**M**yrtei, lib. duæ, ceræ libra, pumicis cremati uinoq; restincti drach. sex, squamæ ferri quod stomoma dicitur drach. sex, gris uisti, cimoliæ, singulorum drach. quinque: super linamentum spongiamq; ex aqua accommodato.

*Emplastrum paula, strumis & bubonibus efficax.*

**C**eræ, resinæ colophonix, nitri, singulorum libra.

*Emplastrum ex nitro ad carbunculos.*

**N**itri tosti unc. tres, ceræ, olei, resinæ colophonix, singulorū sesquidrachma, liquoris cyrenaici aut medici drach. decem: imponitur in linteolis, solutum.

*Emplastrum ex anemone.*

**A**nemone unguibus detractis uncia duæ, ceræ unc. quinque, olei uncie quatuor, resinæ uncie quinque & semis,

PAULI AEGIN.

R colopho-



colophonix resinæ libræ duæ & semis .

*Emplastrum Macherionis viride, ad coxendicum cruciatus, articulos infarctos, & abscessus .*

**O** Popanacis, galbani, æruginis, myrrhæ, iridis, guttæ ammoniac, aristolochiæ, singulorum uncia, resinæ terebinthinæ, ceræ, olei omphacini, singulorum unc. sep tem .

*Viride aliud simplex .*

**R** Esinæ lib. tres, ceræ libra, æruginis rasæ selibra, thuris drac. uiginti quinque, aceti quod satis est .

*Aliud viride, ad humida u t i a, & carnis excrescentias .*

**R** Esinæ colophonix unciæ sex, æruginis rasæ fescuncia, ceræ unciæ duæ, salis cappadocii uncia, rosacei unciæ duæ, aceti quantum sufficit .

*Pegnera ad pleuriticos .*

**R** Vtæ uiridis pondus, butyri sesquipondo, resinæ terebinthinæ pondus & quadrans, hyssopi medicamenti tantundem, opopanacis quadrans, galbani tantundem, anethi pondus .

*Emplastrum dia stactes, hoc est, ex lixiuio, coxendicum doloribus, articularijs, & tumoribus*

*œdema refrentibus utile i*

**C** Eræ, olei ueteris, lixiuii quod habet calcem admistam, singulorum libra, resinæ frictæ, nitri alexandrini, nitri albi, resinæ terebinthinæ, singulorum unc. sex: utrumque nitrum lixiuio teritur .

*Emplastrum è nitro ad abscessus, scyrrhos, & tumores .*

**O** Lei ueteris, ceræ, aphronitri, saponis, lixiuii, singulorū lib. resinæ, terebinthinæ unc. sex, galbani, propolis, guttæ ammoniaci, singulorū unc. præparatur quemadmodū superius .

*Emplastrum ex sale, dia halon dicitur .*

**C** Eræ unciæ quatuor, olei libra, salis communis unciæ quatuor, aphronitri tantundem, cerusæ unc. octo, aceti unc. duæ, ad arida conterenda. **A L I T E R.** Salis communis, nitri, singulorum unc. quatuor, ceræ, olei ueteris, singulorum unciæ sex, aquæ marinæ quod satis est .

*Emplastrum dia pternes, ex perna, topbos soluit .*

**P** Ernæ suillæ ueteris pinguis, guttæ ammoniaci, casei ueteris uaccini



uaccini aut caprilli, seui taurini, apochymatis quæ est naus ratura, singulorum libra, medullæ ceruinæ uncia octo, hyssopi cerati unc. tres, cyprini olei unc. sex, uini Aegyptii quod satis est.

*Emplastrum dia cinnabareos, hoc est, ex cinnabari ad tophos aliosque omnigenos tumores induratos, dicitur pamplethes.*

**A**rgenti spumæ libra, olei ueteris sextarius, squamæ eris uncia, æris usti tantundem, cinnabaris scrupula octodecim, lapidis magnetis uiui uncia, lapidis phrygij drach. sex, lapidis pyritidis, cadmie, æruginis rasæ, thuris, singulorum uncia, diphrygis unc. duæ, aloes sescuncia, galbani tantundem, lapidis onitis scythici scrupula octodecim, lapidis hæmatitis uncia, propolis libra scrupula uintiocto, ceræ unc. septendecim, lapidis perdiciatis uncia, (in alio perdiciati habet) betonicæ uncia scrupula octo, gentianæ uncia, aristolochiæ longæ & rotundæ drach. quatuor, chamæleontis nigri uncia, dictamni scrupula quadragintaduobus, resinæ aridæ libra, seui struthiocameli libra: lapides cum spuma argenti teruntur seorsim, adiectis salis floris libris duobus, donec totum absumatur.

*Emplastrum ex auellanis, dia leptocaryon dicitur, ad articulorum tophos probatum.*

**L**ixiuii quod calcem habet adiectam unc. sex, auellandarum partis interioris unc. duæ, aphronitri unc. sex, olei ueteris libra, saponis gallici unc. quatuor, mellis unc. octo, ouorum sex aquata, ceræ unc. decem, resinæ terebinthinæ unc. duæ: læuigantur ex lixiuio.

*Dia turpenes ceratum ad podagram, dolorem leniens mirabiliter.*

**Q**Vinto Martii mensis, die, olei cõmunis sextarios, duos lebeti in domo subterranea infundito, coquitoque lignis e uite: ubi inferbuerit, turpenæ marini piscis libram adiecito, asphalacis animantis, quod nonnulli madamudam uocant, sanguinis uncias quatuor, incoquitoque dum carnes piscis dissoluantur aut torrescant, deinde exemptis illis, olei & ceræ momentum adiecito in spissitudinem, ut mollissimum fiat ceratũ, quod lincolo illitum impones.

R 2      Emplastrum



*Emplastrum ex urina muli, podagricis utile.*

**V**Rinae muli sextarii quatuor, argenti spumae lib. duae, olei ueteris mystrum, trita diu omnia ut strigmenti spissitudo fiat, incoquito donec digitos non inquinent.

*Emplastrum ex lapidis asii flore philagrij ad scyrrhos.*

**P**ucedani radicis, asij lapidis floris, si non adsit, salis, guttae ammoniacae, lanarum succidarum crematarum, singulorum uncia, aristolochiae rotundae, pumicis, canini stercoreis, aëru ginis rasae, squamæ æris, misyos, singulorum scrupula octodecim, castorij tantundem, myrrhae unc. tres, acetum quàm acerri mi tantundem, cerae unc. duodecim, & semis, resinae e picea, picis brutiae, singulorum unc. octodecim, semis scrupula sex, olei ueteris quod sufficit.

*Ex eodem Galeni.*

**C**erae, resinae terebenthinae, singulorum libra, lapidis asij, mannae thuris, singulorum tres unc. cyprini unc. duae, aquae lixiuiae quantum satis est.

*Emplastrum ex salis flore, articularijs in declinatione accommodatum.*

**R**esinae terebinthinae, resinae frictae, resinae e picea, cerae, singulorum libra, picis aridae, aluminis scissilis, salis floris, singulorum semibra: coquantur in lebece.

*Emplastrum quod nutriendae ulcerum carni est.*

**R**osacei, resinae terebenthinae, mellis, singulorum unc. duae, cerulae, butyri, singulorum uncia, alii etiam thuris unciam addunt.

*Emplastrum Italicum ad purgandum sordida, inducendumque carnem.*

**E**rinæi (dico autem sylvestris ficus) tenerum corticem oleo excoctum proicito, cerae rufae quantum satis est. in oleo liquefacito, in linamenta illito utitor.

*Entaticon, quasi dicas intensorium.*

**S**atyrii, pudendi ceruini, scisci caudae, singulorum drach. duae, ærucæ seminis, pyrethri, seminis rorismarini, cerae, singulorum drach. quatuor, resinae terebenthinae drachma, oua passerum troglodytarum tria, stelliones transmarini tres, olei laurini uel irini quod satis est: macerantur uini in aceto stelliones ad dies



ad dies triginta, uase cui insunt in fimo defosso.

*Cbryse, cruentis uulneribus accommodata.*

**T** Huris, aluminis scissilis singuli sextantes, colophonix resinæ libra, olei quadrans auripigmenti sextans, aceti cum oleo mixti, quod satis est.

*Catagmatice quod est fracturis idoneum medicamentum, Oribasii.*

**P** Icis brutix libra, unc. quatuor, argenti spumæ tantundem, thuris unc. octo, resinæ terebinthinæ unc. quinque, seui taurini libra, unc. quatuor, galbani, opopanacis, singulorum uncia, ceræ unc. quatuor, olei ueteris libra, aceti unc. quinque.

*Catagmatice ad fracturas cum uulnere citraque id factas, ex commentarijs Heracleti.*

**P** Icis aridæ mina, argenti spumæ tantundem, mannæ thuris minæ dimidium, seui uitulini mina, ceræ tyrrhenicæ uigintisex, opopanacis unc. octo, æruginis rasæ, æris cyprii, singulorum minæ quinque & decima eius portio, resinæ terebinthinæ sesquimina & quinta portio, æris uncia, recinini, aut olei ueteris hemina, aceti hemina semissis.

*Liquidi hyssopi medicamenti præparatio.*

**S** Ertulæ campanæ nnc. quatuor, cardamomi unc. duæ, lamarum bene sordidarum unc. sex: macerata in uini duobus sexrariis ad triduum incoquito, dum paululum fuerit reliquum. his ablati miscentur uino olei unc. tres, coquanturque; dum exiguum superfit, atque uino etiam tunc adiiciuntur resinæ colophonix unc. decem, terebinthinæ tantundem: nonnulli uerò & ceræ dextantem miscent, hyssopi herbæ unciam, aliisque; incoquant: alii lanas uino eluunt: ubi deficcarint, uinum cum sordibus lanarum addunt, quas pinon etiam appellant quum usus incidit, treis ex eo uncias mittunt, tum reliqua ut comprehensum est.

*De Malagmatis & epithematis. Cap. XVIII.*

**I** Nter ea quæ malagmata dicuntur, alia mediis corporis partibus iniiciuntur, longa inflammatione conflictantibus, aut induratis, aut æstu flagrantibus, aut perfriktionem fluxionemve expertis: alia articulis quibus humores sint impacti uel neruis refrigeratis, uel etiam aliis particulis scirrho obsessis

R 3 congruunt.



cōgruunt de his igitur tum in capite de emplastris tractatū est tum ubi ad acopa uentum erit differetur. Porro inter malagmata mediis corporis regionibus accommodata, ) epithemata propriè nuncupantur) quæ quidem stomacho, & iocinori ad mouentur, qualiacunq; illa fuerint roborantem ex astringentibus uim postulant. Sine his etenim uitæ aliquod discrimen intulerint, cum illa nempe stomachus & iecur communes aliarum partium alimenti, sint officinæ. Quamobrè eiusmodi medicamenta ex aromatis potissimum conficiuntur. Stomacho igitur iniici debent, si non concoquit, aut infirmatur, aut inflatione laborat, malagmata ex seminibus, meliloto, aloe, absinthio, sampsucho, nardo, & mastiche. Iecori autem ex myrobalano confecta, ammoniaco, pinguibus, & chamæmelino. At lie ni applicantur, quæ constant calce uiua, auripigmento, cappari, salicibus, cardamomo, æruginè, ammoniaco, & aceto: iis autem qui alui fluore laborant, ex cenanthe, alumine, melino, & aliis astringentibus præparata. atq; hæc etiam per abusionem communiter malagmata nominant, & si diuersam à molliendo uim repræsentet. Si uerò ardor uiscera urgeat, in febribus ardentibus, ex croco competunt malagmata, rosaceo, succo lini seminis, aut intybi, aut herbæ seminalis, adipe suillo, & spuma argenti: si perfrixerunt, ea quæ opobalsamum, phyllum, casum, & piper recipiunt. Pectori, quum sanguis eiicitur, profunt astringentia siccantiaque, ex alumine, salice, & bitumine. In tabe quæ phthisis dicitur, conducunt ex baccis lauri, marrubio, cardamomo, & lixiuio confecta.

*Malagma ex fertula campana, dia meliloton dicitur.*

**C**Roci, nardi gallici, iunci angulosi, cardamomi, iridis, myrrhæ, singulorum unc. duæ, fertulæ campanæ libra, stillæ ammoniacæ tantundem, ceræ lib. tres, resinæ terebinthinæ libra, olei cyprini lib. tres, gleucini lib. duæ, bdellii unc. sex, nonnulli etiam cyphi uncias duas addunt, uini quod satis est.

*Polyarchion ex commentario Galeni de compositione medicamentorum secundum locos.*

**C**Eræ, resinæ terebinthinæ, bdellii suffiminis ammoniaci, cardamomi, iunci quadrati, singulorum mina, fertulæ campanæ, amomi, nardi Indice, croci, myrrhæ, thuris, xylocinnamomi, singulorum drach. uiginti quinque, olei cyprini hemina, uini



uini Italici quod satis est: præparato ac utitor, interim mero, interim cerato quod ex cyprino fit, soluto.

*Aliter polyarchion.*

**X**Ylobalsami, costi, iridis, iunci quadrati, myrrhæ, iunci rotundi floris, cardamomi, thuris, spicæ nardi, mastiches, styracis, bdellii, amomi, phylli, croci, cassiæ, pyrethri, aristolochiæ longæ, singulorum uncia, guttæ ammoniacæ fescuncia, resinæ frictæ tres unc. resinæ terebinthinæ libra medullæ ceruinæ uncia duæ, ceræ lib. duæ, opobalsami unc. sex, uini uncia octo.

*Philagrianum.*

**C**Roci fescuncia, aloes, ammoniaci thymianatis, bdellii, styracis, singulæ unc. a lipis anserini sextans, hyssopi medicinali triens, palmularum sextans, ceræ libra, nardi selibra, melini unc. sex, uini quod sufficit ad sicca læuiganda: per triduum macerantur mouenturque rudicula ter die, deinde incoquantur oleo, secundo die cardamomum aqua pridie maceratum, tertio autem crocus, uino. Nonnulli cum croco etiam alias quinque myrrhæ uncias adiiciunt: illis autem exemptis, oleum purum reponunt, omni uero specierum facie in pastillos coacta siccataque id habent quod crocomagma, dicitur.

*Mendesium.*

**D**Ictum est Mendesium quod in Aegypto reperiatur, ubi & Mendes, hoc est, caper colitur. Recipit autem olei balani libram, alias sextarios decem, myrrhæ, cassiæ fistulæ, singulorum uncias treis, resinæ terebinthinæ libram, in alio, sextarios decem, cinnamomi uncias treis: hoc non decoquitur, sed aridis inditis diebus sexaginta agitur, inde liquefacta terebinthina in partem olei mittitur, postea rursus diebus aliis septem mouetur, atque sic reconditur.

*Marciatum.*

**M**Astiches, ceræ, styracis, singulorum unc. tres, hyssopi medicinali semuncia, opobalsami fescuncia, nardini, gleucini, olei omphacini, singulorum unc. tres, medullæ ceruinæ fescuncia, terebinthinæ uncia.

*Iniectio prima dia omphacos.*

**A**Spalathi, rudiculae palmarum, fertulae campanæ, iridis, iunci rotundi floris, xylobalsami, rosarum siccarum, calami aromatici, singulorum uncia tres, olei omphacini

R 4 lib.



lib. decem, uuae immaturae succi tantundem.

*Iniectio secunda, ex caryophyllo.*

**A**mmoniaci, spicae nardi, costi, caryophylli, cassiae, casami, singulorum nunc. tres, in alio etiam habetur arnabo unc. tres uini quod sufficit.

*Iniectio tertia.*

**T**huris, guttae ammoniaci, styracis, bdellii, myrrhae, mastiches, singulorum unc. tres, uini quod satis est, cerae albae unc. quinque, opobalsami unc. sex, nonnulli uncias octo. Primae iniectionis medicamenta, pridie in uuae acerbae succo oleoque macerantur, secundae seorsim in uino aminaeo aut alio ueteri, ac odorato, mouenturque; quotidie rudicula palmae: tertiae ad triduum, post quod in cacabo nitente primum in ectonis primae medicamenta incoquantur, quousque pauxillum succi uuae acerbae relictum fuerit: mox secundae iniectionis species cum uino immittuntur, rectius aurem fiet si prius aliis exemptis, puro deinde oleo ipsae adiciantur, coquanturque; donec paululum uini super sit, ne aduratur oleum: sublata ab igne eximito, superque adiecito rursus oleo puro tertiae iniectionis medicamenta, prius ex uino in pila soluta praeter styracem quemadmodum praedixi, hic enim cum aliis inditus prompte soluitur. Coques autem carbonibus quousque bene habere tibi uideantur: sublata ab igne refrigerari finito, insequenti die exceptis diligenter ex oleo calfactisque; abunde super ignem ceram adiecito, inde sublata rudicula agitato, ubi refrixerinto, opobalsamum admisceto, & uitreis uasis reponito.

*Gleucinum, iniectio prima.*

**O**lei sextarii decem, musti aminaei sextarii sex, aspalathi unc. quatuor, palmae fructus operimenti quod spathe dicitur unc. sex, iunci rotundi floris tantundem, sertulae campanae unc. quatuor, rosarum uncia, myrrhae unc. tres, foliorum lauri unc. duae, arboris thuris unciae sex, xylobal sami totidem, inulae campanae unc. sex, aristolochiae longae unc. tres, iridis tantundem: haec macerantur in musto.

*Altera iniectio.*

**N**ardi gallicae unc. quatuor, casami, qui est balsami fructus unc. duae, cyperi, cassiae, spicae nardi, asari, amomi, costi, sampsuchi, singulorum unc. tres, calami aromatici, caryophylli, phylli,



phylli, singulorum uncia, cardamomi unc. quatuor, balsamum uino odorato madescit.

*Iniectio tertia.*

**M**astiches triens, myrrhæ troglodyticæ, bdellij, singuli sextantes, ladanij quadrans styrcis liquidi, thuris masculi, singuli trientes, opobalsami selibra, nonnulli & croci sextantē addunt, præparatur quemadmodum medicamentum ex uina acerba, nisi quod ceram non recipiat, hic autem septem diebus oportet species duarum iniectionum macerari.

*Nardus cizicine, iniectio prima.*

**O**lei primi meriti sextarij decem, aspalathi, cypiarum inula campanæ, iridis, xylobalsami, aristolochiæ, cardamomi, iunci rotundi floris, singulorum unc. sex, sampsuchi unc. quatuor, herbæ sabine unc. duæ, nonnulli & calami odorati uncias duas immittunt: hæc in uini odorati sextarijs quaternis commadescunt.

*Alter a iniectio.*

**C**assia, casami, arnabo, singulorum unc. duæ, spicæ nardi unc. tres, caryophylli uncia, costi, amomi, singulorum unc. duæ nonnulli etiam nardi gallicæ uncias duas addunt, atq; hæc in uino macerantur.

*Tertia iniectio.*

**M**yrhæ troglodyticæ, aloes, thuris, singulorum unc. duæ, styrcis unc. tres, mastiches unc. quatuor, opobalsami unc. sex, quidam & croci uino læuigati unciam miscent. præparato & hoc sicut comprehensum est.

*Decamyron.*

**S**pice nardi, phylli, euphorbij, piperis, costi, adarces, singulorum uncia, mastiches sescuncia, opobalsami unc. sex, nardini libra, ceræ lib. tres.

*Pentamyron.*

**S**tyrcis uncia, mastiches unc. duæ, ceræ albæ unc. tres, opopanax unc. quatuor, nardini unc. quinque.

*Euodes, à grato odore dictum.*

**C**roci, aloes, mastiches, absinthii, styrcis, cenanthæ, casami, caryophylli, singulorum unc. tres, nardi libra, ceræ tantundem, melini unc. sex, palmulæ, duodecim, uini quod satis est.

Baion.



*Baion.*

**C**ardamomi, cassiæ, ænanthæ, nardi gallicæ, balauftiorum, propolis, singulorum scrupula octo, herbæ sabinae, casami, amomi singulorum scrupula sex, iunci rotundi floris scrupula octodecim, iridis scrupula quatuor, caryophylli sesquiscrupulū, suffiminis Crinati unc. dug, thuris, myrrhæ, singulorū uncia, ladanii unc. sex, bdellii, mastiches, aloes, nardi, olei lentiscini, singulorum semuncia, resinæ acernæ quæ zygia dicitur, resinæ picæ, resinæ terebinthinæ, singulorum unc. tres, opobalsami uncia, guttæ ammoniaci scrupula sex, ceræ unc. sex, ænanthino liquida læuigantur, aridaque tontulā in alio exemplari piperis quoque scrupula octodecim inuenio: nonnulli & moschi scrupulum unum addunt.

*Galenium.*

**C**Roci semuncia, aloes uncia, mastiches tres unc. absinthii seminis scrupula octo, ænanthes tantundem, palmulæ maiores tres, ceræ unc. tres olei melini unc. sex.

*Erythrium.*

**S**Tyracis unc. quinque, malorum cotoneorum unc. uiginti, masuchæ uel masuphii, croci, singulorum drach. decem, psichæ, cyphios, singulorum drach. quinque, ænanthæ unc. duæ semis, casami, ablinthii, singulorum drach. decem, caryophylli scrupula quindecim, guttæ ammoniaci scrupula decem, opobalsami scrupula sex & semis, nardi unc. quinque, resinæ colophonæ, gleucini, melini, singulorum unc. decem, rosacei drachmæ decem, propolis unc. quinque, resinæ terebinthinæ unc. decem, mellis cochlearia decem, phylli drach. decem, spicæ nardi tantundem, ceræ unc. septem & semis: uino falerno aut amaro conteruntur.

*Malagma Nili ad lienem, omnemque duritiem.*

**C**eræ pondo, guttæ ammoniaci pondo, olei cyprini pondo, croci semuncia, secundum alios unc. acetī quantū satis est.

*Citrinum.*

**C**eræ resinæ, colophonæ, singulorum libra, suffiminis ammoniaci, auripigmenti, calcis, aluminis, acetī, singulorum cyathi octo, læuigantur arida in aceto.

*Malagma*



*Malagma quod ad Cureum autorem refertur.*

**P**Iceis aridæ libra, ceræ, resinæ piceæ, guttæ ammoniaci, nitri, baccarum lauri aridarum, seu taurini, singulorum lib. duæ, farinæ fœnugræci sextarius, pollinis frumentacei tantundem, chamæleontis nigri radicis siccæ libra.

*Malagma ex stercore caprillo Oribasii, ad lienosos, hydropicos, & iecur induratum.*

**C**Yprini, aut uetustissimi olei lib. tres, ceræ lib. duæ semis, fimi caprarum, baccarum lauri cortice detracto, iridis illyricæ, singulorum sextarii decem, resinæ terebinthinæ libra, sinapis, nitri, cyperi, raphani seminis, capparis radicis corticis, singulorum unc. tres, cucurbitæ syluestris carnis unc. duæ, fœnugræci uncia: inrerim arida excipiuntur liquidis, interim aceto macerata: quod si aluus profluat, cucurbita iniici non debet.

*Ex fimo caprillo sphongion, hydropicis efficax.*

**P**Iceis brutiæ lib. duæ semis, nitri libra una, cucurbitæ syluestris carnis, pyrethri, opopanacis, cocci gnidii, singulorum unc. tres, capparis radicis corticis, thuris, iridis, adipis taurini, elaterii, squamæ æris, apii seminis, lathyridum, singulorum uncia sex, baccarum lauri sextarii dimidium fœnugræci farinæ semuncia, fellis taurini unc. duæ, olei cyprini sextarii dimidium, ceræ libra, resinæ frictæ lib. tres, caprilli stercoreis montani, cachryos, cyper, cardamomi, singulorum unc. sex.

*Ex baccis lauri.*

**C**eræ, resinæ, picis, baccarum lauri, seu taurini, singulorum libra, nitri, guttæ ammoniacæ singulorum unc. sex, aceti quantum sufficit.

*Medicamentum dia spermaton, hoc est, ex seminibus.*

**C**ardamomi, cyperi, herbæ sabinae, nitri, baccarum lauri, cassiæ, fertulæ campanæ, fœnugræci, nardi gallicæ; apii seminis, sampsuchi, anisi, panacis radicis, thuris, guttæ ammoniaci, terebinthinæ, singulorum unc. tres, mellis, ceræ, nardi, singulorum libra, seu taurini tantundem.

*Malagma à fædo odore dysodes dictum, ad pleuriticos.*

**R**esinæ piceæ libra ceræ, rutæ uiridis cyprini, singulorum uncia sex, sulfuris uiui, opopanacis, sagapeni, singulorum drach.



drach. quatuor, nonnulli & galbani tantundem addunt.

*Malagma dia sampsychu.*

**C**Eræ pondo, resinæ terebinthinæ pondo duo, sampsuchi, bacarum lauri, scœnugræci, singulorum sextarius, nardini quod satis est.

*Malagma apollophanis ad iecorosos.*

**C**Eræ drach. octoginta, resinæ terebinthinæ, mannæ thuris, singulorum drach. quadraginta, mortario irini sedimento uncto contunditur.

*Copton ad duritiem Stomachi & iocinoris.*

**P**Ropolis unc. sex, styracis unc. duæ, mastiches uncia, resinæ terebinthinæ semuncia, fecis nardini quantum satis est.

*Malagma ex ænanthe.*

**O**Enanthæ, aloes, croci, acaciæ, aluminis scissilis, rosarum siccarum, absinthii succi, gallæ, omphacii, thus syriaci, mannæ thuris, singulorum drachma olei myrtei, ceræ, utriusque libra, palmulæ magnæ quinque, uini quod sufficit.

*Antylium.*

**A**Luminis scissilis semuncia, aloes uncia, mastiches scrupulum, ænanthes scrupula, sex, omphacii scrupula octo rosarum siccarum tantundem, rhu syriaci scrupula decem, spinæ Aegyptiæ totidem, balaustiorum scrupula uiginti, gallarum scrupula quindecim, ceræ unc. quinque, olei melini quod sufficit.

*Malagma ex uinaceis, dia gigarton dicitur.*

**C**Roci, sandycis, labruscæ, singulorum uncia, aluminis sicci unc. quatuor, balaustiorum, omphacii, rosarum floris, myrtorum siccorum, singulorum unc. duæ, ceræ albæ libra, olei melini lib. duæ, malorum cotoneorum unc. quatuor, dactyli qui nycolai dicuntur decem, uini aminæi quod satis est, uinaceorum aridorum unc. octo in usu, medicamento uncis tribus ceræ unam misces.

*Anethine.*

**A**Nethi uiridis unc. sex, fertulæ campanæ unc. duæ, chamæmeli tantundem, capitum papaueris uiridium decem excoctorum iuris lib. tres, & olei quod sufficit: ubi uerò consumptum fuerit ius, adipis suilli recentis lib. duæ adduntur, tritisque priuatim scilicet tostæ interioris uncis duabus & medul-

læ



læ ceruinæ totidem, omnia miscentur.

*Ambrosia ad febreis arcendas apta.*

**A**Rgenti spumæ libra, adipis suilli recentis unc. sex, lini seminis succi tantundem, ceræ albæ uncia nouem, rosacei libra, mellis unc. tres, croci uncia, nonnulli etiam ouorum decem lutea cruda addunt.

*De acopis, inunctionibus, dropacibus, & sinapismis.*

*Cap. XIX.*

**A**Copa inde nouem sortiuntur, quod præcipuè ad lassitudinis, quæ copos græcè dicitur, nempe tensuæ ulcerosæ & eius quæ ossa defatigar, sensum cōueniāt, quam aliis quoq; morbis compluribus sint ex usu. † Alia liquidem ipsorum calefaciendi uim habent, alia emolliendi. Quæ calefaciunt, pipere, pyrethro, semine rorismarini, & consimilibus constant: neruorum uitis, perfrictionibus ualidis & quæ uix ullo calore possunt euinci, accommodata. Quæ emolliūt, durities, scirrhus, & infarctos articulorum sinus discutunt, quorum materies capite de emplastris comprehensa est. At emollientibus quæ adarce, semine rorismarini euphorbio, cocco guidio, & id genus aliis componuntur, in diu turnis affectibus, & qui agrè possunt elidi, quibus etiam sinapismus congruit, utimur. Porro spissitudinem uniuersa acopa inter cerata, & emplastra mediam habere conuenit. Vnguina uero acopis similia, liquidiorē propemodum substantiam obtinent. At dropax duplicem recipit præparationem hanc emplastro, illam malagmati consimilem, nonnulli & calidum ipsum illinunt: materiam uerò acopis & emplastris confinem. Ceterum usum cataplasmatibus exhibet, diuturnis affectibus iisdem quibus & sinapismus, utilis, ideoq; ante illum assumitur, quo corpus sinapi reddatur idoneum, à sinapismo adhibetur, ut affectus reliquias discutiat. Sinapismus materiam quidem uariam non habet, uerum diuturnis potissimum affectibus post deprehensam probatamq; aliorum præsidiorum uim, efficacissimus est, utilissimè autem applicatur capiti in eius dolore, quem cephalæam dicunt, & quum altera duntaxat ipsius pars affligitur Græci heterocraniam uocant, in morbo comitiali, uertiginibus, & insania: pectori autem in suspirio, orthopnœa, hoc est, quū non nisi recta ceruice spiritus trahitur, & tulli lōga. At in diuturna



diuturna humorum è capite in fauceis destillatione, & caput & thorax sinapi oblini debet. Item stomachus & uenter, in longis ipsorum morbis eodem obducuntur. Iam conueniens est præsidium sinapi coxendicum & podagricis doloribus, omni-  
que parti resolutæ, aut alio quodam modo persfrictionem ex-  
pertæ, ut difficulter excalheri possit. At tunc profecisse satis id  
putato, ubi dolor subsequutus fuerit ualidus & caro liuidior al-  
tiorque, euaserit, & postquam ablotum fuerit, mitius pustulæ  
eruperint. Quodd si etiam sensus perierit, animum adhibere ne-  
gotio conuenit, parte quam oblineris sæpius detecta: nam si  
uel immodicè adurantur ita affecti non persentiscunt. Præte-  
rea in acutis morbis, utpote lethargo, profunda in somnum de-  
lacione (cataphora dicitur) & catocho, sinapi inducitur, per  
initia quidem, cruribus, ubi uerò materia radices egerit, capiti.  
Porro qui ita frigori patuerunt ut uix ullo modo queant incale-  
scere, iis crura & inguina sinapi oblinuntur. In his autem qui con-  
tinua febre laborant, ulcusque habent, tum in cartilaginosis, tum  
locis ex carnibus, uitari debet sinapismus: nam partes carnibus  
uacuae si obducantur sinapi, uruntur, interim etiam nigrescunt.

† Hæc uerba ita leguntur in nostris codicib. τὰ μὲν γὰρ ἀν-  
τὼν ἐστὶν θερμαντικὰ τὰ δὲ μαλακτικὰ τὰ δὲ ἀμυκτικὰ. Oro-  
scius tamen legendum putat ἀμυκτικὰ.

*Bromion acopon.*

**C**Eræ, resinæ colophonix, singulorum libra, adipis suilli unc.  
quatuor, butyri unc. sex, althææ, fœnugræci, seminis lini,  
singulorum lib. duæ, olei libra, galbani unc. duæ & semissis, ex  
cocto succo cum oleo, quousque magna illius pars fuerit ab-  
sumpta, reliqua cum cera & galbano adiiciuntur.

*Acopon à uarietate pœcilon dictum.*

**S**Vcci althææ, fœnugræci, seminis lini, rutæ, cumini, singulorum  
lib. duæ, medullæ ceruinæ, olei ueteris, adipis anserini, opo-  
balsami, nardi, singulorum libra, ceræ, colophonix & resinæ, sin-  
gulorum sesquilibra, euphorbii, resina terebinthinæ, opopana-  
cis, singulorum unc. sex, castorii unc. tres, herbarum unde suc-  
cus exprimitur, singulorum libra iniicietur: coques ut superius

*Acopon Azanite.*

**A**dipis suilli lib. duæ, seui taurini, resinæ colophonix, hyssopi  
medicamenti, ceræ, singulorum libra, galbani unc. tres.  
Acopon



*Acopon Basilij.*

**A**lthææ, chamæmeli, sertuæ campanæ, lini seminis scœnogræci, singulorum sescuncia, amomi unc. tres. hæc macerantur in uini Ascalonii aut Cilicii sextariis octo, per triduum, coquunturq; ad melleam spissitudinem, deinde succi lib. quinque cum olei ueteris libris quatuor & semisse decoquuntur, quousque modicum succi fuerit relictum, adiciuntur butyri unc. sex, resinæ terebinthinæ unc. quatuor adipis anserini unc. quindecim, medullæ ceruinæ cum momento olei læuigatæ unc. quinque, ceræ albæ lib. tres.

*Lysiponium.*

**P**iperis, castorii, styracis, mastiches, aloes, inulæ campanæ, iris, singulorum unc. quatuor, euphorbii, costi, guttæ ammoniaci, myrrhæ, sampsuchi, thuris, cyperi, cassiæ fistulæ, semen rorismarini, singulorum nunc tres, adarcæ, amomi, bdellii, xylobalsami, singulorum unc. duæ, malabathri, spicæ nardi, pyrethri, croci, singulorum uncia, opobalsami, libra, nardini, cypri, gleucini, singulorum lib. duæ, ceræ libra.

*Acopon à fædo odore dysodes appellatum, ex opere de compositione medicamentorum secundum genera.*

**C**eræ, resinæ, terebinthinæ, singulorum drach. uigintiquatuor, galbani, suffiminis ammoniaci singulorum drach. sex, olei ueteris heminæ duæ, medullæ ceruinæ drach. octo: uti tor mero & diluto.

*Aliud dysodes.*

**R**esinæ terebinthinæ drach. sedecim, ceræ drach. uiginti octo, æsyp<sup>i</sup>, mellis, singulorum drach. sex, medullæ ceruinæ unc. sex, stillæ ammoniacæ, galbani, aphronitri, baccarum lauri, singulorum unc. sex, olei ueteris sextarius, uini cyathi duo, quidam etiam castorii drachmas treis admiscent.

*Barbaricum, dia euphorbiu, ad coxendicum dolores, & alia pleraque.*

**O**popanacis uncia, ceræ tyrrhenicæ libra, resinæ terebinthino libræ duæ & semis, galbani uncia, stillæ ammoniacæ uncia duæ, euphorbii, castorii, piperis albi, singulorum uncia duæ, medullæ ceruinæ unc. quatuor, æsypi tantundem, lemnestidis (est autem adarce) semuncia, olei styracini, laurini, irini, amaricini,



amaricini, singulorum unc. sex, olei ueteris lib. duæ, hedicroi uncia sex.

*Acopon cui nomen est pycis.*

**R**efinæ colophonix sesquilibra, refinæ terebinthinæ uncia, octo, guttæ ammoniaci unc. tres, thuris unc. nouem, olei ueteris lib. duæ, succi lini seminis libra, lactis uaccini tantundem, adipis anserini unc. sex, butyri unc. octo, ouorum uiginti quatuor albumina, præparatum buxæ uase reponitur.

*Acopon ex abiete Galeni.*

**A**bietis seminis cocti modius Italicus, hoc est, sextarii duodecim, olei lib. quindecim, ceræ lib. quatuor, refinæ strobilinæ aut terebinthinæ unc. quatuor. Contusum abietis semen, oleo iniicitur. Vbi quadraginta diebus in eo fueris, expressum prolicito, mixtis reliquis utitor, ad labores spontaneos, resolutiones, & articulorum perfrictiones. At si necessitas urgeat, coquere oportet semen abietis cum oleo mixtum ne nimium aduratur, & aquæ sextariis quatuor, idque in podagricis & articulariis affectibus.

*Aliud ad idem.*

**O**lei heminæ uigintiquinque, id est, sextarii duodecim & semis. fructus abietis modius, hoc est, libra semis, refinæ abiegnae lib. tres, strobilinæ uel terebinthinæ lib. tres, ceræ libra.

*Acopon ex nigra populo, dia ægyptos dicitur, ad eadem.*

**L**oco fructus abietis, nigrae populi fructus æqua portio additur, & reliqua similiter illi præparantur.

*Unguentum zofimi ad tremulos celebratum.*

**R**efinæ piceæ unc. sedecim, ceræ unc. quatuor, olei ueteris libra, opopanacis unc. duæ, adarce uncia, euphorbii tantundem, nitri unc. quatuor, aphronitri teneri totidem: nitrū, euphorbium, adarce cum uino læuigantur, deinde adiicitur opopanax, simulque in læuorem teritur, seorsim autem quæ liquari possunt, cum anchusâ ad colorem accipiendum eliquantur, refrigerata excipiuntur.

*Dropax Gallus, Oribasii.*

**R**efinæ colophonix quæ thus redolet, piceæ & lignosæ dictæ quæ sola in Italia nascitur, apochymatis, picis aridæ, ceræ, singulorum lib. quatuor, refinæ frictæ unc. quindecim, pi



cis brutæ lib. duæ, nitri libra, bituminis, galbani, adarcæ, pyrethri, singulorum unc. sex, opopanax, euphorbi, ueratri albi, piperis, singulorum unc. quatuor, sulfuris uiui unc. tres, castorii, ammoniaci, uux pæsse syluestris staphis agria dicitur, singulorum unc. duæ, olei sicyonii libra opobalsami unc. sex.

*Aliter simplex.*

**C**Eræ pondo, picis siccæ pondo, picis brutæ pondo, resinæ piceæ sesquipondo, frictæ pondo & quadrans, loco prius nitro exterso imponitur.

*Quomodo sinapismus fiat.*

**F**Icus siccatæ pridie in aqua tepida macerari debent, die insequenti probè expressæ ualenter læuigari, deinde acre sinapi, cuiusmodi est syriacum ægyptiumque priuatim conteri, diluto illarum affuso, factaq; massa admisceri, & siquidem uehementem sinapismum uoluerimus inducere, parteis duas sinapis cum una ficuum temperabimus: sin imbecillem, e contrario: si mediocrem, æqualeis. Cæterum sinapi antequàm deteratur, aceto commadescens, ut nonnulli faciunt, languidius euadit. At sinapi ablato, etiam balneum utile est. Si dolor uehemens ruborve accesserit, & pustulæ, linteolum succo maluæ aut fœnugræci cum rosaceo madefactum imponemus, deinde rosaceo cerato cum cerusa utemur. Verum in resolutis in quibus sensus labefactatus est, cura adhibetur, ut sæpius partem re regamus, inspiciamusq;: Quum enim admota non percipiant, sæpe immodicè exusti sunt. Item caprarum fimus cum aceto illitus sinapi est efficacior, & præsertim in coxædicû doloribus.

*Acopon ex atramento librario, cutis ruborem peculiariter inducens, idque potissimum in ijs, quibus altera capitis pars dolet, ex commentarijs Alexandri.*

**E**Vphorbi, atramenti librarij, singulorum drach. quatuor, myrrhæ troglodyticæ, crocomagmatis, piperis albi, singulorum unc. tres, croci drach. duæ, aceti quod satis est ad hæc probè læuiganda, utque spissitudo sordibus similis ipsi fiat: quo facto illines, à media superciliorum parte incipiens, adusq; tempora tota, præsertim si æger pilis careat: ubi refrigerata fuerint, rursus illines: & quum præsidium bene profecerit, in balneum hominem deduces.

PAULI AEGIN.

S

Quomodo



*Quomodo diuersa olei & unguentorum genera  
conficiuntur. Cap. XX.*

**I**nunctionum unguentorumq; uel olei generum quæ unguenta repræsentet, alia sunt simplicia, una olei specie iniecta, alia composita ex pluribus conflata. Ac simplicium alia ex floribus oleo incoctis efficiuntur, uerbi causa, rosaceû, chamæmelinum, sulinû. Quædam ex fructibus, & seminibus conficiuntur: quædã ex surculis quibusdã nempe rutæ, qui etiã simul cum oleo coquuntur. At cû nullus florum coctionẽ recipiat, insolantur potius. uerû si ualidam odoris gratiã repræsentent, & pluribus diebus constantẽ, ex insolatu tenuius ipso rum oleû magisq; utile redditur, quemadmodû rosaceû & chamæmelinum. Qui inualidiores sunt faciliusq; diffilari possunt, minus insolatum tolerant, ut quorum uirtus promptẽ euanescat, utpote lilium & uiola. Ex iis quæ fructibus & seminibus cõstant nõnulla illis integris oleo iniectis conficiuntur, ueluti melinû, nonnulla contulis uel læuigatis, oleamine ipso rum sequestrato, uel expressis ipsis in cõchulas: uel ex aqua calida, sic ut ipsa discernantur, exempli causa, caryinon, sesaminû, amygdalinum, lentiscinum, laurinû, ricininum, raphaninû, atq; eius notæ alia. Porro quæ ex stirpibus odoratis componuntur, præparari potissimum solent, illis, oleo incoctis cû uino uel misto, uel aqua, atq; eisdem deinde exemptis. Liquoribus autẽ quibusdam oleo contemperatis, interim & adipibus uel medullis, ex huiusmodi aliquo exactam olei spissitudinẽ sortita, simplici sermone unguenta uel inunctiones nominantur, ut gleucinum, nardinû, sicyonium & cyprinû. Sunt quæ acopa crassitudine repræsentent, ceram aut resinã aut eiusmodi quippiã recipientia, uocanturq; myracopa, ueluti decamyron, amaracinû, atq; his similia. Iam uerò aliqua una uice coquuntur, quæ non diuersam recipiunt materiã, sicuti metopion, mastichinum, sicyonium aliqua duabus tribusue, & quatuor iniectionibus. Primum continuatioribus incoctis, ut aspalatho, spatha, thure arbore, lauro: inde aromatis, phyllo, spica nardi, amomo, herba sabina: postremo liquoribus, adipibus & medullis. Si autẽ eueniat, cera quoq; & resinis inditis. At balsami liquor neutiquã coquitur, sed post absolutam coctionẽ unguento mediocriter refrigerato instillatur. imò ex ipsis unguentis sunt quæ nullã coctionem



coctionem recipiant, sed tantū misceantur, quale est mende-  
 sium. Nonnulli uerò uiride unguentum reddere cogitantes,  
 ubi ab igne sustulerint, in olei sextariū intingunt, æruginis ra-  
 sã in exactum detritã læuorẽ sescunciam, immiscentes, quem-  
 admodum in cyprino & amaracino. Cæterum simplicia qui-  
 dem unguenta specierum quæ in ipsa mittuntur, naturam uel  
 eorum ex quibus contusis facta sunt, obtinent, ut oleum uel  
 ti materiæ rationem obtineat. At quæ uariam magis cõposi-  
 tionem sortita sunt, tota eorum natura ad calidum inclinata  
 est, sed quædã ualide calefaciunt emolliuntq; , ut etiam articu-  
 lis recenti cicatrice obductis & sinibus eorum infarctis conue-  
 niant, ueluti metopium, mendesium, marciatum: mediocrius  
 autem est pentamyron, quemadmodum decamyron ualētius  
 ut etiam summa rodat: mediocriter autem calida tenuiaq; di-  
 co. At uerò modicè calida extenuant leniunt & concoquunt,  
 quale est susinum, amaracinum, irinū, crocinum, foliatinum.  
 Alia præterquàm quòd calefaciunt, abundè siccant inciduntq;  
 ueluti cyprinum & ficyonium. Alia calefaciunt quidem insi-  
 gniter, sed uires magis confirmant, unde stomacho potissimū  
 & uisceribus resolutis competunt, qualia habentur mastichi-  
 num, nardinum, & gleucinū. Valētius adhuc corroborat, quod  
 ex uua acerba conficitur. Iã nonnullis unguentis ob gratum  
 duntaxat odorẽ utuntur, ut foliato, spicato, cõmogeno & quæ  
 moschelæa, quasi dicas, ex musco & oleo cõfecta nuncupantur.

### *Rosacei confectio.*

**R**osarum rubrarum detractis unguibus marcescentium die  
 nocteq̃ue una, uncia tres, olei omphacini sextarius, urna  
 diligenter constricta ne perspirent, insolabis sub dio diebus  
 quadraginta, atque sic repones non in pauimento, sed assere.  
 Aliqui uero uice insolatus in puteum urnam diebus quadra-  
 ginta mittunt, ut ex frigiditate odoris gratia conseruatur.  
 Alii uero ipsam sub terra defodiunt.

### *Chamæmolino.*

**C**hamæmeli floris sine albis foliis marcescentis, per diem  
 noctemq̃ue unam olei sextarius Italicus. uase lintheo sim-  
 plici contexto ut perspiret, insolatur, idq̃ue diebus, quadragin-  
 ta, inde securè hoc percolatum repones.

S a

Anethinum



*Anethinum.*

**A**Nethi uiridis comæ arefactæ uncia, olei dulcis sextarius Italicus. Simili modo insolantur, fiet autem & pro temporis ratione anethinum cum insolatus desideratur, sicci enim anethi comam decoquentes cum oleo in cacabo utuntur, & chamæmelino similiter: uerum hæc imbecilliora sunt iis quæ ex uiridibus fiunt & præsertim insolatis.

*Liliaceum alij susinum dicunt, quod in Susis  
forsan reperiatur.*

**F**oliorum alborum liliorum similiter marcescentium undæ in olei sextarium Italicum, coniectæ exactè circumstringuntur, ne euaporent, & per triduum insolantur, inde primis exemptis proiectisque, aliæ undæ unc. iniiciuntur per triduum subsequens, atque sic reponuntur.

*Susinum compositum.*

**O**lei sextarii tres, calami odorati lib. quinq;, myrrhæ unc. quinque, cardamomi lib. tres, lilij foliorum unguibus ablatis arefactorum libra, cinnamomi unc. tres, croci cilicij unc. quinque: tota confectio tribus iniectionibus distinguenda est. Primum myrrha & calamus odoratus, uino ad dies quinq; macerata ter die mouentur, inde oleo modicè incoquantur, deinde cardamomum aqua maceratum triduo mouetur similiterq; rursus cum oleo ad horam unam incoquitur, inde exemptis illis tertiam liliorum partem oleo puro inferemus, tribus, diebus post his quoq; exemptis reliqua liliorum tertia portio immitteretur, iterumque post triduum exemptis proiectisque primis, postremo tertia pars cum croco læuigata iniicietur. Secundum alios tres dies ablato oleo cinnamomum contusum indetur. Huius in uicem, Arnabo, aut carpesium, aut cassiæ duplicatum, atque reponetur.

*Violaceum.*

**V**iolaceum præparant, modò purpurearum, modò crocearum, modo candidarum uiolarum foliis ungue desecto, trium unciarum pondere coniectis in olei omphacini sextarios quinque Italicos: circumstricta exactè, ne perspirent, ad dies decem insolantur, tertioq; eadem mutantur ad triduum, quemadmodum lilia: ad repositionem autem pauca iniiciunt exactè arida.

Melinum.



*Melinum.*

**H**Oc efficitur ex malis cotoneis extrinsecus panniculo inuolutis, & in frusta cum suis corticibus dissectis, deinde unciis ternis illorum, in decem olei omphacini sextarios Italicos coniectis, atque quadraginta dies insolatis.

*Sesaminum.*

**S**esaminum oleum fit, contusis uel læuigatis sesamis, expressisque per fiscellas in cochleis, oleo ipso ceu in aqua calida segregato, uasisque uitreis reposito.

*Raphaninum.*

**E**odem modo fit raphaninum in Aegypto, ex semine raphani qui tenuem radicem habeat contuso segregatoque.

*Ricininum siue cicinum.*

**H**Oc quoque similiter in Aegypto fit, ex semine ricini qui croton dicitur, pari modo contuso aut læuigato.

*Aegirinum.*

**V**erno tempore oleum fit Aegirinum, hoc est, ex nigra populo, quum resina circa semen copiosa existit: etenim grana populi contusa unciis quatuor in dulcis olei sextarium immittunt, diebusque quadraginta insolant, uel horis tribus in lebetes decoquant, atque sic exempta reponunt.

*Amygdalinum.*

**C**onficitur hoc quoque sicut prædictum, amygdalis amariis &que puris, contusis, aqua modica irroratis separatisque, ut comprehensum est: Nonnulli tusa amygdala unciis duabus, dulcis olei sextario Italico immissa, in cacabo decoquant.

*Amygdalinum, quod & metopion dicitur.*

**A**Egyptii huius olei inuentores metopion ipsum nuncupant, quod galbanum recipiat: germen autem unde galbanum nascitur, metopion appellatur. Hæc recipit, olei omphacini sextarios uiginti, amygdalarum amararum libras duas, cardamomi libram, iunci rotundi floris, calami odorati, carpobalsami, singulorum libram, myrrhæ, galbani, singulorum uncias sex, resinæ terebinthinæ, libras duas, uini odorati ad arida imbueda sextarios quatuor, mellis attici libras tres: resinam & galbanum in læuorem redacta ex olei parte soluta, reliquis incoctis adiiciemus, necnon ipsum mel: Mixta uerò accuratè omnia

S 3 abigne



ab igne tollentes, quum tepidum est medicamentum eximimus, nam refrigeratum concrefcit.

*Balaninum.*

**B**alaninum oleum perinde ut simplex amygdalinum præparatur, ex querneis glandibus.

*Caryinum.*

**H**oc quoq; ut supra dictum ex uetustis nucibus conficitur.

*Laurinum.*

**P**rum quidem Laurinum simili ratione & lauri fructu confit, mixtum uero hæc recipiet: maturarum oliuarum sextarium, cum duobus baccarum lauri miscemus: teruntur omnia exprimenturq; . Nonnulli æqualẽ amborum portionem miscent.

*Lentiscinum.*

**L**entiscinum oleum laurini modo ex lentisci semine conficitur, idq; bifariam & per se, & cum oliuis immaturis.

*Mastichinum.*

**M**astichinum simplicissimum quidẽ fit, chiæ mastiches uncia, omphacini olei sextario Italico immissa, excocta que in cacabo. Nonnulli uero absinthii & styracis, singulorum unciam adiungunt.

*Mastichinum magis uarium.*

**O**lei sextarii quinquaginta, inulæ cāpanæ libræ quinq;, xylobalsami libræ decem, iunci rotundi floris libræ quinq;, cardamomi libræ septem, mastiches libræ quinque, xylomastiches libræ octo, resinæ terebinthinæ libræ tres, absinthii comæ libra, uini odorati sextarii quinque, aquæ sextarii decem, arida uino ante tertium diem macerata oleo miscentur, & aqua horis sex coquuntur, ac mastiche & terebinthina iniicitur: accuratè mixta excipiantur: refrigerata transfunduntur.

*Sicyonium simplex.*

**R**adix cucumeris syluestris marcida duarum unciarum pondere in olei sextarium Italicum mittitur, atque in lebece coquitur, fitq; sicyonium.

*Sicyonium compositum.*

**O**lei sextarii decem, cucumis syluestris radicis derafæ pondus, serpylli, fertulæ campanæ singulorum uncia sex, tedarum piceæ pinguium, althææ singulorum uncia quinq;, scolopendriæ



Iopendriæ uncia sex, fœnugræci sextarii duo. Fœnugræcum aqua primum die uno prius commadescet, deinde exemptum inditur commemoratis unâ cum oleo, & uini sextariis duobus omnibusque incoctis adiciuntur medullæ ceruinæ cum momento olei læuigatæ uncia quatuor, adipis gallinarum totidem, rursus exceptum oleum in aliud uas transfunditur. Nonnulli ipsum post coctionem diebus quadraginta insolant.

*Aliud sicyonium efficacius.*

**E** Laterii succi sextarii tres, aristolochiæ rotundæ & longæ, styracis, inulæ cāpanæ, hyssopi, iridis, cucurbitæ sylvestris, pulegii, origani, cyperi, thuris arboris, centaurii, foliorum lauri, singulorum uncia duæ, olei sextarii quinque. Mistâ incoqui to dum parum succi relictum fuerit.

*Cyprinum ex commentarijs Posidonij.*

**O** Lei sextarius, iunci quadrati, inulæ campanæ, iridis, singulorum libra, sampsuchi, hyssopi, uiticis seminis elelisphaci, singulorum uncia tres, iunci quadrati floris libra. Reliqua omnia pridie in uino macerata coquuntur cū oleo horis sex. Excepto oleo puro, iuncus quadratus iniicitur. Siquidem adsit uiridis cum teneris uirgultis non concisis, sin minus, certè aridus contusus cum aquæ momento coquetur sesquihora. At si uoles ipsum tingere postquā ab igne fuerit ablatum, indito æruginis puræ sesquilibram. Posidonius autem acrimoniam æruginis uitans, à coctione (inquit) triduū dimittes oleū in cacaibo bene humido, & tingetur ita ut uirtus ipsius nō offendatur.

*Alia scriptura cyprini.*

**C**yperii foliorum, lauri foliorum, iridis, cyperi, elelisphaci, singulorum quadrans, thuris arboris, aristolochiæ longæ, uiticis seminis, singulorum triens, inulæ campanæ, aspalathi, singulorum uncia sex, rutæ uncia duæ, cupressi uncia duæ, olei sextarii decem. Hæc prius uino madefacta, incoques oleo. ubi exemeris iniice, rursus xylobalsami, xylocassiae singulorum uncias quatuor, sampsuchi, cumini, myrti, styracis, mastiches, singulorum uncias tres, opopanacis uncias duas, iunci quadrati floris uncias sex, æruginis unciam.

*Amaracinum.*

**I** Nulæ campanæ pondo, xylobalsami libræ uiginti, cyperi libræ octo, iunci rotundi floris, aspalathi, herbæ sabinae  
S 4 singulorum



singulorum libræ octo, opopanacis, amaraci seminis singulorum libræ duæ, olei primi meriti sextarii duo, uini odorati sextarii quinque. Alia omnia superius dicta primum iniectionem habent uino prius macerata, secundam herba sabina, atque illa quidem horis sex incoquantur. hoc autem tribus nonnulli etiam hoc tingentes æruginis uncias tres iniiciunt.

*Irinum.*

**I**Ridis, aspalathi, cyperi singulorum libræ quinque, opopana-  
cis uncia tres, anchusæ unc. duæ, olei sextarii triginta, aquæ  
sextarii quindecim. Sunt qui adiiciant iunci rotundi floris un-  
cias sex, cassiæ uncias tres, xylobalsami uncias sex, nardi galli-  
cæ, tantundem, omnia contusa aqua pridie macerantur, inde  
oleo diebus quinque incoquantur in lebetes ad sex horas: repo-  
niturque unguentum.

*Crocinum, in quo & alterius crocomagmatis con-  
fectura explicatur.*

**O**Lei omphacini odorati libra, calami odorati, myrrhæ tro-  
glodyticæ singulorum uncia quinque, cardamomi uncia  
septem, croci cilicii uncia sex primum iniiciatur calamus &  
myrrha uino læuigata, & ante unc. modo reposita, piperis albi  
grana quadraginta, myrrhæ troglodyticæ drachma, tunsa, cri-  
brataque teruntur rursus in mortario adiecta olei nardini li-  
bra. ut autem medicamentum reddatur nigrius, nucum corti-  
ces combustos detritosque in mortario adiecto: inde opobalsa-  
mi cochlearia tria, ceræ sesquilibram admiscero.

*Ee ænantharijs.*

*Cap. XXI.*

**N**On quod ænanthen, hoc est, labruscam habeant hæc,  
(nonnulli enim ne ænanthen quidem recipiunt) sed  
ex uino & flore liliorum nomen hoc sortita sunt. Vfus  
ænanthariorum apud quosdam odoris gratia duntaxat & deli-  
tiarum adhibetur, sic ut qui eis utuntur, à lauacro perfundan-  
tur: & mensæ ipsis per spongiam oblinantur. At apud eos qui  
rectè utuntur, etiam fiunt præsidia tum in resolutis, tum in iis  
quos syncope premit, si roborantibus stomachi cataplasmatibus  
admisceantur. Item in iis, qui se à morbo præsertim febrili re-  
colligunt, ubi lauacro egrediantur per totum corpus diffun-  
dentur: naribusque admouebuntur, adhuc spirantibus. Trahitur  
enim in altum, & spiritum animale, uitalemque confirmat;  
Adhæc



Adhæc utilia sunt ad morbum pestiferum uitandum, cum eiusmodi mutationem aer sustinet. Refertur autē huiusmodi unguentū ad Posidoniū authorē, à quo uocat̃ mesopotamenon.

*Oenanthini confectio.*

**C**assia, myrrha, thuris, phylli, amomi, mastiches, costi, carpobalsami, opobalsami, singulorum unc. tres, styracis pinguis unc. quatuor, uini odorati aminæi, Italici sextarij decem confusa omnia, cribrataque; styracem uero minutim concisum composito in urnam oris ampli, cum folijs liliorum pridie refrigeratorum, è domo una in alteram & unguibus detrahis, sint autem lilia numero trecenta. deinde uinum adiicitur, & opobalsamum, mista, commotaque; ante iniectionem, & constricto urnæ ostio quadraginta diebus insolantur. Balnei usus est in uirium ex morbo recreatione. Domus irrorabitur unguento, uasaque, & spongiæ intinctæ faciei admoventur.

*Alia confectio, nostra.*

**C**osti unc. tres, spicæ nardi, arnabo, caryophylli, singulorū uncis, amomi unc. tres, cassia, cœnanthes, calami, singulorum unc. nouem, styracis, opobalsami, singulorū unc. quatuor, lilia trecenta, uini falerni sextarii decē. Simili modo p̃paratur.

*De suffimentis & cyphi.*

*Cap. XXII.*

**C**yphis materia inter medicamenta quæ potuit dantur & antidota existit, usus est eius incensi ad odorem gratum conciliandum, quemadmodum & suffiminum. Interim naribus admouetur, ut destillationes ex capite in subiectas partes concoquat, grauedinesque, & obstructione liberet, purgetque; cerebri uentriculos, item pestilentialibus morbis euitandis. Iam per os quoque assumitur, tum ad hæc, tum ac ea quæ pectori inhærescunt, concoquenda: necnon ad frigidiores iecoris affectus, unde & Cyphoide appellata Antidota ueteres inuenerunt. Miscetur autem compositis medicinis, præcipuè epithematis & antidotis.

*Rosatum suffimen.*

**C**osti, amomi, myrrha, cassia, singulorum uncia, styracis, chia, bdellij, conchulæ Indicæ, musci, ladani, singulorum drach. duæ, rosarum purarum uncia uiginti nouem, opobalsami modicum, uini quod sufficit.

Suffimen



*Suffimen lirinum, quod crinaton dicunt.*

**L**iliorum ungue defecto libra, styracis primæ notæ, unc. novem, spicæ nardi, uncia tres, costi, caryophylli, amomi, mastiches, conchulæ Indicæ combustæ, mellis, singulorum fescuncia, opobalsami uncia quinque, uini quantum satis est, læuigata coguntur in pastillos.

*Cyphi magnum quod uocant solare, ex rebus triginta sex confectum.*

**S**tyracis, myrrhæ, ladani, aspalathi, inulæ campanæ, singulorum uncia sex, nardi gallici, phylli, cupressi seminis, guttæ ammoniaci, strobili, splanchni aut loco ipsius conchularum Indicarum maiorum, carpobalsami, singulorum uncia tres, cassiæ, iridis, seselis, sphagni, cyperi, cardamomi, calami odorati, singulorum uncia quinque, rosarum siccarum, croci, spicæ nardi, herbæ sabinæ, hastulæ regiæ radices (alii succi) singulorum uncia quatuor, lacapthi, hoc est, piceæ corticis uel alterius cuiusdam arboris uncie novem, costi, iunci rotundi floris, singulorum unc. duæ, iuniperi maiores quadraginta, minores quinquaginta, amomi, resinæ terebinthinæ, palmularum purarum singulorum libra, ficuū, siccatarū granis exemptis, uuarum passarum acinis ablatis, singulorum lib. duæ, mellis despumati lib. quinque. Posidonius etiam uini odorati sextarios treis adiicit.

*Aliud cyphi, quod rebus uigintiocto constat lunare appellatum.*

**B**dellij, inulæ campanæ, singulorum uncie septem, iunci rotundi uncie duæ, sphagni uncia quinque, iuniperi minores quinquaginta, cardamomi, uncia quinque, aspalathi uncia septem, cassiæ fistulæ uncia quinque, spicæ nardi uncia duæ, cyperi uncia quinque, hastulæ regiæ radices, herbæ sabinæ, singulorum uncia quatuor, cupressi seminis, nardi gallicæ, malabathricum cum foliis, rosarum siccarum singulorum uncia tres, costi, croci, singulorum uncia duæ, ladani, myrrhæ, singulorum uncia septem, caricarum pinguium, uuarum passarum, aciuis exemptis singulorum libræ duæ, strobilorum uncia octo, resinæ terebinthinæ libra, styracis uncia septem, palmularum pinguium libra, mellis libræ quinque, uini odorati quantum satis est.

Confectio



*Confectio masuchæ, quod nonnullis masuaphion  
uocatur. Cap. XXIII.*

**M**Eliloti sextans, xylobalsami, aspalathi, herbæ sabinæ,  
myrrhæ, amomi, iunci rotundi floris, foliorum lauri,  
myrrhæ stillatitiæ, styracis, calami odorati, sampsu-  
chi, singulorum uncia duæ, iridis uncia quinque, phylli, croci,  
singulorum uncia, opobalsami semuncia, gummi libra, rosa-  
rum siccarum uncia sex, uini quantum sufficit.

*Ex commentarijs Antylli, de pessis. Cap. XXIIII.*

**P**essi mulierum locis admoventur, cæterum generales ip-  
sorum differentia tres existunt, alii siquidem emolliunt,  
alii astringunt, alii aperiunt. Emollientes inflammatio-  
nibus uteri, exulcerationi, perfrictioni, strangulatiui, auersioni  
& inflationibus accommodantur. Fiunt autem ex cera tyrre-  
nica, cyprino, susino, pinguedine anseris aut gallinæ, butyro in-  
sulso, resina deusta, medulla ceruina, fœnugræco & quæ sunt  
eius generis. Aperientibus utimur, quum purgationem sup-  
pressam irritate statuimus, aut uulvam conuenientem com-  
pressamve emendare. Præparantur hi ex melle, artemisia, di-  
ctamno, brassica, succo dulcis radicula, porro, succo rutæ, scam-  
monia, & similibus. Astringentes in contrarium aperientibus  
usum exhibentur, nam fluxum muliebrem cohibent, & ada-  
pertum contrahunt uterum, prolapsumq; reprimunt. Materia  
uero astringentium prius in capite de collyriorum etiam mo-  
do comprehensa est. Ceterum conuenit pessi crassitudinem  
instar strigmenti & paulo spissiore facere, deinde lanam lina-  
mento tortilli similem, duplicatam in medicamentum tinctam  
ori uulvæ condere, sic ut stuppam prælongam habeat alligatā,  
quo pessus facile possit extrahi, quando usum fuerit.

*Pessus crocoides, ad inflammationes, auersiones,  
duritias & inflationes.*

**C**eræ albæ, medullæ uitulinæ, singulorum drach. sedecim,  
medullæ ceruinæ drach. undecim, adipis anserini drachmæ  
octo, adipis gallinæ drach. octo, mastiches drachmæ quatuor,  
hysopi medicamenti drach. tres, mellis drach. duæ, croci drach-  
mæ octo, rosacei qd̄ satis est, crocus lacte muliebri læuigatur.

*Pessus*



*Pessus ab aureo colore dictus chrysos emolliens  
laudatissimus.*

**C**Roci drachma, æsypi tātundem, medullæ ceruinæ drach.  
duæ, resinæ terebinthinæ, ceræ, adipis anserini, singulorū  
drach. tres, ouorum tostorum lutea sedecim, irini & rosacei  
quod satis est ex æquo.

*Passus libanius, menseis euocans & uulua ui-  
tius singulariter accommodus.*

**N**Ardini unguenti unc. sex, ceræ tyrrhenicæ unc. quinque,  
sufini unguenti unc. quatuor, adipis suilli recentis uncia  
tres, anseris & gallinæ adipis, medullæ ceruinæ, amaracini un-  
guenti, singulorum unc. duæ, seni taurini, resinæ terebinthinæ,  
æsypi, singulorū uncia: lebere eliquant, omnesq; reliqui pessi.

*Enneapharmacus.*

**R**osacei unguenti, ricinini, resinæ terebinthinæ, ceræ, mel-  
lis, adipis anserini & bouilli, medullæ ceruinæ & butyri pa-  
res portiones.

*Titianus emolliens.*

**C**eræ unc. sex, resinæ colophonæ unc. quatuor & semis, se-  
ui taurini unc. quatuor, guttæ ammoniaci tantundem:  
ammoniacum aqua soluitur.

*Pessus Aegyptia.*

**M**ellis, resinæ terebinthinæ, butyri, rosacei uel sufini, croci,  
singulæ partes: in quibus autem inflammatio abest, & sor-  
didis, æruginis dimidiam addunt.

*Gone ad concipiendum.*

**B**utyri unc. sex, hyssopi medicamēti, medullæ ceruinæ, adie-  
tis anseris & gallinæ, resinæ terebinthinæ, aloes singulorum  
unc. tres, ceræ tyrrhenicæ unc. sex, rosacei lib. duæ, myrrhæ, cas-  
siæ, singulorū unc. duæ, spicæ nardi uncia, mellis quod satis est.

*Quomodo medicamenta quæ emplastra ingre-  
diuntur coqui debeant.*

*Argenti spuma.*

**I**N medicaminum coctionibus argenti spuma cum oleo deco-  
quetur. Conuenit autem læuigatam rursus ex oleo conte-  
rere, ut sordidum fiat spissitudo, inde leni igne continenter ex  
coquere,



coquere, mouendo, initio igitur intumescit & in bullas attol-  
litur: ubi uero iam ferè satis incocta fuerit, colorem facci simi-  
liorem recipit. modus coctionis est, quum à tumore subsidet,  
& manus non inquinat.

*Plumbago.*

**P**lumbago similiter argenti spumæ excoquitur, sed eo usq;  
dum non modo digitos nō inquinat, uerū etiam ex igneo  
colore in rufum & uehementer floridum elanguescat.

*Aes crematum.*

**A**es crematum non protinus ab initio ad coquendum ini-  
citur, sed ubi emplastrum semicoctum fuerit. finis coquen-  
di est quum color ipsius, nisi admodum exiguum indatur, su-  
peret, & emplastrum rufum efficiat.

*Sori & diphryges.*

**S**ori & diphryges demittuntur & ipsa inter coquendum le-  
beti: diphryges autem sicut & squama, eousq; coquitur dum  
colore reliqua uincat. sori peculiarem coctionis finem non ha-  
bet, sed is omnibus communis est, ut emplastrum spissum red-  
datur, digitosque non inquinat.

*Chalcitis.*

**C**halcitis incoquitur æris modo, coctionemq; ipsius metitur  
inde si emplastrum fuluum magis & phœniceum euaserit.

*Flos æris.*

**A**ëris flos similiter æri coquitur, sed eo modo qui commu-  
nis esse coctionis solet.

*Atramentum sutorium.*

**A**tramentum sutorium in media coctione emplastro indi-  
citur, coctum uerò uehementiorem eius colorem efficit, & si  
alia ei non resistent, nigrum.

*Misy.*

**M**isy postremò adiicitur, quamdiu autem coqui debeat,  
propriè definitum non est.

*Auripigmentum & sandaracha.*

**A**uripigmentum & sandaracha in coctionis fine iniiciuntur.

*Plumbum ustum.*

**P**lumbum ustum in media coctione adiungitur.

*Cerusa.*



*Cerusa.*

**C**erusa in alba emplastra postremò mittitur, sic enim colorem conferuat, magisque albescit: in nigra autem, principio: cocta enim largius, nigrescit.

*Aerugo.*

**A**erugo uiridibus emplastris post coctionem iniicitur. In quibus neutiquam ollæ inditur, sed cum aceto detrita ipsi manentiq; in pila reliqua superfunduntur. In melinis emplastris, quum semicocta est confectio immittitur: nam moderatam consequuta coctionem, melinum quasi mali cotonei colorem efficit. ac in his quæ diprosopa, & dichroma dicuntur, per initia statim æruginem incoquimus. in quibusdam enim per coctionem primum melinum colorem inducit, qui duplicem repræsentat, postremò fuluum.

*Alumen.*

**A**lumen plerumque secundum coctionem additur, peculiarem uerò coctionis modum nullum habet.

*Minium, cadmia & pompholyx.*

**M**inium in fine admiscetur, cadmia & pompholyx per initia immittuntur.

*Sal nitrum, sulfur.*

**S**al & nitrum in medio coctionis, sulfur, in fine adiicitur, coctio autem ipsius emplastra nigrefacit.

*Terra & lapides, pumex, conchyliæ.*

**T**erram omnem & lapides plerumque ad coctionis finem iniicimus, item punicem & conchyliæ combusta.

*Oleum & reliqua pingua.*

**O**leum si quidem per initia fuerit iniectum, resine aut pici liquidæ emplastrum non spissescit, quare ubi crassa euaserint incocta, rectè inderetur, reliqua uerò pingua salis expertia, iuxta mediam coctionem adiungere conuenit.

*Vnguenta.*

**V**nguentum irinum coctionem quidem fert, sed cyprinum & rosaceum minus: reliqua neutiquam. quare ad finem coctionis immittenda sunt.

*Cera.*

**C**eræ priuatim sola non coquitur, ut quæ aduratur, neque cum



cum resina liquida, aut pice liquida, non enim coit spissaturq; ,  
uerum superiniicitur, uel oleo puro, uel oleo focum quodam  
metallico incocto, aut resinæ, aut pici prius incoctæ, ac prius  
quàm reliqua quæ possunt iniici spissescet.

*Resina.*

**R**esina arida, cum cera immittitur: liquida ante oīa alia ipsa  
priuatim decoquitur, nisi admodū paululū eius assumatur.

*Pix.*

**P**ix ante reliqua omnia additur. Modus autem coctionis, li-  
quidæ, dum inspissatur: aridæ, maximè dum amplius non  
amplius inter coquendum ebullit, neque inturgescit.

*Apochyma pix nauibus derafa.*

**A**pochyma læuigatum cribroq; ab excrementis suis secre-  
tum, emplastro posteaquàm coctū fuerit, insuper igitur. Si  
autē molle fuerit, cum oleo soluitur, sed prima ratio coquendi  
exactior est, quod scilicet in secunda pondus non conseruetur.

*Bitumen.*

**B**itumen inter initia iniectum coquitur, non autem id in læ-  
uorem deterere oportet, quoniam asperitudines fici oliua-  
rumque granis interioribus simileis, obtinet. Quapropter in-  
crassiores particulas confringendum est, coquendumq; in ace-  
to, sic ut non agitetur usque dum ebullire desinat. Ego uero  
(inquit Timocrates) in oleo decoquens, uoti compos euasi.

*Propolis.*

**P**ropolin emollire & discoquere oportet. siquidem à coctio-  
ne neutiquā diffunditur. At si & cerā emplastrum recipiat,  
propolin cū illa quēadmodū & galbanū, contusam iniiciemus.

*Ammoniacum.*

**A**mmoniacum circiter mediam coctionem iniicitur. detritū  
uerò si potest fieri & in tenuem redactum puluerem insper-  
gere conuenit: sin minus, cum liquore quodam leuigatum ini-  
cere: si emplastrum cruentis uulneribus adaptabitur, cum ace-  
to aut uino: si fistulis aut strumis omnino cum aceto: at si mol-  
le futurum est, qualia sunt quæ ano accommodantur, cū aqua,  
inde in sordium spissitudinem coactum aliis refrigeratis infun-  
dere, ne efferuescat.

*Opopanax.*



*Opopanax .*

**O**popanax multò post ammoniacum inditur : omnino autem paucam coctionem requirit. Idem etiam ex uino, aceto prius læuigandus est.

*Galbanum .*

**G**albanum neutiquam coctionem tolerat, uerum emplastro ab igne sublato, quo spissescat, sic ut digitos non inquit, emollicum inditur.

*Sagapenuu .*

**S**agapenum tunditur in pila, & teneriusculum redditum cum emplastro ubi ab igne sublato fuerit, emollicur.

*Aloe .*

**A**loe secundum coctionem inspergitur.

*Lachryma papaueris .*

**L**achryma papaueris pridie in aqua modica maceratur, inde in pila læuigatur, mox etiã emplastrum ei superfunditur.

*Thapsia .*

**T**hapsia inspergitur postrema, uel liquore quodã læuigatur.

*Bdellium .*

**B**dellium in læuorẽ pertritum, emplastro ab igne iam sublato inspergitur: at si pingue existat & læuigari non possit, sagapeno similiter ipsum contusum, ac in emplastri figuram coactum, post coctionem simul cum emplastro molliemus.

*Thuris lachryma & manna .*

**L**achryma thuris & manna coctione iam absoluta insperguntur, in sordium spissitudinem coacta ex melle modico aut aceto, aut aqua aut uino, si emplastrum liquorem recipiat.

*Myrrha .*

**M**yrtha ubi iam coctio finita est, inditur.

*Semina, radices, & herbae .*

**S**emina, radices, & herbae nullã coctionẽ sustinent? læuigatis igitur & in pila etiamnũ subsistẽtibus liquida superfunduntur.

*Qui ceræ modus cum oleo esse debeat .*

**Q**uod si unguina quæ Græci à leuãda lassitudine acopa appellant, conficere constitueris, oleũ ceræ quadruplũ immittes:



immittes : at si liquidum ceratum, ut in fracturis præparamus, duplicatum. Si medicamentum quod emplastri figuram habeat efficere cogitauerimus, portionem olei ceræ æqualem miscebimus, si aer ambiens moderatus extiterit : at si cera uetus aut squalida, aer frigidus fuerit, oleum paulò copiosius quàm cera erit : quemadmodum & si cera pinguis, aer existat calidus, paulò minor olei portio erit, paulum autem hoc, medij in utramlibet partem excessus duodecima erit portio, etenim undecim & tredecim olei uncias, ceræ libræ admiscebis.

*De medicamentis inuicem succidaneis ex commentarijs Galeni.* Cap. XXV.

**I**N Alexandria (inquit) muliere quadam morbo periclitante cum quæsissem lichnidem, nec eius fuisset data copia, nisi protinus uice lichnidis usus fuisset acanthij semine, perijsset mulier. Vnde rogatus ab amicis ad hanc succedentiū inuicē medicaminum expositionem ueni, secundum literarum seriem exorsus.

**V**ICE Abrotani, origanum.  
Absinthij, abrotanum.

Acanthæ, Cerasiorū acanthus.

Acanthij seminis, lychnis.

Aconiti, radix iridis syluestris.

Acori, asari radix.

Actes, hoc est, sambuci, acantha.

Adianthi, aphroselinum.

Adipis uulpini, adeps ursina.

Adipis ceruini, adeps anserina.

Adipis siulli, adeps uulpinus.

Aeruginis ferri, excrementum ferri.

Aethiopicæ oliuæ, lachrymæ acaciæ partes duæ.

Agarici, euphorbium.

Agriostaphidis, hoc est, syluestris uuæ passæ, dactyli Syriaci.

Alicacabi, semen Solani.

Aloes. Galenus Agalochi, centaureum, & impressus Pauli

codex, aloes Indicæ. aloes uiridis folia uel glaucium, uel lycium, uel centaureum.

Aluminis, sal fossilis.

Amianti, aphroselinum.

Ammoniaci thymiamatis, propolis.

Ammoniaci salis, sal Cappadocum.

Amyli, aridus pollen.

Amygdalarum amararum, absinthium.

Anacardii, psylla herba.

Anchusæ, hyacinthus.

Aracis, hoc est Cicerculæ, sesamum.

Aristolochiæ rotundæ, aristolochia longa.

Argemones, seriphion.

Armeni lapidis, atramentū Indicum.

Asbesti, hoc est calcis uiuæ, adarce

PAULI AEGIN.

T Afij



Asij lapidis, Gagates lapis, uel  
sal ammoniacus crematus.

Aspalathi, hoc est bituminis, pix  
liquida brutia.

Aspalathicae semen.

Asphodeli radices, betae succus.

Auripigmenti sandaracha.

## B

Balsami liquoris, myrrha flos.

Bdelli, spagnum aromaticum.

Euccinorum, ostrea.

Buprestis, blattae pedentes.

Butyri, lac bubulum concretum.

## C

Cadmiae, leucographis Aegyptia.

Calamintha, menta sylvestris.

Calami odorati, sphagnum.

Cantharidum, phalangia.

Capparis radices, radix ericae, uel  
myrica.

Cardamomi, cyperis ammoniaca.

Cassiae, cinnamomum.

Castorei, blattarum pedentium  
intestina.

Cedri baccarum, ladanum.

Ceraunii, leucographis.

Cerae lomentum cum propoli  
coquitur, & contrahitur.

Cerui cornu, caprillum cornu.

Ceruae, incrementum plumbi.

Chamaedryos, runcis sylvestris  
radix.

Chamaemeli, Anthenis.

Cicios, hoc est, ricini sordes pa-  
larum.

Cicutae, semen coriandri.

Cinnabaris, rhodocides.

Cinnamomi, cassiae duplum.

Clinopodii, heliotropium.

Cnidii seminis, semen uiticis.

Colocynthidis, semen ricini quod  
est crotonis.

Colophonie, apochyma, seu pix  
derasa nauibus.

Comariae, ammoniacum rhy-  
miama.

Coralli, moly.

Costi, cedrinae baccae. Galeus,  
costi, ammoniacum, baccarum  
cedri, baccae lauri.

Cotyledonis, anacardium.

Crinanthemi, aphrodisium.

Croci, crocomagma.

Crocodyli adipis, adeps canis  
marini.

Crocomagmatis, aloe Indica.

Cymini, semen brassicae.

Cymini Aethiopici, melanthium.

Cynosbati, halicacabi semen.

Cyperus, luniperus maior.

Cypheos, carica cremata.

Cyrenaici liquoris, syriacus li-  
quor.

Cucumeris, anchusa.

## D

Dauci seminis, semen sij.

Dictamni, salvia.

Diphrygis, apis phrygius.

Dorycnii, semen alterci.

Dracunculi, apobrotinum. Ga-  
lenus addit Damasonii, eryn-  
gium.

## E

Ebeni, lorinum aridum.

Ebisci radices, folia moti.

Elaterii succi, eiusdem herbae  
succus.



succus.

Eleisphaci, hoc est, saluæ, nepita.

Hellebori nigri, radix papyri.

Eneaphylli, potamogiton.

Ericæ feminis, gallæ omphacitis.

Erini foliorum, finus ciconiæ.

Erysimi foliorum, herba lanaria.

Erucae feminis, erysimi semen.

F

Feculæ uini combustæ, sandaracha.

Fellis cameli, fel ascalabotæ.

Fellis muris aranei, fel cameli.

Fellis hyenæ, fel perdicis.

Fellis uiperæ, fel ichneumonis.

Fici liquoris, liquor mori.

Fimi palumbini, finus colubæ.

Fimi Aluri, finus ichneumonis.

G

Galbani sagapenum.

Gentianæ radice, apii odorati radix.

Glycyrrhizæ succi, sycamini succus.

Gongilidis, hoc est rapæ, heliotropium.

H

Hederæ succi, persici liquor.

Hippuris, chamæpytis.

Hormini, lini semen.

Humidæ picis, succus panacis.

Hyacinthi, flos Isateos.

Hyenæ adipis, uulpis adeps.

Hyenæ fellis, fel perdicis.

Hysciyami, quod est alterci, rubi canis semen.

Hyperici, anethi semen.

Hypocystidis succi, acaciæ spinæ succus.

I

Iridis Illyricæ, helenium odoratum.

Innci odorati, cardamomum.

L

Lachrymæ papaueris, succus mædragoræ.

Ladani, sampsuchum.

Lanariæ radice ueratri nigri radix.

Lapathi radice, pyrethri radix.

Lapidis pyritæ, lapis pyrebolus.

Lapidis phrygii, lapis argyrites.

Lapidis magnetis, lapis phrygius.

Lapidis asii, lapis gagates.

Lathyridum, granum cnidium.

Lauri baccarum, serpillum aridum.

Lentisci, polygoni radix.

Lepidii, erythrodanum.

Lepidi radice, folia capparis.

Leporis marini, cancer fluuiatilis.

Leucini floris, struthion, seu lanaria.

Ligni balsami, radix uiolæ candidæ.

Lini feminis, fabæ succus.

Loti feminis, Betæ semen.

Lybistici, semen staphylini.

M

Malabathri, cassia uel nardus Indica.

Magnyting uitreg, l. brū Italicū.

Malorum cotoneorū, melilotū.

Maluæ, fenugrecum.

T 2

Mandra-



Mandragoræ, oleæ lachryma.  
 Mandragoræ succi, dorycnium.  
 Mannæ thuris, cortex thuris.  
 Mastichæ, lentisci medulla seu  
 cor.

Medullæ ceruinæ, adeps cerui,  
 uel medulla uituli.

Mellis sapa.

Mellis Artici crudi, mel aliud de  
 spumatum.

Meu, myrobalanus.

Myrsinites uinum, succus mori.

Misyos Cyprii, ochracigna.

Mulcerdæ, muscæ tantundem.

Mororum succi, ruborum folia.

Myrobalani, peucinum.

Myrrhæ trogloditidis, calamus  
 odoratus.

Myrtei olei, lentiscinum.

Myrti, succus mori.

Misy torrefactum, diphryges.

## N

Nardi Syriacæ, iuncus odoratus.

Nepitæ, menta syluestris.

Napi, gongilidis semen,

## O

Ocymi, sisymbrium.

Ocymoides, syluatica menta.

Oenanthes succi, ampelini arbo-  
 ris succus.

Olei ricinini, oleum laurinum.

Olei ueteris, duplū olei coqui-  
 tur cum adipe suillo ueteri.

Oleæ lachrymæ, hypocistidis suc-  
 cus Galenus oleæ Aethyopi-  
 cæ lachrymæ.

Opocarpali, liquor myrti.

Opopanacis, lac sycamini.

Orizæ, hordeacea farina.

Oenitho gallorum, anthani.

## P

Papaueris liquoris, mandragoræ  
 suceus.

Peristereonis, chamæleuce.

Peucedani liquoris, succus gly-  
 cyrrhizæ.

Picis liquidæ, opopanax.

Pityocampæ, uespæ, in Cedriā.

Piperis, zingiber.

Polypodii, radix Chameleæ, uel  
 chamæleontis.

Polytrichi, absinthium.

Propolis, ladanum.

Populi nigræ surculorum, sam-  
 psuchus.

Pfilii, lenticula palustris.

Pterei, cncori semen.

Pulegii, hyssopus.

Pyrethri, zingiber.

Pumicis, terra Cretica,

Phu, sphagnus.

Phyci, anchusa.

## Q

Quercus, chamæleon.

## R

Rapæ, heliotropium.

Radicis rumicis, Cinira.

Raphanini olei, rhicininum.

Recrementi plumbi, helcysma.

Recrementi æris Cyprii, melin-  
 teria Aegyptia.

Resinæ piceæ, resina terebinthi-  
 na.

Resinæ colophonie, apochyma.

Rhodoidis, sinopis.

Rhododaphnæ liquoris, uiscus  
 quercinus.

Rosarum siccarum, Perseæ fo-  
 lia sic.



lia sicca.

Rhu, centaureum.

Rubicanini, uesicariae semen.

Rumicis, pyrethri radix.

## S

Sabini olei, oleum recinum.

Sagapeni, piceae resina arida:

Salamandrae, lacerta uiridis.

Salis ammoniaci, sal Cappadocicum.

Salicis liquoris, nigrae hederæ liquor.

Salviae, nepita.

Sampſuchi, rhus calinarius ficus.

Santonici, abrotanum.

Satyræ, semeu erucæ.

Scammonii, ricini.

Scillæ, bulbus.

Scinci, satyrium.

Scordii, albi papaueris caput.

Semperuiui, lactuca serapiadis, radix pœoniæ.

Semperuiui succi, lactucæ succus, aut folia.

Sepiæ testæ, pumex.

Serpylli, potamogiton.

Sesami, semen lini.

Sesamoides, expressum amaracinum.

Sinapis, cardamomum.

Sisonis, anisi.

Sisymbrii, ocymum.

Sphagni odorati, iuncus cultus.

Spheclæ, hoc est fœcis uini com-

bustæ, sandaracha.

Stymmeos tusi, squama æris.

Styracis, castoreum.

Strobilorum, semen cucumeris,

Suruthii radices, radix ueratri nigri.

Sulphuris uiui, sandaracha.

Syrici, spuma argenti.

## T

Terræ Samiæ, leucographis Aegyptia.

Terræ erythriadis, calx Thebaica. Galenus addit terræ teneræ, plumbago.

Thapsiæ, Elydri.

Thapsiæ succi, chamæleontis nigri succus.

Thermuntiadis, lycopsolos.

Troximi maiounium, aut maioulum.

Thuris, ampelites.

## V

Vini Italici, uinum mendesium.

Vuæ acerbæ, galla omphacitis.

Vuæ passæ satiuæ, palmulæ.

Visci quercini, chamæleon niger.

Vulpini adipis, urfinus adeps.

Vulturis fimis, columbinus fimus.

## X

Xylobalsami, uiolarum albarum radix.

## Z

Zingiberis, pyrethrum.



**P**ondus, grauitate dimensum iudicatur, mensura autem uasis capacitate: uas autem, siccae quantitatis aut humide mensura est, ut tres quantitatis quæ mensuratur, sint differentiae, una quidem ponderis, altera uerò aridae substantiae qualis ea quæ in cumulum cogi potest, porro tertia humidæ est substantiae. Cum autem multa propeq; infinita sint pondera & mensuræ, pro regionum diuersitate, & utentiū consuetudine, de ijs quæ omnibus in usu communi sunt, nobis sermo erit præcipuus.

*De notis ponderum & mensurarum.*

**Q**uoniam uerò nonnulli literis non integris, sed notis, signisq; pondera & mensuras demonstrant, satius fuerit, ueteres in hac re imitari, & primum characteras ipsos exponere. Primum igitur χ litera, cum superscriptum habet α, chalcum hoc est æreolum signat, exempli gratia. Si ο habeat, choa, quod est congiuum. Si υ, chœnicem. Si κ, chemam. At κ si ε habet suprapositum, & lineam rectam, quæ per obliquum inferius cornu ipsius secet, ceratium, hoc est siliquam notat, ut Si υ superiectum est, cyathum. Si ο, cotylam, hoc est heminam. At linea circumflexa quam nihil aliud circumstat, & quæ per obliquum ponitur obolum notat, Si duæ huiusmodi lineæ sint, quas nihil circumstat, duos signat obolos: qui obuli gramma, hoc est scrupulum faciunt. is notatur litera r, quæ ς literam habent annexam, recta quadam linea diuisam. Duæ autem coniunctæ atq; altera parte in angulum coactæ, duobus κ literæ cornibus similem ad rectam lineam spectantibus, notant drachmam, quæ alio nomine uocatur olca, propriè uerò olca per λ scribitur, cui in medio litera ο sit addita. Verum si λ adiectum habet, libram signat. Nonnulli uerò alteram λ literæ lineam oblique secantes libram ostendunt. At cum r litera, in ipso sui angulo ο habeat, unciam denotat. Quod si μ in summo uertice habeat oppositum ν, minam refert. Si υ, notat mystrium, Si ε, medimnum, Si ο, modium. Porro τ post se habens ς, & υ, signat tryglion, τ ς υ. At ξ cui iuxta sit positum ε, xessen, qui sextarius, ostendit, ξ ε. Si ο apponitur, oxybaphum, id est acetabulum ξ ο. Aliqui uerò sextarium linea recta ξ secantes conficiunt. Sed κ adiectum literæ μ, heminam κ addito ς, incumbente ipsis μ, ceramium ualet.

De pon.



*De ponderibus.*

**M**ina Attica & Aegyptia habet uncias sedecim. Romana viginti. Libra uncias duodecim. Vncia drachmas octo. Drachma habet scrupula tria. Scrupulum, obolos duos. Obolus, siliquas duas. Siliqua, æreolos duos, & duas tertij partes.

*De mensuris liquidis.*

**I**talicum ceramium habet congios octo, Congius sextarios sex, Sextarius cochlearia duo, quæ nonnulli triblia nuncupant. Hemina idem triblium continet, mystra magna tria, acetabula autem quatuor. Nam magnum mystrum habet acetabulum, Acetabulum sesquicyathum habet. Cyathus, chymas paruas seu mystra parua duo. At si uoles & ponderum liquidorum mensuram scire, permultæ liquidarum rerum secundum lancis momentum differentia habentur, ut in olei, uini, & mellis exemplo dicemus. Mel igitur uino ponderosius quarta parte, itemq, decima est: quo fit ut ferè tertia ponderis pars melli accedat: capit enim integrâ huius mensuram, & insuper trientem. Mel autem oleo ex media parte grauius est: continet enim totum olei modum, & ultra semissem. Vinum oleo nona parte supereminet, totum enim ipsius pondus continet, & nonam eius partem. Quò autem res hæc dilucidior, omnium mensurarum pondus sigillatim ueluti in tabula depictum subiecimus. ex qua liquido constat, per pondera quæ singulis mensuris subiecta sunt, oleum, uinum, & mel, ex ordine demonstrari.



	Olei	Vini	Mellis
Ceramiū Italicū habet	lib. 72	lib 80	lib. 103
Congius	lib. 9	lib. 10	lib. 13 S.
Sextarius	lib. 1. unc. 6	lib. 1. unc. 8	unc. 13 & S.
Hemina	unc. 9	unc. 10	unc. 13. & S.
Mystrum magnum	unc. 3	unc. 3. scrup. 8	unc. 4 & S.
Acetabulum	drac. 18	unc. 2. scrup. 12. drach. 27	
Cyathus	drac. 12	drac. 10. scrup. 4. unc. 2. dr. 2	
Mystrum paruum	drac. 16	scrup. 20	drach. 9

**O**Ribasius secundum adamantium author est sextarium Italicum uini mensura quidem unciarum uiginti quatuor esse, pondere uero unciarum uiginti, sextarium pondere mellis duas libras, & dimidiam habere.




**A**egyptia artaba habet modios quinque. Modius ægyptius & Italicus Chœnices octo. Chœnix sextarios duos. Sextarius, semifextarios duos quos & heminas uocant. Hemina habet cyathos octo. Atticus medimus habet semifextaria, quæ hemiecta uocant duodecim. Hamiectum chœnices quatuor. Ita medimnus habebit minas quadragintanouem, sextarios nonagintafex. Huiusmodi autem mensurarum pondus exponere haud facile, quòd aridarum rerum infinitæ iuxta momenti lancis rationem differentia existant.

FINIS LIBRI SEPTIMI IOANNE  
GVINTERIO ANDERNACO MEDI-  
CO INTERPRETE.




LECTORI.



Ntequàm te ad lectionem Pauli conferas, scito aliquando uerbum digerere positum esse pro discutere. Item mannam pro tenuiore parte thuris. Cachry pro flore ro-  
ris marini.






# IOANNIS

ANDERNACI

IN LIBRVM PRIMVM

PAULI ÆGINETAE

COMMENTARIVS.



## CAPVT I.



VANDO QVIDEM grauidis. ] Primum hoc caput Pauli ad uerbū ex quinto Oribasij sumptū est : in quo grauidis multa superuenire legimus inter cætera stomachi redūdationē. ut Pliniano more loquar, quam Paulus uerbo τῷ περισσάνειν significat. Id si Hesychio & Suidæ credimus, à canibus caudam mouētibus: aut po-

Stomachi  
redunda-  
tio.  
περίσσαν  
σις,

tius, quod hic etiam magis cōgruit, à fluctuum agitatione tra-  
latum est. In grauida enim sanguis menstruus, qui ante cōcep-  
tum statō tēpore, expurgari solebat, copiosior in utero col-  
lectus quā pro fœtu adhuc exiguō ad stomachum regurgi-  
tat, ibiq; exundans, nausæam excitat. In prima nostra uersio-  
ne erat, Nausea, sicuti etiam Aristoteles lib. 7. de historia ani-  
malium ponit. ἔτι δὲ ναυτίαι, inquit, καὶ ἐμετοὶ λαμβάνου-  
σι τὰς πλείους. id est, præterea nausæ & uomitus plurimas  
infestant. Aetius πλάστος τομάχου ait, quod est nimia humi-  
ditas stomachum debilitans, non ut Orosius putabat, sola  
imbecillitas. Nā Galenus Commentario secundo in primum  
de morbis

ναυτίαι.



πλάδους.

de morbis uulgaribus, αἰτ τὴν περιττὴν ὑγρότητα πλάδον εἶναι οὐνομαζειν, hoc est superfluam humiditatem, pladon appellare consuevit, de Hippocrate dicens. Idem Commentario secundo de ratione uictus in morbis acutis, εἰς ὧν καὶ προσέθηκεν, ὡς ὁ μὲν ὑδαρὴς οἶνος πλάδους ἐν τῇ ἄνω κοιλίᾳ τοῦτέστιν ὑγρότητα, καὶ ἀτονίαν ἐμποιήσει. hoc est, in quibus etiam adiecit, uinum aquosum, Pladon, id est, humiditatem & imbecillitatem in superiore uentre excitaturum.

πτυελίζειν.

Sputa crebra.] Quia stomachus ex humiditate laequet, eo-  
que os ipsum tenui sputo assidue plenum existit: Græca dictio est πτυελίζειν: quam Galenus in priore prædictionū interpretatur, πτύειν πολλάκις, hoc est spuere frequenter.

καρδιωγμός.

Stomachi erosio] Quando ab acrioribus humoribus irritatur, mordeturque, uomitus futuri signum non exiguum habetur. Græce dicitur καρδιωγμός, quasi dicas cordis morsus. Veteres autem olim os uentriculi cor appellauerunt, nimirum ex situs uicinitate: quia cor prope os uentriculi situm est, ut ait Galenus, & ipsa rei euidentia docet eundem affectum Galenus etiam καρδιαλγίαν uocat libro secundo de placitis Hippocratis & Platonis.

καρδιαλγία.  
Cibi fastidium.  
ἀσιτία.ἀσιτοι.  
ἀπόσιτοι.  
ἀγορέκτοιἀσιτία,  
ἀποσιτίαFastidium  
abstinentia.

Cibi fastidium.] Nimirū ex uitiosis humoribus stomachū infestantibus, si Galeno credimus græca dictio est ἀσιτία, quæ signat cibo abstinere, & inedia uti, sicut Grammatici nobiles interpretantur. Galenus etiam libro primo περὶ ἐπιδημιῶν differentiam inter ἀσίτες & ἀποσίτες ponit hisce uerbis. ὅτι τὰς ἀγορέκτας ἀσίτες ὀνομάζουσιν οἱ Ἕλληνες τὰς μὴ προσενεγκάμενες σιτία, τὰς δὲ ἀπετραμμένους προσιέσθαι, ἀποσίτες καλεῖσιν. hoc est, quod Græci appetentia carentes uocāt, Afittos, eos sanè qui cibos non assumunt: illos autem, qui assumere oblatos auersantur, abhorrentque, appositos, omnibus est manifestum. Ibidem ἀπόσιτοι πάντων γούματων διετέλεον, quasi dicat, omnium ciborum fastidio laborabant. Erit itaque ἀσιτία abstinentia à cibo in totum: ἀποσιτία, fastidium quidem, sed ut aliquid tamen assumatur, quod Galenus ostendit libro primo de causis symptomatum, grauidarum accidentia enumerans in hac uerba, βραχέα σιτουμένης τῆς ἀνθρώπου διὰ τὴν ἀποσιτίαν. Hoc est quod mulier pauca comederet ob fastidium. Hippocrates in Aphorismorum commentario quartus ἀπυρέτω ἐόντι ἀποσιτία, Galenus interpretatur ἢ μὲν ἀποσιτία τὸ



τὰ τὸ αὐτὸ δηλοῖ τῇ ἀνορεξίᾳ. Rursus in libello de uictu priuatorum: ὁ κόσσισι δὲ ὁδύνα γίνονται ἐκ τῶν σπλάγχχνων, ἢ ἐκ γυμνασίας, ἢ ἐξ ἄλλης τινὸς ὁδοιπορίας τουτέοισι συμφέρει ἀναπαύεσθαι ὁσίτως. Hoc est: quibus dolores uiscerum oboriuntur, aut ab exercitio, aut alia quadam obambulatione, his conuenit in abstinentia conuiuere. His omnibus animaduertis, legendum uideatur ἀποσιτεῖν pro ἀσιτεῖν, id quod ex sequenti oratione cuius mediocriter sagaci licetprehendere. Nam Paulus singulorum accidentium remedia tradens, ἀποσίτης δὲ, inquit, non ἀσίτης: quanquam nō ignarus sim aliquando authores, alterum pro altero usurpare: ut ἐ capit. 35. Verum cū utraq; hic ponatur, ἀποσιτεῖν, & ἀσιτεῖν exacte intelligenda sunt. Miror hoc Orosium qui in aliis corrigendis nihil facit reliqui, non aduertisse: Castigatorem uero Basiliensem, qui Paulum Græcum germanicis typis excusum adidit: tum hoc, tum alia pleraq; præterisse, notatu alioqui dignissima.

ἀσίτης.

Corrigitur  
locus Pau  
li in pressaOrosius.  
Castigator  
Basiliensis.

Vina fulua. ] Vt pote frigidioribus naturis accommodata: tū ad concoctionem, tum ad succi bonitatem procreādam, ut ex Galeno didicimus. Ait enim libro duodecimo Methodi οὗτοι πάντες οἱ οἶνοι κίρροι, καὶ θερμοὶ, καὶ εὐώδεις εἰσὶ, καὶ τῆς συστάσεως μέσοι τῶν τεύχων δυνάμεων καὶ τῶν παχέων. Hoc est, omnia hæc uiua fulua, tum calida, tum odorata sunt, & substantiam habent inter aquosa & crassa in mediam.

Vina fulua.  
κίρροι.

Color hic fuluus, qui Græcis κίρρος dicitur, proximus est flauo, quasi dicas in pellucido flauum: hinc etiam flauus color & fuluus eidem sæpe rei accommodantur. Id quod ex Galeno licet condiscere, libro quinto de Sanitate tuenda, ubi habet, σκόπον ἔχων οἶνον κατὰ μὲν τὴν σύστασιν ἀπὸ τὸν λεπτότατον αἰρεῖσθαι, κατὰ δὲ τὴν χροῖαν, ὃν ὁ Ἱπποκράτης εἶπε κίρρον καλεῖν, δύναιτο δ' αὖ καὶ ξανθὸν ὀνομάζειν αὐτόν. Id ferè sonat, huc consilium dirigens, ut uinum substantia quidem tenuissimum semper: colore autem, quæ Hippocrates κίρρον id est, fuluum nominare consuevit: possis etiam eundem flauū appellare. Galenus alibi τὸ κίρρον χρώμα δίναιο αὐτὸ λέγειν πυρρὸν ὡχρόν. Hoc est, fuluum colorem possis rufum pallens dicere. Sunt qui hunc colorem latine Giluum nuncupent: ego malim ex Galeni interpretatione, fuluum conuertere, Pliniū secutus: qui hunc colorem inter alios uino attribuit, non giluum.

Color fuluus,  
κίρρος.Flauus,  
πυρρὸς.  
ὡχρός.



luum. Siue autē dicas gilua flaua, aut fulua, nihil interest, modo obserues plerunq; uina ex uetustate hunc colorē induere.

At medicamenti nomine. ] Superius commemorata ad cibum referuntur: sequentia ceu medicamenta adhibentur, quæ stomachum ex nimia humiditate imbecillem corroborant, exciccentq; ὡς φάρμακον δὲ. id est, ut medicamentū uero habet textus, ego nomine medicamenti uerti.

Radix Pontica. ] Hoc est, rhaponticum, uim habet corroborandi stomachum imbecillem: uide Dioscoridem.

περικάρδιον.

præcordia.

Præcordia apud Plinium.

ὑποχόνδριον.

Subcartilagineum.

Medicamenta in affectu stomachi ubi applicanda.

Recentiores quidam apud Lugdunū Medici.

Linacri uersio.

Galenus. 13. Methodi.

Extrinsæcus præcordia. ] Hoc est, qua parte uentriculi os habetur. Abusus est Paulus dictione περικάρδιον, quæ apud Galenum propriè significat membranam, seu tuniculam, cor ambientem, aut si mauis, cordis inuolucrum. Quia uero os uentriculi olim cor appellabatur, excusari potest, ut Pericardion pro regione externa, sub qua illud delitescit, accipiatur. Plinius libro naturalis historię I I. membranas septi trāuersi, præcordia appellauit, q; cordi prætendantur. Galenus autem, & Hippocrates ὑποχόνδριον totam illam regionē appellant, quæ à mucronata cartilagine, utraq; in parte ad umbilicum usq; porrigitur. Celsus autē latinæ linguæ in Medicina princeps, præcordia nominat. Cæterum ex hoc Pauli loco cōstat, ubi os uentriculi affectum est, ante non ad dorsum applicanda remedia. Nonnulli autem Medici apud, Lugdunum dorso ad-moueri præsidia, ut in inflammatione gulæ uolunt, erroris occasione sumpta ex loco quodam Galeni in 13 Methodi perperam à Linacro Anglo conuerso. Habet autem in hunc modum tralatio. Verum gulæ, quæ propriè uocatur stomachus, cataplasmata super spinam dorsī imponimus, non autem ad pectus: idem facimus, & cū phlegmone os uentris laborat. Multo melius sonant græca. ἀλλ' ἐπίγει τῷ κυρίως ὀνομαζομένῃ στομάχῳ καὶ τὰ καταπλάσματα κατὰ τῆς ῥάχεως ἐπιτίθεμεν ἐκ ἐμπροσθεν, ὥσπερ ὅταν τὸ σῶμα τῆς γαστρὸς φλεγμῶν, id est: Sed gulæ quæ propriè nominatur stomachus, ēc cataplasmata super spinam dorsī applicamus, non antierius, quemadmodum (intellige) facimus in anteriore parte, cum os uentriculi inflammatur. Huic sententiæ ipsa rei euidencia, quæ ex Anatome apparet, adslipulatur.

Præcordia cōtegere. ] Hoc loco usus ē dictione, ὑποχόνδριον: cū hic eūdē locū quē superius in uomitu uoluerit, intelligat.

At eas



At eas quæ cibum fastidiunt. [Græce est τὰς δὲ ἀποσί-  
τες. Remedium fastidientium ponit, quāquam superius ἀσι-  
τον scriptum erat.

Oenanthe.] Hoc est, uua syluestris uitis, ut ait Dioscorides:  
ad uerbum hæc ex Oribasij quinto transcripta sunt. Auicen-  
næ interpretes eundem locum turpiter corruerunt

Citta.] Oroscius Cittam male interpretatur picam: non  
enim pica morbus est apud latinos, sed malacia: à græco au-  
tem uerbo κίττα possis dicere picā, sed apud idoneos autho-  
res usurpatū non est. Galenus originē huius mali tradit libro  
primo de Symptomatum causis in istum modum. *μοχθηρῶν*  
*δὲ ποιστάτων ἐτίμιμῶσιν. ἂν οἷς αὖ εἰς τὰς τῆς κοιλίας χιτῶ-*  
*νας ἀναποθῇ περὶ ττωμα μοχθηρὸν, εἴωθε δὲ τῷτο γίγνεσθαι*  
*μάλιστα ταῖς κακοχύμοις γυναιξίν, ἐπειδὴν κνήσωσι, καὶ καλεῖ-*  
*ται κίττα τὸ παθὸς.* Hoc est: Præuas autem qualitates appe-  
tunt ij quibus uitiosum aliquod recrementum in uentriculi  
tunicas est insinuatum, id quod mulieribus, præsertim succis  
prauis obnoxiiis, ubi in utero habere cœperint, accidere cōsue-  
uit, ac uitium appellatur κίττα & Plinius lib. 28. cap. 7. mala-  
ciam stomachi appellat.

Error Oru  
scij.  
κίττα.  
Malacia.

Id tertio à conceptu mense.] Galenus libro citato, καὶ τῷ-  
το πάσχουσιν αἱ πλείους αὐτῶν ἀχρεῖ τῇ δυνάμει, καὶ τρίτου μῆ-  
νος ἐν δὲ τῷ τετάρτῳ παύονται, id est, ac complures ipsarum  
hoc affectu usq; ad secundum & tertium mensem laborant:  
quarto autem infestari desinunt.

Malacia  
stomachi.  
Aduerte lo-  
cos Pauli  
& Galeni.

Id quod utero est.] Sic interpretatus sum κύημα, quasi di-  
cas conceptum: nondum enim fœtus dici potest, si Galen ū,  
ex quo ferè omnia hæc sunt deriuata, his uerbis loquentem  
intelligamus: κατὰ μὲν τὰς πρώτας δύο μῆνας, ολίγον ἐπισπᾶ-  
ται. τὸ αἷμα τοῦ εἰς αὐτὸ τὸ ἐμῆνον, ὡς αὖ ἐτι μικρότατον  
ὑπάρχον ὅταν μὴ δ' ἐμβρυον ἡδὴ πω καλῶται, κατ' ἐκείνον τὸν  
καιρὸν, ἀλλ' ἐτι κύημα, id est, in primis sanè duobus mensibus  
fœtus pauxillum sanguinis ad se attrahit, ut qui minimus ad-  
huc existat, quando ne fœtus quidem tunc appellari debet,  
sed potius conceptum. Et reliqua uerba Pauli in Galeno or-  
dine inuenies.

κύημα.  
Conceptū.

Iam labor & longior.] Remedium est fastidij, & malaciæ  
stomachi, quæ prauos cibos & alienos à natura appetit, uerum  
malaciæ magis. Græce est in omnibus exēplaribus cum im-  
pressis,

Remedia  
malaciæ  
stomachi.



ἔυστοι.

pressis, tum manu scriptis quotquot mihi uidere contigit, ἔυστοι δὲ καὶ οἱ πόνοι, &c. Hoc est ad uerbum, bene cōmēsse faciunt & labores, quod perinde est, ac si dicas bonorū ciborū appetēt. ā faciūt: ut qui superfluitatē, ac redundantiā humorū discutiant, unde prauorum excitatur appetitus. Clamat hic Orosius Copum & me errasse qui ἔυστοι pro ἔυθετοι legimus. Quando quidem uero superius fecit mentionem ἀποσιτῶν & ἀλλοκότων ὀρεγασῶν, non absurdè ἔυστοι in remedio ponitur. Præterea si remedium est malaciæ potius quàm fastidij, labor, certè εἰστοι rectè dicuntur πόνοι. q̃ bonorum ciborum, malaciæ autem malarum rerum appetentiam facit. Sed parum refert, an ἔυθετοι legas.

ἄταλαι-  
πώως.  
ταλαι-  
πώρια.

Quæ uero mulier citra labores. ] Græcè est ἄταλαιπώως, id est, sine exercitio aut labore. Nam ταλαιπώρια laborem & negocia uitæ apud Hippocratem significat cum alibi, tum in libello de uictu priuatorum, τῆς δὲ παχέας χρεὼς οἱ βολονται λεπτοὶ γενέσθαι τας ταλαιπώριας νήσιας ἐόντας ποίεσθαι ἀπάσας. Hoc est, crassi qui tenues uolunt fieri, omnes labores ieiuni subibunt.

Acia.

Verum acia ] Vt piper, gingiber, nasturcium, aliaq; id genus quæ calore suo stomachi superflua consumant.

Oedemata. ] Tumore sunt ex pituitoso humore collecti, qui digitis prementibus cedunt: uariis etiam morbis superueniunt. Vide Galenum de Tumoribus præter naturam.

κατανι-  
ζειν.

Lauantur. ] Græcus codex impressus κατανίζειν pro κατανίζειν habet. Superfundere etiam significat.

## IN II. CAPVT.

Mulier  
adole-  
scens.

Erate nec nimium. ] Ex hac clausula Græca μήτε δὲ νεώ. Ἀτέρα, reddidi: nec nimium adolescens, hoc est, quæ sit in ipso uigore ætatis: quo nimirum corpus absolutum iam est, & copioso abundat sanguine. Sin infra uiginti quinq; sit annos, nempe adolescens, corpus adhuc increscit, & alimentum minus habet perfectum. Εὐτέρα uerti adolescens. Nam ab anno quartodecimo usq; uigefimum quintum, ætas uocatur adolescentia. Ab anno trigesimo quinto, multis solent menses cessare, aut omnino pauci fluere, eoq; alimento minus ad fœtum alendum abundant.

Nutrix nō multo ante. ] Quia sanguis tunc uberrimè ad mammas confluit, unde lac copiosus etiam suppeditatur.

Masculum.



Masculū.] Hippocraticū est propterea q̄ laborato magis, probōq; nutritō ex sanguine pollet, & minus excremento.

Condimenta.] Sic dicuntur quæ liquoribus quibusdam ut aceto & sapæ, alijsq; condiendis induntur aromata, siue semina odorata quod genus sunt cuminum, anisum., fœniculum, græcis dicuntur ἀρτύσεις & ἀρτύματα. Lege in textu τὰς ἐπὶ σήμας ἐνὸς δίας καὶ ἀρτύσεις, pro τὰς ἐπισίμας.

Venere nutritrix.] Galeni præceptum ex primo de sanitate tuenda: quia ex hac menses prouocantur, & lac odoris gratiam in deterius mutat.

Manus humerosq;.] Exercitationem nutritrici idoneā præscribit: qua uidelicet partes superiores agitatae sanguinē copiosum lacti generando suggerant. Dicit enim Galenus sanguinem optimum gigni exercitatione moderata, cibis tū boni succi, tum iusto tempore, modoq; assumptis. Præterea positione tēpestiua modiceq; sumpta. Græce est, ἀλέτω, i. molat:

## IN III. CAPVT.

**L** Audatissimū.] Galenus libro primo de sanitate tuenda ad uerbum omnia comprehendit. De ungui autē, ex Dioscoride libro secundo sumptum est, quod autem ad lucem debeat inclinari, de suo Paulus adiecit: quemadmodum etiam de probatione.

## IN IIII. CAPVT.

**L** Acuitiatum.] Ex quinto Oribasij conscripta sunt remedia nimirum lactis uitiati: quæ tum corporis totius purificatione, tum uictus ratione constant.

Oxymelite.] Hic uomitus facillimus est, aliquando additur radícula quæ raphanus dicitur, minutim cōcisa horis duabus in oxymelite madescit. Deinde ea proiecta, oxymeli assumitur. Vel radiculam esse oportet, deinde aquam tepidā bibere Valentiore uomitus ciendi modi septimo lib. tradunt.

Laboribus.] Nam exercitatio calorem prouocat: qui frigidum, viscosumq; humorem calefacit, extenuatq;.

Cibum præcedentibus.] Alioqui plus noxæ quàm cōmodi afferent: imo plus pituitæ generarent, dum uidelicet cibū prius quàm esset concoctus, in membra digereret.

Salsamentum,] Græce τάρυχος est, quod conditā thynni carnem significat. Cuius generis & Cybia sunt, quo nomine Priuius Pelamidem concisam appellat. Pelamidem uero Thynnum,

ἀρτύ-  
ματα.ἀρτύσεις.  
Condimen-  
ta.

Vomitūs.

τάρυχος.



Thymum, qui nondum attigerit annum. Idem à recenti partu Corpyla dicitur.

Esus por-  
culorū pro  
sumētis æ-  
tate uaria-  
tur,

Carnibus suillis.] Ad obtundendam nimirum humoris biliosi acrimoniam. Nam humida & crassi succi : ijs qui concoquere possunt, utilissima. Habet autem uiscosi aliquid, quo iecur & renes obstruat : cætera ex omnium animantium genere quæ pedibus fidunt, ut ait Galenus, saluberrima. Porro indistinctè dixit Paulus carnibus suillis, cuius puta ætatis esse uelit omittens Nam floridæ ætatis hominibus ac sese exercitantibus iusta magnitudine adulti : inclinantibus, qui adhuc incrementum accipiunt, porculi conueniunt, Minimorum caro excrementis generandis est : uetulorum siccitate, & duritia displicet.

Collatio  
locorum  
Pauli &  
Galenii.

Sæpeq; & uini dulcis.] Galenus libro περὶ ἐυχυμίας καὶ κακοχυμίας, contrarium ferè scribit, docens biliosis, quibus lac acrius tenuiusq; esse solet uinum dulce nequaquam conuenire. His uerbis : τοῖς χολωδέτεροις σώμασιν, ἢ τε διὰ φυσικὴν δυσκρασίαν, ἢ τε δι' ἐπίκτητον ὁπώσῃ γεγονύαι, ἢ τε φαλερῖνος, ἢ τε τρωλῖτης κίρῃος γλυκὺς, ἢ τ' ἄρουσιος ἢ δ' ὁ λῆσβιος ὁ ἐνὶ ὠδῆς τε καὶ κίρῃος ὁμοιοῦς τοῖς προειρημένοις ὧν ἐπιτήδειος πίνεισθαι. Δερμοὶ γὰρ ἅπαντες οἱ τοιοῦτοι. Μήτ' ἐν χαλώδεσι, μήτε τοῖς ἐξ ἐγκαύσεως ἢ καυμάτων πολλῶν, ἢ ἐνδύας, ἢ λύπης, ἢ ὥρας, ἢ χῶρας καὶ καταστάσει δερμῶν, διδόναι τοιοῦτον οἶνον. ἐξ ὑπεικνυμένην ἐν ἀγαθῷ ἅπασιν τοῖς δερμαίνεσθαι δεομένοις, φλεγματώδεσι καὶ ψυχραῖς κρᾶσεσι, καὶ χυμῶν πλῆθος ὥμων ἢ ῥωκόσιν, ἀργῶς βιῶσιν, ἐν χωρίῳ ψυχρῷ, καὶ χειμῶνι, καὶ καταστάσει ψυχρᾷ καὶ ὑγρᾷ. τέτοις μὲν ἅπασιν ἀγαθὸς ὁ κίρῃος οἶνος καὶ γλυκὺς. ἐναντίως δὲ τοῖς ἐναντίως ἔχουσιν, id est, Biliosiori corpori, siue ex temperamento naturali, siue qualicunq; ascititio, nec falerinum, nec dulce molites fuluum, nec Aruesium, nec Lesbium odorum & fuluum prædictis simile potui est idoneum. Quippe omnia id genus uina calida sunt, eoq; nec biliosis natura, nec ex insolatu, aut aliis ardoribus, uel inedia, uel tristitia, uel anni tempore, uel regione, & calido aeris statu huiusmodi uinum exhibendum est. E contrario salutare est omnibus qui calefieri desiderant, pituitosis, frigidis tēperatura, ijs qui crudorum humorum copiam coacerparunt, in ocio uiuentibus: in loco frigido, hyeme, & statu aeris frigido, humidoq;ue. His inquam uniuersis fuluum ac dulce uinum salutiferum est, contrarium ijs qui secus habent, &c. Quid igitur hic dicemus?

ratione



ratione alimenti exhiberi. Nam antea dixerat ἡ τροφή δ' ἐξ  
ἐπάντων ἐστὶν αὐτῶν ἀνάλογος τῷ πάχει. Hoc est: Alimentum  
uero ex omnibus ipsis crassitie respōdet: puta qualem sub-  
stantiæ crassitiem obtinent, tale etiam nutrimentum, nempe  
crassi succi producant. Sic igitur ijs quibus lac tenue est, con-  
uenit. Quamquam muliebris etiam lēxus, respectu masculi-  
ni, frigidior existat: deinde sanguis tenuis, & serosus esse po-  
test, acris, non etiam statim biliosus, ac calidus.

Cucurbitula etiam.] Vt uidelicet sanguinē ad partes eas  
ex aliis attrahat. Cautē uerō ad māmillas defigenda est. Caro  
enim mollis cum sit, facilē intumescit, cucurbitulaq; repleta  
difficile auellitur. Quod si hoc acciderit, spongia calida illi su-  
perponi debet: sic enim laxatur. Sin minus, pertundetur.

Melanthiū.] Dioscorides hoc docet lac extrahere: in  
qua re miror castigatorem Orosiū, papauer nigrum uertere:  
quod contra omnem medicinam est, ne dicam piaculum, pre-  
bere ad lactis generationem uehementer refrigerantia adeo  
ut suporem inducant, & quidem uiolenter, nec sine incom-  
modo natura. In Græce exemplari legēdum quidem ei assen-  
tior pro γλυκύ, γλυκῆ, quod præterijt Gemusæus. Melanthiū  
uero apud nullos autores papauer nigrum signat, etiam si cō-  
ueniret instituto. Ita sunt quidam ad uituperandū alios pro-  
cliues, ut sæpe ipsi in multo grauiores errores incidant.

Error Oro-  
scij,

Textus  
Græcus  
corrigit.  
Melanthiū  
quod gith  
dicitur.

προσαί-  
νεν.  
καταιο-  
νέν.

Calida prius.] Græce est θερμῶ προσαινόσαντες legen-  
dum: non προσεινόσαντες, ut habent codice impressi, quod  
neuter Aristarchus, uel Orosius uel castigator Basilien-  
sis aduertit. Dicitur etiā καταινόσαντες à uerbo καταίναν, quod  
significat καταυτλάν, & καταχεύειν. Galenus i primo ad Glau-  
conem. τῶν δὲ σπλάγχνων προνοῶνται καταιονέντατε καὶ κα-  
ταπλάττονται τοῖς μαλάττην καὶ χαλὰν δύναμένοις: hoc est ui-  
sceribus autem prospicere oportet, superfundendo, obducen-  
doq; ea quæ emollire possunt, & laxare. Leoniceus ungen-  
do uerterat.

Prius emulso.] προαμέλξασαν passiuē positum est: cum  
medium alioqui sit.

Ieiuno.] Hic propriē positum est ἀσίτω, ut facilē intelli-  
gas in initio primi capitis pro ἀσίτης legendum ἀποσίτης.

Cibus solidior.] Galenus primo de sanitate tuenda puerū  
uult nutrirī lacte, quoad primores dentes amiserint. Deinde

PAULI AEGIN.

V cibo



σπιτίον.

cibo solidiore, utpote pane, leguminibus, carne, similibusque, sed omnibus prius commansis. Græcè tantum est σπιτίον, quod per se cibum simpliciter signat, uerum lactis ratione solidior intelligendus uenit.

Si autem imprudentibus.] Græce est, αὐτὰρ λαβόντα πληρωθεῖν, id est: Si autem latentes repleti fuerint. Sed uerbum λαβόντων in eiusmodi locutione uertitur, recte cōuertitur, imprudentibus nobis, aut nescijs, id quod ē Budęus! annotauit.

## IN VI. CAPVT.

Exanthemata.

ἐπανθεῖν.

PVstulis quæ quod puero.] Post educationem infantuli morbos enumerat, quibus in ea ætatula cōflicari solet: uocatq; Græce ἐξανθήματα à uerbo ἐξανθῆν, qđ est efflorescere.

Ad summa eruperint.] ὄθαι δὲ ἐπανθίσκει, qđ est i extima erupere. Vt ἐξανθῆν sit simpliciter se in altum promere: ἐπανθῆν uerò iusta magnitudine & figura per summa apparere.

## IN VII. CAPVT.

κρύουζα.

μελιτισμός.

Textus Græcus mutilus.

ἀπεφθον.

GRauedo.] Græce est κρύουζα. Sic enim Celsus lib 4 interpretatur: qua nimirum pituita ex capite defluens, nares claudit, uocem obtundit, tussim mouet.

Melitisimi.] Ita dicuntur, sicut sinapismi, cum melle pars oblinitur, melitisimus, cum sinapi, sinapismi.

Copioso calido.] In Græco deerat θερμῶ quod est calido. Sic enim magis aperit & discutit si quæ sunt superflua.

## IN VIII. CAPVT.

DIScocto.] Hoc est, probe cocto: quod Græci dicunt ἀπέφθον.

## IN IX. CAPVT.

Tendines.

Exeribatio.

TENDinum.] Quos hic uocat tendines, considerato, an musculorum buccam mouentium, an neruos à cerebro dentium radicibus adhærentes, unde sensus ipsis communicatur. An tendines alios malis.

Anisum.] Impressi codices habent ἀνέθον, hoc est anethū, quod ipsum quoq; aluum sistit. Sed Oribasius habet anisum.

Calide.] Non calidis potentia, sed calide actu aluus sisti debet. Græce θερμῶς non θερμῶς legendum.

## IN X. CAPVT.

ἀφθαι.

APHthæ.] Celsus libro secundo capite primo: Proximum: ell ut infantes adhuc pueros serpentina ulcera oris quæ Græci ἀφθὰς nominant, exerceant. Variis interea coloribus apparent,



apparent, pro humorum ea gignentium natura.

## IN XIII. CAPVT.

**T**Omenti modo.] Græce est ἐν τρόπῳ πτύγματος. Signifi- πτύγμα.  
cat autem idem πτύγμα quod πίλημα, τρόφιον εἶναι, σί-  
τρεμμα ἐρίων, hoc est, lapsus lanæ ut Celsus ait, uel circulus.

Heliotropion.] Celso herba solaris dicitur. Ab herbariis  
uulgaribus nouo indito nomine, uocatur herba cancri, cum  
scorpioides potius appellaretur. Sed quia scorpio incognitus  
magis est à cancro appellationem traxerunt.

Cucumeris.] Cucumis statim in Pepones, & Melopepo-  
nes degenerat, figura tantum & quantitate inter se dissi-  
dentes: cum magnitudine excessere, pepones uocantur, cum ue-  
ro rotundi, formam & effigiem mali referunt, facta ex pepo-  
ne, & malo appellatione.

Pepones,  
Melope-  
pones.

## IN XIII. CAPVT.

**I**Am uictus rationem præscribit ab infantia usq; ad ætatem  
declinantem, quæ nō tam ex Medicina, quàm Philosophia  
petita est: quæ mos est etiam Galeno, ut non solum corpus,  
sed animum quoq; curet.

Liberiore.] Græce est ἐν ἀνέσει, hoc est, cū animi remissio- ἐλαφρῶς.  
ne, à uerbo ἀνίημι, qđ est, licētia permitto, aut solute indulget.

Leuiora.] Græce quidem τροφὰς αὐτοῖς προσφέρειν ἐλα-  
φρῶς, hoc est, alimēta ipsis leniter præbere, reddidi ego leuio-  
ra: utrum malis accipe. Hæc dixi, ne uilitigatores ullā ca-  
lumniandi occasionem habeant, si uel tantillū immutauerim.

## IN XVI. CAPVT.

**E**xercitatio.] Totum hoc caput ex secundo Galeni de sa-  
nitate tuenda Galeni tuenda transcriptum est: ex quinto  
uero Oribasii. in eodem uero hæc clausula aliter legitur. Græ-  
cus codex Pauli impressus habet: δὲ μήτε πλῆθος ὡμῶν, καὶ Locus Pau-  
li castiga-  
tus.  
ἀπεπτῶν, μήτε σιτίων, μήτε χυμῶν, ἢ κατὰ τὴν κοιλίαν ἢ ἐν τοῖς  
ἐντέροις, hoc est: Non debet erudi, incoctiq; siue cibi, siue hu-  
moris copia, aut in uentre, aut in intestinis contineri: pro  
ἐν τοῖς ἐντέροις. Galenus habet ἐν τοῖς ἀγγείοις, quod est in ua-  
sis: cui lectioni ego assentior. Intestina siquidem concoctio-  
ni proprie dicata non sunt: deinde uentris dictione etiam ip-  
sa comprehenduntur. Verum ut concoctio altera in uentre,  
altera in uasis administratur: ita distributio ex intestinis pri-  
ma: altera ex uasis obitur. Hæc non aduerterunt Orosius, &



Erratum  
Orosij.

Basilienſis caſtigatōr. Omitto quod etiam ἐκ τῆς γαστρὸς in eodem ferè Galeni loco, Oroſcius ex ſtomacho diſtribuitur, ueteris, cū dicendum ſit ex uentre. Nam inde fit diſtributio.

Exerci-  
tatio.

Vnde manifeſto liquet.] Galenus cū libro de ſanitate tuè da, iam citato, tum maxime in commētario: περὶ εὐχυμίας, καὶ κακοχυμίας ſimillimam habet ſentētiam: ὥς περ γὰρ ἀγα-  
θὸν μέγιστον ἐστὶν εἶναι τὸ πρὸ τῶν ſιτίων γυμναſιον, οὕτω  
βλαβερώτατον ἀπασα κίνησις ἐπὶ ſιτίοις, ἀναδίδοται γὰρ ἐκ  
τῆς κοιλίας ἡ τροφή, πρὶν πεφθῆναι, καὶ τῷδε πλῆθος ὤμων χυ-  
μῶν ἀθροίζεται κατὰ τὰς φλέβας, ἐξ ὧν εἴθε νοσήματα παντοῖα  
γίνονται. μὴ φθασάντων αὐτῶν ἢ τοὶ διαφορῆσθαι πόνοις πλέο-  
σιν, ἢ πεφθῆναι, καὶ μεταβαλεῖν εἰς αἷμα ὑπὸ τῆς κατ' ἥπαρτε  
καὶ φλέβας δυνάμεως. Hoc eſt, ut Græcæ linguæ ignare intelli-  
gant: Sicut enim exercitatio cibum præcedens plurimū con-  
ſeruandæ ſanitati conducit: ſic quælibet à cibo cōmotio, no-  
centiſſima eſt. Nam alimentum antequam ſit cōcoctum, ex  
uentre diſtribuitur. Vnde crudorū humorū copia in uenis col-  
lecta, omnigenas morborū ſpecies procreare ſolet, niſi protin-  
us labore multo fuerint diſcuſſi, uel concocti, ac in ſanguinē  
facultatis beneficio quæ iocinori, ueniſq; inſita eſt, trāſierint.

Compen-  
dit Pauli.  
Caſtigatur  
Paulus.

Modo factam.] Galenus addit, ſecundam, ut ſit mediocri-  
ter pallida concoctionem ſecundam (nempe quæ in uenis fit)  
modo factam ſignificat. Omiſit Paulus ſecundam, quia ex uri-  
na iudicium non niſi de ſecunda concoctione ſumitur.

Exercita-  
tiones ſin-  
gularum  
partium.

Accliuſ deambulatio.] Codex impreſſus uiciatus eſt, ha-  
bet enim καὶ οἷον ἀντις δύναιτο pro καὶ οἱ ἀνακτες περίπατοι  
ex Galeno inſtauratum, unde hæc omnia tranſcripſit. Eſt au-  
tem accliuſ ambulatio, cum quis contra montem, aut loca  
æditiora inambulāt. Non aduertit Baſilienſis caſtigatōr.

Εὐαυδής.  
Caſtigatur  
codex Gre-  
cus impreſ-  
ſus.

Præterea per alias ex.] Quippe itatio, curſusq; curū exer-  
citationes ſunt: acrochm ſunt, & ſciomachiz, brachiorum, ac  
manuum propria. Lumborum autem, affiduè ſe inclinare, &  
rurſus reuocare, alteres, ſpinæ thoracis autē & pulmonis, ma-  
ximæ reſpirationes propriæ exercitationes ſunt.

Donec rubefcat.] Hoc eſt dum ſanguis in extremam cutē  
fuerit euocatur. Id ſignat εὐαυδής ὑπάρχῃ. Hoc eſt cum  
floridus, uiuidusq; & rubet apparuerit.

Concinna.] Malè in Græco εὐαυδής, pro εὐαυδής legitur.  
Vide Oribasium & Galenum. Non aduertit Gemellus.

Calido



Calido uapore.] In codice Græco impresso θερμὸν ad sudorem uidetur referri. Galenus lib. 2. de sanitate tuenda legit θερμῶ, ut referatur ad uaporē, sicut nos conuertimus. Vterq; Aristarchus, & Orosius, & Basiliensis hæc præterierunt. Victatus  
codex.  
Orosius.

Apothērapia.] Exercitationis omnis pars ultima est apothērapia, ceu dicas recreatoria: nam corpus expurgat, & lassitudinem arcet.

## IN XVIII. CAPVT.

**I**nter frictions.] Paulus hoc ex secundo Galeni iam dicto libro ad uerbum mutuatus est. Galenus autem ex commē ἀνάτριψις tario Hippocratis, qui inscribitur κατ' ἰατρῆον, in hunc modum: ἀνάτριψις δύναται λύσαι, δῆσαι, σαρκῶσαι μινιθῆσαι, ἢ σκληρῇ δῆσαι, ἢ μαλακῇ λύσαι ἢ πολλὴν μινυθῆσαι, ἢ μετρίῃ παχύναι. Hoc est, frictio potest soluere, ligare, replere, minuire. Dura ligare, mollis soluere, multa minuire.

## IN XIX. CAPVT.

**I**nter uocis exer.] Hoc est ex quinto Oribasij transcriptū. Galenus huius exercitationis ferè non meminit. Est autem dictio Græca ἀναφώνησις: quæ signat exclamationem uociferationemq;: qualis in cātū editur, & lectione clara, orationeq;. Verbū ἀναφωνεῖν pro uoce cōtēdere interpretari potes. ἀναφώνησις.

## IN XX. CAPVT.

**V**lcerosa.] Exercitationum genera persecutus, nunc ea quæ illis superuenire solent, enumerat. Sunt itaq; lassitudinis tres numero differentiæ, ulcerosa, tensoria, & inflammatoria, seu ut Græce dicam, φλεγμονώδης. in tertio Galeni de sanitate tuenda ad uerbum explicat. Lassitudines.

Quo tendi uidentur.] Græce impressi codices, τήκειται, quod est liquari, consumi; habent, pro τήνεται non tamen hoc aduerterunt Orosius & Gemusæus. In eodem capite χαλᾶται δὲ συντεταγμένον, pro χαλᾶται δὲ συντεταμένον, quod est, sane laxatur, quod distentum est. Negligentia Orosij.

Oleo dulci atq; egelido,] Hoc est: Ex maturis oliuis quarum baccæ iam nigrescere inceperint, droppas appellant, confecto. Egelido, hoc est tepido, ut soli expositum fieri solet. Id Græca dictio uidetur innuere ἐλιδέρος si Grammaticis credimus, qui exponunt ὑπ' ἡλίου θερμαθέντος. id est à sole excofacto. Quid si hyems, aut frigidum alioqui tempus sit: quo sol non solet, aut certe parum nos excalfacere, tūc ne etiam soli ἐλιδέρος. Egelidum



**Tepidum.** Oroscius adfert, & pro tepido tantū, & poni, ut postea in lassitudine inflammatoria legitur, ἐλαιον τε ἢ πολὺ χλιαρὸν, quod est: Oleum igitur copiosum tepidum addibendum. Verūm ideo me reprehendere uidetur Oroscius, q̃ egelido dixi, putans hoc frigidum significari: male mehercules in authoribus latinis uersatus. Celsus egelidum in eodem sensu quo ego multis in locis usurpat: ut lib. 4. cap. 11. Neq; ea ipsa frigida, sed potius egelida danda est. Quomodo etiam Lina cer eundem locum in Galenum ante me uertit, qui antea corrigendus erat. Scio quidē apud ueteres in usu fuisse post lassitudinem uictionem, uel in sole, uel ad ignē, si hoc pacto uolet intelligere εἰλαθέρους, uerūm hoc oī tēpore nō est perpetuū.

Instauratur lectio Pauli,

Gemufcus.

**Unctio.]** Non est in græcis codicibus impressis: aliquot autem scripti manu habēt, & sensus exigit. Quid enim est, si referatur hæc dictio, continua, ad quietem. Multa quidem esse debet: non tamen perpetua, quod συνεχὴς significat. Iam Galenus ipse & Oribasius habent, ἀλειφὴ συνεχὴς, hoc est, unctio continua. Legendū itaq; in Paulo pro μάλιτα συνεχὴς, quod est maximē continua, ἀλείμματα συνεχῆ, unctiones assidua. Hoc omiseras Gemufcus, qui mauis curta omnia & mutila aliquādo in Paulo legi, quā dictione una, aut altera ex Galeno, unde hæc transcripsit, sententiæ autoris adiuncta: utrum maius sit peccatum, alij iudicent.

Corrigitur textus.

**Apothepiæ exercitationem.** Quæ tum in motu, tum frictione, & pauca, & mollis, & tarda sit: præterea solum similiter calidum. Protinus autem in lauacra frigida exiliant, ut nimirum ipsis robur, in cute una cum calore constet, quē admodum ait Galenus lib. 3. de sanitate tuenda. Lege in codice græco, ἐν τοῖς λέτροις ἐκ τῆς, &c.

**Boni succi.]** In codicibus impressis perperā habetur ἐνθὺς pro ἐνχυμῶ. Gemufcus omisit & hoc & superius.

#### IN XXI. CAPUT.

ἀέγνωσις  
quid,  
Acopum  
ex popu-  
lo nigra.

**Strictio.]** Galenus lib. 3. de sanitate uenda inquit: **Voco** ita meatuum cutis uitium, quo superuacua transmittere prohibetur. ἀέγνωσις græcis appellatur.

**Oleumq; ex.]** Hoc Oribasius debet Is enim lib. 5. ad uerbum ex Galeno prius mutuatus erat. Verum in hoc dissentit, Paulus habet αἰγέγιον ἐλαιον, hoc est, oleum ex populo nigra



nigra cōfectum, Orībasius ἀκοπον αἰγύρινον. Galenus acopon ex abietis semine, τὸ διὰ τῆς σπέρματος τῆς ἐλάτης ἀκοπον. Habes apud Paulum lib. 7. acopon ex abiete, acopon ex populo nigra, & oleum ex eadem populo, omnia eiusdem facultatis. Nam loco fructus abietis, nigræ populi fructus æqua portio, apud eundem autorem ponitur.

## IN XXII. CAPVT.

**H**oc capite de lassitudinibus agit, quæ citra exercitationē aut motum corporis sua sponte, nempe ex humorum superfluorū copia accedunt. Galenus eas lib. 4. de sanitate tuenda persequitur amplissime,

Si his peractis. ] Hoc est : Si omnibus commemoratis præsidis malum cesserit, ad consueta munia paulatim transeundum est. In Paulo deprauata est lectio græca, habetur. n. πρὸς τὰ συνήθη κατὰ λόγον, pro πρὸς τὰ συνήθη κατ' ὀλίγον, quod corrector Basiliensis omisit. Linacer rursus, conuertit.

Corrigitur  
textus.

Si enim uires cōstent. ] Quod est, cum sanguinis plus, succi uero mali minus in corpore redūdat. nam in sanguine uires naturales deprehenduntur. Si igitur paululum uel citra sanguinem restitutum uel ultra, processum est, audacter mittendus est. Si plurimum nequaquam.

Quando  
mittendus  
sanguis.

At si crudi humores. ] Hi enim in iecore, & uentre manētes, temporis spacio paulatim cōcoquantur, efficiunturq; benigni. eoq; seruari debent, qui tales humores collegerunt, in omni quiete, præcordiis probe fomētorum præsidio munitis, non aut sanguis debet eis detrahi, qm̄ uiriū robur his non adest ut Galenus ait in θεραπευτικῇ περὶ φλεβοτομίας in hanc sniam ἔδὲ γὰρ ὁπότε πλῆθος ὡμῶν χυμῶν ἡδύρεται τοῖς τοῖς, ὡς κελεύει φλεβοτομῇ ὁ λόγος ἐλέγχεται. ἥ ὡμὴ γὰρ τέτοις ἔσθ' ἀνάμειξ' ἐπάρεσι. Præterea purgatio his dari non debet, quia concocta. non cruda medicamenti sollicitare oportet.

Galenī sen-  
tentia.

Crudiū ui-  
riū robur  
deest.

Oxymel. ] Intellige simplex. Id enim cum ætatibus, tum naturis uniuersis, ut ait Galenus, & præcipue pituitosis ad sanitatis securitatē seruit utilissime, dum omnes meatus arctos aperit, ut nusquā crassus, uel glutinosus humor adhærescat.

Oximeli-  
s facul-  
tas.

Apomeli. ] Fit hoc melle à fauis expressio, & aqua fontana. Verum non simpliciter ex melle & aqua, ut putat Orosius. uide Galenū lib 4 de sanitate tuenda, & Paulum lib 7.

Erratum  
Orosij.



**S**enectus.] Ex quinto Oribasij. quintoq; Galeni de sanita-  
te tuenda. In Paulo autem Græcus codex impressus depra-  
uatus est habet enim ἐπανρόθωσις δ' αὐτῆ δια τῶν θερμαίνον-  
των τε καὶ ὑγρῶν τῶν ἀμὰ τοῖς θερμαίνουσι, hoc est: Corrigi-  
tur autem ea calefacientibus, & humectantibus una cum ca-  
lefacientibus Superfluum est ἀμὰ τοῖς θερμαίνουσι. Orosius  
& Gemusæus non aduerterunt.

Biratum  
Orosij.

**F**rictio.] Cū oleo scilicet adhibita, quæ uirtute robur exci-  
tat, & modice calefacit, unde & distributio nutritiōis facili-  
& nutritio promptior consequitur.

**I**mbecilliores.] Vt qui decrepita potissimum ætate sunt:  
et si alij alijs celerius senectutis incōmoda experiantur Qui-  
cūq; igitur uel crudi adhuc senes, quos græci ὠμογέροντας  
appellant, uel decrepiti, imbecilliores uiribus existunt natu-  
ralibus, ter die cibum assument, idq; hanc ob causam potissi-  
mum: nempe q̃ una uice multum assumere nequeunt. Dein-  
de, etiam si sumant, concoquere nequeunt, quare melius est  
cibum partiri in tres uices.

ὠμογέ-  
ροντες.  
Viridis se-  
necius.

Ficum.

**A**c fici maturæ.] Hæ paulo innocentiores, immaturis: me-  
diocriter tamen in usum adhibita. Ante cibum alium assumi  
debent, eo quod si non citò per aluum descendāt, corruptio-  
nem in uētriculo subeunt, & alios secum cibos corrumpunt,  
id quod de omnibus fructibus fugacibus intelligendum est.

**P**er hyemem uero caricæ.] Hæ incidendi, extenuandique  
uim habent, quo nomine aluum citant, renesq; exputgant.  
Cum nucibus uerò simul cōmestæ ad omnia præstātiores exi-  
stunt, atq; hinc nonnulli qui medicamentorū aduersus letha-  
lia cōfecturas perscripserunt, ficus aridas cum nucibus, & ru-  
ta præsumptas omniū illorū præsens esse remediū tradunt.

**S**i nullū in dextra.] Galenus libello περὶ εὐχυμίας καὶ κα-  
κοχυμίας inquit: περὶ ἰσχάδων δὲ δόξιν αὐτὶς ἐναντία λέγων  
ἀληθεύειν, καὶ κακοχύμους γὰρ ἀμὰ καὶ εὐχύμους αὐτὰς ἀπὸ νοσῶν-  
των τε καὶ ὑγιανόντων ἐχούσας. ἔαν γὰρ αὗται διεξέρχονται κατὰ τὴν  
γαστέρα, καὶ ἡ ἀπ' αὐτῶν ἀναδοθεῖσα τροφή, διὰ τῆς δέρμα-  
τος, καὶ τῶν νεφρῶν ὑγιαναίτε εἰς καὶ εὐχυμῆν, βραδύνουσαι δὲ  
κακοχυμότεραι πῶς γίνονται. Id est: De caricis autem, si quis  
contraria pronunciet, uere dicere censeriqueat, nempe bono  
maloq; esse præditas: morbidi cuiusdam & salubris particeps.

Si nanq;



Si namq; per aluum descendant, ac alimentū quod ab eis pro-  
uenit, in corpus distributum, iecur renesq; transferit, salubres  
sunt, & succi benignioris: sin remorentur, prauioris quodam-  
modo sunt: In textu hoc Galeni habes διάτε τῆ δέρματος,  
quod est, per cutem, male pro διάτε τῆ ἡπατος. Hoc in codi-  
ce nuper impresso Gemusæus castigatōr præterijt.

Textus  
Galenī  
uiciatus.

Ante cibum.] Alus subducendæ gratia: quæ etiam oliuis,  
ut Galenus in commentario de alimentis docet, & damasce-  
nis sollicitatur.

## IN XXVI. CAPVT.

**Q**uandoquidem uero.] Ex quinto Oribasij sumptum  
est Græcus textus deprauatus in Paulo est, pro ἐπι-  
δὴ δὲ δεικται legi debet ἐπεδὴ δὲ δὴ τῇ ἑξῆς, &c. quod anno-  
tauit Orosius. Verum in hoc grauissimè peccat, dum alios  
reprehendit quod τρίμματα uerterit frictione, cum Galenus,  
Paulus & Oribasius semper dictionem τρίψιν & ἀνάτρίψιν,  
pro frictione usurparint. τρίμμα uero apud grāmaticos, Sui-  
dam, Hesichium, Budæumq; nostrum pro detrimento accipi-  
tur, ueluti cum lapides atteruntur, aliàs aliæ res minutissimæ  
deteruntur. Quid hic commodius erit quàm puluis? qui ex  
medicamentis contritis effectus sit, & corpori admotus in bal-  
neo. Addidi hic, aquæ indito, ad sensum explendum Præterea  
errat Orosius, qui λουόμενος, id est, dū lauatur, uerterit, post  
balneum, cum eiusmodi smegmata in balneo soleant adhi-  
beri. Sed frictionem intelligit: quanquam ipse textus sequēs  
eum admoueat. Nam à balneo acopi usum præscribit: in bal-  
neo, aliorū erit. Reliquit textū uitiosum corrector Basiliensis.

Corrigitur  
Pauli le-  
ctio.  
Erratum  
Orosij.  
τρίμμα.

Erratum  
Orosij.

Summatq; propoma.] Vfus sum dictione græca quod ferè  
nulla apud latinos extet, quæ ad unguem eam referre possit.  
Græci autem uocant προπόματα quæ ex uino fiunt, & melle  
dispermato. Nā Paul. lib. 7. inq;: ἀλλὰ καὶ τὰ μὲν ἐξ οἴνου συντι-  
θέμενα, & δὴ καὶ προπόματα καλεῖται, τῶ μελιτος ἀπαφροδιέντος  
ἐκ λαμβάνει πρὸς τέσσαρας τῶ οἴνου, καὶ συντίθεται μὴ ἐφόμενα

Propo-  
mata.

## IN XXVII. CAPVT.

**C**orpus decoloratum.] Vita lætior, citra curas, & melācho-  
liam actiones naturales non habet impeditas, unde san-  
guis primū coqui, deinde toti corpori distribui potest. Græce  
est βίος εὐφροσύνης, hoc est, uita læta, & iucūda: προσκυνῆ βρω-  
σις est προσφιλῆς, quod signat chara, grataq; commestio.

βίος εὐ-  
φροσύνης.  
προσκηνης  
βρωσις.

Pastillos.



κόλλικες.

Pastillos.] Græca dictio est κόλλικας, à nullo ferè grammatico exposita. Galenus autem ex Hippocrate interpretatus est τροχίσκος, quod hic optimè quadrat. Magni alioqui uiri in hac uoce decepti sunt, qui pro glutinâtibus quibusdam rebus usurparint.

Corrigitur  
codex.

## IN XXIX. CAPVT.

Mel coctum.] Exemplaria græca deprauata sunt, habent enim καὶ μέλι ἐφθόν τὸ σκληρὸν ἄγαν, pro τὸ σκληρὸν ἄγαν εἶναι, hoc est, quod durū nimis sit: causam addit, cur mel coctum dentibus noceat.

## IN XXXI. CAPVT.

IN superiore uentre.] Ex quinto Oribasij transcriptum est, ἂνω uerti in superiore uentre, in quo fit concoctio. In eo si diutius immorentur, perficacia sunt & dura.

Germani,  
ex impres-  
sio.

Ventos contrarios.] Nihil oculis magis incōmodat quàm uentus contrarius, eoq; miror, cur Germanicus corrector mutauerit ἐναντίους, hoc est contrarios in ἐναντίους, quasi dicas causæ authores.

## IN XXXII. CAPVT.

Purimum noxæ ciborum.] Similem habet sententiā Galenus in commentario Aphorismorum primo: ὅταν γὰρ ἐπερπληρώσῃ τὰ ἀγγεῖα ποτῶν ἢ σιτίων τὸ διαρρῆσθαι κίνδυνος αὐτοῖς, ἢ καταπνεῖσθαι ἢ καὶ σβεσθῆναι τὸ ἐμφυτον αὐτὸ θερμὸν κατὰπερ καὶ ἀπώλλονται οἱ τινες. Hoc est: Cum enim uasa potu, aut cibo repleta supra modum fuerint, periculum ne ea rumpuntur, aut ipsi suffocantur aut etiam calidum natuum ipsum extinguant.

Vomitu igitur.] Post uomitum autem os colluendū, dentes, oculosq; & totam faciem postea præcepit Oribasius. Id nisi fiat, dentes eis qui uomunt, computrescere. Sollicitari autem uomitus debet aqua tepida statim assumpta.

πληθώρα.  
πληθος.  
πλησμο-  
νία.

At si neq; descenderit.] Signa repletionis uenarum commemorat. At sanguinis redundantia proprie πληθώρα græcis dicitur. πληθος pro omnium humorum separatim plenitudine accipitur. πλησμονή pro repletionem tum potus, tum cibi, & uentris & uenarum usurpatur.

## IN XXXIII. CAPVT.

Cibus in uentre. Hoc sumptum est ex sexto Galeni de sanitate tuenda. Fit autem sæpe, ut cibi corrumpantur, aut  
nimia



nimia copia ingesti, aut qualitate praua donati, aut tempore in commodo assumpti, aut ipsius uentriculi affecti uicio. Quō autem corrupta educantur, Galenus ample docet. Inter cætera uomitum cōmendat ex uini dulcis potu. Sed Pauli textus impressus in omnibus exemplaribus deprauatus est, habet. n. *δι' οἶνῃ πόσεως καὶ γλυκέως, προ δι' οἶνῃ πόσεως γλυκέως.*

Corrigitur  
textus  
Pauli.

Quæ mediocriter purgant.] Sunt enim quædam medicamenta, quæ admodum grauitur, & magno cum naturæ detrimento purgant. Itaq; mediocria hic præcipit, quæ sæpius per interualla sumi possint: qualis est picra dia aloes, cuius compositionem habes in septimo descriptam.

## IN XXXV. CAPVT.

Veneris hæc sunt commoda. Ex Oribasij lib. i. hæc sunt transcripta. Ante commoda autē docet, quibus uenus noceat: tum partibus corporis, tum temperaturis. Noxia itaq; uenus est inquit, pectori, pulmonibus, capiti, & neruis: itē siccis natura, & frigidis. Caueri etiā debet post repletionem, cū cibi, tum uini, item post euacuationem ex uomitu factā: purgationem, & si uenter sua sponte fuerit solutus. Præterea si cibus nondum sit concoctus, aut si ægritudo quædam infestat.

Eoq; melancholicis.] Vide Aristotelem in problematum sectione 4. ad finem, nimirum q̄ statu redundant. Semen autem decessio status existit. Sed quid de insanientibus dicemus, an & illi flatus habent? Ego sane opinor uenerem insanientibus conuenire, quod seminis qualitas quæ uirilitatem & ut dicā græce θυμὸν homini cōciliat, si in corporibus aliqui temperamento calidis, copiosior impertiatur, ex θυμῷ solet μανία fieri. Semine autem excreto, animus ille remittitur & qualitas imminuitur. Galen. optimè de ueneris usu scribit in cōmentario qui inscribitur, ἰατρικὴ τέχνη, uerba ipsius in hunc modum habet: ἀφροδισίων δὲ κατὰ μὲν ἐπίκουρον καὶ δὲ μία χρῆσις ὑγιεινὴ, κατὰ δὲ τὸ ἀληθές, ἐκ διαλειμμάτων τηλικέτων ὡς ἐπὶ ταῖς χρήσεσι, μήτε ἐκ λήσεως αἰσθάνεσθαι, καὶ κηφότερον αὐτὸν ἑαυτῷ δοκεῖν γεγονέναι, καὶ εὐπνότερον. ὁ δὲ καιρὸς τῆς χρήσεως, ὅταν ἀκριβῶς μέσον ἢ τῶν ἐξωθεν περιστάσεων ἀπασῶν τὸ σῶμα μὴδ' ὑπερπεπληρωμένον, μὴτ' ἐνδύς, μὴδ' ὑπερφυμένον, μὴδ' ὑπερτεθραμμένον, ἢ ἐξηρασμένον, ἢ ὑγρασμένον ἀμέτρως. i. Rei ueneris s̄m Epicurū sane nullus ad sanitatē usus est. Sin aut uerū fateri uelim⁹, conducit, si tāto t̄pis interuallo exer-

Venus corpus integrum requirit.



exerceatur, ut ex ipsius usu nec resolutionem corpus sentiat, & leuius quàm fuit euasisse, perspiratiusq; uideatur. Tempus autem coeundi est, cum ex omnibus quæ foris accidunt medium exacte corpus obtinuerit, neq; uidelicet repletum nimis sit, neq; inane, neq; refrigeratum impendio, neq; excalfactum: neq; siccatum, neq; humectatum immodicè.

ἔυσιτοι.  
ἄσιτοι.

Cæterum alij etiam.] Duæ dictiones contrariæ in græco ponuntur, nempe ὀυσιτότεροι, & ἄσιτοι, quanquam improprie si Galeno credimus, ἄσιτοι ponitur pro ijs qui fastidio laborant. Nam id ἀπόσιτοι significat, ut superius annotatum est. Sed positum est opinor, ut ἀσπλάγγιος, hoc est, sine uisceribus, pro eo qui parua uiscera habet, ἔυσιτος, hoc est, uoce carens, pro illo, qui paruam uocem edit, ἔυσιτος cibi appetens. Superius nempe capite primo positum uidetur pro εὐσίτης ποιῶν. hoc est, cibi cupidos faciens. Nam εὐσιτοι δὲ καὶ οἱ πόνοι. καὶ αἰμακρωτέραι ἀποδημίαι. Id est: Iam uero & labores, & longiores profectioes cibi appetentiam faciunt. Verum alius εὐβητοι legendum putat.

Celsus.

At uehemens.] Celsus eleganter libro primo hanc sententiam ex græcis confirmat his uerbis. Concubitus uero, neq; nimis concupiscendus, neq; nimis pertimescendus est. Rarus corpus excitat, frequens soluit. Cum autem frequens non numero sit, sed natura, ratione ætatis & corporis scire licet, eum nō inutile esse, quæ corporis neq; languor, neq; dolor sequitur.

Contrario  
sententiæ.

Antequam somnus inuadat.] Ex Oribasio hæc particula sumpta est: & uideri possit Galeno contraria. Is enim libro primo de sanitate tuenda ex Hippocratis sententia hunc ordinē obseruat. Labor, cibus, potus, somnus, uenus, & hæc omnia mediocria. Paulus ante somnum uenerem ineundam censeat, redditq; rationem non certè inualidam. Sed intelligendū est, secundum cibum, non statim, sed concoctione obita: nihil etiam refert, si somnus aliquis breuior præcesserit: sequatur prolixior: ex quo uires colliguntur.

Varia le-  
ctio.  
Gemusgus

Frigus superueniens.] Bifariam legitur in græcis exemplaribus, Germanicum habet καὶ ψύξις αἰ ἐπιγιγνώμεναι, hoc est, frigus ugens, aut ualens. Alia habent ἐπιγιγνώμεναι, quasi dica's superueniens. Ita quoque Oribasius habet. Nescio cur Gemusgus mutauerit.

In



## IN XXVIII. CAPVT.

**C**Apite grauantur & anxij fiunt.] Hoc caput ex Oribasij libro primo transcriptum est. Vbi etiam græce habetur, καὶ ἀσώδεις γίνονται, quod est, & anxij fiunt, conflictanturq;. Oroscius alios reprehendens, ex Marcelli Florentini Dioscoridis interpretis sententia uertendum censet ἀσώδεις ex repletione cibum fastidientes. At Galenus in commentario libri secundi προῤῥητικῶν Hippocratis hoc modo interpretatur, διττῶς γὰρ γινόμενων ἀσώδων τῶν καμνόντων, ἓνα μὲν τρόπον, ὅταν ἡ δύναμις ὑπὸ σώματος βαρύνηται καὶ μηδὲν φέρειν σχῆμα ξαδίως. ἕτερον δὲ ὅταν τὸ σῶμα τῆς γαστρὸς ὑπὸ μοχθηρῶν δάκνηται χυμῶν. οἱ πρότεροι μὲν ὀλεθρίως διάκνεται, ναυτιώδεις δ' εἰσὶν οἱ δεύτεροι. Id est: Cum bifariam ægotantes fiāt ἀσώδεις, uno quidem modo, quum uirtus à corpore grauat, nullamq; eius figuram ex facili tolerat, altero autem cum os uentriculi à uitiosis humoribus mordetur, priores quidē affecti sunt perniciosè: alteri uero nauseabundi existūt, &c. Hoc itaq; Pauli contextu prior significatio accipienda est: nō secunda, quādoquidem uirtus seminis copia multum grauat, Deductum autem ἀσώδεις est ab ἀσκη: quæ dictio frequens est apud Galenum & Hippocratem, primum δυσφορίαν, signans: deinde fastidium acribus humoribus stomachum rodētibus excitatum, unde & uomitus ἀσώδεις dicitur. Nolo hic cōtemorare, quā multi etiā celebres uiri in eius interpretatione sint decepti. Legendum est ἀσώδης, non ὡσώδης, quod etiam ἀσόμενος dicitur.

ἀσώδης.

Hippocrates.

Duplex significatus dictionis. ἀσώδης.

ἀσκη quid

ἀσόμενος.

Lectio castigata.

Aliorum.] In codicibus græcis impressis habetur ἀλλῶν, hoc est, sale, pro ἄλλων, quod est, aliorum, quam lectionem & sensus, & Galenus in sexto de sanitate tuenda approbat. Nos antea quoq; aduertimus.

Semen uiricis.] Græcus codex habet καὶ σπέρμα τῆς λίνης; hoc est & semen lini, pro σπέρμα τῆς ἄγνης, quod est semen uiricis. Sic etiam habet Oribasius. Irem superius iam fecerat Paulus mentionem seminis lini. Hoc non aduerterūt Oroscius & Gemusæus.

Lectio deprauata. Erratum Oroscij &amp; Gemusæi.

## IN XXXIX. CAPVT.

**P**er myrrham cum dulci.] Calida perfrictionem expertis præscribit: quæ nimirum habitum ipsorum restituāt. Nescio autem cur Oroscius legendum hic censeat cum uino albo,

Oroscius falso emendat.



albo, cum nullum eius generis calidum sit, nec odorum, quale Paulus requirit. Melior itaq; lectio cum uino dulci, quale est fuluum, frigidis aut temperamento, aut ex accidenti accom-  
modatissimum, si Galeno credimus, & ipsi euidentia.

## IN XL CAPVT.

ἔγκαυσις.  
quid.  
Celsus.

Lectio e-  
mendata.  
ἀδρόως.

**S**I qui uero.] Græce est ἔγκαυσις, quod ad uerbum sonat  
adustio uel exustio. Galenus lib secundo κατὰ τόπους: pro-  
priè dici affirmat, de ijs qui exuruntur in sole. Celsus: Si quis  
in sole exustus est, huic corpus & caput oleo perfundendum.  
Paulatin.] In impresso est κατὰ λόγον, quod est secūdm  
rationem, pro κατ' ὀλίγον, id est palatim, cuius cōtrarium se-  
quitur ἀδρόως, quod idem significat quod uniuersim, subito ac  
una uice.

## IN XLI. CAPVT.

Celsus.  
Cibi ualen-  
tis materia  
τροφήμα.  
Celsus.  
Instantata  
lectio.

**C**ibos ualentis materiae.] Ex quinto Oribasij traducta  
sunt: uoco autem cibos ualentis materiae, quæ probe &  
multum nutriunt: ut Celsus alia ualentis, alia inediae, alia im-  
becillæ materie, libro secundo commemorat: uocatq; ualen-  
tissimū, in quo plurimū alimenti est. Græci uocant τροφήμα.  
Et ijs quidem obl.] Græcus codex deprauatus est, habet  
enim καίροντι μηδ' ἐπὶ τῆτοις. Id est, oblectetur, neq; ob hæc  
pro καίροντι δ' ἐπὶ τούτοις omiſsa negatione μὴ. Sic legit Ori-  
basius, quod etiā Orosius annotauit: sed Gemusæus omisit.

## IN XLII. CAPVT.

Vomitus  
quot mo-  
dis excite-  
tur.

Empirici  
nostræ æta-  
tis.

**Q**uoniam laboriosè uomentibus.] Hoc caput ex pri-  
mo Oribasii sumptum est. Vomitum primum uicis  
ratione excitatur: deinde medicamentis, &c. Victus ratione  
excitato utuntur etiam in secunda quoq; ualitudine: præ-  
terea in acutis fere morbis, quum bilis, aut pituita in stom-  
acho superat. Medicamentis uomitum facientibus, neq; sanis,  
neq; acuta egritudine occupati utentur. Nam ea longis tan-  
tum affectibus, & induratis conueniunt. Hinc etiam ueteres  
cū nihil in medicina spei deprehendissent, ad uomitum sole-  
bant confugere. Id quod hodie etiam empirici quidam sine  
ulla ratione faciunt, optimis quibusq; medicis laudem præ-  
ripiunt. Nam ea medicamenta propinant, quæ suprâ & infrâ  
ualentissimè purgent: quæ si æger ferre possit, sanitati pluri-  
mum restituitur: sin autem moritur, audaciæ suæ & temerita-  
tis patrociniū habent, q̄ scilicet morbus fuerit desperatus,  
tot me-



tot medicis antea curationem frustra molitis. Ceterū quando potissimum uomitus sollicitari debeat, Polybus in libello de uictu priuatorum docet. Sex mensibus hybernis inquietus, uomitu, æstate clysteriis utendum est. Quia enim per hyemē pituita in uentre generatur, uomitu eam euacuari præcipit: æstate uero bilem supernatantē, deorsum reuellere. Quæ sententia Hippocrati contraria in Aphorismis uideri queat: ubi haber: Æstate superiora magis, hyeme inferiora medicamentis sollicitare oportet. Hic dicemus ex sententia Galeni, totū corpus si purgare uolueris, æstate per superiorem uentrē, hyeme per inferiorem medicandum est. Sicut in Aphorismis dictum inuenimus. Etenim redundantibus, purgatio medetur, illuc quō uergunt adhibita. At si ab incremento humores in parte aliqua prohibere uolueris, per opposita reuellere conducit. Melancholicus autem humor quocunq; in loco fuerit, per inferiora educi debet. Ceterum alii singulis mensibus bis uomunt: alii per longiora interualla: alii nullo tēpore præscripto, sed quoties aut uino, aut cibo pleniore se ingurgitarint. Qui aut uomere bis in mēse uult, inquit Polybus, & post eū Celsus, melius cōsulet, si biduo continuarit, q̄ si post quintumdecimum diem uomuerit. Galenus aut nihil referre dicit, si ex interuallo nō cōtinuatis diebus uomas. Porro uomitus quō medicamentis excitē, septimo libro est cōprehēsum.

Ferculum ex fabis, ] Græce hoc uocatur ἔτνος. Galenus interpretatur libello de euchymia his uerbis. ἔτνος οἶνομάζω το ἐκ τῶν ἐρεχθέντων ὀσπρίων καὶ χερρόπων σκληρῶν, &c. Verūm quod sequitur in codice καὶ τὰ πείονα τῶν κρεῶν, hoc est, & pinguiore carnes, ubi legendum cēseo καὶ τὰ πλείονα τῶν κρεῶν, quod est, & copiosiores carnes, scilicet fabarum. Nam ex leguminibus hæc commemorat Paulus. Non sum autem ignarus, pinguiore carnes, ut est suilla aliorumq; animalium uomitum posse excitare. Verūm Oribasius nobiscum sentit & contextus requirit.

Verūm non solum. ] Hoc quoq; superiorem lectionē confirmat. Nam χύλοι hoc est, succi seu cremores non de carnibus animalium dicitur, si quid iudico, sed de leguminibus aqua maceratis: aut de herbis, si mentio earum fuisset facta. Dixi autem cremores, secutus Varronem & Celsum, qui uocant cremorem ptisanæ, aliorumq; granorum, ac leguminum.

Irrites.

Polybus.  
Quādo uomitu utendum.

Collatio sententiarum.

Quomodo totum corpus purgari debet, & quō pars corporis, Humores ne crescāt per opposita reuellendi.

Quādo uomendum.

ἔτνος.

Neglexis Oroscius.

Chyli leguminum.



Irrites.] Parum absolute dixit irrites, digitis eo perunctis: intellige & in os demissis.

Instaurata  
lectio.

Ne cesset uel intermittat.] Manca uidetur sententia græca: ἐμετικὸν δὲ καὶ τὸ μὴ ἀνέναι καὶ διαλύειν ἐπὶ τοῖς ἐμέτοις, quod est: Eum qui uomere debet, non oportet cessare, nec intermittere. Quid hoc est, nisi ponatur aliquid, quod terminum eius signet? Nam hoc pacto perpetuus, uomitus, aut simile quippiam intelligi possit, quod quàm sit absurdum, omnes eruditi norunt, addendum ergo in codice græco ἀχρεὶς ἀν' ἀπαντα λαμβάνειν βαλῆ. i. Donec oīa quæ infestāt, eiecerit. Ut est in Oribasio, quod Orosius & Gemusæus præterierūt.

#### IN XLIII. CAPVT.

Orosius  
& Gemu-  
sæus nimis  
in aliorum  
erratis oc-  
cupati.  
Epithymi-  
dosis: non  
animaduer-  
sa ab Oro-  
scio.

Varietates  
clysterum.

Manc epithymi drachmam.] Nusquam inuenio minus epithymi pondus ad aluum ducendā. Alii drachmas tres propinant, alii quatuor, alii quinque. Nec opinor drachmam unam quippiam proficere, eoq; mendum forte est. Item Paulus in septimo drachmas quinque præbet. Auicenna usque ad quatuor.

#### IN XLIII. CAPVT.

Mensura.]

Clysteribus utendum.] Quemadmodum balneorum præfecti, lapidum sordes, lutumq; abluunt, ita clysteres ventriculi & intestinorum pituitam & bilem detergent, qui humoris diuersitate etiam uariari solent: alii præterea lenes, alii acres habentur. Item triplici liquoris mensura constant. Sūma est, tres hemine, media, duæ, minima, una. Si Oribasio credimus, eoq; miror Paulum hic semiheminā ponere, quod ferè apud nos dimidia libra est: quæ parum adeo euacuabit.

#### IN XLV. CAPVT.

παρεσις.  
παράλυ-  
σις.  
παράτοι.

VTimur etiam gland.] Et hoc & superius caput ex primo Oribasii transcriptum est. In calce habetur græce παρῆσις αὐτῶν quasi remissionibus, aut relaxationibus, uel resolutionibus. Sed παρῆσις & παράλυσις, ita differunt, q̃ illa partem aliquam corporis obsidet: hæc uero totum corpus. Dicuntur etiam παρῆτοι resoluti in aliquo membro.

#### IN XLVI. CAPVT.

ἀποφλεγ-  
ματισ-  
μός.

Humores in capite.] De medicamentis agit quæ materiā ex capite tum per os, tum per nares detrahunt, ac potius detrahendi modum præscribit. Ac primum Græco uocabulo ἀποφλέγματισμόν appellat. Scribonius compositione nona exponit



exponit his uerbis : Si per os magis detrahere materiã uisum fuerit, suadebimus pyrethri radiculam commanducare: atque subinde hiantem pati fluere saliuam, Celsus etiam lib 4. cap. 2. explicat : Gargarizare his, quæ saliuam mouent, inquit : Nam aut manduntur ea medicamenta, aut in gargarismata adhibentur. Rectè igitur interpretabimur, & Latine ἀποφλεγματίζειν, saliuam mouere. Alterum medicamentum quod per nares caput purgat, ἐξῆρνον uocatur. Solet enim hoc per cornu, quod ξικηγχιτης dicitur, naribus infundi. Ibi paulisper commoratur, materiam è capite detrahic. Tertium ab illitu διαχειτόν nuncupatur, quod palato, collumellæ, & narium foraminibus applicatur. Verùm hoc in uniuersum intelligi debet, nullum ex comprehensis modo medicamentis esse adhibendum, nisi toto prius corpore purgato.

Materiam  
per os de-  
trahere.

Saliuam  
mouere.

ἐξῆρνον.

διαχει-  
τόν.

Sapa.] Græci hoc uocant σίρσαιον, & ἔφημα. Galenus lib 3. κατὰ γένη. cap. 11. ὁνείς ἐν ἑνὰ τῶν τροχίσκων ἢ κυκλίσκων, ἢ ὅπως αὐτὸν ὀνομάζειν ἐθέλοι τις, ὧν εἷς ἐστὶ καὶ ὁ πολυείδης δι' ἔφηματος ἢ σιρσαίου. καὶ γὰρ καὶ τὸ το καλεῖν ὡς αὐτὸς βαλκῆς ἐξέφωσται, &c. Solutio igitur uno pastillorum aut orbiculorum, aut quomodocūq; uocare libet, è quorum numero etiam est qui Polyidæ ascribitur, ex sapa, quā Græci ἔφημα uel σίρσαιον, uel quomodocūq; hanc quoq; uelis, appellant Est autem serxū uel hepsēma, uel sapa, ingenij non naturæ opus, musto ad tertiam usq; partem mensuræ decocto. Quod ubi factum ad dimidiam est, defrutū uocamus. Hæc Plinius lib 14. cap 9 Idē lib. 23. cap. 2. Vino cognata res sapa est: musto decocto, donec tertia pars superfit. His consentit Leontinus agriculturæ scriptor Græcus, in hunc modum inquit: τλεύκας καλλιφουξετας ἢ, οἶνον καλλιφουξετας ῥ. ἐπὶ τρίτης ἐψῶν καὶ ἀπαφρίζων, ἐξ αἵρετον ποιήσεις, Hoc est: musti optimi sextarios octo, uini nobilissimi sextarios centum, ad tertiam coquens, despuansq; eximiam sapat conficies. Columella refert quosdam partem quartam eius musti quod in uasa plumbea coniecerunt, nonnullos tertiam decoquere. Verum id ex aliorum sententia recenset. His accidit aliud sapat nomen Latinum, Calenum scilicet, quod deprauatum est in Palladio, mutatumq; in Caroenum, quod uir quidā non mediocriter in literis uersatus putat ex Palladij seculo manasse. apud ueteres tū Græcos, tum Latinos in usu nō fuisse. Verum rem penitus intro-

Sapa.

Defrutum.

Leontinus.

Calenum.



Voces con-  
funduntur.

spicienti Calenum apud Strabonem urbs est Cāpaniæ, in cuius agro uinum optimū & dulce nascitur. Plin. lib. 14. cap. 16. ijs præponi solebāt Calena, Legendū itaq; cēseo apud Palladium: Modus his & uirtutē mutabit, & nomina. Nam defrutum à defruendo dictū, ubi ad spissitudinem ualde despumauerit, effectum est: Calenum, cum tertia perditā, duæ partes remāscunt: sapa, ubi ad tertiā redacta descenderit &c. Quēadmodū igitur σίγαλον ἔφημα, & ἔφητον apud Hippocratē inter se cōfunduntur, ita apud Latinos sapa, & defrutū. Cū ipse Columella lib. 12. scribat, mustū quādo dulcissimi saporis decoquit ad tertiā, & decoctum, sicut supra dixi, defrutū uocat.

Quod autem ori illinitur tale est: sapo. ] Hoc sumptum est ex lib. 2. de Cōpositione medicamentorum secundum locos ad calcē: uerba ita sonant: ἄλλο διακριτὸν στόματος, σάπωνα δι᾽ εἰς τεύτλου χυλῶ χρίσιν, τὰ κατὰ τῶν ἔρρανίσκων, καὶ τὸν κρόνα τῷ στόματος, τὸ δὲ αὐτό τῷ το καὶ ἔρρινον ἔστιν. i. aliud qđ ori illinitur. Saponem betæ succo dilutum palati regionibus & columellæ illinito. Idem uero hoc etiam per nares infunditur, &c. Deinde sequitur paulo post, εὐπορίτω δὲ πολλάκις ἐχρησάμην φαρμάκῳ ἐγχεομένῳ τῇ ρίνι μελανθίῳ, ποτὲ μὲν ὅξει δριμύτι διαβρέχων πρὸ μιᾶς ἡμέρας, ἄλλα τῇ ὑπεραιῖα σὺν ὅξει πάλιν λείων, καὶ ἐγχεῶν εἰς τὴν ρίνα διατῶν μυκτήρων. Hoc est, facili autem paratu subinde usus sum medicamento melanthio, quod naribus infunditur, interim sane aceto acri pridie macerans, deinde postero die ex aceto rursus læuigans, infundensq; narium foraminibus, &c. Ex priore igitur cōtextu Galeni, Pauli lectio corrigenda uenit, legendumq; pro σίνηπι, qđ est sinapi, σάπων, hoc est sapo. Cui lectioni altipulatur etiam Oribasius lib. 1. Est autem teste Plinio Sapo gallosum inuentum rutilandis capillis, ex seuo & cinere, liquidus & spissus. Hoc non aduertit Orosius, iam seuerus aliorum castigator.

Leſio cor-  
rigitur.

Hoc non  
aduertit  
Orosius,

#### IN XLVII. CAPVT.

Quæcunq; urinæ ciendæ sunt. ] Omnia ex Oribasio pene descripta sunt, nisi quod post rutam, addit Oribasius, aut anethi radices ustæ, aut cinis earum cum melle. Cæterum quibus de causis menses retineantur interim, tertio libro abunde condiscēs.

Vulux subiiciuntur. ] Græci uocant medicamenta propriè, quæ lana excepta naturalibus cōduntur, πρόσθετα, quales sunt



sunt possi dicti, aut penicilla, collyriaq̃, ut apud Aristotelem in 2. de generatione: τὰς δὲ γυναῖκας βασανίζουσι τοῖς τε προ-  
 θέτοις, ἔαν δὲ κινῶνται αἱ ὁσμαι πρὸς τὸ πνεῦμα τὸ θύραθεν κα-  
 τῶθεν αἶνω: καὶ τοῖς ἐγγύστοις Hoc est, mulieres autem ijs quæ  
 uulvæ insinuantur, explorant, num odores ad spiritum qui fo-  
 ris aduenit, ab infernis partibus sursum perueniant; item ijs  
 quæ illinuntur, &c. quod Hippocrates ex suffitu aromatum  
 ad nares & os delato cognosci tradit. Cæterum προθετα ue-  
 niunt à uerbo προτίθεσθαι, quod priuatim signat, subiici natu  
 ralibus mulierum. Dioscorides lib. 1. cap. 1. προτεθεσθαι δὲ ὡς  
 κολλύριον μετὰ μέλιτος, ἔμβρυα κατασπῶσι. Hoc est radices  
 iridis collyrij modo cum melle naturalibus fœminarum su-  
 biectæ fœtus excutiunt. Hinc etiam προδέματα deriuantur,  
 idē quod πρόσδετα, significātia. Dioscorides de costa loquens,  
 δύναμιν δὲ ἔχει ἐμμήνων ἀγωγὸν, καὶ τῶν περὶ τὴν ὑτέραν πα-  
 τῶν ἀγωγὸν ἐν προδέμασι, καταπλήμασι καὶ περιάσει, quod  
 Latine sonat: Menstrua uero educit, & uulvæ affectibus me-  
 detur, in pessis subiecta, superfusionibus & fomentis. Quēad-  
 modum igitur προτίθεσθαι apud Græcos usurpatur, ita subii-  
 cere, apud idoneos Latinæ scripturæ scriptores. Id quod ex  
 Celso licet deprehēdere, lib. 5 c. 21. ubi habet: Sed alia quoq;  
 utilia sunt, ut ea quæ fœminis subiiciūt: πέσσους Græci uocāt.  
 Aut allium Lege in codice Græco ἡ σκύρδον λεῖον προτι-  
 οίμενον, non habetur impressum ἡ σκύρδον λεῖον προτιθεμένον.  
 Id nec Orosius, nec Gemusæus aduertit.

## IN XLVIII. CAPVT.

**S**Vdorem eliciunt.] Quemadmodum alius quotidie respō-  
 dens, & urina, aliaq; recrementa reddita sanitati faciūt, ita  
 sudor etiam cum opus est, effusus, non mediocriter corpus cō-  
 seruat. Ex cibo igitur dum concoquitur, duo recrementa ge-  
 nerantur, alterū, quod crassius est, crassioribus intestinis trās-  
 mittitur, alterum quod tenuius, cūm chylo adhuc fertur. In  
 iocinore chylus in sanguinem conuersus, ad cauam uenam  
 transit. Quem ubi serosi illi humores, quod excremētum te-  
 nue appellauī, eō traduxerint, non conuenit, ut diutius in cor-  
 pore maneant, ideoq; renes cauæ uenæ non procul à iocino-  
 re adhærent, qui illos recipiant, pauco sane adhuc aquoso hu-  
 more sanguini permixto, uehiculi causa, qui & ipse purgari  
 per cutis meatus debet, uocaturq; sudor. Si itaque copiosior  
 X 2 successu

προθετα.  
 προτίθε-  
 σθαι.

Subijcere

Orosius  
 hoc negle-  
 xit.

Recremen-  
 ta.

Sudor quo  
 modo gene-  
 rerur.



successu temporis collectus fuerit, ut iam onus uenis existat, artificio elici debet, natura uidelicet cessante, uel ob meatuū densitatem, uel ob aliam causam Scribit itaq; remedia quædā Aegineta, quæ ex Oribasio omnia mutuatus est.

Similiter inspersa.] Codex impressus uterque habet ἐμπλασσομένη, quod est emplastri modo adhibita pro ἐμπασσομένη, id est, inspersa. Non enim simplicia euumerata, materiam habent, quæ illini possit. Orosius & Gemusæus præterierunt, in aliorum erratis castigandis occupati.

Orosius  
non aduer-  
ti.

## IN XLIX. CAPVT.

L Audatissimus.] Quemadmodū uino, escis exercitatione, uigilijs, somno ac uenere, alijs alias uti pro ratione ætatis expedit, ita de aere, quoq; iudicandū, quem optimū in pulmones trahere, omnibus iuxta salubre est. Transcriptū est hoc caput pene ad uerbū ex Gal. 1. de sanitate tuenda, & Oribasio.

Pestilentem auram exhalante.] In codice impresso habet δειλητήριον αἶρα ἀναπέμποντος, hoc est exitialem perflatū sursum mittente. Galenus unde hæc mutuatus est, ἀποπνέοντος habet. quod est, respirante, exhalante: quanquam parum refert, hoc, uel illo modo legas.

Galenus.

Nota mor-  
horum pu-  
plice gras-  
santium.

Hoc igitur modo.] Hippocrates iudicium hoc maximum in morborū causis cognoscēdis tradit: nempe si oēs, cuiuscunq; ætatis, ac tēperaturæ fuerint, morbis cōflētētur, aerem autorē esse intelligemus ut postea in secūdo uolumine discēs.

## IN L. CAPVT.

A Quarum,] Ex eodem Galeni loco; hæc transcripta sunt. Autor autem hic noster ad sanitatem tuēdam etiā aquæ bonæ usum facere testatur Si quidem sit interim, ut alibi Galenus memoriæ prodit, ut totus exercitus prauæ aquæ usu de uita periclitetur.

In lib. de  
euchymia,  
& cachy-  
mia.

Aegre concoctionis.] In Græco ἀτέρεμνα male pro ἀτέραμνα legitur. Quæ de dictio proprie de leguminibus dicitur: nempe concoctu difficilibus ob duritiem. Galenus in libello quomodo boni maliq; succi generantur, in hunc modū ait: ἐνία δὲ τῶν δημητρίων σπερμάτων, καὶ ὅλως ὀγκῶσαι πέφυ-  
κεν ἐφύμενα κεκλήμασι: δὲ ἀτέραμνα τὰ τοιαῦτα τῶν παλαιῶν ἑλλήνων τινές, id est: Nonnulla uero cerealia semina nequaquam solent intumescere, cum coquuntur, uocarunt autem eiusmodi ex ueteribus Græcis nonnulli οὐτέραμνα, quasi di-  
cas re-

ἀτέραμ-  
να.



cas rebellia, peruicaciaq; Aristotele, ἀτέραμον ὕδωρ pro cru- ἀτέραμ-  
 da aqua dixit in quarto de generatione animalium διὸ καὶ νον ὕδωρ.  
 ἀτέραμον ὕδατα, καὶ ψυχρὰ, τὰ μὲν ἀτεκνίαν ποιεῖ, τὰ δὲ θη-  
 λυγονίαν. Hoc est: Quare etiam cruda aqua, & frigida partim  
 sterilitatem, partim fœmellarum procreationem efficit. Cæ-  
 terum ἀτέραμον habet cōtrarium, τέραμον Theophrastus in  
 octauo: τὸ δὲ τέραμον, καὶ ἀτέραμον λέγεται ἐπὶ ὁπρίων μό- τέραμον.  
 νον. Qd̄ est: Teramū & ateramū de Teguminibus tm̄ dicitur.

Aut terram colatur puram. ] Paulus habet, puram, sed Ga-  
 lenus unde hæc transcripsit. integra sententia sic habet: ὡς Instaurata  
 ὅσων γε πρότε τὰς ἀνατολὰς ἐξέσῳγασιν αἱ πηγὰς καὶ διὰ πόρε- lectio.  
 τινος ἢ γῆς διηθεῖται καθαρὰς, &c. Hoc est: Vt quarū ad Orien- Nō aduer-  
 tem solem fons erumpit, & per meatuum quendam aut ter- tit Oro-  
 ram puram colatur. scius,

## IN LI. CAPVT.

**F**Rigidam lauationem. ] Hoc est in aqua frigida lauationem, quam Græci ψυχρολουσίαν uocant. Celsus libro primo frigida etiam lauationis meminit, Aestate aptissima sunt & caro, & olus, potioq; dilutissima, frigida lautio. Hæc non omni conuenit ætati, sed ubi iam corpus iustā impleuerit magnitudinem. Nam in adolescente, incrementum eius remorator. Hoc quoq; ex Oribasij libro citato transcriptum est. Frigida la-  
uatio.

Iis qui nullo uictus, ] Qui enim cibus crassi succi, maliq; nisi sunt, iis statim ex frigida meatus occluduntur, per quos discuti, euocariq; debebant Græce est πρυσυχὸν quod signat, ut cōtigerit, nulla ratione habita, quæadmodū faciūt, qui nec debito tēpore, nec pro naturæ modo, aut exercētur, aut cibū sumūt. Exacte autē uiuūt, qui exercitationes ante cibū moderatas subeunt, & quādiu libet, ut ait Galenus dormiunt, ad concoctionem scilicet obeundā, nec balneis à cibo utūtur, postremo qui cibos medii tenuiū, crassorumq; ordinis assumūt, quales sunt exquisitissimi, maximeq; inculpati, tāquā in symmetria excessuū cōstituti. Huius generis sunt panes optime elaborati, carnes gallinarū, gallorū, auiū, phasianorū, perdicū, columbarū, attagenarū, turturū, turdorū, merularū, omniumq; passerulorum, præterea piscium saxatiliū. Quanquam qui plurimis exercitationibus utuntur agricolæ, nautæ, aliq; id genus tā exacto uictu opus nō habēt, quippe caloris beneficio qui laboribus excitatur, et crassi succi cibus tuto assumūt. Exacte ui-  
uētes qui,



Porro multis. ] Qui nimirum sole feruente iter fecerunt, aut laboris quid subierunt, totum corpus stipulæ modo aridū habentes, ij ubi in aquam frigidā se proiecerint, iuuantur: potissimum qui ualentibus sunt uiribus, & frigido soli assueti.

## IN LII. CAPVT.

Balinea  
naturales.

Differētiæ.

Vfus.

Naturalium balneorum. ] Vocātur balnea naturalia, quæ sua sponte talia proueniunt: alia calida per se, alia calefiunt. Galenus libro de simplici medicina illorum mentionē facit. Plinius lib. 31. cap. 6. ubi in hunc modum habet: Est autem utilis sulphurata neruis, aluminata paralyticis, aut simili morbo solutis. Bituminata, aut nitrosa utilis est bibendo atq; purgationibus. Pleriq; in gloria ducūt plurimis horis perpeti calorem earum, quod est inimicissimū: nanq; paulo diucius quam balneis uti oportet. Haftenus Plinius. In Germania certe plurimis horis quotidie utuntur, nec à cibo potuq; interim abstinēt, corpore etiam nullam antea euacuationē per medicamenta experto, quod contra omnē rationem est, præterea uno balneo & paralytici, & sanguinem spuētes & lienosi, aliisq; affectibus obnoxii utuntur.

Aquarum naturalium. ] Sola aqua potabilis teste Galeno humida est. Cæterarum nulla humectare potest, quod uidelicet nō sint exacte aqua, sed mista & adulterata, accepto nimirum, aut alumine, aut chalcitro, aut sale, aut id genus aliquo.

## IN LIII. CAPVT.

Sic etiā Polybus de ratione priuatorum. Questio cur hyeme laborandū magis.

Solutio.

Non alienum est. ] Celsus ex Hippocrate eleganter transtulit eandē fere sententiam. Eo tempore anni inquit, calidis omnibus potius utendum est, uel calorem mouētibus.

Pluribus uti laboribus. ] Quærere aliquis possit, cur pluribus utendum laboribus per hyemem, cum calor ipse genuinus sit amplior tunc quā alio tempore, testimonio etiam Hippocratis, qui ait uentres hyeme & uere calidissimi sunt. Ex calore autem concoctio optima, inde probus sanguis, ex hoc autem omnes corporis partes aluntur. Quare paucioribus laboribus hoc tempore quā alio utēdum est. Siquidem calor naturalis per se copiosus, & efficax, non opus habet ut plus nunc excitetur quā in ipsa æstate, aut alia anni parte. Huic quæstioni sic respondere non dubitem. Calidissimi quidem uentres hyeme existunt, naturali calore, hoc est, temperatissimi. Particulæ autem corporis magis refrigerantur hyeme, ac



me, ac nonnullis ad uentris usq; regiones penetrat. Quapropter etiam si probe concocti sint in uentriculo cibi, non tamen exactam in iecinore mutationem recipiunt, sed aliquatenus ea frustrantur. Præterea totius corporis uenæ ab aere circumfluo refrigeratæ haud similiter ipsos transmutant. Accedit ciborum copia, quam tunc una cum pituitosioribus qualitatibus assumunt: unde etiam humor crudus colligitur, qui laboribus & exterioribus particulis recalefacientibus concoqui, digeriq; debet.

Plus esse ] Hippocrates, aut Polybus eius discipulus ait: Polybus.  
τὸ μὲν χειμῶνος ἐστὶν ὡς πλεῖστα, πίνειν δὲ ὡς ἐλάχιστα. εἶναι  
δὲ χρὴ τὸ πῶμα θῖνον ὡς ἀκρητέστατον. quod Celsus in hunc Celsus.  
modum interpretatur. Hyeme plus esse: minus, sed meracius  
bibere conuenit.

Vere autem ineunte.] Vide libellum Galeni, cui titulus est, quos & quando purgate oportet.

A laboribus conquiescendum.] Intellige iis quibus per hyemem usus fueris. Sæper enim exercitatio corporis necessaria, uerum minor nunc, & facilior, ne calor naturalis, qui à sole tunc euocatur, etiam per hanc magis dissipetur.

At in autumnno.] Celsus eadem fere habet: per autumnū, inquit, propter cibi uarietatem, periculum maximum est. Itaq; neq; sine ueste, neq; sine calciamentis prodire oportet, præcipueq; diebus frigidioribus, neq; sub diuo nocte dormire, aut certe bene operiri.

Poma.] Græce est ὀπώρας. Nam pomum generale uocabulum est, & quicquid apud Græcos opera continet, completur. Discrimē ponit Democritus inter oporas & acrodrya. ὀπώρας.  
Quicquid herbaceo fructu uiret lignosi nihil exterius habēs, ἀκρόδρυα  
ut duracina, pyra, mala damascena, pruna, opora, apud Græcos dicitur. Acrodrya uerò contra nominatur, quæ putamen exterius, lignosumq; fructum cōtinent, ut malum punicum, castanæ, pistacea, nuces, utrunq; genus Salgami nomine complectuntur latini, à quo Salgamarius originem duxit. Celsus Celsus.  
eodem loco iam citato: poma inquit, nocere quidam putāt: Poma.  
quæ immodicè toto die plerunq; sic assumuntur, ne quid ex  
densiore cibo remittatur, ita non hæc, sed consummatio omnium nocet. Galenus optimè utriusq; uocis significatū exprimit Cōmentario περὶ εὐχυμίας καὶ κακοχυμίας, in hunc mo-



dum: τῶν δ' ἄλλων οἱ μὲν ὠρεῖται καλούμενοι κάρπει, κακόχυμοι πάντες. εἰ δὲ διαφθαρῶσιν ἐν τῇ γαστρὶ φαρμάκου δηλητηρίῃς πλοῖοι ἡκῶσιν, ὥσπερ καὶ τὰ μῶρα ἢν δ' οὐνομάζεσιν ἰδίως οἱ Ἕλληνες ὀπώραν ἐν σῦκοις καὶ ταφυλαῖς οὔσαν, ἀμείνων μὲν ἐστὶ τῶν εἰρημένων. &, τὰ δ' ἄλλα τῶν ἱεροδρύων εἶδη κακόχυμα ἐστὶ, &c. Hoc est, aliarum uero arborum fructus fugaces, omnes, maligni sunt. Sin autem in uentre computruerint, medicamenti uenenosi naturam induunt, sicut & mora, &c. Quam autem Græci propriè nominant oporam, ficibus & uuis cōprehensam, prædictis est potior. Plinius compositionem quādam Oporinen appellat ex fructibus generatam, ut confundat differentiam, quæ inter oporam & acrodrya existit. Tu igitur si uoles oporam fructus omnes appellabis ὠρεῖται καρπεῖς, horarios fructus.

Quando  
purgandū.

Post æquinoctium.] Intellige autumnale, quod ad octauū calendas Octobres, uel ad sextum incipit, ut Florētinus Agriculturæ scriptor memoriæ prodidit. Consulit itaq; Paulus, ut si fortè humores uel melancholici, uel adusti in corpore redūdent, ante hyemem in autumno purgentur. Siquidem bis corpus in anno recte euacuatur, si plethoricum, sanguinis dimissione: si malis scatet succis, purgatione. Vere, humorum qui ex hyeme sunt contracti: autūno, qui ex æstate reliqui uisione sunt experti. Quare in duobus æquinoctiis fere, sani corporis euacuationē moliemur, ad futurorū accidentiū præcautionē.

#### IN LIIII, CAPVT.

Omnis mu-  
ratio subi-  
ta noxia  
est.

Consuetis  
aliquid tri-  
buendum.  
Densi,  
Rari.

Facili præditus.] Hoc caput ex libro primo Oribasii sumptum est. Vult autem Paulus in omni uitæ genere, ut semper consuetis utamur. Quod enim contra cōsuetudinem est, nocet. Neq; enim ex nimio labore, subitum ocium, neq; ex nimio ocio subitus labor sine graui noxa est. Qui igitur in laboribus uitam agunt, si facile ferunt, mutationem non consulit. Qui in otio degunt, sani neq; hi ad labores sunt cogendi. Siquidem natura consuetis gaudet. Verū ut mediocris exercitatio summum corpori præsidium cōciliat, ita ocium, extremum adfert malum, ut albi Galenus ait, præsertim si corpus densum, quod non ex facili diffletur, contigerit: sin autē natura est rarum, perspiratu non impedito, aptisq; nutritur humoribus, etiam si non exercitetur, uix morbis est opportunū: Siquidem per meatus, quicquid fuliginosum uiscosumq; fuerit,



rit, diffatur, expelliturq; ac qui talem corporis constitutio- εὐδιάπ-  
nem, fabricationemq; habent, à græcis uocantur εὐδιάπινδ-  
νευτοι. τοι. Exercitiū hoc loco intelliges, ex præscripto institutū, qđ  
multi ante cibū, uti expedit, subire nequeunt ciuilibus nego-  
tiis, aut aliis ēē districti. iis igitur si meatuū cutis raritas & am-  
plitudo fauet, etiā sine exercitio, sanitate aliquādiu frui licet.

Imo nec eos.] Hippocrates hanc sententiam in aphoris-  
morum secundo confirmat: τὰ δ' ἐκ πολλῶν χρόνων συνήθεα,  
καὶ ἡ χεῖρ τῶν ἀσυνήτων, ἵσσοι ἐνοχλεῖν εἴωθε. Hoc est: Que  
longo tempore consue- ta sunt. etiam si insuetis sint deterio-  
ra, minus molestare solent. Nec ea de exercitiis tantum, sed  
omnibus quæ ad corpus attinent, accipienda ueniunt.

In omnibus autem his.] Galenus in libello *περὶ ἐνχυμίας*,  
*καὶ κακοχυμίας* probat in hunc modum: Multi eiusmodi ui-  
tæ institutum sequuntur, ut ipsis non liceat, uel ante cibum  
probè exercitari, uel satis opportune cibum sumere, uel ali-  
menta feliciter concoquere: qui sane à morbis immunes  
permanere nō possunt, nisi ex interuallo alui subductione sibi  
prospiciant: interim purgatione, cum tempestiua sanguinis  
detractione, &c. Quanquam Paulus etiam intelligit ut quoti-  
die aluus bis, aut certe semel respondeat inculpate pro assum-  
ptorum ratione. Id nisi fiat, certe sollicitandā esse docuimus.

**Necessitas**  
purgatio-  
num cōtra  
eos q̄ nun-  
quā medi-  
cina uten-  
dū docent.

## IN LVI. CAPVT.

**V**omitionibus.] Quandoquidem plerisq; necessitas inci-  
dit, nauigio per mare proficiscendi, Paulus ēē hic remedia  
malis obuientibus enumerare uoluit, Oribasium secutus li-  
bro quinto: facit igitur uini mentionē, quod maximè stoma-  
cho uomitionibus turbata cōuenit. Vocat aut̄ græcè *οἰνάριον*  
quasi dicas uillū, sicut ēē *ὄξειον τὸ ἀπὸ μέλιτος*, p oxymelite.

Polentæ polline.] Hoc est tenuiore parte farinæ ordeæ  
cæ tostæ. Voco autem pollinem cuiuscunq; partem subti-  
liorem, non tantum farinæ triticeæ, ut putat Orosius. Nam  
Celsus, Scriboniusq; thuris pollinis meminit. Plinius præpa-  
rationem eius lib. 18. cap. 7. docet: Polentam quoq; græci nō  
aliunde præferunt. Pluribus sit hæc modis. Græci persusum *ἀλφίτον*  
aqua ordeum siccant nocte una, ac postremo die frigunt: de- *ἀλφίτου*  
inde molis frangunt. Galenus lib. 1. de alimentis, de nouello *παιπαί-*  
ordeo tosto intelligit. Græci polentam *ἀλφίτον* nominant: *λη*,  
tenuiorem eius partem, *ἀλφίτον παιπάλη*.

*οἰνάριον.*  
*ὄξειον.*  
Pollen po-  
lentæ.  
Errat Oro-  
scius.



**Q** Vum immodice corpus.] Ex Oribasii quinto, metho-  
di uero Galeni decimoquarto hæc ferè transcripsit.  
Cæterum medici officium est, ut intemperies corrigere, con-  
tinui diuorrium, committere, ita quoq; amputare, & præscin-  
dere, quod magnitudine, uel numero redundat, reficere autē,  
& fingere quod desit. Verbi causa, cum corpus ex corpulentia  
eò deuenit, ut nec ingredi sine molestia, nec sedem propter  
uentris molem contingere, nec respirare libere possit, hanc  
sedem propter uentris molem contingere, nec respirare libe-  
re possit, hanc liquare & tollere, æque nimirum, ut quando  
corpus ali definit, huic quoq; reficiendo prospicere Paul. græ-  
ce dixit ὅταν εἰς πολυσαρξίαν ἤμετρον ἐκτραπῇ τὸ σῶμα. Hoc  
est: Cum corpus in corpulentiam immodicā deuenierit. Cel-  
sus plenum corpus dicit & obesum.

πολυσαρ-  
κία.

Lesio ca-  
stigata.

ὀξεία.

ταχεία.

κατασάρ-  
κους.

πολυσάρ-  
κους.

παχέας.

ἡλίωσης.

Fallitur.

Oroscius.

Calidior & siccior.] Græcus codex non habet καὶ ξηροτέ-  
ρα, id est & siccior. Ex Galeno autem addendum uenit, quod  
Genusæus præteriit.

Citas exercitationes.] Græce dixit Paulus ὀξεῖα γυμνάσια,  
quod ad uerbum sonat, acuta exercitia Galenus in commen-  
tario libelli de ratione uictus priuatorum interpretatur fere  
quod decimoquarto docuit: ἢ ταχεῖα κινήσεις τὴν θερμότητα  
ἐπιπλεῖον ἀνξάνουσα τήκει τὸ σῶμα. Quod est: Velox motus  
calorem amplius augens, corpus liquat. Idem igitur est ὀξεῖα,  
& ταχεία. Celsus cursum, multam obambulationem, omnem-  
que uehementem exercitationem ponit.

Iuuat itidē crassios insolatus.] Crassios hic intelligo, quos  
græci κατασάρκους, ωλυσάκης, ταχέας νοῖαντ. His opponūtur  
λέπτοι, ἰσχυροί, κατισχυθέντες, & καταλελεπτυσμένοι. Celsus  
cōtrarios inter se uocat, plenū, & tenuē, gracilem & obesum.  
Insolatus autem græce dicitur ὑλίωσις, quod Celsus interpre-  
tatus est sol inurens: & omnis calor, quanquam Orosocio id  
non placeat, homini in bonis authoribus parum uersato.

Præbire autem non debent.] Hoc intelligendum est ni-  
mirum, ne cibus statim in corpore distribuatur. Contrariam  
plane sententiam habes apud Polybum: quam Celsus dein-  
de interpretatus est: sed non nihil euariat. Græce primū sic  
habetur: καὶ τοῖς σιτίοισιν ἐπιχειρεῖν, προπεπωκότας οἶνον κε-  
κράμενον, καὶ μὴ πανὴ σφόδρα ψυχρόν, hoc est: Et cibos aggre-  
di, uino



di, uino prius temperato, & non admodum frigido assumpto. Celsus inquit, semel die assumptæ epulæ, & uini non perfrigidipotio ieiuno in consuetudinem adducta. Galenus autem, sententiam corrigens, dicit legēdum μήτ' ὅλωσθαι, quod est, neq; omnino calidi.

Semel tantum die.] Græci hoc uocant μονοσιτῆν. Galenus autem in commentario nuper citato locum hunc quasi corrigit, κάλλιον inquit, ἂν ἦν εἰρησθαι πρὸς αὐτῷ μὴ μονοσιτῆν, ἀλλὰ ὀλιγοσιτῆν, hoc est: Præstaret dictum ab eo fuisse, non semel epulas assumere, sed modicas. Quidam enim ex iis qui semel tantum cibum sumunt, multo plns ingerunt, quàm qui bis capiunt.

μονοσι-  
τῆν.  
ὀλιγοσι-  
τῆν.  
Galenus  
non semel  
modice,

## IN LVIII. CAPVT.

**Q**Uum extenuatos.] Hoc caput ex decimoquarto Methodi Galeni sumptum est. Commemorat autem uetus rationem extenuatis accommodam, primum quidem uinum crassum, cuiusmodi sunt nigra & fulua Italica uel Asiana, aut etiam Hispana. Linacer autem methodi interpretes uertit οἶνον παχὺν, uinum pingue, qua ratione, uel quem secutus autorem nescio. Dicuntur autem uina crassa, quæ succū crassum habent, multumq; alunt. Cibus autem crassi succi, qualis est, alica, porcina caro, panes furnacei, & textuacei, tragus, oua, lac, caseus, magnaq; piscium pars. Qui cibi crassi, omnes ad nutriendum sunt ualentissimi: & si probe in uentriculo, ac iocinore concocti fuerint, sanguinē benignū generare solent.

Vina cras-  
sa.  
Linacri  
locus.

Exercitatio modica.] Omnia exemplaria Pauli impressa habent γυμνάσια δὲ βραδέα. Hoc est, exercitia autem lenta: & optime quadrat lectio superiori sententiæ, quæ de crassis extenuandis habetur, nempe huic, Citas exercitationes. Galenus autem in Methodo, omnibus codicibus attestantibus, legit βραχέα, hoc est, modica. Celsus in simili sententia de replendis tenuibus dicit conuenire, modicam exercitationē. Rursus Galenus in commentario superius citato dicit extenuatis eadē fere ex usu esse: οὕτω δὲ, inquit, καὶ τὰ γυμνάσια, βραχέα τε γυμνάζεται, καὶ βραδέα, καὶ μετὰ τροφήν. Quid est: Ita uero etiam exercitia, & pauca, & lenta, & post cibum habebit. Sume igitur utramuis lectionem. Ego secutus sum Galenum in methodo, unde hæc sunt descripta.

Crassi suc-  
cibus,

Contrarij  
loci.

Apud Pa-  
lybum.

Lectio  
emendata.

Deinde frictione dura.] Hæc sententia & mutila, & deprauata



Orosius.  
Castigator  
Basilienſis.

uata exiſtit in Paulo. Quid enim per hæc uerba intelligas: καὶ  
πειτὰ σκληρὰ μὴ πολλὰ πέλυντες τὸ δέρμα, &c. Corrigenda in-  
ſtaurandaq; eſt ex Galeni lib. 6. de ſanitate tuenda, in hūc mo-  
dum: καὶ πειτὰ τρίψει σκληρὰ μὴ πολλὰ πέλυντας τὸ δέρμα.  
Hoc eſt: Et poſtea frictione dura non multa cogentes cutē,  
quo denſa, duraq; euadat. Hæc Oroſcius & caſtigator Baſi-  
lienſis non aduerterunt.

Ijs qui pallido.] Iram, motusq; animi præcipit decolora-  
tis, ut uidelicet inde ſanguis in exteriores partes trahatur: ſi-  
cut alii quibuſdam medicamentis eò alliciunt.

#### IN LIX. CAPVT.

πίττωσις

Extenuantur plerunq;.] Vide Galenum in decimoquarto  
Methodi medendi, ubi etiam horum curationem plenius  
perſequitur. Picationis mentionem facit, quæ πίττωσις dici-  
tur græcis, hoc eſt, pix mēbris oblita: hyeme bis æſtate ſemel,  
idq; frigidis & humidis, aut utroq; tēperamēto ſimul donatis.  
Nā ſiccis & calidis eiufmodi medicamēta adhiberi nō debēt.

#### IN LXI. CAPVT.

Instaurata  
lectio.

Conſuetu-  
do acquiſi-  
ta natura.

Entient, increſcentq;.] Hoc & ſuperius caput, ex cōmen-  
tario Galeni ſumptū eſt, qui ars medicinalis inſcribitur.  
Deeſt autem in codicibus Pauli impreſſis dictio καὶ, in capitis  
principio. Lege igitur τοῦτε ὀδόντας φύσει θάττον, καὶ αὐξη-  
θήσεται. Hoc eſt: Dentes citius producent, & augebuntur:

Is ob conſuetudinem.] Puta liberaliorem cibum ſumptū  
cōtinue, ocium, totamq; deniq; uictus rationem: quod apud  
Galenum κατὰ ſυμβεβηκῆς, hoc eſt, ſecundum accidens, con-  
trarium huic uocat κατὰ φύσιν, ex natura. Veluti alii nati grā-  
dioribus uenis, corpore ad gracilitatem idoneo ex ocio diu-  
turno, cibisq; tum ualidis tum copioſis craſſeſcunt, alii exili-  
bus uenis præditi ex labore aſſiduo, curis, uigiliisq; & cibis  
extenuantibus uſi in obſitatem prolabuntur.

Instaurata  
lectio.

Hoc etiam  
aduerſit  
Orosius.

Nigri ipſis pili exiſtunt.] In codicibus Pauli impreſſis hac  
tota ſententia deſideratur: planeq; ut adſit, neceſſaria ad di-  
ſputationē de tēperaturis vī. Nā altera diuiſionis pars exiſtit.  
Repone igitur ex Galeno in arte medicinali in hūc modum  
poſt ἢ ὀλίγω θερμότερον. μέλαινα δ' αὐτοῖς αἰ τρίχεις, καὶ ἡ  
σὰρξ ἀπὶ μέλος εἰ δ' ὀλίγω μὲν αἰ θερμότερα, παμπόλλω δὲ ὑ-  
γρότερα, μαλακὸ τούτοις εἶναι ἡ σὰρξ καὶ πολλή, καὶ τὸ χρῶμα  
ſυμμιγῆς ἐξ ἐρυθροῦ καὶ λευκοῦ καὶ φανώντων ὀλίγω θερμότερα.  
Color



Color autem & capilli.] Hic quoq; mutilus est codex græcus, habetur enim: τὰ δὲ τῶν τριχῶν τῆς χροῖας, pro τὰ δὲ τῶν τριχῶν, καὶ τῆς χροῖας. Nec aduertit hoc Gemusæus. Color itaq; totius corporis, hoc est albus, maxime erit, si illud uehementer fuerit frigidum, capilli quoq; rarissimi enascentur, si illud tale fuerit: sin minus, minus illa quoq; erunt intensa. Hoc itaq; est pro proportione.

Restitutus  
locus.

## IN LXII. CAPVT.

**E**Xiguum sane caput.] Hæc quoq; ex arte medica Galeni transcripta sunt. Prauam, inquit, cerebri structuram indicat. Nam quod in tentorijs præstant pali quos græci κάμακας appellāt, & in ædibus parietes, id nimirum in animalibus ossium substantia. Quippe ad huius imitationem cætera omnia in animæte solent effingi, mutariq; ut si caluaria sit rotunda, necessario cerebrū tale fuerit: quemadmodum etiam si oblonga sit, talem quoq; figuram cerebrum induet. Si itaq; paruū est caput, ea q̄ ossibus adhærēt, exigua, aut mutila esse cōiicimus.

κάμακας.

Figura.] Nempe quæ ad oblongæ spheræ potissimum similitudinem structa est. Alia uero capitis figura uertice acuminato, qualem Therpsites habebat apud Homerum, deprauata est. Naturalis itaq; priorem ac posteriorem partem prominentiorem habet. Deprauata, altera eminentiarum caret. Interim utraq; : quare etiam futuras præter naturam habet.

Figura perfecta.

Si optimè sit disposita.] Galenus dicit: Si ualidam habet ceruicem, aliisq; ossibus optimè sit constituta.

Plerunq; igitur.] Retuli ad eminentias. Nam figuram nō pōt. Vult itaq; Paulus nōnunquam etiam fieri, ut capita etiā bona existant, quāuis eminentiæ à naturæ modo reuoluerint.

## IN LXIII. CAPVT.

**M**Inimeq; ab omnibus exteris.] Ex eodem Galeni commentario sumptum est: dicit autem exteris, quod idem sibi uult, ac si dicas, extrinsecus accidentibus quæ calefaciūt, refrigerant, siccant, & humectant. De pilis etiam in libris de facultatibus naturalibus comprehensa à Galeno reperias.

Summatim circa.] In fine capitis hæc clausula habetur. Sonat autem græcè ταχύγηρι τὰ περὶ τὴν κεφαλὴν ἅπαντα εἰσίν. Hoc est ad uerbum: Cito senescunt in iis omnibus quæ circa caput sunt. Quasi dicas: Omnes capitis partes potissimū, mature senium testantur.



κλύδω-  
νις.

**F**luctuationes.] Sic interpretatus sum græcam dictionem κλύδωνας. Ventriculi est parum ea quæ ingesta sunt, comprehendentis, concoquentisq; fluctuationes experiri. Male impressum est in Galeno græco nuper ædito Basileæ, κώδωνας pro κλύδωνας.

Castigatus  
locus.

Calidis cibis.] In impresso codice erat, πολλοῖς pro θερμοῖς. Nec aduertit Gemusæus, tot manu scripta exemplaria iactans. Galenum uide in arte medicinali.

## IN LXV. CAPVT.

Lectio in-  
staurata.Præterijt  
Oroscius.

Gemusæus

ἐντρέχει.

**N**on modo uentriculus.] Ex eodē Galeni libro, eodemq; ferè loco transcripta sunt. Post hæc autem uerba: Cor, pulmo, & iecur, sententia Pauli manca uidetur, quicquid Gemusæus dixerit de epitome. Quid enim est, quin etiam bibentes, non cessant, uel ut græce dicam, καὶ μὲν δὴ καὶ πίνοντες οὐ πάνονται, nisi alia præcesserint? Integra igitur sententia apud Galenum sic habet: ὁ μόνον ἡ κοιλία διψῶδεις τε καὶ ἀδίφες ἐργάζεται, καὶ ψυχρὰ καὶ θερμὰ πόματος ὀρεκτικὰς, ἀλλὰ καὶ τὰ κωτὰ θώρακα σπλάγχνα καρδίαν, καὶ πνεύμων: ἀλλ' οἷγε διὰ τὴν τοῦτων θερμότητα διψῶντες, εἰσπνέουσι τε πλέον, ἐκφυσῶσι τε μακρόν, αἰσθάνονται τε κατὰ τὸν θώρακα τὴν κάυματος, ὥσπερ οἱ διὰ τὴν γαστέρα κατὰ τὸν ὑποχόνδριον, καὶ μὲν δὴ πίνοντες, ὅτι εὐθέως ἡ συχάσσει. Hoc est ut interpretatus sum, restitue igitur, si uidetur codicem: Prius tantum erat: Non solū, uentriculus sitim uel adfert, uel arcet, ac frigida calidæq; portionis appetentiam facit, sed etiam quæ in thorace continetur uiscera, cor, pulmo, & iecur. Quinetiam si biberint, non statim sitire desinunt, &c Quam integra hæc sit oratio, doctis iudicandum relinquo, meo certe iudicio apponenda uidetur, quæ ego textui inserui ex Galeno Miror Oroscium hunc locum præterisse: Gemusæum autem non castigasse ex ueteribus exemplaribus quibus se abundare sæpius triumphat.

Recrementa ipsis interueniunt.] Hoc est, crassæ humiditates & pituitosæ arteriam asperā, per quam uox editur, interceptiunt. Græcum uerbum est ἐντρέχει αὐτοῖς. Alias signat, insident, inhærescunt, si Græcorum grammaticis fidem accommodamus.

IN



## IN LXVI. CAPVT.

**A**C præcordiorū regio. ] Hoc est qua præcordia incipiunt. Græcus codex habet: καὶ τῶν καθ' ὑποχόνδριον ὅσα τοῖς ταῖς πλησίον, quasi dicas ad uerbum: Et præcordiorum quæ his propinqua sunt. Hoc est, & partes præcordiorum his pectoribus uicinæ hirsutæ sunt. Mox sequitur; Magna uero ex parte quod textus græcus in impresso tantum his uerbis continet: ὡς ἐπιτοπολὺ καὶ τὸ, pro ὡς ἐπιτοπολὴ δὲ καὶ, atq; sic corrigito. Paulo post; Quinetiam, in græco impresso est καὶ μὲν γὰρ ἡ, &c. tu corrige ex Galeno καὶ μὲν τρι καὶ ἡ, requirēte id sensu. Rursus pusillanimes, negligentes, pectore glabro, codex græcus plane deprauatus est. Habet enim ἀτολμοὶ, καὶ μάλιτα ἐφίλῶν αὐτοῖς τὸ στέριον, pro ἀτολμοὶ καὶ ἀμέλῃται, καὶ φίλον. Hæc Gemusæus castigator non aduertit, sic nec superiora Orosius.

Omisit  
Orosius.Lectioes  
castigatæ

## IN LXVII. CAPVT.

**H**Oc caput etiam ex eodem Galeni commentario, ut superiora quæ de temperaturis agunt, quasi transcriptū est. Ceterum in clausula uenæ duriores, græcus codex deprauatus est. Habet enim αἱ φλέβες ξηραὶ, quod est uenæ sicce, pro αἱ φλέβες σκληρότεραι. Hoc est uenæ duriores.

Locus ca-  
stigatus.

## IN LXVIII. CAPVT.

**P**Orro si humiditas calori fuerit cōiuncta, hispidos quidem minus, tales. ] Vtrunq; exemplar impressum mutilū est, desideratur enim ἡ ττον. Nam legendum est, συνελθούσης δὲ ὑγρότητος τῇ θερμότητι, λάσιον μὲν ἡ ττον οἱ τοῖς τρι. Hoc Gemusæus præterit.

Lectio ca-  
stigata.

## IN LXX. CAPVT.

**Q**Vum itaq; calida ] Totum hoc caput ex sexto Galeni de sanitate tuenda iuxta principium, & Oribasii quinto sumptum est: cōuenit aut recte ut postquam temperaturarū notas descripserit, intemperierū remedia subiungat. Sollicitudo & uigiliæ. ] Post has dictiones, καὶ κινήσεων ἀπασῶν ὀξεῖων. Hoc est, & omnes celeres motus. Sic enim uerto ὀξύ, quod est acutum, Recte autem dixit celeres motus: ut qui corpus calefaciant impensius.

Motus ce-  
leres.

Humidæ & calidæ natura ] In græcis codicibus impressis, tantum humidæ, habetur. Legendum autem ex Galeno, sensu id requirente: αἱ δὲ ὑγραὶ καὶ θερμαὶ τῇ φύσει, &c. Quod est: Hu-

Instaurata  
lectio.



Calida &  
humida.

est: Humidæ uerò & calidæ natura. Nam ubiq; apud Galenū habes, humidæ & calidæ naturæ, putredini sunt obnox æ, qđ lib. i. de febrium differentiis hisce uerbis confirmat: ἐτοιμότατα γὰρ σήπεται πάντα ὅσα θερμά, καὶ ὑγρὰ. Hoc est: Nā omnia quæ calida & humida sunt, facillime computrescunt.

Rheumaticis, plethoricisq; . Vfus sum græcis dictionibus opera dedita, quòd medicis admodum sint familiares. Poterā autem dixisse, fluxionum & redundantie morbis, quemadmodū Linacrus. Sed nescio quid energix habēt uoces græcanicæ.

ἀπόρροιαί

Porro defluxionibus ] Recte quadrat. Nam superius dixi, rheumaticis patent morbis . Vocantur autem græcis ἀπόρροιαί corporis defluxus, nunc in hanc nunc in illam partem: quales experiri sæpe solent humidi temperamento & calidi.

LECTIO NOTATA  
DIGNA  
INSTAURATA.

Lauacris, multa exerc. ] Trifariam hæc lectio apud autores uariatur: apud Paulum habetur: ἀπορροιαὶ δὲ προνοεῖν χρὴ διὰ τε λούτρων καὶ γυμνασίων πολλῶν καὶ πρὸ τροφῆς . Hoc est: Defluxionibus prospiciendum est, lauacris, exercitiis multis, & ante cibum, &c. Oribasius legit καὶ τῶν ἀπορροιαῶν δὲ προνοεῖν χρὴ διὰ τε λούτρων καὶ γυμνασίων πολλῶν, &c. consentit fere cum Paulo . Galenus autem in hunc modum: ὥς τε καὶ τὸν ἐπιτατῆντα τῷ τοιοῦτῷ σώματι τῶν ἀπορροιαῶν πρωτοῖται χρὴ διὰ τε γυμνασίων ὥς ἔφην, καὶ λούτρων καὶ τροφῶν πλείονων, ἐκκρίσεως ὥς τε τῶν δι' ἔρων, καὶ γατρος γινομένων, &c. Hoc est, Quare qni huiusmodi corpori tuendo præficitur, prospicere iis debet quæ ab ipso defluunt tum exercitiis ut dixi, tum balneis, & cibis pluribus, tum uero iis quæ per uentrē & urinas redduntur, excernendis, &c. In hac oratione mendū plane est: quod enim sibi uult, cibis pluribus? cū corpus defluxionibus opportunum, sobriam potius uiuendi rationem requirat, quàm multorum cibo tum ingestionem qui ipsi sæpius fluxiones solent excitare . Legendum itaq; existimo in codice græco λούτρων πρὸ τροφῶν πλείονων, quod est: Lauacris ante cibum pluribus. Nam ut exercitatio cibum præcedēs, ita balneum quoq; superflua corporis discutit, subsequēs autem cibos, cruditatem, eoq; prædicta symptomata procreat. Sed cui auctori assentiemur, alius habet pluribus balneis, alius, pluribus, exercitiis. Superius semel dixerat, multa exercitatione, eoq; hic etiam referendam puto dictionē pluribus, uel exercitiis. Hæc nō aduertit Gemusæus nec Orosius.

Omisit  
Orosius.

IN



## IN LXXI. CAPVT.

**I**Nter frigidās.] Hoc totum caput ex sexto libro Galeni de sanitate tuenda sumptū est: ex Oribasij autem quinto. Enumerat autem tres frigidæ intemperies differentias, frigidā & siccam, frigidam & humidam, frigidam & mediocrem in siccitate & humiditate. Harum singularum remedia ordine enumerat. Inter quæ Paul. recēset ἀλυσία τε καὶ γυμνάσια πλείονα καὶ λεπτότερα, quod est balnei abstinētia, exercitia plura, & tenuiora Vbi legendū existimo ex Galeno, sensu id exigente. ἀλυσία τε καὶ γυμνάσια πλείονα καὶ διαίται λεπτόραι, hoc est: Balnei abstinētia, exercitia plura, & uictus ratio tenuior. Hoc præterierunt Orosius & Gemusæus.

Locus re-  
stitutus.

## IN LXXII. CAPVT.

**I**Ntemperies sicca.] Hoc autem caput ex septimo methodi ad uerbum transcriptum est: ubi docet, quæ potissimū intemperies, seu alterationes facilius reparari queant Enumerat aut siccitatis differentias tres: quas etiam alibi cōprehendit: Verum Pauli codex græcus statim in principio capitis deprauatus est. Habet enim ἡ δὲ τῆς ὑγροπαγῆς οὐσίας πρὸς ταύταις. Quod nihil fere significat. Corrigitur igitur in hunc modum: ἡ δὲ τῶν ἐκ τῆς ὑγροπαγῆς οὐσίας συνεστώτων, ἑκτακέντων, καὶ τρίτη πρὸς ταύταις. In textu latino sum interpretatus græca, quæ desiderabantur. Castigator Basilien̄sis hoc quoq; præterit.

Castigator  
Basilien̄sis.

Ex humore concreto.] Galenus addit, sicut caro & adeps, Paulus compendij causa omisit. Cæterum caro & adeps nihil aliud sunt, quàm humor concretus: caro quidem, sanguis ui assimilattice in carnem redactus: adeps autem humor extra uasa elapsus, ex frigiditate congelascit, concrescitq;.

Chondrum ptisanæ modo.] Chondrus omnino fit ex zea, ut in sequentibus docebitur.

Ptisana, ἀ πτίσσειν duxit originem, quod ordeū unde præparatur, tundendo deglubatur, ac suo cortice castratum, usui seruetur. Hordeum mundatum officinæ uocant: tunditur enim hoc, nec molitur.

Quo picatores utuntur.] Vnguentum hoc alias dropax uocatur, quod picem recipit. Vide Paulum, in septimo ad calcem. Solet partibus emacratīs adhiberi. Administratio græcis πίττωσις, quasi picatio: qui adhibent πίττωται dicuntur.

πίττωσις  
πίττω-  
ται:

PAVLI AEGIN.

Y Iam



Codex  
Græcus re-  
stitutus.  
Omiserūt  
aristarchi.

Iam uero multæ.] Græcus codex non habet δαφιλαῖ, hoc est, multæ: uerum sensus exigit, ut contraria opponantur sibi δαφιλες, καὶ μέτριον. Sic etiā Galenus habet: μίγνῃ δ' ἐφε-  
ξῆς δαφιλεῖ ξηρότητι καθάπερ ὑπόκειται, μὴ πανυ πολλὴ θερμό-  
της. Hoc est: Ab hinc uero iuncta sit multæ siccitati ut dictū  
est, non admodum multa caliditas. In sequenti sententia, re-  
litue græcum codicem, ac lege: πὶ μεντῆς τοιαύτης ὑπάλ-  
λάξῃς τὴν πρότην ἀγογὴν φυλάξομεν. Quæ Orosius, & casti-  
gatores Basilienſes omiserunt.

Quæ sint  
galactode.

Tepidos lactis modo.] In Græco codice est, χλιαρὰ δὲ τὰ  
ἐδέσματα καὶ γαλακτώδη. Hoc est, Tepidos autem cibos &  
laçteos offeremus. Galenus lib. 7 Methodi dictionem γαλα-  
κτώδη interpretatur, χλιαρὰ δὲ, inquit, ens, τὰ ἐδέσματα προ-  
στίχομεν ἀκαλῶν ἐβος ἐστὶ τοῖς ἰατροῖς γαλακτώδη, quod est: Te-  
pidos autē cibos offeremus, quos medicis uocare lacteos con-  
suetudo est. Idem lib. 11 Aetiæ τα αλβυλα καὶ τῇ κρύσει γα-  
λακτώδη. Hoc est albulæ & tēperamēto lacteæ balineæ, quod  
est, tepidæ lactis iam emulcti modo. Celsus tales cibos, lib. 4.  
cap. 11 in hunc modū inquit. Aqua neq; ea ipsa frigida, sed  
potius egelida dāda est. Ibidē: Si uero tormina sunt, oportet  
frigidis & humidis fomētis stomachū fouere: uel si uēter do-  
let, iisdē egelids, sicut uēter ipse mediocriter calētibus iuuei.

Restitutus  
locus.

Quod si ad uomitū sint idonei.] In Græco codice muti-  
latus locus est, in hunc modum: εἰ δ' ἐπιτηδείως ἔχοι διὰ ξα-  
φανίδων ἐμέτω, adde post ἔχοι dictiones duas πρὸς ἐμετὸν,  
quod Gemusæus castigato non aduertit, uolens in compen-  
dio eiusmodi intelligi.

### IN LXXIII. CAPVT.

**Q**Uum igitur attenuandi.] Olim ueteres maiorē uim  
in uictus ratione ponebant, quā in medicamentis:  
ubi uel humor uiciosus emendandus, uel morbo ueniēti erat  
prospiciendum: alia nimirū ratione, quā huius seculi Me-  
dici ſactitantes: qui statim cum quis de particula aliqua cō-  
coqueritur, id ualentissima etiam medicamenta confugiunt.  
Cæterum Paulus noster hæc ex commentario Galeni cui  
titulus est, de ijs quæ bonum malumue humorem gignunt  
sumpsisse uidetur. Habet ille in hunc modum: καὶ διὰ τῶτο  
τοῖς ἰατροῖς εὐρέθῃ τὰ κληθέντα πρὸς αὐτῶν ὑγιεινὰ φάρμακα  
τῆς λεπτυνύσεως ἅπαντα δυνάμειος ὄντα. τούτοις γὰρ ἔργον  
ἐστίν,



ἐστίν, ἐκφράττειν μὲν τὰς τοιαύτας διεξόδους, ἀπορρίπτειν δὲ τὸ  
προπλαττόμενον γλίσχρον ἐκ τῶν χυμῶν τοῖς ἀγγείοις, τέμνειν  
δὲ καὶ λεπτύνειν τὰ παχέα τῶν ὑγρῶν, ἀλλ' ἔαν πλεονάσῃ τε ἐν  
αὐτῇ, ὁ ῥῥῶδες, ἢ πικρόχολον ἐν τῷ χρόνῳ, ἢ μελαγχολικὸν ἐρ-  
γάζεται τὸ αἷμα. Hoc est: Quamobrem medici salubria ab

Salubria  
medica-  
menta quæ.

ipsis uocata medicamenta inuenerunt, omnia facultatis atte-  
nuatoriæ: siquidē munus ipsorū est arctos trāsitus patētiores  
reddere, succorū lentorē uasis adhærescentē abstergere: humo-  
rū crassitiē incidere atq; extenuare. Sin autē serosum quippiā  
in eis redūdet, uel sanguinē biliosum temporis interuallo, uel  
melancholicū efficiūt, &c. Sunt autē medicamenta salubria, ci-  
bi loco medicamentorū sumpti, quibus per sanitatē utimur.

Porro quæ in crassandi. ] Ex eodem commentario transcri-  
pta sunt, ubi in istum modū habet: τὰ δὲ τὰς παχέας καὶ γλίσ-  
χρας γεννῶντά τε χυμὸς ἐδέσματα τροφιμώτατα πάντ' ἐστὶ,  
καὶ πεφτῆ καλῶς ἐντε πῆ γαστρὶ, καὶ τῷ ἥπατι, χρηστὸν αἷμα γεν-  
νᾶν πέφυκεν, ἀμεμπτότατα δὲ τῶν ἐδεσμάτων ὑπάρχει τὰ με-  
ταξὺ τῶν λεπτυνόντων τε καὶ παχυνόντων. Quod est: Cibi ue-  
ro crassus, uiscosusq; humores generātes, oēs & ualentissimæ  
sunt materiæ, & si probe in uētriculo, & hepate fuerint conco-  
cti, benignū generare sanguinē assolēt: uerum inculpatissimi  
inter cibos sunt, qui tenuium, crassorumq; medii habentur.

Qui sese exercent, & quantum libet ] Galenus hæc ita ha-  
bet: ὅσοις μὲν γὰρ ἀνθρώποις οἶοντ' ἐστὶ γυμνασίοις τε πλέοσι  
χρῆσθαι, καὶ κομᾶσθαι μεχρὶς περ' ἀν' ἐθέλωσι, καὶ βίον ἔξω τῶν  
πολιτικῶν ἀσχολιῶν ἡρῆνται τοῦτοις ἐγχεσθαι, καὶ τὰ παχύχυ-  
μα καὶ γλίσχρα τῶν ἐδεσμάτων ἐδίειν. Hoc est. Quibus itaq;  
exercitiis pluribus urī licet, & quā diu libet dormire: ad hæc  
qui uitam ciuilibus negotiis uacantē degunt, ii & cibos crassi  
succī, & uiscosos tuto assument.

Exercitio.

Porro quemadmodum. ] Ad uerbum ex eodem loco tran-  
scripta sunt Galenus autem addit rationem: ne utiquā enim,  
inquiens, aliquis ægrotabit, si opportune prospiciat, ne conco-  
ctione unquam frustretur, item ne à cibo ualidam quandam  
ambulationem subeat. Quippe sicut exercitatio cibos præce-  
dens, plurimū cōseruandæ sanitati conducit: sic quælibet fm  
cibos cōmotio, nocētissima est. Nam alimentū antequā sit cō-  
coctione elaboratū, ex uentriculo distribuitur. Vnde crudorū  
humorū copia in uenis collecta, oīgenas morborū spēs pro-

Y 2 creare



create solet, nisi protinus labore assiduo fuerint discussi, uel concocti, ac in sanguinem commutati.

Varia ciborum genera.] Plinius lib. 11. cap. 52. Homini ei-  
bas utilissimus simplex, Aceruatio saporum pestifera, & con-  
dimenta perniciosiora.

## IN LXXIII. CAPVT.

**L** Actuca.] Ex libris de alimentorum facultatibus fore mu-  
tuatus est omnia Paulus. Itaq; cum dicit, eoq; somnū ac-  
cerfit, intellige, uesperī commanducata, ut Galenus uti sole-  
bat. Valenter nutrit, græca dictio est τροφίμος, quasi dicas, nu-  
triciens ualde, sic enim docti interpretantur uocem istam.

τροφίμος.

Ita boni succi Galenus, cum alia omnia olera paucissimū  
sanguinem generent, sola lactuca non multum quidem nec  
uitiosum gignit, non tamen absolute εὐχυμον, hoc est boni  
succī, laudabilem & benignum.

**I**ntybum.] Alias græcis στερῖς dicitur, in satium & agre-  
stem diuiditur. Quanquam græci per cichoreum tam dome-  
sticum quàm agrestem intelligant. Satiuus intybus duplex,  
unus latioribus foliis, lactucæ similia, quem nos endiuia, cor-  
rupto nimirum uocabulo appellamus. Alter, foliis strictiori-  
bus, multis capillamentis per radicem transeuntibus. Hoc lo-  
co intybum, intellige potissimum, quam uulgo Endiuia no-  
minamus, in acetiariis usitatam.

Endiuia,

**B**raffica marina.] Forte ea est herba, quam officinæ solda-  
nellam uocant circa maritima nascētem, nisi Dioscorides fo-  
lia longa brassicæ huic attribuisset, quæ in Soldanella nō sunt.  
aut longitudo de foliorum ordine uenit intelligenda.

Soldanel-  
la.

**B**litum & atriplex.] Blitum olus rubrum quod in cultis  
se attollit, cuius folia iuribus incocta sic ea inficiunt rubore,  
ut nigelli uini dilutum colorem repræsentet: à quo rubrum  
olus etiam ab olitoribus uulgo uocari. Radice non una niti-  
tur, sed contra cæterorum fere olerum morē multiplici, pro-  
lixa, non in rectum tendente, betaceis frondibus, sine acrimo-  
nia fatuis, semen corticeum profert racematim singulis ra-  
mis insidēs. Atriplex flore aureo prodit, caule interdū purpu-  
reo, interdum candicante, ramoso, folio bliti, cū pubescit her-  
baceo, cum senescit, flammeo nonnunquam in luteum lan-  
guescēte, semine foliaceo, simplici radice in altū ascendente.  
ex quo multæ se promūt. Dicit̃ ēt Dioscoridi Chrysolacanū.

Chryfola-  
canum,

Scolymos



Scolymos.] Paulus & Aetius scolymon à cinara direme-  
runt hanc officere stomacho, illum prodesse iudicantes Idem  
etiam Galenus, ex quo sua mutuati sunt illi in 2. de alimen-  
torum facultatibus testatur. Alii tamen Græci nullum aliud  
inter hæc discrimen ponunt, quàm quod scolymos ferus sit, &  
syluester: cinara uero, domita cultu, feritate exuta, mitior &  
alcalis: cuius cibus, licet stomacho sit grauis, non protinus à  
scolymis natura, uiribusq; degenerauit. Verum ex coctura no-  
xam, quam prius referebat, amolitur: ijs additis quæ etiã Ga-  
lenus enumerat.

Attractylis.] Hæc duas habet species, una mitior est cni-  
co satiuo similior, caule rectiore ac rigido, exili. Itaq; pro co-  
lo antiquæ mulieres utebantur, atq; hanc proprie attractyli-  
da nominabant, semine cãdido, grandi amaro. Ab officinis di-  
citur hodie syluestris cartamus. Quibusdam sanguinea uirga  
nominatur quod uulso ramulo cruorem modicũ profundat.  
Altera species hirsuta, caulibus sonchi, torosis, humi reptãti-  
bus, semine minuto, frequenti, amaro, & pilis barbato, flore lu-  
theo, ut prior. Cruor etiam ex uulnere secti exit: hæc offici-  
nis uocatur, cardus benedictus.

Syluestris  
cartamus.

Cardus be-  
neditus.

Apium hipposelinum, sion, smyrnion. Quum apium abso-  
lute apud autores ponitur, hortense uenit intelligendũ, quod  
uulgo Petroselinum dicitur. Semina quæ à pharmacopolis  
passim uenduntur, eleoselini sunt, id est, palustris apii. Hippo-  
selinum à Romanis olus atrum dicitur, non autem ab equis  
nomen sumpsit, ut quidam uoluere, sed à magnitudine sua.  
Nam apud Græcos ἵππος in compositione solam magnitudi-  
nẽ signat, in ijs maxime rebus, quibus nihil peculiare habet.  
Id quibusdam putatur apium, quod Galli, Ache, Germani  
eppich nominant, Ferrariæ uulgo appellant apium Macedo-  
nicum. Dissentiant autores in Hipposelino & Smyrnio. Alii  
Hipposelinum, olus atrum nominant, alii smyrnion, quidam  
diuersa olera hæc iudicant, quidam eadem. Nam Plinius ait:  
Olus atrum hipposelinum Græci uocāt, alii smyrnion. Theo-  
phrastus idem uidetur cum Plinio dixisse. Galenus smyrnion  
olus atrum uocat, Romanorum secutus nomenclaturã. Dio-  
scorides & Plinius de iis priuatim ut genere diuersis egerũt.  
Forte ea herba est, quam Galli leuechrã nomināt. Sion, Lati-  
nis dĩ Lauer, frutice pusillo, in profluentibus aquis emicante,

Y 3 habitu



habitu subrecto, pinguiq; latis ac luxuriatibus foliis, olus atro-  
similibus, minoribus tñ, odoratisq; Officinæ berulā uocant.

Berula,

Eruca.] Notissima herba est, in acetariis utimur, ob gustus  
acrimoniam. Græci ἐρύων, Galli Raquetam appellant.

Ocymum.] Recentiores Græci, qui de re herbaria scripse-  
runt, basilicum, hoc est, regium appellant: quod nomen apud  
omnes fere nationes hodie usurpatum uidemus.

Gingidiū.  
Chærefo-  
lium,

Gingidium simile est scandici.] Gingidium forte est herba  
ea quam uulgo Chærefolium appellant: non autem quam  
Plinius Chærepyllon nominat. Olus fuit Pauli & Galeni tē-  
poribus tritissimum in usu. Scandix syluestre olus est, ac ui-  
lissimum si Plauto credimus.

IN LXXV. CAPVT.

Aspara-  
gus.

**A**Sparagus.] Per hanc dictionem intelligi uolo, quæ pri-  
mum in lucem prodeunt olerum germina, priusq; in fo-  
lia explicentur, recentissimosq; turiones qui edendo sunt. In  
summa, primos cauliculorum partus comprehendo.

IN LXXVI. CAPVT.

Bulbi,

**B**ulbi.] Bulborum facies, ut olim ueteribus fuit cognita,  
ita nunc maxime cum officinis, tum medicis, pace erudi-  
torum dixerim, incognita est. Sunt autem cepæ modo tunica-  
ti, & fronde cepiria, tereti, angusta, in mucronē desinente, cau-  
liculo dodrantali, in cuius fastigio flos emicat purpureus, ut  
in scilla circumactus. Agri Gallici appetitus appellationē in-  
diderunt, q̃ meram excitent cibi auiditatem. Verum genus  
hoc q̃ in hortis copiosiore coma uiret, nucleis gracilioribus  
nunc porreā, nunc unionetam à porri, uel unionis, tū sapore,  
tū forma uocant. At nō solū propriæ cuidā plāta bulbi nomē  
inditum est, uerum etiam rotundæ radices suis membranis tu-  
nicatæ Bulbi nominantur, siue pluribus capitulis coagmen-  
tentur, uno folliculo omnes ambiente, siue quadantenus di-  
stinctæ separētur, quales sunt croci, liliorū, narcissi, scyllæ, &c.

Pastinacæ uero, dauci & cari.] Ad uerbum ex Galeni libro  
citato transcripta sunt. Pastinacæ species satis sunt cognitæ.

Officinariū  
daucus.

Dauci uero & cari non item Sunt porrò tres Dauci species à  
Dioscoride descriptæ: quam hodie in officinis habemus, sylue-  
stris pastinaca est, ut sapor, odor & tota deliniatio ostendūt.

Verus Dau-  
cus,

Nulla autem dauci species apud Dioscoridē pastinaca sylue-  
stris est, sed tertia tantum huic comparatur muscario. Verus  
Daucus



Daucus ex Creta exportari debet. Huius semina & radices in usum modicum ueniunt: aliarum specierum semina tantū. Quia uero Dauci & syluestris pastinacæ eadem propemodū uires existunt, ea pro dauco uti licebit.

Cari.] Officinæ carui dicunt Serapionem suum, aliosque Cari. Barbari scriptores secutæ. Non tamē semen hoc carui quod Pharmacopola uendunt, respondent Serapionis descriptioni quippe crassius hoc esse dicit quam cyminum, officinarum autem multo minus cymino est. Caros igitur forte una ex nostratibus dauci speciebus erit, si semen etiam à Dioscoride exiguum descriptum, respiciamus.

Ameloprasum.] Caule prostrato bicubitali, foliis porraceis, sed angustioribus, flore cādido, radice bulbosa. Prouenit in uinetis, unde à natalibus ampeloprasum quali uitigineū porrum Græcis nōiatur. Nostrates officinæ uineate porrū appellant. Portum vineæ.

## IN LXXVII. CAPVT.

TVbera.] Hæc ex terræ sagina conglobantur, sine medulla, uina, cortice, solo undiq; circumdata, nullis fibris, nullisq; capilamentis nixa, nec extuberante loco in quo gignuntur, aut rimam agente, nec ipsa terræ coherent Galli hæc trufia nominant. Itali zunesta tarensole. Vere effodiuntur, nec ultra annum durant.

Fungi.] Istorum origo prima è limo & acescente succo madentis terræ, aut radicis ferme glandiferæ. Initio spuma lentior, dein corpus membranæ simile, mox partus. Cortice, medulla, neruo, uena carent.

## IN LXXVIII. CAPVT.

CHondrus.] Magna scriptorum recentiorum dissensio est, Chondrus. & adhuc sub iudice lis est Nam scilicet chondrus & halica Halica, diuersa inter se sint, cum apud Paulum distinctim scribantur, an idem, cum apud autores Græcos chondrus, pro halica Romana sæpius ponatur. Apud recentiores autem Græcos ambæ dictiones coniungantur: Vt in Aetii sermone 9. cap. 10. in hunc modum: τροφὴν δὲ διδόναι χόνδρον ἁλίκος μετ' αἶνι ἁλυκῶ. Quibus uerbis præcipit cibum dari chondrū ali- cæ cū uino albo. Item disceptatur, an hæc semina sint naturalia per se, an potius res facticiæ. Certe quantum ad primā cōtrouersiam attinet, collatis multorū autorū scriptis, chondrus uidetur antiquorum in usu fuisse, si Galeno de uictus ratione in



morbis acutis credimus, quanquam lib. 1. de alimentis nomē eius apud antiquos perrarum fuisse prodatur. ut fere sibi ipse cōtrarius uideatur. Alica uero teste Plinio, res Romana est, neque Pompeij magni ætate in usu fuisse traditur, nec pridem excogitata. Paulus noster ambo quasi consimilis usus ac facultatis, frequenter coniungit, ut lib. 3. cap. 31. ἔγω δὲ σοὶ ἀγ-  
τος πλετὸς ἐκ ψυχρῆ, ἢ ἀλῖξ, ἢ χόνδρος. Id est: Panis tibi esto lotus ē frigida, uel alica, uel chondrus. Sic itaq; colligo, ut secunda quoq; discordia dirimatur, chondrum & alicam eisdem fere modis fieri, non autem semina, aut fruges esse per se. Paulus autem dicit alicam chondro in omnibus respondere, nisi quod uētre mē magis astringat. Nimirū propterea quod chondrus fiat ex zea, quæ Italis & quibusdā Germanis spelta nominatur hodie. Frumētī genus inter triticum & hordeū mediū. Alica uero ex tritico fiat, quicquid dicat Palladius de hordeo semimaturum. Ea hodie nobis puls frumentacea uocatur: prisanae cremori colatitio similis. Errant qui alicam ex zea, chondrum ex tritico fieri autumant. De chondro consulant Dioscoridem & Constantinū lib. 3. de re rustica. Interim uideas apud ueteres hæc duo confundi, ut quod alicæ tribuendum sit, chondro tribuant. Inueniasq; uarias uel chondri, uel alicæ conficiendæ rationes. Non etiam audiendi sunt, qui far apud Romanos dictum, chondrum esse arbitrantur: cum & ipsum far testimonio Archigenis frumenti quædam sit præparatio, ex zea nimirum & frumēto. Plinius testatur populū Romanum farre tantū ex frumento tercentū annis usum fuisse.

Panes.

Inter panes firmissimus. ] Vñ sum dictione Celsiana, firmissimus, pro eo quod est alimenti plurimum præstans, quam in comparandi gradu τροφιμώτερος habeatur.

Syncomistis.

Syncomiston ] Hunc alio nomine Galenus autopyron appellat, quod ex omnibus suæ farinæ partibus citra ullā de tractionem cōstet, inter furfuraceum & similageum medius, syncomistos quasi confusaneus dictus, quoniam castratus nō sit, sed omnia simul tulerit, furfures, utriculos & similem.

Maza.

Polenta ] Vide Galenū lib. 1. de alimētis, ubi polentam q̃ Græci ἀλφιτα νοῖαν, recenset, ex hordeo nouello mediocriter tosto fieri, eamq; ueteres militib⁹ panis loco dare solebāt.

Maza. ] Cū polēta liquore cōspargitur, atq; subigitur, maza appellationē assumit: Hinc quidā eruditus offam appellat.

Oryza.



Oryza.] Hoc frumenti genus Gallicum, Germanicumq; Oriza. uulgus detracta priore litera Rizon appellant.

## IN LXXIX. CAPVT.

EX leguminibus ] Legumina, inquit Galenus ea ex cerea- Legumina libus seminibus appellant, quæ panificio non accommo- dantur, ut puta fabæ, ipsa, cicera olentes lupinum, oryza, eruū, &c. Galenus uocat ὀσπερια & χεδρόνα

## IN LXXX. CAPVT.

DE temporariis. ] Sic interpretatus sum ὥραϊς : quasi di- ὥραϊς. Fructus, cas horarios. Nam Galenus cæteri q; græci id anni tem- pus, horam appellant : in quo medio canicula sidus oritur, ad quadraginta usq; dies perdurās, quo tempore omnes tempo- rarij fructus, aut tempestiui, ut Plinius ait, proueniunt. At Ga- lenus non solum horarios dici censet, q; eo tempore nascan- tur, sed ut à cōditaneis discernantur. Sic ēt Plinius apposite di- xit, de persico, q; a nō aliud fugacius. Hoc est qđ minus duret. Fructus fu- gaces, Omnia poma. ] Græce est ὅλη ὁ πῶρα. Sic antea interpre- tatus sum quicquid herbaceo fructu uiret, lignosi nihil exte- rius habens. Proprie uero Galenus opēram nominat libello περὶ ἐνχυμίας καὶ κακοχυμίας, ficus & uuas : ut Paulus sequen- ti capite etiam indicat.

## IN LXXXI. CAPVT.

EX cerasijs. ] Galenus commentario iam citato in hunc modum de tempestiuis illis fructibus præcepit. Sunt autē arborei prope dixerim uniuerſi fructus, uitiosis succis donati, præter quas uocāt castaneas. Hæ si quidē exactā in uētriculo concoctionē adeptæ, nutriunt, uerū succis crassioribus : malis nequaquā. Aliarū arborū fructus temperarij omnes maligni Aliquādo uiciosis utendum, sunt, nā si in uentricula cōputrescant, medicamenti deleteri naturā fere induūt, sicut & mora, licet ea persicis dictis & pru- nis moderatiora sunt. Tamen corruptelam nihilominus illic prauā sustinent, &c. De usu horum paulo post ait : A uitiosis semper abstinendum, nisi cūm ægroti æstate totius corporis siccitatem caloremq; emendare conantur. Cōueniunt enim tunc poma, pira mora, cerasia adsumpta. Cucumer uero, pe- po, & melopepo, item præcocia dicta, uel persica modice tunc manducari debent.

In uniuerſum, astringentia. ] Vide Galenum lib. 2. de ali- mentis : ubi rationem tradit, cur rethori cuidam astringen- tibus



tibus sumptis post alios cibos laxantes uenter fuerit solutus. Ibiq; hæc Pauli sententia copiosius explicatur.

Primæ mē-  
sæ qui cibi  
cōueniunt.

Eoq; primum exhiberi debent. ] Idem Galenus libro supra nominato confirmat in hunc modum. Omnes cibi qui prauum succum cum humiditate, & lubricitate obtinent, ex facili descendunt, eoq; prima mensa sumi debent.

Duracina.

Constanti-  
nus.

Druppæ.

Duracina. ] Sunt qui lectionem hæc deprauatā putant, uelintq; legi pro duracina, rhodacina nulla plane ratione ualida nitentes. Galen. quidem & alii uetustiores hoc uocabuli non usurpant, uerum recentiores græci, uti Paulus, hoc cum Rhomanis commune habent. Vocantur autem duracina, q̃ corpus ipsorum pertinacius ossi hæreat, quàm ut auelli queat.

Græci δωρακινά, uel δερρακινά dicunt, latinos fere imitati. Cōstantinus lib. 10. de agricultura. ἐπειδὴ δὲ ἴσμεν τὸ δωρακινὸν παχέως γινέσθαι. Paulo post, ἐν δὲ ποιήσεις τὰ δωρακινά, ἧδ' αὖ φυτεῖων ἐπὶ τὰ φυτά.

Druppæ. ] Plinius lib. 13. cap. 26. Oleum & Omphacium est. Fit duobus generibus, & totidem modis ex olea & uite: olea adhuc alba expressa, deterius ex druppæ. ita enim uocatur, priusquam cibo matura sit, iam tum colorem mutans, &c. Græci δρυπετας appellant.

Pistacea.

Pistacea. ] Vide Plinium. Fructus est ex nucum genere, qui è Syria apportatur: Crescit arbore omnino nuda, præterquam ramorum cacuminibus. Hæc enim conantur densiore folio, angusto, maiore tamen quàm lentisci subruffo, surculis dependētibus pineæ nucis similitudine. Lutetiæ in quibuldā hortis est uidere nunc. Officinæ pharmacopolarū uocant fistica, aut fisticorum grana.

Phistica of-  
ficinar.

Sirica.

Vide an re-  
centiores cū  
ueteribus  
cōueniant.

Sirica. ] Galenus ita uocat zizipha à recentioribus græcis appellata: quæ officinæ sephisiariorum iuiubas nuncupant. Recentiores maxinie commendant hunc fructum, ut boni succi. Galenus ut prauo donatum reiiciendum putat. illi præterea stomachum gratum, hic cōcoctioni rebellem prædicat. item illi aluo subducendæ conuenire, hic astringere aluum. Aetius recentior, calore & humore temperata tradit, eoq; sanguinis acrimoniam edomant. probum succum creant, serosum sanguinis humorem eliciūt. Decoctum eorum tuissima & difficultatē spirandi lenit, pectori, renibus, uesicæ, prodest.

IN



## IN XCII. CAPVT.

**M**olles.] Addidi cute, & paulo post, dura carne, dixi, ne ex simplici uocum interpretationem cōtraria inter sese posita uideri possint Sūt itaq; pisces hi molles cute si attingas, duri autem carne, ut Galenus habet lib. 3. de alimentis. Nihil in capita præcedentia sum commentatus q̄ & facilia, & ex Galeni libro iam citato sint omnia fere decerpta.

## IN XCIII. CAPVT.

**C**artilaginea.] Hi pisces superioribus sunt contrarii, nam duram habent cutem: mollem autem carnem. Cæterum Galenus selache dictos affirmat, ἀπὸ τῆς σέλας ἔχειν, hoc est, quia splendorem habeat eorum cutis.

Selache  
Pisces.

## IN XCVII. CAPVT.

**I**Taq; somnus.] Galeno lib 3. de causis pulsuum in hūc modum somni generationem describit: ὁ μὲν γὰρ ὑπνὸς γίνεται τῆς ἐμφύτης θερμασίας ἥτοι διὰ κάματος τινος, καὶ ξηρότητας πλείους πρὸς τὴν τροφήν ἐπιστραφείσης, ἢ διὰ ἀμετρίαν υγρότητος ἀδυνατῆτος ἐκτὸς ἀποτείνεσθαι ἐπὶ δ' ὁ μὲν πρότερος ὑγιεινὸς τε καὶ κατὰ φύσιν, ὁ δὲ δεύτερος ξηραῖς, οἷος δ' ἐν κόμασι τε καὶ ληθέρεσι. Hoc est: Etenim somnus fit, cū naturalis caliditas, uel ob defatigationem quandam & maiorem siccitatem ad alimentum conuersa est, uel ubi propter nimiam humiditatem foras nequit extendit. Prior sane est salubris, & secundum naturam. Secundus autem dictus, qualis in comate & lethargo, &c. Paulo post: τῶν δ' ὑπνῶν τῶν κατὰ φύσιν, ὥσπερ ἐν καὶ τῶν ἐξηγύρσεων ἡ γένεσις οἷα πρόθεν εἴρηται, δεομένη μὲν ἅμα, καὶ ἀπορῆντος υγρότητος διαφύλαξ τῆς κατὰ φύσιν ἐν τῇ ζωῇ θερμῆς, καὶ διὰ τὸ συνιόντος εἰς τὰ σπλάγχνα, καὶ τὴν γαστέρα τῶν ὑπνῶν γινομένων. ἀντάρκως δ' ἀπολάυσαντος ταύτης ὥς ἡδη τὴν κατὰ φύσιν ποιότητα ἔχειν, τῆς ἐξηγύρσεως ἀποτελεμένης, &c. Hoc est. Sōnōrū uerò naturalium, sicuti ēt uigiliarū generatio existit qualis antea exposita est, nēpe ut somni fiant cū naturalis animantium calor indiget quidē simul & destituitur copiosa humiditate, eoq; ad uiscera & uentrē cōmeat: ut aut uigiliæ, cū idem calor hac humiditate potius fuerit abūde, ut iā naturalē habeat qualitātē, &c. Nā ex alimēti cōfectione multa uaporosa humiditas in ipso calore, meatibus, omnibusq; particulis intermediis suggerit̄.

Somni ge-  
neratio.

Virium



Mutua vi-  
rium subli-  
dia.

Virium animalium requies.] Hoc est, ipsæ quidem non agunt, sed naturalibus subsidium adferunt: eoq; præcipitur recte, ut dum fit concoctio, etiam in uigilantibus, abstineatur à lectione, disputatione, aut cogitatione graui, ne uis naturalis alio distrahat, nā mutuo sibi ferūt auxilia, impedimētaq;.

Tempus  
somni.

Tempus somni optimum à cibo.] Intellige, non statim: nā somnus statim à cibo, caput replet, ut etiam plethoricæ dispositiones, si Galeno in Aphorismis fidem accommodamus.

Terminus autem somni.] Non sunt audiendi qui unum omnibus terminum somni præscribunt. Nam alii celerius, alii tardius concoquunt: hi plus assument, illi minus. Quare Galenus recte in commentario de euchymia & cacoehymia tradit. Quibus itaq; exercitationibus plurimis uti licet, & quam diu libet dormire, ij & cibos crassi succi, & uiscosos tuto assument. Quæ ita græce sonāt ὅσοις μὲν γὰρ ἀνθρώποις οἶοντ' ἐπὶ γυμνασίοις τε πλείοσι χρῆσθαι, καὶ κομᾶσθαι μέχρις περὶ ἂν ἐθέλωσι, &c ut supra dictum est.

#### IN XCIX. CAPVT.


Catapho-  
ra.  
καταφέ-  
ρειται.

Cataphora.] Dictio græca est, à uerbo καταφέρειται, quod est obdormiscere uehementius. Vnde etiam καταφορικὸς ὕπνος dicitur. Latine interpretari possis, grauis aut uehementis soporis impetum. Galenus sub hoc nomine, alios affectus soporosos uidetur comprehendere, καταφορὰς inquit, βαθείας ἐργάζεται. ἃς ὀνομάζουσιν ἀποπληξίας, καὶ κάρους, καὶ κατοχάς. Hoc est, Cataphoras profundas efficit, quas nominant apoplexias, & caros, & catochos.

In Epistola Dioclis habetur συνάχην νύκτωρ. In qua uitiū esse puto. Nam quid sibi uelit νύκτωρ, non satis intelligo. Angina enim omni tempore solet excitari. Nihil itaq; mali erit, si legas pro νύκτωρ, νυκτάλωπα.

#### FINIS LIBRI PRIMI

COMMENTARIORVM.





# COMMENTARIORVM IN PAVLVM AEGIN.

## LIBER SECVNDVS.

### CAPVT I.



LIBER hic secundus de febribus, & earum accidentiis facili tractat compendio, ex Galeni opere de medendi ratione ad Glauconem magna ex parte transcriptus. Nonnulla uero Paulus noster ex opere de Crisibus, pauca ex Prognosticis Hippocraticis, quædam ex aliis autoribus sumpsisse uidetur. Cæterum à morbis similibus auspicaturum se dicit, qui quatuor constant intemperaturis. Quia uerò calida omnium est efficacissima, merito ab hac appellationem desumpsit, febres, morbos nominās similes, qui nimirum etiam simpliciores dicuntur. Compositos in tertio quartoq; uolumine persequetur.

Oribasii compendio ] Iulianus olim Imperator medicinā suo tēpore uagam amplamq; intelligens, præstantissimos ex omni regione medicos Romæ colligendos magno studio curauit, delegitq; ex uniuerso illorū numero septuaginta duos, qui diuersis antiquorum aurorum monumentis euolutis examinatisq; necessaria magis in artem medicam compendiosa ratione comprehēderent. Hi igitur oēs, sua prius rōne & uia, singulatim explicata, uno tandem consensu scribendi prouinciam Oribasius ut facile principi, doctissimoq; tradiderunt. Is uaria Galeni opera, aliorumq; nonnullorum perscrutatus in compen-



compendium quoddā septuaginta duobus libris comprehensum (tot enim fuerant conuocati medio) artificiosè redegit. Paulus autem Aegineta opus hoc maius esse animaduertēs, quā ut iter facturo circumferri possit: aut ab homine tenuioris fortunæ comparari, in septem tantum libros constrinxit.

Castigatur  
codex.

Ex Galeni sane. In græco male legitur ἐκ τῶν Γαλυνῶν μὲν ὡς μάλιστα. Hic ὦ est superfluum: ac legi debet Γαλινῶ μὲν ὡς μάλιστα. Hos & Orosius, & castigator Basilien̄sis præterit:

## IN II. CAPVT.

αθρόως.

**V**Na uice.] In græco est ἀτρώως, quod cumulatim signat, ac una uice. Celsus dixisset semel. Contrarium huic κατὰ μέρος, & κατ' ὀλίγον, quod est, particulatim, & paulatim, multisq; uicibus. Quando scilicet morbi in abscessum finiūt pluribus diebus fit erisis.

## IN III. CAPVT.

Græcus  
codex ul-  
ciosus.

**N**Eq; enim capitis.] Ex Galeni i. de diebus decretariis hac transcripta sunt. Desideratur autem in Paulo uocula, δέ, habet enim πυρετὸς εἰς βάλλων, pro πυρετὸς δέ εἰς βάλλων, quod neglexerunt Aristarchi.

Aliquem latere.] Galenus addit emphaseos gratia καὶ ἀναιδιμότατος εἶναι, hoc est, etiam si stupidissimus, & ab omni alienus sensu fuerit.

## IN IIII. CAPVT.

νεκρῶδες.

**L**Ethales notæ.] Subsequentes scilicet, facies cadauerosæ, sano quā dissimillima, et quæ mortuum imitetur, unde græcis νεκρῶδες dicitur. Nam si ex Hippocratis sententia, similis sit sani præsertim ipsius, qui nunc ægrotat, faciei, optime sperandum est. Porro notæ hæ sunt in morbis acutis, diuturnis, animi defectionibus, doloribus, item omnibus defunctis. In faciei autem, quod imprimis appareant, & uim obtineant maximam: Cadauerosæ, quoniam natura debilitata, nō amplius sanguinem & spiritum in hanc suppeditat.

Laurentianus.  
Nares acutæ.

**N**ares acutæ.] Ita Celsus interpretatur Nescio cur Laurentianus Nasus cōpressus uerterit, quod græcis dicitur ὀξεῖα ῥίς. Sunt autem nares acutæ, aut ob aliquam causam carnosas animalium partes consumentem, corrumpentemq; , aut ob debilitatem caloris natui, qui non magis in extimas corporis partes extendi potest, sed in uisceribus solis exiguus remanet.



net. Quo fit, ut non amplius tantum sanguinis, aut spiritus in partes illas affluat. Cum autem in naso osses partes & humide carnosęq; sint, inuicem commissę: deinde quum osses propter terrestrem ipsarum substantiam similes permaneāt, humidiores autē consumi facile possint, & in se concidere ob inopiam tum spiritus tum sanguinis, fit ut nasus gracilescat.

. Oculi concaui. ] Ob easdem causas sunt: sed quanto extremo naso humidiores, mollioresq; existunt, tanto citius cauantur. Imo etiam spiritus animalis copiosi participes existunt, & caloris non pauci, quibus ipsi destituti merito cōtrahuntur. Cadauerosa igitur facies quę sequentia apud Hippocratem obtinet, in diuturnis sepe morbis uisitur: raro per initia, ob quod & periculosissimū est, & in acuta morbo prorsus lethale: tāquā ne occasionē quidē habuerit à tēpore. In morbis autē lōgis nō adeo lethale: ita nec in frigido loco, hyeme, statu aeris frigido, & senectute: quia morbus nature respōdet.

Si hęc ueq; ] Aut tali aliqua manifesta causa, minos periculosum est, quam si ob morbi malitiam, etsi pręstaret, neque ab eiusmodi causis uirtutem prorsus debilitari. Celsus optime hanc sententiam lib. 2. exprimit latine. Si hęc, inquiēs, ita sunt, ut neq; uigilia pręcesserit, neq; uentris resolutio, neque inedia. Dixit autem Hippocrates neq; ex uigilia: quia ex hac oculi, ueluti chorda ex siccitate tenduntur.

Vigilię.

Vacuatione. Intellige per alui profluuium, & mordicationem, ut Galenus apud Hippocratem interpretatur. Verum Hippocrates habet τὰ τῆς κοιλίας ἐξυγοισμένα ἢ σφοδρῆς, quod est: Aluus uehementer humectata. Celsus dixit uentris resolutio. Paulus utitur dictione κοινώσεως.

Vacuatio.

Aut inedia. ] Hippocrates dixit λιμῶδες τι, quasi famelicum aliquid, aut fames quædam Paulus ex Galeno ἀσιτία, hoc est, inedia. Cæterum & alui resolutio uehemens, & inedia corpus siccant, adeo quandoque, ut per se emortuam hanc faciem inducant.

Inedia.

Si oculi lumen refugiant. ] Hoc est, auersantur, ob uisorię facultatis imbecillitatem. Quæ quum propter instrumentorum affectonem laborat, quemadmodum in lippitudinibus, aut ob alium quendam fluxum pręter naturam quidem est, non tamen mortale: cum autem per se afficitur, lethale.

Illachrymant, nō ex quadam ] Hippocrates habet ἢ γὰρ

τὴν



Hippocra-  
tes.  
Celsus.

τὴν αὐγὴν φεύγουσιν, ἢ δακρύουσιν ἀπροαιρέτως. Hoc est: Si n. lumen refugiunt, aut illachrymant citra uoluntatem: nimirum ob facultatis retentoriæ imbecillitatem. In Hippocrate additur: ἀποτρεφῶσιν, quod est, peruertuntur. Celsus simpliciter dixit, si præter hæc oculi quoq; lumen refugiunt, & illachrymant. Paulus autem pulchre distinguit, causa tum exteriorum tum interiorum, quæ sane utraq; lachrymas sæpe in oculis mouet.

Ad hæc si alter ex his minor. ] Quæ nota facultatem ipsam dispensatam emori significat.

Album  
oculi.

Quæq; in ijs alba. ] Sicut in lippitudinibus quibusdam & ebriosis nonnullis iudicium uero est plenitudinis in cerebro, eiusq; membranis: interim & inflammationis. Vtroq; enim modo sanguis ad oculorum uenas exprimitur. Album oculi pars est pupillam ambientis, pericranii extremitas.

Aut nigricent. ] Refrigerata scilicet. Refrigerantur autem emortua. Idcirco mali colores perpetuo apparent.

Pituita a-  
pud Celsū  
in oculis p  
græcorū.  
λεῖμα.

Craffior pituita. ] Græce λεῖμα, quod Plinius lib. 23. cap. 1. dixit, græco usus uocabulo, uel inquirēs, si lemæ in oculis erūt. Nos Celsum imitati libro secundo, de iudiciis mortis, quod caput ex Hippocrate transtulit, diximus, pituita. Habet ille, pituitaq; in iis innatans nouissime angulis inhærescit. Cæterum Galenus Lemas exponens, dicit lemicocti alimenti esse recrementum. Nam facultas oculum dispensans imbecilla alatum nutrimentum nequiuit concoquere. Iam fiunt etiam lemæ in lippitudinibus tum ob humiditate præter naturam copiam, tum ob instrumentorum uicium.

Per somnum alba. ] Ex 14 cap. prognosticon Hippocratis sumptum uidentur. Ita uero apparent, ob imbecillitatem facultatis palpebras mouentis, cum citra causam exteriorum constituitur.

Stridor ex  
quibus  
causis.

Stridere dentibus, ] Hippocrates adiicit, quibus à pueritia consuetum non est. Fit autem ex cerebri offensione, & per se delirium significat: cum delirio autem, mortem. Cæterum fiunt stridores dentium, cum temporales & masticatorii musculi modo conuulsorio mouentur. Quibusdam accidit, ipsis tantum musculis affectis, uel ab origine, uel postea ex quadā causa. In nonnullis principio neruorum in eiusmodi affectionem deducto, unde potissimum illorum quæ ab eo nata sunt, conuulsiones



conuulsiones fiunt, ut hic neruorum musculus insertorum.

Aut in ueste floccos legere. ] Hoc græce dixit Paulus unico uerbo κροκιδίζειν, quod Hippocrates τὰς κοκίδας ἀπὸ τῶν ἱματίων ἀποτίλλειν dixit capite uigesimo octauo. Celsus hoc interpretatus libro secundo: ait: Si in ueste floccos legit, sim- κροκιδί-  
briasq; deducit. Id autē fit corporis humoribus ad caput ex- ζειν.  
halantibus Quorum uapore purus ille pupillæ humor infici-  
tur, unde prædictæ oriuntur imagines, ut in suffusis. Vbi enim  
niger aliquis, aut crassus antestat, lumē uisoriū prohibēs foras  
excedere, pro humoris subsistētis natura, imagines generant.

Si æger supinus. ] Hoc à decubitu iudicium sumptum est.  
Galenus in prognostica Hippocratis capite septimo scribit,  
id neq; ad salutem, neq; ad mortem habere momentum, sed  
medium esse, aut parum ad alterum declinare. At si consuetū  
ægro est, ita cubare, & medicum ingredientem non reuereatur,  
ex bonis signis est. Sin autem consuetum non est, & me-  
dicum reuereatur, malum est.

Veluti resolutus. ] Græce est οἷον παρεμείνον. Nam πάρεσις  
idem quod παράλυσις: Sed illa incertis quibusdam partibus, πάρεσις.  
hæc in toto corpore obuenire dicitur. Sit igitur, ueluti artu-  
bus resolutis. Forte idem est quod dixit Hippocrates καὶ χεῖ-  
ρας καὶ τράχηλον, καὶ σκέλεα ἔχειν ἐκτεταμένα. Hoc est, & ma-  
nus & ceruicem & crura habere extensa: non contracta. Cel-  
sus dixit, ubi supinus æger iacet porrectis manib. & cruribus.

Vel si etiā deorsum. ] Hoc inquit Galenus facultatis cor-  
pus gubernantis abolitionem testatur. Celsus dixit, ubi deor-  
sum ad pedes subinde delabitur.

Spiritum. ] Hoc est, totam respirationem frigidum, ob ex-  
tinctionem caloris natiui. Græce est ἀναπνεῖν, quod est, respi- ἀναπνεῖν.  
rare, Celsus secutus dixi spiritum elidere. Spiritum  
elidere.

Item pulsus languidus. ] Hippocrates pulsus non memi-  
nit. Languidus autem, quem alii obscurum uertunt, imbecil-  
litatem uirtutis fatetur. Creber magnam necessitatem, defi-  
ciens per interualla, aut ut percipi uix possit, extremam de-  
bilitatem.

Sudore digeratur. ] Græce est ἰδρῆν συκοπτικῶς, quasi di ἰδρῆν συ-  
cas sudare ad syncopen. Vide Hippocratem. Celsus in Car- γκοπτι-  
diaco dixit: Id autem nihil aliud est, quàm nimia imbecillitas κῶς.  
corporis, quod stomacho languēte immodico sudore digerit.

PAVLI AEGIN.

Z

Pulsus



ἐυσφυξία.

Pulsus uegetior,] Græca dictio est ἐυσφυξία, quasi dicas, bona pulsatio Hoc est mediocris magnitudine, frequentia & celeritate: æqualis sibi per omnia.

προσφο-  
ραι.

Bene erga cibū.] Paulo aliter sonant uerba græca, εὖ ἔχειν πρὸς τὰς προσφορας. Hoc est: bene habere ad oblationem intellige cibi.

## IN V. CAPVT.

SI quatuor particul.] Quum nimirum materia est extra uasa. Sicut autem morbus totus quatuor, habet tempora: principium, augmentum, statum, & declinationem, ita quoq; particulares accessiones Vide Galenum de morborum temporibus, & de totius morbi temporibus, quem librum nos latinitate donauimus.

Cuius extremus] Hoc est, longissimus, quasi dicas: Si longissime producat, in septimana iudicatur. Nam teste Galeno exacte peracutus is est, qui quartum diem attingit. Non exacte, qui ad septimum usq; producit. Ita inter acutos, alius exacte acutus, qui ad usq; diem quartum decimum producit. Non exacte uero, qui usq; ad uigesimum durat, quam & ipse acutus sit.

Sin autem inde in quadragesimum incidit, acutus ex decedentia, quem græci κατὰ μετὰ πτωσιν appellant.

Quarto die crism.] Nam quarto plerunq; solunt, aut occidunt. Si multum, ad septimanam perdurant.

Sed duodecim] Quæ accessionis longitudo maxima est, tertianæ exquisitæ dictæ, quæ intra quartūdecimum, hoc est, antequam omnino prætereat, soluitur.

Longus.

Talis morbus longus] Vt est quarta, & semitertiana, tertiana non exquisita.

Acutorum  
duplex na-  
tura.

At si particulares] Galenus lib. 2. Duplex autem horum acutorum quoq; natura est. Vel enim accessionum remissiones in exactum integritatem finiunt, uel continua, semper febris manet, quæ particulares accessiones non habet, materia in maioribus uiscerum uasis subsistente.

Corrigitur  
codex græ-  
cus.

Si quidem facies, & totum.] Intelligi primis diebus. Nā fieri potest, longo tempore ex parua febris, ut corpus modice collabatur. Modice autem dixit: quia nimium consumi & præter rationem facultatis retentoriæ imbecillitatem testatur. In codice græco, superflua est particula ε. Nam legi debet: τὸ

πρότωπον,



πρόσωποι, καὶ τὸ λαίπρον, &c. non autem τὸ πρόσωπον ἐκαὶ τὸ  
λαίπρον, nam una hæc uocula sententiam peruertit, quod nec  
Orosius intellexit, nec Basiliensis corrector.

Si prorsus nihil.] Græce est. *αὐτὸ πάντας ἀσύμπτω-*  
τον, quod est: Sin autem omnino non collapsum est. Celsus  
latinius lib 2. cap. 4. de signis lōgæ ualitudinis dicit: Vbi æger  
pro spatio parum emacrescit. *ἀσύμπτω-  
τον.*

Ex arteriarum motu.] Magnus pulsus, qui in omnem di-  
stantiam attollitur, fit ob magnum refrigerij usum. Citatus,  
ubi magnitudo pulsus non sufficit, additur Celeritas. Sicuti cū  
qui magno incedit passu, non potest iter institutum tempe-  
stius absolueret, nisi eundem gradum acceleret. Creber, ce-  
leritatem adhuc adiuuat, dum breuem facit ab opere quietē.  
Veluti qui nunquam intermittit, uerū semper iter repetit,  
quod celeriter perficit atq; maximum usum refrigerii indi-  
cat. Vehemens, robustis uiribus, natura strenue se ad fuligino-  
sa excrementa expellenda accingente. *Pulsus.  
Magnus.  
Citatus.  
  
Creber.*

Contrarius longum.] Hoc est: Paruus, tardus, rarus, lan-  
guidus. Paruus quia tantus color nō est, qui refrigerari ualde  
requirat, aut uiribus imbecillis, materiae oppressis. *Paruus.  
Tardus.  
Rarus.*

Quatenus calidæ, & urētes.] Subaudi ad tactum. Hæc sum-  
psit ex libro primo Galeni ad Glauconem capite de curatio-  
ne doloris capitis.

Delitescentes.] *οἷον σμυχόμενοι*, græce est. Interpretantur  
autem grammatici *σμυχόμενοι ἀφανιζόμενοι*, quod est, non  
apparentes. Galenus utitur hoc uerbo, præterquam in li-  
bro supra citato, secundo etiam de iudicatoriis diebus. Qui  
nanq; inquit, ad quartumdecimum, aut uigesimum diem  
morbi prorsus acuti exciderunt, hi plane inceperunt tanquā  
*σμυχόμενοι*, lento motu. Nihil refert etiam si interpreteris,  
mitiores & languidæ. Habetur in codice Græco ante *σμυχό-  
μενοι* dictio *μαλακώτεροι*, factu *μαλακωτέροι*. *σμυχόμε-  
νοι.*

## IN VI. CAPVI.

Magna ex parte.] Recte dicitur, magna ex parte, quoniā  
plurimi longi affectus teste Galeno libro secūdo de die-  
bus decretoriis, etiam excretionibus finiuntur, sed non mani-  
festis. Potissimum autem abscessibus, & concoctione. Qui  
enim ad quartumdecimum crudi sunt, non ante quadragesi-  
mum soluuntur.



Dies decre-  
torij qui.

**D**ierum decretoriorum. ] Antequam dies ipsos enume-  
remus, apte prius dicetur, cur ita appellentur, Græci uo-  
cant, κρισίμῃ; quasi iudicijs dicatos. In quibus natura cū mor-  
bo pugnante, iudicium expectatur, naturā ne morbum sit su-  
peratura, an morbus naturam. Hoc autem fit, quando facul-  
tas alicui siue qualitate, siue quantitate, siue utroque corpus  
offendentis, operi suo ualentissime se accingit: quæ uere Cri-  
sis dicitur. Hæc autē singulis diebus potest accidere, teste Ga-  
leno, sed non æque frequenter, nec æquali fide. Hinc Paulus  
noster inquit: Dierum decretoriorum alii de ægris frequen-  
ter, cum fide, nempe cum excretionē quadam copiosa, aut  
abscessū non obscuro. Post quæ morbi reciduae timēda nō est.

Salubriter. ] Græca dictio est ἀγαθῶς, quod est bene: quo  
die morbus ad sanitatem definit, eoq; dixi salubriter.

Perfecte. ] τελέως interpretatus sum perfecte, iudicat au-  
tem is dies perfecte, qui nihil amplius in morbo facit reliquū.

Manifesto ] Hoc est: Quo cum excretionē, aut abscessū  
quodam euidenti morbus solutus est.

Natura  
motibus  
ordinatis  
guberna-  
tur.

Insigniter. ] Paulus dixit græce ἐπισύμῳς, Galenus εὐσύ-  
μῳς, quasi cum bonis signis. Hoc est, qui prius à contempla-  
torio iudicatus sit, Iam intelligendum uenit, naturæ motus  
proportionibus definitis fieri, & circuitibus ordinatis, cū mor-  
bi materiā superauerit: prohibetur autem quum non plane  
superauerit. Septenarij igitur circuitus ualidissima sunt uir-  
tute præditi: mox quaternarij: quædam uero extra hos exci-  
dunt: quos coincidentes seu intercalarios nominare licet. At  
perfectus circuitus est, ex tribus septenariis compositus, qui  
nimirum uiginti constat diebus Vnde liquet non omnes se-  
ptenarios inuicem separari. sed nonnullos coniungi, ut etiā  
quaterniones. Nam hi teste Oribasio in ipsis partibus à præ-  
cedente numero incipiunt: post ipsas uero partes absq; præ-  
cedente numero procedunt. Porro secundus sextenarius cir-  
culus à primo disiunctus est, testimonio Hippocratis ex Apho-  
rismo quarto decimo libri secundi, secūdi septenarii, octauus  
dies initium est: tertius septenarius circuitus secundo cohe-  
ret. Vnde fit ut non eadem proportio post quartumdecimū  
diem seruetur. Nam ab ipso quartodecimo, qui finis secundi  
est, tertius incipit: post uigesimum diem, idem circuitū or-  
do per-



do perpetuo cōsistit. Hinc est quod apud Hippocratem probetur maxime, post septimum, quartumdecimum, uigesimalū, uigesimalseptimus, trigesimalquartus, quadragesimus. Respo-  
debit ergo trigesimalquartus, quartodecimo, quippe qui ex duobus septenariis sit coniunctus. Et quadragesimus, uigesimalmo, ut qui tertium septenarium coniunctum expleat. Eadē ratione commendat sexagesimum, octuagesimum, centesimum, centesimum uigesimalum, ut perfectos circuitus. Iā quaterniones ita habent. Secundus & primus coniunguntur: tertius à secundo sepatatur. Quartus autē tertio, & quinto coniungitur: quintus iterum sexto. Atq; ita quoque post uigesimalum, ut in septenariis proportio seruatur. Concidunt eis nonus, quintus, & tertius.

Sunt itaq; potentes ad iudicandum septenarii: mox quaterniones. Quartus enim dies morbos qui primo non desinunt, soluit Undecimus quos septimus nō discussit. At si maior morbus sit quā ut quarto die crīsim subeat, certe solutio ipsius in eodem preparatur: septimo autem finis morbi adicitur. Qui uero morbi septimo die non finiunt, undecimo natura soluere molitur. Atq; sic in ipso uel decernit, uel quartodecimo præparat. Ac omnibus pulchre euenientibus, nullo admissō errore, ad quaternionum circuitus iudicia omnino perueniunt. Erratis autem quibusdam admissis, in coincidentes, seu intercalarios recidunt, quanquam in facta iam crīsi iudicāda, præstat eam in nono factam esse, quā octauo, ut quæ sit tutior, & fidelior: Itaq; differunt quaterniones ab intercalariis, natura & usu: natura ut dictum est: usu, quod ad futuræ crīsis cognitionem sufficiant. At morbi acuti impari dierū numero, longi pari iudicantur. Inuadunt quidam morbi secundum diem priore grauiorem habentes: quartum tertio, & totas accessiones in diebus partibus, qui longorum morborum iudices sunt. Protinus autem ut acuti propter accessionis uehementiam finiuntur, hi ēt secundo die interficiunt, & quarto: uerum sexto plurimos. Cæterum dies intercalarii, tertius, & quintus, non minus quā quartus decernunt. Nam perturbationis euidētia naturam ea quæ molestant, etiam ante tempus propulsare compeilit. Proinde primariam decernendi uirtutem non habent, sed per accidens aliquod sic eueniūt. Quoniam enim natura non conuenienti semper tempore de-

Z 3 morbis



morbis decernit, sed concitata plerumque; alias aliis de causis, à quibus accessio in morbis acutis maxime continua redditur, in imparibus acutorum iudicia fieri ratio est.

Exiguum naturæ impetum ] Hoc est, si uel modice natura ad expetendum aliena se accinxerit. Ex primo Galeni libro ad Glauconem de curatione doloris capitis hæc transscripta sunt, ubi ita habetur: ἡ μὲν γὰρ ἐβδομὴ ἡμέρα, καὶ κατὰ τὰς βραχέας παρασκύβας τῆς φύσεως ἔξομα πρὸς τὴν διὰ κενώσεως κρίσιν. Hoc est: Nam septimus dies etiam ex paruis naturæ apparatibus ad crisin quæ per euacuationem confit, erumpit, itaque; ad quartumdecimum usque diem ualentissima. Græci erat ἀγωνιστικώτατα, hoc est, maximo cum certamine, & impetu naturæ. Ex lib. 2. de diebus decretoriis.

ἀγωνιστικώτατα.

Prorsus elanguescunt ] Superius dixit de diebus post uigesimum succedentibus: quod scilicet uehementiam in iudicando remittant. ita hic eos qui post quadragesimum sunt, prorsus, languescere in naturæ moribus. Græce est τελείως εἰσὶν ἐκλυτοί, quod est, omnino sunt resoluti. Male autem in codice Græco impresso est ἐκλυτοί pro ἐκλυτοί. Nec hoc aduerterunt Oroscius & Gemusæus.

Leſtio codicis Græci castigatur.

#### IN VIII CAPVT.

Concoctionis signa ] Galenus lib. 1. cap. 3. de Crisibus eadem plane habet. Dicit autem signa decretoria nonnunquam male euenire, propterea quod apparētibus scilicet decretorijs citra concoctionem, natura ob perturbationis uolentiam, quæ alias ab aliis causis accidit, ad expellendum coacta, crisis uel bona, uel mala fiat.

Neque igitur per initia. ] Ex eodē Galeni libro capite octauo sumptum est: sequitur autem in Paulo Græco: ἢ τε ἐν ἐν ταῖς ἀρχαῖς, οὐτε ἐν ταῖς ἀναβάσειν αὐτὰ φαίνεσθαι χρὴ, ἀλλ' ἐν τῷ τῆς παρακμῆς χρόνῳ. Hoc est: Neque igitur per initia, neque in augmento ipsa apparere, sed declinationis tempore conuenit. Galenus autem habet: ἢ τε γὰρ ἐν ἀναβάσει, ἢ τε ἐν ταῖς ἀρχαῖς, ἀλλ' ἐν ταῖς ἀκμῇς αὐτὰ ἐπιφαίνεσθαι χρὴ. Quod est: Neque, n. in augmento, neque principio, sed in uigore ipsa apparere oportet. Cui lectioni ego assentior. Nam testimonio Galeni lib. 2. de Crisibus, capite quinto: Exquisita concoctio status tempore confit. Ergo si morbus ante statum iudicatus fuerit, malo est. Mutandum itaque; in Paulo ἐν τῷ τῆς παρακμῆς

Leſtio codicis Græci uitiata.



παράκλησις ἐν τῷ τῆς ἀκμῆς. Hoc nō intellexisti Orosci, nec tu Gemuseg aduertisti.

Si accessiones urgeant.] Galenus lib. 3. de Crisibus, capite quarto, inquit in hunc modum: εἰ μὲν γὰρ ἐπείγουσιντο, καὶ προλαμβάνουσιν αὐτῇ τῆς συνήθους ὥρας, &c. Hoc est: Si enim urgeant, praeuertantq; horam consuetam. Paulus habet: εἰ μὲν ἐπιτείνουσιντο, hoc est, si intrudantur, quod postea explicatur per hanc clausulam: Et uehementiores multo fiant. Quare cum Galeno etiam legendum censeo, ἐπείγουσιντο, non ἐπιτείνουσιντο, quanquam non adeo refert, utrum malis. Galenus certe paulo post eodem uerbo eadem in re utitur: πρόσθικλον inquitens: ὥς ἐπὶ τὴν κρῖσιν ἐπείγεται, &c.

Item ijs qui ob rigores.] Nempe ijs qui febribus laborant intermittētibz. Parum proprie dixi rigores, nam hi proprie de frigoribus uehementibus, aut duritie ex frigore cōtracta, aut etiam sine frigore dicitur. Vt apud authores idoneos est inuenire. Græca autem dictio ῥίγος, totius corporis cōcussio. Rigor. nem significat. Celsus eā uocabulo horroris qui Græcus φρίκη dicitur, interpretatus est. Plinius tamen libro septimo capite quinquagesimo scribit: Gertis pestifer calor remeat horis, aut rigor. Capiamus itaq; hoc loco rigorem, pro uehementi horrore, ut Galenus est autor.

## IN X. CAPVT.

**A**Nte quamlibet iudicationem, agrotus grauit̃ ex cruciatur.] Caput hoc ex primo Galeni ad Glauconem libro, sumptum est. Excruciatur autem grauit̃, quia natura in totum contra morbum insurgit, ad expellendum ea quæ præter naturam sunt. Græce est δυσφορία προηγῆται Hoc est ad uerbum: Difficilis tolerantia præcedit. Natu δυσφορεῖν uerbum. signat ægre morbum ferre, inquietum esse, exagitari & affligi.

Atque his obuientibus.] Galenus libro citato: εἰ γὰρ ἐπὶ ταῖς ἀπάσιν Hoc est: Si enim præter hæc omnia. Sublimius attollantur. Galenus libro tertio de prænotione ex pulsibus sumpta, inquit pulsum sublimem omnem excretionis indicem esse.

Ad hæc si dies decretorius indicetur.] Hoc est si prædicatur ab alio contemplatorio, ut septimus à quarto, quartusdecimus ab undecimo, &c.



Exilientem.] Subaudi è lecto. Galenus in commentario quem inscripsit *περὶ προγινώσκων*, in hunc modum habet: Cū natura incumberet in ea quæ grauabant, expellenda, æger erexit se tanquam uellet è lecto exilire: Rogatus cur id uellet facere, respondit se uidere serpentem rubrum ex regula emergentē, ac ueteri ne in uia ille aberrans, super ipsum caderet, eoq; fugere in locum quo decumbebat.

Si qua partium ipsius palpitet.] *ἐν τῇ πάλλαίτο* Græcus co-  
 dex habet, ut etiam Galeni primus ad Glauconem. Signat au-  
 tem *πάλλομαι*, idem quod moueor, concutior, palpito. Vide  
 libellum Galeni de palpitatione, quam alii tremorem inter-  
 pretantur. Libro primo de crisibus pro *πάλλαίτο* habetur,  
*σείεται*, quod est, mouetur, additurq; *καὶ τρομαδὲς γίνεται*,  
 id est, & tremulum fit, ut labrum.

Venæ in temporibus.] Quod signat sanguinem ad supe-  
 riora erupisse, & calidissimum, cum alioquin proprium sit ar-  
 teriarum pulsare.

## IN XI. CAPVT.

SI euacuatio.] Ex Galeno de Crisibus tertio, cap. 3. fere om-  
 nia transcripta sunt Meminerint autem lectores, aliquādo  
 medictione Græca crisi scilicet uti, quod medicorum familiæ  
 sit & usitata, & familiaris. Aliquando interpretor iudiciū, uel  
 iudicationē: quod ut mihi liceat post alios, oratos ipsos uolo.

## IN XII. CAPVT.

Pulsus.] Hoc caput ex uariis Galeni libris de pulsibus ttā-  
 scriptum est. Primum itaq; Paulus definitionē ponit, qua  
 dicit cor & arterias attolli, & deprimi. Attolluntur autem, lon-  
 gis fibris in se coeuntibus: aliis omnibus relaxatis. Submit-  
 tuntur, hoc est deprimuntur, astringuntur, longis relaxatis, la-  
 tis in se coeuntibus, Græce est *ὁ μὲν σφυγμὸς κύνησις ἐστὶν καὶ  
 διάσ καὶ ἀρτηριῶν κατὰ διαστολὴν καὶ συστολὴν γιγνομένη.* Hoc  
 est: Pulsus sane motus est cordis, & arteriarum qui fit secun-  
 dum diastolen & systolen.

Fuliginosa.] Quæ ex functione obita collecta sunt. Nam  
 hæc teste Galeno, non aliter calorem natium, quàm flammā  
 ignis extinguunt.

Primo pulsum genus.] Hoc ad uerbum ex Galeni libel-  
 lo ad candidatos medicinæ sumptum est. Habetur enim: Ex  
 iis quæ propria motus sunt, celeritas existit & tarditas: alius  
 ugens



urgens motus, alius resolutus.

Quoniam enim.] Hunc syllogisum ex primo de differentiis pulsum mutuatus est. Verba ita sonant: Quia uero & arteria tria interualla sortita est, sicut aliud quoduis corpus, lungum, latum, & profundum, necesse est omnino in singulis distantis quantitatem diafoles, & sistoles metiri. Verti autem interuallum, διατάσις, quod neoterici dimentionem interpretantur. Celsus libro tertio dixit: Si uenæ non æquis interuallis mouentur, arterias intelligere.

διάτασις  
Interuallū

Humoris infusi.] Galenus libro de dignoscendis pulsibus quarto etiam ex infusione humoris differentiam pulsus constituit. Nā alias plus, alias minus in ea continetur, nunc crassior, nunc tenuior, nunc aquosa, nunc aerea humiditas.

Pleniorem.] Verba sunt Archigenis apud Galenum lib. quarto de dignoscendis pulsibus, admodum obscura, ut lectores facile iudicabunt. Cæterum plenus pulsus habet tria genera, ut summam dicam: Primum, quod ipsum corpus arteriæ, quo statu sit declarat: alterum quod qualitatem substantiæ quam continet: tertium natiui spiritus facultatem indicat.

Pulsus  
plenior,

Quoniam uero caloris.] Hic locus ad uerbum ex lib. 1 de differentiis pulsum desumptus est, Verba ita sonant: ὅτι κατὰ τὸν τῆς ἀρτηρίας τόπον, ἐνεργέτερον γνωρίζομένης τῆς τῆ πυρετῆς θερμότητος οἷα τις εἶναι, ἢ ἐκ τ' ἄλλοι πόριον ἄπτοιο, πιθανὸν εἶδοξεν εἶναι τισι καὶ τοῖς το γένος σφυγμῶν συναριθμῆσαι τοῖς ἄλλοις. Ex qua lectione uidetur addendum in Paulo τινές, ut sic ἤξιωσαν τινές καὶ τῆς το, &c. qđ pterunt Aristarchi.

Corrigitur  
exemplar.

Nam cum arteria.] Galenus primo differentiis pulsum in hunc modum habes: τῆς ἀρτηρίας σώματος ὅσης κόίλου, καὶ μακρῆ καὶ περιφερῆς, κινεμένης τε δια παντὸς διπλῆν κίνησιν ἐξ ἐναντίων συνθετοῦ μορίων: ἢ γὰρ εἰς ἐαυτὴν συνιζάνει πανταχόθεν ἢ διατέλλεται πανταχόσε, καὶ ταύτας τῆς διπλῆς κινήσεως ὀνομαζομένης σφυγμῆ, διττὰς ἀναγκαῖον αὐτῇ συμπίπτειν ἡρεμίας ἐφ' ἐκάτερα, &c. Hoc est, ut Græcæ linguæ ignari intelligant. Cum arteria corpus sit cauum longū, & teres, moueturq; perpetuo duplici metu, ex contrariis composito particulis (uel enim in se undiquaq; subsidet, uel in omnem partem attollitur, qui motus duplex appellatur pulsus) necesse est, ut duplex ei quies in utroq; coincidat. Deinde pergit, atq; has duas quietes exercitata manus cognoscit, & ratio demonstrat,



Corrigitur  
codex græ-  
cus.

strat. Pauli lectio uidetur corrigenda. Habet enim codex im-  
pressus τῆς γὰρ ἀσθησίας διπλὴν κινημένης κίνησιν ἐξ ἐναν-  
τίων συγκατεμένων κινήσεων. Quod est: Cum enim arteria du-  
plici moueatur motu, contrariis composito motibus, pro ἐξ  
ἐναντίων συγκατεμένων μορίων. Sic itaq; tu corrigito, Orosius  
& Basiliensis corrector hoc sponte sua scilicet omiserunt.

Differentiæ rhythmī.] Ex primo de differentiis pulsuum  
Galenī transcripta sunt. Quare qui omnia planius fusiūsq;e  
explicata desiderabit, ad eos se commentarios conferat.

Ac cum secundum magnitudinē inæqualitas, id quod ma-  
turius, aut tardius assumpserit.] Hoc est, ut apertius in erpre-  
ter: quanquam sic habeant, ac cum inæqualitas ex magnitu-  
dine sumpta, inæqualitatem quæ celeritatis, aut tarditatis ra-  
tione constat, assumpserit. Sed malui esse obscurior, quàm non  
fidelis Aristarchis nostris uideri.

Ac si id quod in situ est.] Eadem locutio. Idem intelligo.  
ac si dicas: Si eam differentiam inæqualitatis sumpserit, quæ  
ex situ arteriæ capitur.

Porro opportunum erit.] Sequentia Pauli dicta, ex Ga-  
leni libris de causis pulsuum, & de prænotione miro artificio,  
compendioq; sunt decerpta.

Magnus igitur pulsus.] Galenus primo περὶ προγνώσεως  
σφυγμῶν, in hanc sententiam ait de magno pulsus ἡτοι γὰρ  
διὰ τὴν ἰσχυρότητα τοῦ σώματος, ἢ διὰ τὴν θερμότητα τῆς κρα-  
σεως, ἢ διὰ τὴν ἐπίκρητον κίνησιν. Hoc est: Vel enim fit ob  
corporis (intellige arteriæ) gracilitatem, aut temperamentī  
calorem, aut motum acquisitum.

Causæ ipsius naturales.] Paulo post Galenus habet: ἀλλ'  
αἱ μὲν ἐπίκρητοι κινήσεις, αὐτίκα καθίστανται, παραμένουσι δ'  
ἐτι διὰ τὴν ἰσχυρότητα, καὶ τὴν κράσιν, quod est: Verum mo-  
tus ascititij statim subsidunt, qui autem ex gracilitate, & tem-  
peramento proueniunt, adhuc perseverant.

Vt etiam manu admota.] Galenus ὥτ' ἐνεγίσοι τῶν σφυγ-  
μῶν ἀφαιμένω, καὶ περὶ βραχὺ διαλείποντι, καὶ πάλιν ἐφαφα-  
μένω σαφέστατὰ διαγνῶναι τὴν μεταβολήν. Hoc est. Vt liceat  
tibi pulsus tangenti, & deinde paululum intermittenti, rur-  
susq; iterum attingenti, mutationem manifestissimā digno-  
scere, &c. Habetur autē in codice græco Pauli bis πάντως, tu  
igitur postremum expunge, quod neglexerūt nostri mastiges.

Qui faue

Textus  
græcus  
castiga-  
tur.



Qui sane ob balineas.] Hæc fere & sequētia lib. 1. iā citato inuenies. Nisi qđ Gal. uerbis nōnihil immutatis eadē dicat.

Ex humorum putredine magnus, ad magnitudinem, adhuc submissionem magis citatam.] Galenus libro. 2. προγνώσεως σφυγμῶν hanc sententiam interpretatur in eum modum: δηλώσει τοι γάρ τὸ μὲν τάχος τῆς συστολῆς ἀξιόλογον τι πλῆθος αἰθωλώδων περιττωμάτων ἀθροίζεσθαι τε ἅμα καὶ ἐκκρίνεσθαι.

Et statim: παμπολὲ μὲν γὰρ ἀθροίζεται κατὰ τὰς σήψης τῶν χυμῶν, &c. Hoc est: Indicabit igitur, celeritas quidem systoles, eximiam quandam fuliginosorum excrementorum copiam colligi simul, & excerni, &c. Per multum enim ex humorum putredinibus colligitur. Iam libro primo de causis ita habet: Cum refrigerantem causam attrahit corpus arteriarum distenditur: cum fuliginosum excernit, comprimitur. Superat autē alias diastole, cum scilicet maior refrigerij usus est. Systole, cum plura recrementa expelli desiderant.

Causæ pul-  
suum & co-  
rum disse-  
rentiæ.

Verum ad magnum pulsum.] Galenus primo de causis: Conuenit igitur tria causarum genera sibi mutuo opitulari, ut pulsus magnus aut celer fiat: nempe usum generationis ipsorum urgentem, uirtutem robustam, arteriarum tunicas molles, aut non omnino duras.

Celeritas accedit.] Eodem libro: Copiosiore calore in corpore collecto, necesse est animal maiorem desiderare respirationē pulsusq; maiores. Qua autem ratione maiores, hac etiam uelociiores & frequentiores. Vt enim sitientes nō solū multum, sed etiam cito, & frequenter potionem assument, ita qui refrigerantem substantiam requirunt, multam simul hanc, & celeriter & frequenter attrahunt. Quare proprii, sunt copiarum caloris pulsus magni, celeres, & frequentes non tamē necessarii frequentes, uerum si nullum ex prædictis impedierit.

Non amplius id quod in.] Primo de causis Galenus. Fortassis uidebuntur pugnare ea quæ apparent tum inter se, tum una cum causis propositis. Conuenit enim, ut in caliditate primum sane magnitudo, mox celeritas, deinde frequentia erat, ita etiā in frigiditate primū sane oriri paruitatem: mox tarditatem: tertium raritatem. Quæ igitur solutio? Quoniam uirtute robusta, & si usus paulo minus fuerit, primam sane actionem, neq; exiguan, neque tardam necesse est fieri, secundam uero post longius tempus, si usus urget, ratio est absolui.

Dubij so-  
lutio.

Sicut



Sicut enim cū urgebat stimulatq; & impellebat uirtutē ad actionem, ita cum non urget, diutius conuiescere permittit.

Sin autem tarditas paruitasq; accreuerint, ē contrario raritas in crebritudinem. ] Quod fit cum non totum arteriæ spacium absoluit pulsus, sed medium duntaxat, unde sæpius repetere cogitur: alioqui in magno usu cum frequens est, totum spacium peragit, crebro id repetens. Si uerò maior frigiditas oborta, sit, eoq; usus abundè solutus fuerit, una quidem cum eo motus etiam celeritas ita soluetur. Minor autem erit & diastole si plurimum fuerit aucta frigiditas, rarissimos quidem, non tamen & tardissimos, & minimos pulsus fieri necesse est: sed tardiores semper, & minores sufficit. Quippe uirtute robusta absolute tardi, aut parui nunquam fient, etiam si usus admodum fuerit solutus.

Itaq; latitudo. ] Latos omnino pulsus post criticas excretionem fieri docet Galenus lib. 2. de pulsuū causis. Paulo post: Frequenter lati fiunt ob humiditatem, & præsertim cū ipsa corpora arteriarum irrigua fuerint, ut in hydrope, aliquando ob pondus, quod extrinsecus arteriis accidit. Id autem pōdus plerunq; cutis ipsius rigositas est.

Quemadmodum sublimitas. ] Sublimis in ira & ante crises, scilicet cū natura ijs quæ molestant, expellendis incumbit.

Longus. ] Cum quo reliquarum duarū distantiarū quantitas existimatur, ob tenuitatem corporis, aut peculiare magnitudinem talis efficitur. Nam aliquando motus quatuor digitis occurrit arctus sane & gracilis adeo ut chordam tenuē repræsentet. Siue enim ueluti gracilis cuiusdam chordæ, siue ut pili occurfus appareat, ex hoc ipso magna quædam tunica arteriarum durities apparet.

Non enim extrema ] Idem Galenus habet primo περί προγνώσεως σφυγμών, hisce uerbis: ἀσφυξία κατὰ μὲν τὴν ἀλβύθειαν ἐδ' ἔποτε ἐν ζῶντι σῶματι γίνεται. Hoc est: Pulsus defectio reuera quidem nunquam in corpore uiuo accidit.

Corpore emaciato. ] Hanc sententiam & superiorem in libello de pulsibus quem ad candidatos inscripsit.

Vires dissoluuntur. ] Vide libellum iam citatum, & prognosticum.

Durum pulsum. ] Galenus lib. 3. de differentiis pulsum in calce: & 1. de dignotione: Durus inquit, & uehemens esse



esse possunt, sed non uehementissimus, & durissimus. Vide ēē primum de præsagijs pulsum.

Reliqua pituitæ uitia ] Alia quæ arteriarum tunicas humiditate multa, & præcipue pituitosa irrigant. Primo de causis ad calcem.

Rhythmus. ] Vide secundum Galeni librum de præsagijs, & tertium de causis pulsum.

Deficientes ] Alii uocant intermittentes. Fit quando facultas grauatur humorū copia, & impeditur, quo minus morum conuenienti tempore auspicetur: uel ob crassitudinem, uel copiam humorū ora arteriarū cordi uicinarū obstruentē.

Pulsus deficientes unde.

Coincidentes. ] Fiunt hi teste Galeno ob frequentiam inæqualem: quod cor sæpe functionem minus ac usus exigit, obierit. Hoc autem ipsum rursus fit, uel grauato corde humorum copia, uel instrumentis obstructis, uel coactis: quæ & deficientium causa erat. Differunt autem inter se, quæ coincidentes uirtutem testentur repugnantem, & contendentem cum ijs quæ molestant. Deficientes, detrectantem id subire. Coincidentes sæpe crism intulerunt. Deficientes illis periculosiores. Vtrique accidunt in febribus ardentibus,

Coincidentes pulsus.

Inclinantes. ] Cum uirtus imbecillis erit, corpora autem arterias ambientia, emaciata & colliquata. Multæ sunt causæ. Inflammationes, scirrhi, abscessus, phymata cruda, omnis tumor præter naturam, durities squalida, frigiditas nimia. Galenus primo de causis.

Inclinantes.

Caprizans. ] Fit cum uirtus quantum ad se pertinet, naturale robur seruat, sed à motu impeditur, uel propter copiam immodicam uel obstructionem, uel instrumentorum cōpressionem. Vide secundum de causis pulsum.

Caprizans.

Dicrotus ] Hic & caprizans bis feriunt, sed dicrotus duritiam instrumentorum habet, & intemperiem.

Dicrotus.

Vadofus & uermiculans ] Hi duo quantitate sola differunt, una species existunt. Sūt autem in diuersis particulis, sed uno in pulsu. causa est, imbecillitas uirtutis, aut copia humorum, aut mollicies instrumentorum extrema: cum robur uitale arteriam nequit attollere.

## IN XIII. CAPVT.

Aluus optima. ] Hoc caput partim ex prognosticorū secundum Aluum, cundo, partim ex primo de Crisibus libro Galeni sumptū est. Dixi



est. Dixi autem alius, pro deiectione, securus Celsus, qui libro secundo eandem fere sententiam habet. At uenter ei qui à periculo tutus est, reddit modo mollia, figurata, eodem fere tempore, quo secunda ualetudine assuevit, modo conuenientia his quæ assumuntur. Cæterum qui causas omnium uolet intelligere, commentarium suprâ citatum lectitet.

Leuiter ruffa. ] Sic interpretatus sum ἐπάπυρρον quasi dicas subruffa: hoc est, quam bilis ex iocinore leuiter tinxerit.

Conuenienter spissa. ] Græce est ἀματῇ τροσικούσῃ συνεχῶς, quod est cum conuenienti spissitudine. Apud Galenū de Crisibus non est, quod satis in uerbo συνεσκηδός, hoc est, cohærens intelligatur.

Non nimis foetida. ] Hippocraticum esse dixit Galenus, quod Celsus aliquando interpretatus est, mali odoris, aliquando si magna foeditas odoris accessit.

Non exuccata. ] Hoc est: Ex qua humiditas chyli aquositasq; non sit per uenas mesaraicas iecori distributa. Vt fere idem, sit quod alius liquida aquosaq;. Cum. n. distributio parum absolute peragitur in uentre, excrementa liquida, tenuia & aquosa permanent, si Galeno & rationi credimus. Græca dictio est ἀχύματον, quam Leoniceus uir alioqui in Italia habitus maximus in re medica, uertit, humoris expers, quod quam sit ad rem, eruditi iudicent. Est autem ἀχύματον, id quod Galenus lib. 8. de cōpositione medicamentorum secundū locos, ἀνεχύματον dixit, in hac nimirum sententia ὅταν μὲν ἐν ἑλκεν ἐκ τῆς κοιλίας τε καὶ τῶν ἐντέρων τὴν τροφήν ἀτονήσῃ τὸ ἥπαρ ὑγρὰ, καὶ ἀνεχύματα ἐκκρίεται διὰ τῆς ἐδρας. Hoc est: Cum igitur iecur alimentum ex uentriculo & intestinis præ debilitate nequiverit attrahere, liquida, & non exuccata per sedem excernuntur, &c. Ex hisce uerbis liquet nō debere accipi pro ἀχύλπτων, aut ἀχυλοποιηθῆν, sicut nōnulli interpretantur. Nam deiectio liquida, & tenuis esse potest, etiam si uenter pro munere suo sit functus. Necessè autem est & circumpositas partes à uitio immunes esse, & distributionē probe in iecur fieri, ut alimentū concoctū esse, ex aluo iudicemus. Cæterum ἀχύματον vñ contrarium fere esse uerbo συνεσκηδός. Nam hoc tam est substantia moderatum, ut undiq; cohæreat, simulq; existat molle. Illud contra tam liquidum ut undiquaq; diffuat.

At, mere ruffa. ] Iam ad tertium deiectionū genus descendit, quod

ἀχύμα-  
τον.  
Leonice-  
nus,



dit, quod nonnihil ex recrementis à toto corpore in uētre  
confluentibus: non ex ciborum confectiōe iudicare potest.

Viridis æruginosæ.] Aeruginosa in uentre gignitur & por-  
racea: aliæ bilis differentia in uenis procreantur teste Gale-  
no in commentario de atra bile.

Animantis particularum cōsumptionem.] Græce est σύν-  
τηξιν δύλοϊ τῶν τῆ ζώης πορίων, quasi dicas colliquationem ani-  
mantis particularum indicat: Intellige autem solidarū: quæ σύντηξις.  
absolute particulæ dicuntur.

## IN XIII. CAPVT.

**V**Rina igitur.] Ex lib. 1. de Crisibus omnia mutuatus est

Paulus. Cæterum ubi de exacte aquosa agit, Galenus fu-  
sus pleniusq; persequitur. Habet autem Paulus: τὸ δ' ἐσχά-  
τως ἀπεπτον, ὅπερ ἐστὶ τὸ ὑδατῶδες ἀκριβές, οἷον ἀπεγνωμένης  
πέφews σύπτωμα τῆ φλεβώδους γένους ὑπάρχον. Hoc ut inter-  
pretatus sum. Galenus autē τὸ τοῖνον ἐσχάτως ἀπεπτον ὑπὲρ  
ἀπαντὰ ταῦτ' ἐστίν. ἔν δ' ἂν ὑδατῶδες ἀκριβῶς τὸ τοῖστον, **Urina cruda.**  
ἔτ' ἡδὴ πεττόμενον, ὡς τὸ θολερὸν ἔτε μέλλον, ὡς τὸ μετ' ἐλί-  
γον ἀνατολούμενον. ἀλλ' οἷον ἀπεγνωσμένης τῆς πέφews σύπτω-  
μα, τὸ τοῖστο τῆ φλεβώδους γένους ὑπάρχει πάρος, οἷον ἀκριβῆς  
ἀπεψία γαστρὸς. Quod est: Itaque extreme cruda præter has  
uniuersas existit. Talis autem erit exacte aquosa, ut quæ nec  
modo coquat ut turbida, nec coquenda est, ut quæ paulo post  
turbatur, uerum ut desperata concoctionis accidēs. Talis ue-  
noli generis affectus existit, qualis exacte uentris cruditas.

Hic uicina est.] Recenset ordine erudarum differentias,  
quas etiam Galenus breuiter hunc in modum cōmemorat:  
χείριστον μὲν ἢ ἰσὺς ἔρα διάρρησια, μοχθηρόν δ' ἰκαίως καὶ τὸ λεπ-  
τὸν δ' οὕτως καὶ λευκόν, οἷον περ καὶ τὸ ὕδωρ. τούτω δ' ἐγγύς  
ἐστὶν ἕτερον οὗρον ἐν πολλαῖς τῶν νόσων φαινόμενον, ὡς οἶνον διο-  
κτὴν ἰκαίως λευκῆ καὶ λευπτῆ μεμιγμένην ἔχειν ἰδέαν. Quod **Aduerte.**  
est: Deterrima quidem in urinas profluxio. Iam uerò praua  
admodum est tenuis adeo & alba, qualis & aqua existit. Huic  
aut uicina est alia urina, quæ in multis morbis apparet: & uini  
albi admodum & tenuis mixtam habere speciem uideat, &c.  
Paulus fere eadē habet, nisi quod οἶνον hoc est, uini, nullā men-  
tionem faciat. Tu igitur apud te cōsidera, num Galeni scriptu-  
rā malis, an intelligere ἐγγύς ἰκαίως τῆ λεπτῆ καὶ λευκῆ, qđ  
est: Alteram urinam esse admodum propinquam tenui & al-  
bæ urinae,



bæ urinæ, quæ aquam repræsentare dicebatur. Oroscius locū hunc nimia sua diligentia intactum præterit.

Castigatur  
græca.

Tantum uero crassitie ipsam ab aquosa.] In græco codice est τὸ ὕδατος, hoc est, ab aqua: ubi legendum sit ὕδατος, id est, ab aquosa, nec hoc aduerterunt Aristarchi.

# IN XV. CAPUT.

Sputa.

Putum subflauum, subrusum. Ex eodē Galeni loco, & Orisbasij sexto libro collecta ista uidetur. Hippocrates in prognosticon secundo prius omnia est complexus.

Etenim præter sanguinem.] Hæc periodus libro secundo prognosticon, a Galeno sic scripta est: πλὴν γὰρ τῆ αἵματος, ὅστις ἀνὰ κρατὸς ἢ μοχθηρὰν ἐνδείκνυται διάθεσιν, ἐπὶ θερμότητι φλογώδεις τὴν γενεσιν ἔκων, ὁ μὲν ξανθὸς, ἐξοπτωμένης αὐτῆς τῆς ὀρερώδους ὑγρότητος. ἢ ἐπιμιγνυμένης ὡχροῦς ἐφαίνεται, ἢ δὲ ἰώδους ἐξ ὑπεροπτησεως ταύτης. ὁ δὲ μέλας, ἢ τοι τῆς αὐτῆς ὑπεροπτησεως, ἢ περὶ κακίᾳ τε καὶ διαβρωτικῷ τῇ γίνεται μέλαινα χολή, ἢ τῶ παχέος αἵματος ὁμοίως ξηραθέντος, ἢ λόγῳ νεκρώσεως τε καὶ ψύξεως. Hoc est: Nam præter sanguinē, quicunq; syncerus humor fuerit, prauam indicat affectionem, ex flamma caliditate trahens originem. Flauus sane, serosa ipsa humiditate retorrída, qua admixta, pallidus apparebat. Eruginosus auem, hæc nimium adusta. Nigar, uel eadē supra modum adusta, quæ efficitur atra bilis & pessima, & maxime erodens, uel crassio sanguine similiter resiccato, uel ratione tum mortificationis, tum perfriktionis.

Cruenta igitur.] Galenus loco iam citato in istū modum habet: τὰ μὲν γὰρ αἱματώδη καὶ φλεγματώδη, μέτρια, τὰ τῆς ξαυτῆς ἢ μελαίνης χολῆς, χαλεπὰ. διαβρωτικὰ μὲν γὰρ εἶναι ἀμφω τῶν σωμάτων, καὶ τὰ τῶν αὐτοῖς κοινόν. Hoc est: Etenim cruenta, & pituitosa moderata: Flauæ autem, aut nigræ bilis sputa difficilia. Quippe ambo corpora credunt, atq; hoc ipsis est commune. Paulus non habet φλεγματώδη.

Nam si prompte excreentur.] Hoc est ex Hippocrate: ἢ γὰρ εὐπετέως ἀναπτύσσονται. Galenus interpretatur dictionem εὐπετέως, quod nos uertimus prompte, hoc pacto. τὸ δὲ εὐπετέως ἀντὶ τῆ ῥαδίως τε καὶ ἐτόίμως οἱ Ἕλληνες λέγουσι. Rursus: εὐτετῆς γὰρ ἀναγωγὴ πτύελου, τὰ τέτιν ἐτόιμη τε καὶ ῥαδίᾳ γίνεται μετ' ὀδύνης ἰσχυρᾶς ὥσθις κατὰ τὸν θώρακα.

Castigatur  
codex græ-  
cus.

Valde crassum.] Græcus codex habet ὑπάπαχον, quod est subcrassum



subcrassum, pro υπέρπαχυ, hoc est, supra modum crassum, ex pituita nimium assata nimirum. Præterijt Gemusæus.

At si expuat quidē. ] Codex græcus deprauatus est, habet enim *ει δέ μη πτύοιτο μέλαν, ἀλλὰ, pro ει δέ μη πτύοιτο μιν, ἀλλὰ, &c.* Emendantur græca.

## IN XVI. CAPVT.

**D**iaras febres. ] Hoc principium sumptum est ex primo Galeni libro ad Glauconem circa principium. Dicuntur autem *ἐφήμεραι* græcis, quasi dicas ad diem durantes: *ἀμφήμεραι* autem, circa singulos dies infestantes, quotidianæ uno uerbo latinis appellantur. Diaria.

Opportuni sunt. ] Ista cum sequentibus ex octauo Metho di Therapeutices huc translata sunt. Paulus *ἐφ' ὧν αἱ ἀπέρροιαι τῷ σώματι εἰσιν ἐκ ἀτμῶδεις, ἀλλὰ δριμύτι καὶ οἷον καπνῶδεις ἐχουσιν, &c.* Galenus autē habet: *ἐν οἷς ἐστὶ τὸ δεαπνεόμενον ἐκ ἀτμῶδεις, οἷον περὶ ἐν τοῖς ἐυχύμοις ἀλλὰ δακνῶδεις, καὶ δρομύ, καὶ καπνῶ παρῶπλήσιον ἢ λινύ, &c.*

Lauare quidem non subinde. ] Paulus græce habet *λούειν* Conferuntur loci. *μὲν μὴ πολλάκις*, hoc est ut uertit. Galenus autē οὔτε *τρίφειν*, *ἔτε λειψῶν* *δέωνται* *πολλῶν*, quod est: Neq; frictionibus, neque balneis multis indigent.

Vehementer refrigerata. ] Græcus codex deprauatus est. Habet enim *ψυχρὸν τὰ δὲ αὐτὰ σφοδρῶν καταχῆν. &c.* Vbi sit legendum *ψυχρὸν τὰ δὲ αὐτὰ σφοδρῶς*, ut nos etiam uertimus. Græca uiciata.

Victus dulcibus. ] Hoc est bonis. Nam bonus in corpore succus, aut sanguis, dulcis & est, & dicitur: malus autem, amarum, acidum, aliamuē qualitatem extraneam habere ostenditur. Perperam igitur nos corripuit Orosius, quod dulcis succi *γλυκύχυμος* uerterim: cum idem sit dulcis & bonus in probi sanguinis significatur. Male habet græcus codex *γλυκύχυμος*. Vide Galeni octauum circa principium. Codex græcus uiciatus.

Aliquos horum nutrire ] Codex græcus est deprauatus habet, *τέτων τινὰ τρέφειν*, pro *τέτων τινὰς τρέφειν*. Vide octauum Galeni de morbis curandis. corrigenda sunt omnia exemplaria impressa.

Sed ulceri quod. ] Plenius in Galeno hæc sententia habetur in hunc modum: *ἀλλὰ πᾶσι ἑλκυσ ἐφ' ὧν περὶ ὅ βεβῶν αὐτοῖς εἰν γενομένης, αὐτῷ τε τῷ βεβῶνος προνοησάμενοι λένται κατὰ τὴν παρακμὴν τῷ γενομένου παροξυσμῷ.* Hoc Græca emendantur. **PAVLI AEGIN.** **Aa** est: Sed



est: Sed ulceri ob quod Bubo ipsis fuerit excitatus, ipsiq; buboni prospicientes in accessionis declinatione lauant.

Cæterum à uino ] Hæc clausula ad uerbum ex primo ad Glauconem sumpta est. Vbi etiam dictio *πρὶν* accipitur pro *μεχρὶς οὗ*, hoc est donec: aut sic dicendum: Cæterum priusquam inflammationes fuerint solutæ, arcendi à uino sunt ægroti. Atq; hoc pacto seruabit dictio communem significatum.

## IN XVII. CAPVT.

Græca cor-  
rigenda.

Nota.

Corrige  
græca.

**P**utridæ febres. ] Hoc caput ex primo Galeni de febribus libro totum transcriptum est: sed uarijs ex locis. Textus autem in græco Pauli codice deprauatus est. Habet enim τῶν ἐπὶ σήφει πυρετῶν διάγνωσις, τῷ μὴδὲν τῶν προκαταρκτικῶν αἰτίων προηγήσασθαι, καὶ τὸ μὴ ἀπὸ ξίγους δὲ ἀρξασθαι τὸν πυρετὸν. Hoc est: Febrium ex putredine contractarum dignotio est, quod nulla causa primitiua præcesserit, & quod non à rigore febris inceperit, &c. Quæ sententia plane falsa est. Nā proprium plane febrium putridarum est à rigore inchoare. Oroscius & castigatior Basilienensis, clarissimi & medici, & philosophi, ut ipsi audire uolunt, hæc opinor tanquam parua neglexerunt. Tu autem quisquis ueritatem amas in hunc modū corrigito: τῶν ἐπὶ σήφει πυρετῶν διάγνωσις τὸ μὴδὲν προκαταρκτικῶν αἰτίων προηγήσασθαι, τὸ δὲ ἀπὸ ξίγους ἀρξασθαι τὸν πυρετὸν, ὅτ' ἐγκαίσεως, &c.

Hoc enim singulariter ] In codice græco superfluum est τὸ, præst. μέγιστον adde δὲ particulam, quia noua incipit oratio.

Similiter ad ipsas. ] Græce est ἰδίον ἐστὶ μάλιτα τῶν τοιούτων πυρετῶν. Galenus habet: ἰδίον δὲ ἐστὶ ἐν τοῖς μάλιτα. Si uoles, ita legito.

## IN XVIII. CAPVT.

**S**i uires sint ualidæ ] Ex Galeni undecimo Methodi sumpta sunt ad uerbum. In nono libro circa principium, ait in eundem fere modum: Nam si præcedat ciborū cruditas, tanto tempore differre uenæ sectionem iubebit, quantum satisfacere, tum ad eorum concoctionem, tum ut excrementa descendat, uidebitur.

Putrida per urinas ] Et hæc ex undecimo, sed paulo ante, mutuatus est Paulus. Oportet enim id quod putruit, omni ratione uacuare, quod reliquum est, moderatis motibus, & refrigerante perspiratu, ad exactam symmetriam reducere, &c.

Si uero



Si uero febris magnitudo.] Galenus addit ad planiorem intellectum, ut in continuis. Hæ enim magis hominem affligunt, quàm intermittentes.

Vires inualidæ.] Græcus codex Pauli habet καὶ τῶν δυνάμεων ἰσχυρῶν. Hoc est: Et uires ualidæ, cum sit legendum καὶ τῶν δυνάμεων ἐκ ἰσχυρῶν. Hoc est: Et uires non ualidæ. Præterijt hoc Gemusæus. Textus græcus uiciatus.

## IN XIX. CAPVT.

Tertiana febris cum sit.] Ex secundo libro de crisi- bus, capite tertio hoc transcriptum est iisdem plane uerbis. Cæterum Galenus post illa, in hanc quoq; sententi- am habet: τὸν ἐν ἀκριβῇ τριτῷ ἡμέρῃ ἐκείνῃ δέχεται μὴ ἔμετὰ εἰς τοὺς σφοδρῶς γινέσθαι. Quam orationem Leonicensius uertit. Tertianam itaque febrem fieri contingit sine rigore uehementi, &c. Cum sit dicendum: Exactam itaq; tertianam non licet nisi cum rigore uehementi fieri. Leonicensi error.

## IN XX. CAPVT.

Exquisitam tertianam.] Ex primo ad Glauconē hæc Paulus transcripsit. Nonnihil autem à Galeno uariat, breuitate sermonis intelligo, quæ tamen sensum nonnihil obscurum reddit. Verba ad Glauconem ita habent: προτρέπιν ἐν χρεὶ τὸν μὲν εἰς τὴν γαστέρα συρρέοντα κενοῦσθαι δι' ἐμέτων. τὸν δὲ κάτω ἐπίοντα ὡς αὐτῶς διὰ τῆς κάτω ἐκκρίσεως. Quod est: Humorem itaq; in uentriculum confluentem, per euomitiones euacuare oportet: inferius autem descendētem similiter per internam excretionem. Paulus autem in istum modum: καὶ τὸ μὲν εἰς γαστέρα συρρέον, κενοῦν δι' ἐμέτων τε καὶ κάτω. Hoc est: Et quod sane in uentrem confluit, euacuare per uomitum, & inferna, &c. In Galeni uerbis γαστῆρ pro uentriculo: apud Paulum pro toto uentre positum esse existimandum, si concordēs alioqui intelligas. Conferuntur loci.

Vinis autem admodū uetustis.] Lectio in codice impresso plane mutila & deprauata est. Habet enim ἀπέχειν δὲ μέλιτος, καὶ νάπυος καὶ τασίχους, καὶ τῶν φύσει θερμῶν πάντα μὲν ἐπὶ παλαιῶν. Ex Galeno & Oribasio legendum: ἀπέχειν δὲ μέλιτος τε καὶ νάπυος, καὶ τασίχους, καὶ τῶν δις μέων ἀπάντων, καὶ οἴνων δὲ τῶν φύσει θερμῶν, καὶ παλαιῶν ἱκανῶς, &c. Atque sic nos reddidimus latina: In priore enim lectione nulla uel acrium, uel uini facta est mentio. Orosius & castigator



Basilienſis non aduerterunt.

IN XXI. CAPVT.

**L** Auare in tertianis ſpuriis.] Hæc quoque ex eodem loco ſunt huc translata. Diſtictio autem τὴ in græco exemplari deſideratur. Lege igitur: ἀλλὰ τι καὶ τοῦ τμητικότερος. Quod ceu paruum Ariſtarchi noſtri contempſerunt.

IN XXII. CAPVT.

**Q** Vartana.] Ex primo etiam ad Glauconem & ſexto Oribasij hæc ſumpta ſunt. De rigore autem quartanæ febris, Galenus cum alibi, tum in libello de tremore & palpitatione inquit: τὸ δὲ τῶν τετραστίων οἱ πειραθέντες ἀχρεὶ καὶ τῶν ὀτῶν φασι διήκειν, ὅταν ᾖ σφοδρόν. Hoc eſt: Rigorẽ quartanarum qui experti ſunt, etiam ad oſſa uſq; penetrare affirmant, cum uehemens fuerit.

Nec bilis uomitus.] Sed pituitæ intelligas, comitatur etiã lienis inflammatio, tumor, interim faſtidium, intenſa interim cupiditas.

Pullus exiguus ac rarus.] In hac febr̃i inæqualitas pulſuũ in uno ictu maniſeſtiſſima deprehenditur Multo enim uelocius principium motus finemq; inuenies quàm medium.

IN XXI. I. CAPVT.

**Q** Vartana.] Ad uerbum omnia ex Galeni libro iam ſepius nominato, compendioſe tranſcripſit. Quãquam id antea fecerit Oribasius lib. 6.

Caſtigatur  
codex græ-  
cus.

Qui refrigerant corpus ſiccantq;.] In græco codice erat ὑγραίνοντων, hoc eſt, humectantium pro ξηραίνοντων, quod eſt, ſiccantium. Miror tam apertum uicium iudices noſtros adeo oculos non deprehendiſſe.

Reſtitutus  
codex græ-  
cus.

Tum per dies aliquot.] Male eſt in exemplari græco διῃμερῶν τριῶν. Quod eſt: Per dies tres, pro διῃμερῶν τινῶν. Id eſt: Per dies: aliquot. Baſiliẽſis corrector hoc quoq; neglexit.

Quod ſuccum Cyrenaicum.] Galenus hoc medicamentum maxime etiam commendat libello de Tremore, ceu ad rigorem, quartanosq; circuitus, uſiſſimum.

IN XXIII. CAPVT.

**Q** Votidiana.] Ex quinto capite ſecundi libri de criſibus excerpta ſunt. At Galenus libello de Typis, latius accidentia enumerat in hunc modum: ἀμφιμερῶν δὲ παρὲς περὶ ὑγρότης ἕξεως, καὶ φλεγματώδεις ἑματοὶ, καὶ δειφός οὐκ ἐπιτε-



ἐπιτεταμένον, καὶ βαρυσμὸς τοῦ σώματος ὕλη, καὶ ὕπνος καρώ-  
δες, καὶ καταφορικὸς καὶ σφυγμὸς μέγας, καὶ ἄραιος, καὶ χαῖνος  
τὸ πρόσωπον ὑπερέλιδνον, καὶ χαῖνον, καὶ πεπονῶδες, καὶ πολ-  
λὴν ἐμφαίνον τὴν τῆς ὕλης καχεξίαν, καὶ τροφὴν, &c. Hoc est,  
ut ignari linguarum intelligant: Quotidianam uero comi-  
tatur habitudinis humiditas, uomitus pituitosi, sitis nō inten-  
sa, grauitas totius corporis, somnus soporosus, ueternosusq̃;  
pulsus magnus, rarus, laxus, facies subluida laxa, reponū mo-  
do tumida, quæ magnam materiæ prauitatem, & mutatio-  
nem repræsentet

Aquosiora.] Gal. addit libro iam citato: καὶ φλεγματικώ-  
τερα, quod est, pituitosiora, quæ ipsam febris cām ostendunt.

## IN XXV. CAPVT.

**Q**uotidianam cūrantes.] Ex primo ad Glauconē lib.  
Galenī Paulus hæc descripsit.

Oxymelite.] Simplici intelligendū, ut quod omnes mea-  
tus arctos aperiat. ne crassus alibi humor, uel glutinosus ad-  
hærescat. Conuenit aut cum ætatibus, cum naturis uniuersis.

Primis diebus.] Græce est κατὰ τὰς πρώτας ἡμέρας. Male Galenī lo-  
cus castigatus.  
autem in Galeno ad Glauconem μετὰ τὰς πρώτας ἡμέρας ἡ-  
betur, quod etiam castigator Basiliensis non mutauit.

Ventriculi.] Sic uerti γαστρός, quæ dictio nunc pro uentri-  
culo, nunc pro toto uentre accipitur. Galenus libello de ty-  
pis febrium ait: συνίσταται δὲ μάλιτα ἐπιτομάχῳ κακοπρα-  
γῇ. Quod est: Constituitur autem potissimum obstoma-  
chum male affectum. Propterea Paulus recte dixit uētriculi,  
& oris ipsius rationem esse habendam, quanquam accidat in-  
terim, ut in hac febri etiam lien scyrrhum contrahat.

Idq̃; tam diu, quā.]. Græce est: κατὰ πολὺ ἕως οὗ πάντῃ. Nota:  
Hoc paulo secus sonat, quā reddiderim. Galenus nō habet:  
Eoq̃; multi, à quodam alio quā Paulo fuisse adiectū pntant.

## IN XXVI. CAPVT.

**S**i uitrea pituita.] Ex Oribasi sextis sumptum est. Vitrea  
autem pituita à Galeno lib. 2. de febrium differentiis expli-  
catur, in hunc modum: ὑαλώδης δὲ μοι δοκεῖ προσαγορεύειν δὲ  
πραξαγέρας τὸν χυμὸν τοῖσιν, οἱ νεώτεροι δὲ ὧν ἐστὶ καὶ φίλιπ-  
πος ὡμὸν ἀπλῶς. Item in commentario de Tremore in hanc  
sententiam: οὐ μόνον δὲ ἐπὶ τῆς ξανθῆς ἢ μελαίνης χολῆς εἶδος,  
ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῷ ψυχρῷ φλέγματι φιλεῖ γίνεσθαι καὶ δὲ ὑα-



λῶδ' ἡ τὸν χυμὸν τῷ τὸν δ' παραγόμενος, &c. Hoc est: Non solū autem ob flauam, aut nigram bilem rigor, sed etiam ob frigidam ualde pituitam fieri solet, uocat autem humorem hunc Praxagoras, uitreum. Subiungit autem: Verum hic rigor nō adeo uehemens est: quanquam pluribus nonnunquam diebus subsequētibz perseveret.

## IN XXVII. CAPVT.

**C**ontinentes.] Ex sexto capite libri secundi de Crisibus excerpta sunt. Interpretatus autem sum hic febres continentes, quas Græci συνεχεῖς appellant: continuas autē, quas συνοχές. In Latina quoq; lingua duas uoces usurpemus. Cæterum Galenus intelligit continentes, quarū materia in ualīs subsistit: ubi enim ea per totum corpus delata fuerit, intermittentes appellatæ, sunt.

Acumine.] Græce est ὀξύτης. Nam ut ὀξύς acutus morbus dicitur, ita deriuatiuum ipsius ὀξύτης, acumen, celeritas, aut præcipitancia, aut quocunq; modo libet appellare.

## IN XXVIII. CAPVT.

**C**ontinuarum.] Vide nonum Methodi, & sextum Oribasij. Per cōtinuas autem hic intelligo συνάχους, qui ex sanguine potissimum constituuntur. Male in Græco codice legitur τῶν συνεχῶν pro συνοχῶν. Neglexit hoc Gemusæus. Nā συνεχεῖς uocabulum generale de omnibus febribz ex quocūque humore continue affligētibz. συνοχὸς autem de febre ex sanguine uel putrido, uel efferuescente usurpatur. Barbari hāc fœminino genere synocham nominarunt.

**E**mendatur græca, In uigesimo nono capite codex Græcus habet παχῆα pro τραχῆα. Non enim crassa lingua, sed aspera, uel scabra dicendum est, hoc in loco, quod castigato Basiliensis in codice suo alioqui emendato non aduertit. Cæterum caput hoc & inferius ex sexto Oribasij descriptum est. Præcipit autem ardenti febre laborantes non sola aqua, sed mulsā aquosa nutriendos esse. Cuius rationem Galenus in commentario Hippocratis de morbis acutis. Aqua, scribens, natura frigida, tarde penetrat, & quā plurimo tempore in præcordiis subsistēs, in acutis morbis corrumpitur: mel bile scit, ob id mulsā aquosa dari debet: ut aqua nulla in superiore uētre facta mora à melle mixto ad distributionem trahatur. Non autem aqua cruda, sed cocta esse debet.

Sustiner e'



Sustinere.] Ita sum interpretatus διατᾶν, hoc est, nutrire, alere. Celsus ait, cremore ptisanæ sustentandi sunt. Atque hoc loco proprie dicendum est. Sustinere. Quia tantum cibi hic porrigitur, quantum uiribus sustinendis sufficit.

## IN XXXII. CAPVT.

**D**Vplex hecticarum.] Galenus lib. I. de febrium differentiis, Oribasius sexto eadem plane habent. Leonicens & Laurencianus parum recte in translatione Latina se gerunt. Quid autem sibi uelit Orosius interpretando, ἢ καὶ μενέσσης ἐστὶ συχνῆς, uel etiam si humiditatis aliquid cōtinuum permaneat, eruditi iudicent. Cum melius dixisset, uel etiam mado-  
re adhuc copioso, aut multo permanente. Nam συχνὴ nō tantum συνεχῆς significat, si Hesichio credimus, sed etiam πολὺς. Præterea sensus hunc significatum requirebat. Cæterū Hectica dicitur, quod stabilis sit, ac solutu contumax, uel quod totum corporis habitum occupat.

Aduerie.

## IN XXXIII. CAPVT.

**H**Ectica febre.] Vide Galenum lib. 10. Methodi medendi: ubi paulo manifestius curationē hecticarū persequitur.

Moderato.] Græcus codex habet aduerbium, μεμετρημένως, quasi dicas mensuraliter. Nam Gal. 10. magnam curā habendam esse dicit mensuræ, frigide febricitantibus exhibēde.

μεμετρη-  
μένως.

## IN XXXIIII. CAPVT.

**Q**Vandoquidem tertiana.] Hæc Galenus in secūdo febre de febrium differentiis, Oribasius in sexto tradidit. Cæterum nomē claturæ rationem in libello de Typis interpretatur. Est autem semitertiana triplex: Parua, media, & magna. Parua uiginti quatuor horas absoluit. Media triginta sex. Magna quadraginta octo, atq; continuæ proxima est. Porro ætati mediæ accidit, & tempore potius autumni, cū etiam ualde periculosa est, non solum stomachum, sed etiam nervosam partem, & ut summatim dicam, media attingens.

## IN XXXV. CAPVT.

**P**ublicæ grassantes.] Vide Oribasij sextum, Hippocratiē in commentario περὶ ἐπιδημιῶν, & de natura hominis.

Cæterū morbos publicæ grassantes uoco, quos Paulus πανδὴ ἐπιδημοί μιν & κοινὰς sua lingua appellat. Opportunū aut hic est explicare, quos nam Græci ἐπιδήμους, ἐνδήμους, σποράδας, παιδὴ σποράδες μιν, nominent. Galenus itaq; cōmentario primo in primum πάνδημοι

Aa 4 ἐπιδη-



ἐπιδημιῶν in hunc modum scriptum reliquit : μεμνηῖται χρεῖ  
 τέτων εἰς τὰ μέλλοιτα λέγεσθαι γινώσκων, ὥς ἐνία μὲν τῶν νο-  
 σημάτων κοινῇ πολλὰς καταλαμβάνει, καὶ δὴ λέγεται κοινά. Hoc  
 est : Meminisse conuenit horum ad ea quæ post dicentur, sciē-  
 dumq; nonnullos sane morbos communiter multos corripe-  
 re, qui sane uocantur communes. Statim subdit : τῶν δὲ κοι-  
 νῶν τὰ μὲν ἐνδημαίεισι, τὰ δὲ ἐπιδημάτεσσι ἐπιδημία. τέτων  
 δὲ τὰ χαλεπώτατα λοιμώδη καλεῖται. Id est : Ex cōmunibus  
 alii uernaculi sunt, alii aliunde in populum ingruunt. Horum  
 periculosissimi, pestilenciales appellantur. Item ἐνία δ' ἑκα-  
 στον ἰδίᾳ τὰ σποράδικοι προσαγορεύόμενα Nonnulli singulos  
 priuatim inuadentes dispersi, ac erratici nuncupantur. Paulo  
 supra : δῆλοι ἐν ὧς ἐκ τῆ γένεως τῶν ἐπιδημιῶν νοσημάτων ὅσα  
 κακοηθέστατα γίνονται, καὶ λοιμώδη καλεῖται, τὸ δὲ τῶν ἐπι-  
 δημιῶν ἐκ τῆ τῶν παιδῶν τε καὶ παγκόσμων γένεως ἐστὶν ὁ ταῖς  
 σποράδεσιν ὅσοις ἀντιδίδαισθαι. Hoc est : Itaq; cōstat ex po-  
 pularium morborum genere eos esse, qui malignissimi gene-  
 rantur, & pestilenciales dicuntur Populares autem illorū ge-  
 nere comprehendi, qui undiquaq;, & communiter in omnes  
 grassantur. Quod genus morbis priuatim, & inter se dissimi-  
 libus opponitur Habes ferē omnium appellationes explica-  
 tas, quo autem dilucidior fiat interpretatio, pauca ex primo  
 Hippocratis de uictus ratione in morbis acutis subiiciā Ver-  
 ba sunt Galeni in commentario primo : δηλοῖ δὲ διὰ τῆ λό-  
 γος τέτης, τὰ μὲν τινα πολλὰ γίνεσθαι νοσήματα καθ' ἑνια χρόνον,  
 ἅπερ ὅταν μὲν ὀλέθρια γένωνται, λοιμὸν ὀνομάζουσιν, ὅταν δὲ  
 ἐπιεικέτερα, ἐτέραν τινὶ προσήγορίᾳ δηλώσιν, ἐπίδημα καλεῖν-  
 τες. ὥστε εἶναι τὸ μὲν ἐπίδημον νόσημα τὸ κατα χρόνον τινα  
 πλεονᾶσαι ἐν τινι χωρίῳ, τὸν δὲ λοιμὸν ἐπιδημίαν ὀλέθριον.  
 ἐπὶ δὲ καὶ ἄλλο γένος νοσημάτων κοινὸν πολλοῖς ἡπερ ἐπὶ τὸ  
 κατὰ χώραν ἐπιγινόμενον, τὰ ἐνδημα καλούμενα. τέτοις δὲ αὐ-  
 τήκενται πᾶσιν αἰσποράδες νόσοι, διαφερόντως ἐνοχλῶσαι τὴν  
 νοσούντασιν οὐ κατὰ τὸν κοινὸν τρόπον συνιστάμεναι Hoc est : In-  
 dicat autem in hac oratione, multos sane quosdam morbos  
 uno tempore fieri, quos, cum perniciosi fuerint, pestilentiam  
 nominant, cum mitiores, alia quadam appellatione signifi-  
 cant populares, aut uulgares nuncupantes. Vt popularis qui-  
 dem morbus sit, qui certo tempore in regione quadam domi-  
 natur. Pestilentiam uero morbum popularem perniciosi m.

Iam



Iam uero aliud quoq; morborum genus est, multis commune, quod ex loci natura superuenit, uernaculum appellatur. His autem omnibus opponuntur, priuati morbi, diuersa ratione ægrotos infestantes, non communi modo constituti, &c. Hactenus Galenus noster: cuius sententiam ita interpretor. Morbi qui undiquaq; populatim, nullo non tempore anni grassantur, nulliq; nec sexui, nec ætati, nec corporis statui parcunt, *πανδημῆς*, & *παγκόσμιος* appellant Græci, ex aere infecto trahunt originem. Qui autem certo tempore in regione quadam publicè dominantur, *ἐπιδημῆς*, quasi dicas popularis, aut uulgares nuncupant, similiter ex aere, aquæ uiciatæ potu, stagnorum, paludumq; graui halitu procreantur. Qui autem perpetuo in regione quadā inrudescunt, *ἐνδημῆς* Græci, patrios nostri & uernaculos nominant, simili fere ex causa oriuntur. Porro sit interdum, ut morbus regioni peculiaris, & generalis uno tempore simul inuadant, pro aeris, aliarumque circumstantiarum ratione. At morbi priuati cuiq;, inter se dissimiles, *σποράδης* uocauit Hippocrates, ex uictus ratione trahunt originem.

Cibiq; igitur communes.] Non solum aer teste Galeno communes morbos efficit. Siquidem qui in Aeno dū fames grassaretur, leguminibus uescebantur, crurum impotētes euaserunt. Item qui Eruo genuum dolore cruciabantur. Nouimus autem nonnullos, qui etiam triticum semiputridum fame coacti ederunt, in communem incidisse morbum ex causa communi. Et alibi exercitium totum praua usum aqua similiter in omnibus militibus noxam sensisse.

Afflictiones corporis.] Cum Hippocrates dicit alios morbos ex uictu procreari, intelligit etiam uitæ studia. Nempe exercitia, orium, uigiliæ, tristitiam, iram, perfrictionem, inlolum, balnea quoq; non suo tempore usurpata, morbos excitare, saltem ratione secundaria.

Hæc quidem non ] Græcus habet: *τὰυτὰ πένε*, quod sonat. Hæc quidem igitur. Verum mea sententia legendum uidetur *τὰυτὰ μὲν οὐ*, negatur id quod tum autoritate Oribasii, tum ipsa ratione probate possum. In primis enim Oribasius sexto libro hanc lectionem confirmat, deinde in eodem capite statim Paulus dicit. Siquidem in alias causas nec omnes simul incidimus, neq; eis tot die immoramur, aer autē quoniam

Cibi communes.

Castigandus Græcus.



Gemufcus  
natura ma-  
ledicus.

quoniam omnibus circumfusus est, & inspiratu attrahitur, ut animalium quoque corpora afficiat, est necesse. Nō dico quod Galenus primo commentario in Hip Epidemia, unde illa partim sunt excerpta, in hunc modum habeat: τὰ δὲ ἀπὸ τῶν ἐδεσμάτων καὶ πομάτων πάντα ἐστὶ. Hoc est: Qui autem ex cibo, aut potu sunt, rati sunt, &c. Gemufcus noster uituperandi studio, damnat hanc meam lectionem, nullam adferēs uel autoritatē uel rationē. Quis amabo ignorat populares morbos continenter quidem ex aere procreari, aliunde autem rarius? Sed inquit Gemufcus, ex euaporatione lacuum frequē-  
tius accidere: cui in hoc respondeo, nullum uel stagnum, uel paludem morbum communem generare, nisi τῷ βλάπτειν τὸν ἄερα, ut ait Galenus. Aer autem ipse uel calidior, uel frigidior, humidiorue sæpe nobis circundatur. Quare etiam is morbos potius, quàm Solæ paludum uaporationes, efficit. Quæ ut dixi, nunquam corpora humana afficiunt, nisi prius aerem ipsum corruperint. At rursus obijciat Gemufcus Galeni sententiam commentario secundo in libellum de natura humana, uerba hæc sunt: πολλάκις μὲν γὰρ ἀναθυμιάσεις τινὲς ἐξ ἐλῶν ἢ λιμνῶν, ἢ τελεμάτων, ἢ γῆς τοιαύτης αἰτίας γίνονται τῶν τοιούτων νοσημάτων. Hoc dico Galenum uelle indicare non solum ex aere intemperato huiusmodi morbos procreari, quod Hippocrates uidetur innuere, sed etiam ex aere, euaporationibus paludum infecto. Nō tamen negat ex aere frequentius contrahi. Ad hæc omnia, ex oratione Pauli opinionem meam possum astruere. Nam cōferens ille aerem cum aliis omnibus supra nominatis causis, raro nos omnes simul in eas incidere pronunciat: non autem fieri posse, ut aeris usum effugiamus. Adde quod aeris tantum remedia enumeret, ubi intemperies aliqua subesse uidetur, reliquarū causarum, non item. Vice ergo candide lector, quid faciat procliu-  
is hominum quorundam ad maledicendum natura.

Nota

Præterea lignorum [ Galenus hoc etiam confirmat libro de Theriaca ad Pisonem in eam sententiam: δὴ ὅπερ ἐπαινῶ καὶ τὸν θαυμασιώτατον ἱπποκράτην ὅτι τὸν λοιμὸν ἐκείνον τὸν ἐκ τῆς αἰθιοπίας εἰς τὴν ἑλληνικὴν φθάσαντα ἐκ ἄλλως ἐθεράπευσεν, ἀλλ' ἔτρεψας τὸν ἄερα, καὶ ἀλλοιώσας, ἵνα μηκέτι τοιοῦτος ὢν ἀναπνέηται. κελεύσας δ' ἐν ἀνὰ τὴν πόλιν ὅλην ἐξάπτεσθαι τὸ πῦρ, ἐχάπλην τῆς ἀνάφης τὴν ὕλην ἔχον, ἀλλὰ στεφάνων τε καὶ



καὶ τῶν ἀνθρώπων τὰ ἐυωδέεστα, τοιαῦτα συνεβούλευσεν εἶναι τῷ  
 πυρὸς τὴν τροφήν, καὶ ἐπισπένδειν αὐτῷ τῶν μυρῶν λιπαρώτα-  
 τα, καὶ ἡδίσταν τὴν ὁδὸν ἔχοντα ἵνα οὕτω καθαρόν γενόμενον οἱ  
 ἄνθρωποι ἀναπνέωσιν εἰς τὴν ἀπαλλαγὴν τοῦ ἀέρος. Qd' olim  
 sic Latine reddidimus: Quamobrē etiam Hippocratem illū,  
 multis admirādum laudo, qui lucem illam pestilentiae ex Ae-  
 thiopia Græcos inuadentem, non aliter curauerit, quā aē-  
 rem mutando, alterandoq; ne talis amplius inspiraretur. Cū  
 igitur ignem per totam Athenarum urbem incendi iussisset,  
 nō simplicem lignorum materiam, uerum feta, floresq; sua-  
 uissimos, fomitem ipsius esse consuluit, unguentaq; pinguiissi-  
 ma, & odorifera ipsis superfundi, ut aērem purum hoc modo  
 redditum homines in mali subsidium inspirarent.

## IN XXXVI. CAPVT.

**N**Ares destillant.] Galenus in commentario Prorrhethici  
 Hippocratis scriptum reliquit: ἀπασῶν δ' ἐσῶν τῶν ἀπὸ  
 ξινὸς τῶν χαλεπῶν ὅταν παχύνῃ, καὶ μέλαινα ἀπόστασις, τὰν-  
 τας ὀλεθριωτάτας ἐνρήσεις. Id est: Cum autem omnes è nare  
 stillationes sint periculosæ, cū crassæ, & nigræ fuerint, has per-  
 niciosissimas reperies.

τάξις.

Venter colliquata.] ἡ γὰρ τῆς τῶν συντήξεως habet græcus  
 codex. Est autē σύντηξις colliquatio, cōsumptioq; ne pe cū par-  
 ticularum quotidie aliquid decedit, nec alimētū recipiūt. Plinius  
 lib. 22. cap. 25. hac uoce utitur, Tali, inquit, sorbitionis ge-  
 nere emendantur syntexes, hinc syntectici eodem autore di-  
 cuntur. Licebit igitur interpretari hanc snām, uenter Tabida,  
 & quæ ex ipsius substantia decesserunt, humore undiquaq; in  
 ipsum confluyente, emittit, partim uomitu, partim inferius.

Aloes partes duæ.] Hæc est descriptio pillularum cōmu-  
 niū: quæ in Nicolao illo præposito uiciosa & deprauata  
 habetur. Nam is ponit aloes uncias duas, croci & myrrhæ  
 utriusq; unciam unā, in peste addendū consuluit, bolū arme-  
 nū. Primū uetus scriptura croci nō meminit, deinde thymia-  
 matis ammoniaci, non boli armeni unciam præcipit. Id genus  
 permulta monstra in officinis nostris pertinaciter regnant.

Catapo-  
tra.

Theriacen ex uipetis.] Hoc etiā Galenus lib. de Theriaca  
 ad Pisonein confirmat in eum modum: τὸν αὐτὸν τρόπον νο-  
 μίζω καὶ τὴν θηριακὴν, ὥς περ τι καὶ αὐτὴν ὅταν πῦρ καθάρ-  
 σιον, τὴν μὲν προπινοντάς αὐτὴν ἐν τῇ λοιμικῇ καταστάσει, μηδὲ  
 ὅλως



ὅλως ἔαν ἀλίσκεται τῷ κακῷ. τὰς δὲ ἡδὴ φθάσαντας παθὼν  
 ἐξαῖται δύναται, ἀλλήλῃται, καὶ τρέπεται τὴν τῷ ἀναπνέου-  
 δέντος ἄερος ποιήσιν, &c. Hoc est: Simili modo Theriacen ceu  
 ipsa quoq; ignis quidam purgatorius existat, præsumentes in  
 pestifero aeris statu, neutiquam malo corripere sinere nouimus.  
 Correptis autem mederi posse, aeris inspirati maliciam in al-  
 terando mutandoq;. In Galeni codice græco, qui Basileæ nu-  
 per impressus est perperâ legitur ἀναπνέουδέντος ἄερος. Quasi  
 dicas: Aeris reformati, positum est pro ἀναπνέουδέντος Quod  
 est, inspirati. Nam qui correpti peste sunt, malum aerem at-  
 traxerunt respiratu, non reformatum aut refectionem; aut quo-  
 modocunq; dicere libeat.

Codex græ-  
 cus ulcio-  
 sus.

## IN XXXVII. CAPVT

Nota codi-  
 cum uarie-  
 tatem.

**N**onnulli febricitare.] Galenus lib. 12 omnia hæc ad uer-  
 bum habet. Variat autem nonnihil lectio græcorum co-  
 dicum. Galeni habet ἐν ὅγκῳ τε μέλῳ τὸ κατὰ φύσιν ὄλον τὸ  
 σῶμα ἐστὶ καὶ ἡ χροιά τοῖς μέρει, &c. Hoc est: Et totum corpus  
 uastiore mole quam pro naturæ modo cernitur, & color, &c.  
 Pauli τὸ σῶμα τῆς γαστρὸς, quod est, os uentriculi uastiore mo-  
 le cernitur. Mea sententia cū Galeno legendum esse censeo.

Corrige  
 græca.

Vt pote quos.] Apud Paulum impressum est οἱ δὲ καὶ χω-  
 ρίς τέτων, pro ἄγε καὶ, &c. Sic etiam Galeni exēplaria om-  
 nia habent. Nam ratio datur cur missionem sanguinis, aut pur-  
 gationem non sustineant. Signat igitur hoc loco, si quidem, di-  
 ctio ἄγε. Præterit Oroscius, castigator Basiliensis neglexit.

Sin autem robore mediocri.] Galenus, si autē pulsus me-  
 diocri robore sit, & magnitudine, paulum ad ægotantem re-  
 fert, cuius tamen uires ex pulsu cognoscuntur.

Ergo si æstas.] Galenus non habet; καὶ θερμὸς, quod ego  
 interpretatus sum, calidi temperamenti. Non enim referri  
 potest ad θερος, ut Grammaticus putat.

Balneum his aduersissimum.] Galenus addit, & aer am-  
 biens uel nimium calidus, uel frigidus.

## IN XXXVIII. CAPVT.

**Q**ui tenuium humorū.] Ex eodē loco Galeni, & sex-  
 to libro Oribasij transcriptum. Dicit autem paulatim  
 & continue alendos huiusmodi humoribus laborantes: præ-  
 terea fructus, quos ὀπωρὰς græci nominant, exhibendos. Su-  
 pra uerti poma, quod nihil refert Nam fugaces seu horarios;  
 seu



seu tempestiuos *ωγαις* græci appellant. Hoc remedium olim Luteriæ in quodā adolescente continua febris laborante sum expertus salutare. Nam quoties ille uel aluum deijcere, uel urinam reddere extra lectum uolebat, aut etiam quoties pedibus tantillum consistere, aut in sella, quousq; ei lectulus stereretur sedere, in sincopen solebat incidere: ac uidentes hoc aliquot medici, de salute minus sperare cœperunt. Ego uidens iuuenem natura biliosum, tenuiq; sanguine præditum, cogitavi illi quoquo modo uirium dissipationem impedire, ac statim quum è lecto in sedem esset collocatus, porrexì ei uiam recentem nondum exacte maturam: nam initio Augusti accidit morbus: qua assumpta, paulatim per dimidiam horam seruauì hominem extra lectum citra animi defectiōnem, quod feliciter successisse animaduertens, sequenti die idē facere decreui: exhibitaq; paulo maiore portione, ad unam usq; horam sine ullo incommodo, ut prius seruauì. Factumq; est tandem diebus inscutis, ut tuto iam extra lectum in cubiculo obambulet, daretq; occasionem reliqua auxilia exhibendi. Hoc te nolui celare lector.

Historia.

## IN XXXIX. CAPVT.

**R**eliquæ occasiones.] Ex eodem Galeni loco sumpta hæc sunt ad uerbum. Enumerat autem Paulus syncopæ causas, dolorem uehementem siue ex intemperie, siue humoribus, siue utrisq; uel etiam ex continui diuortio ortum, uigilias nocte dieq; affligentes, nā somno mediocri uires recreantur, immodica inania, aut per uentrem, aut uomitu, aut sudoribus, aut urina, aut sanguinis profluuiū. Ac in iis qui aliena loquuntur, hoc est, qui mente non constant, qui delirant, desipiuntq;. Nam *παρὰ πάλιν* uerbum signat *παρὰ φρονῆσαι*, *ἄλλοφάσαι*, cerebro scilicet affecto, adeo ut functiones suas peculiare, nequeat edere. In ijs si motus quandoq; corporis fiat, uires collabi necesse est. Ad quas conseruandas, & ad syncopen uitandam, singulare est præsidium, temperamenti custodia. Ante omnia uero trium principiorum: mox reliquarum partium, quæcunq; illa in consortium affectus principia secum ex facili trahunt.

*ἄλλοφάσαι.*

## IN XL. CAPVT.

**I**Taq; dolor.] Hæc magna ex parte Galenus in secūdo de locis affectis habet. Reliqua in 12. Methodi medendi.

Dolor



ναρκώδης.  
οδύνη.

Dolor stupidus.] Græce est ἡ μὲν ναρκώδης οδύνη διὰ ψυχρὰν γίνεται διάθεσιν. Quod interpretatus sum ad uerbum in Paulo. Galenus libro iā citato ait. καὶ τοίνυν τὸ ναρκῶδες ἀλγῆμα διάθεσιν ἐργάζεται ψυχρὰν τε, ἀμὰ καὶ οδυνεῖαν, quod est. Itaq; stupidus dolor affectionem frigidam simul & dolorificam parit. Aduerte lector. Paulus hic dolorem ut affectū, Galenus causam interpretatur Verum sequētia in oratione Galeni eos conciliant. Nam stupor, inquit, frigiditas quædam est non exigua eoq; membris hac occupatis difficilem & motum, & sensum parit, atq; ita stupidus dolor, non indicat doloris speciem, uerū dolorem simul & uel affectionem frigidam, uel difficultatē sensus, motusq; ab ea particulæ obortā. Cæterū nō solū in neruis, sed aliis omnibus partibus accidit.

πίνος  
σφυγμώ-  
δης.

Pulsatilis autem dolor.] Græce dicitur σφυγμώδης, & σφυγματώδης πίνος, quasi interpreteris, pulsorins, & pulsatilis labor, uel dolor: insignium inflammationum proprius, arteriarum quidem semper, ptimario affectu, aliorum uero corporum sensilium omnium, consortii lege. Cæterum uocem græcam πίνος Galenus sic exponit, ὃ γάρ τινι πίνος αἰσθησις ἐστὶν ἀνιαρὰ, καθάπερ ἡ ἡδονὴ προσκινῆς αἰσθησις. Hoc est: Siquidem dolor, sensus est molestus, sicut uoluptas est sensus suauis, quod Cicero elegāter dixit. Omne id quo gaudemus, uoluptas est, quo offendimur, dolor.

Colicus  
dolor.

Sin autem tanquam à palo.] Colicorum dolor est, qui in imo uentris ea potissimum parte urget, qua urinarii meatus ex renibus ad uesicam exporriguntur. Atq; hinc non ita ex facili discerni à nephritide potest.

Puncto-  
rius.

Punctorius autem.] Galenus habet: ἀρξόμεθ' ἐν αὐτῇ ἀπὸ τῆς νυγματώδους ὀνομαζομένου, συνισταμένου περὶ τῆς ὑμέρας μά-  
λιστα. οἷον εἰς τῆς πάσης κατὰ τὸ νύττεσθαι δοκῆν ἐρητισμένης, ἐκτεινομένης δ' πλέον ἐπὶ ἐν κύκλῳ ἐπὶ τῷ τοῦ πῆς οδύνης. Hoc est, ut Copus noster uertit: Igitur iterū incipiamus à puncto-  
rio uocato dolore, ac uidetur quidē ueluti ipsius affectus inter pungendū circa mēbranas potissimū. uerum dolor circa locū punctū ad magnū spacium extēditur. Nos autem, pace illius dictum sit, in hunc modum uertendum putamus. Incipiemus itaq; rursus à punctorio dolore dicto, circa mēbranas potissimum constituto, cuius affectus ueluti radix in eo quod pungi uidetur defixa est, dolor autem lōgius orbiculatim ad id ex-  
tenditur,



tenditur, &c. In pleuritide hunc dolorem esse nemo ignorat, acri humore membranam costas succingentem pungente.

Pertundens, uehementissimis ] Hic dolor græcis dicitur *Περτουνδῆς*, quod idem est, ac si dicas *διωρμῶν*, id est, cū impetu perrumpens. Copus uertit turgidus dolor, qua ratione, ignoro. Certe in Cephalæa, caluaria ipsa perrumpi, pertundiue dolentibus uidetur. Id autem tunc accidit, quando ueluti à radice incipiens, ad uicina transit, ut ait Galenus.

Membrana quidem ] In græco codice deest *μὲν* particula. Legendum enim *ὁ μὲν ὑπὸ τῷ θέρματι*, ut respondeat sequenti, *ὁ δὲ*, quod omnes nostri. Aristarchi non aduerterūt. Nec impressum exemplar à Gemusæo castigatum habet. Cæterū mēbrana cuti subiecta quæ sit, audi. Cōtinetur ea cute & corporibus subiectis p fibrarū tela modo subtiliū traductus: quæ uenæ cutē nutriendes & nerui sensum cōmunicātes permeāt.

Diuellentes cruciatus. ] Impressa omnia exemplaria habent *διὸν διασπωμένους* pro *διασπωμένους*: quāquam Orosius hoc & castigator Basiliensis non annotarint.

Profundi sunt. ] Hoc est in alto delitescētes, unde quibusdā *ὀστέοποι* quasi ossium dolores appellantur.

Si igitur sanguinis sit copia. ] Ex 12. Methodi medēdi Galeni, & 6. Oribasii sequentia sunt transcripta.

Auxiliantes. ] Miror cur Gemusæus hunc locum deprauatum reliquerit in suo codice, cū plane ad sensum nihil faciat dictio *προσλιπαρῆντες*, lege igitur *προσβοηοῦντες* ex Galeno, ut nos etiam antea uertimus.

Irrorationibus. ] Hoc est, asperisionibus. Nā *καταιοῦν* est *καταβλεῖν*, quod signat superfundere. Linacer uertit *καταιοῦσι καὶ πυρεασέσιν*, humidis & siccis fomentis. Quāquam non parum diuersa nomina sint, uariasq; res significant. Nam *καταϊόντης* est asperio irroratioq; ut Celsi more loquar, ex oleo potissimum ad rem propositam idoneo facta, ueluti cū multa pituita in ore uentriculi hæret, oleū in quo absinthiū ebullierit, id superfundim<sup>9</sup> *πυρίαις* quæ & *πυρίμα*, & *πυρία*, & *πυρίαις*. & *θέρμα* græcis dicitur. triplex est. Nēpe humida sicca, & *πυρίμα*. mixta, si Hippocrati & Galeno credemus. Humidū fomentū, *πυρία*. spongia mollis magna; ex aqua calida expressa, applicataq; *θέρμα*. Huius generis est aqua calida, aut oleū in utriculos, aut uala *μα*. ærea, hētiliaq; aut in uesicā coniecta, parti; dolēti admota. Fomentum.

Siccum



Siccum fomentum est, milium, sal, harena in sacculos cōiecta, aut solum linthrum. Item lateres & titiones panniculis inuoluti, & sic circumdati. Pace cuiusdam docti uiri dixerim apud Celsum lib. 2. non esse uicium scripturæ in dictione, titionibus. Nam tertio eandem repetit, fomentisq; inquiring, proptinus ualidioribus totum corpus circumdare conuenit, maximeq; inuolutis extinctis testis & titionibus. Mixtum fomentum est, hordeum, eruumq; prius contusa, aceto & aqua macerata, uel etiam farina simili modo preparata, & in sacculis apposita. Ceterum humida fomenta conueniunt inflammationibus ex bilioso humore suscitatis. Sicca iis, quæ ex tenui & aquoso sanguine proueniunt. Mixta crassis, uiscosisq; humoribus incidendis, conficiendis, dissipandisq; expediunt.

ὄγκας.

Sin moles.] Quidam parum nersati in medicina uertunt dictionem ὄγκον in græco codice positam, tumorem, nullo plane sensu, quanquam id quoq; hac uoce significetur. Voco autem hoc in loco molem, corpus, quod ab externo supercecidit: quod uel durum, uel magnū, uel graue, uel simul ambo fuit. In fine capitis male legit in codice ἱππὸ ξυροῦ, ἢ ξηροῦ.

#### IN XLI. CAPVT.

**Q**uum per uentrem.] De hoc accidenti Oribasius lib. 6. eadem tradit Ceterum syntexin, seu ut latine dicā colliquationem corporis facies illa cadauerosa comitatur. Quod in marcōre quem μαρσμον græci nominant, uidere est, aut etiam in hectica marasmode.

Castigator  
codex græ  
cus.

Ex fonte.] Huius loei castigationem Orosius exemplari suo debet, & Oribasius. Nam omnia exemplaria quæ mihi uidere contigit, habent, ἀπὸ γῆς pro ἀπὸ πηγῆς, quanquā aqua ex terra intelligi possit, aqua ex fonte. Hoc præterit etiam Gemusæus.

#### IN XLII. CAPVT.

**N**onnunquam palpebras aperire.] Hoc Galenus confirmat lib. 1. de febribus: οὐ μὴν inquiring, οὐδ' ἀνατείνειν ἐπιπλέον οἷοίτε εἶναι τὰ βλέφαρα, παραπλησίως τοῖς κατὰ τὸ σιν, αἱ δὲ διακείμενοι, καὶ μέντοι μύουσιν ὡς τὸ πολλὰ, καθάπερ ὑπνώττοντες, ἐπὶ δ' οὐχ ὁ ὕπνος αὐτῶν τὸ πάθος, ἀλλ' ἐργηγόςτης ἀδυναμία. Hoc est: Nec uero palpebras diutius attollere possunt similiter nictantibus perpetuo affecti. Quinetiā plerumq; conniuent oculis, ueluti dormitantes. At affectus ipforum



ipforum somnus non est, uerū uigilandi impotentia, &c. Hec quidem de hectica Galenus pronunciauit: nos autē de omni febris, in qua uigiliae urgeant.

Si cōmuneant. ] Male in græco codice *ἢ μῦται*, quod est uel *Restituo*  
connuere, legitur pro *ἢ μίσαιεν*, quod etiam Orosius anno- *exemplar,*  
tauit: Basiliensis autem corrector neglexit.

Cibus quodāmodo sit magis accuratus. ] Ita reddi dictio- *περιεργῶν*  
nem græcam *περιεργόττερα*. Nam uerbum *περιεργᾶν* in bo-  
nam partem acceptum est, quod accurare. Id signat ex cura  
& consilio aliquid gerere Aliquando in malam partem sumi-  
tur, pro eo quod est *πράττειν τὰ περιττὰ* Galenus alibi *διαί-*  
*τη ἀκριβῆ* in eodem significato protulit, hoc est uictu ac cura-  
to, exquisitoq; nō de tenui intelligēs, sed ex delectu sumpto.

Linctus ex papauetis. ] Hanc compositionem etiam ho- *Diacodyon.*  
die officinæ uocant diacodyon. Dixit autem Paulus ex sapa,  
quia duplici modo fieri solet, scilicet ex sapa, & ex melle Quæ  
sapam recipit ad somnum conciliandum utilis est. Quæ uero  
mel, ad sputi reiectionem.

In quibus autem caput. ] Contrario supradictis modo af-  
fectos recenset Nam illi ob tussim ex defluxu capitis pulmo-  
nes infestantem dormire non possunt, eoq; diacodyon ex sa-  
pa assumēt, quod tenues humores incrasset. Hi autem quibus  
caput defluxionibus obnoxium non est, suffitu iuuabūtur. In  
sequenti sententia pro *παραγμαῖς*, legitur *παρακμαῖς*. Item  
pro *λ.* quod signat libram pone *γ.* quod notat drachmam.

Arnabo ] Recentiores quidam modo carnabum, modo  
carnabadium, alii zainabum, & zarnabadium. Odoramentis  
expetitur. Vide Paulum in septimo. Sunt qui Doronicum in  
officinis appellatum esse pronūcient. Non salicis folia, id esse  
putes, ut quidam grammatista hæsitabundus exponit.

## IN XLIII CAPVT.

Soporis noxii. ] Ita sum interpretatus dictiōē *καταφορᾶν*, *καταφορᾶν*  
quam si penitus introspicias, & ex etymo interpretari li- *βλ.*  
beat, impetus somni uehementioris merito dicetur, & inex-  
pugnabilis pene dormiendi necessitas, ut Celsi more loquar.  
Dixi autem, noxii, quia sopor etiam bonus est.

Lactis modo tepenti. ] Tantum ualet *γαλακτέδες*, quasi di *γαλακτε*  
cas, lactosa. Galenus multis in locis hac uoce utitur pro tepi- *δες*  
do. Non autem pro eo, cui lac sit admixtum:

PAVLI ÆGIN.

Bb

Si uero



Castigato  
græcum  
exemplar.

Si uero morbus.] In codice græco deest particula δὲ, ac legendum est ἐπιμενήσῃς δὲ πῆς νοσῇ. Noua. n. sententia incipit, quod miror Orosiū & Basiliensem correctorē uoluisse prætereire, cū alibi ēt minora à me p̄termiſſa ceu capitalia clamitēt.

## IN XLIII. CAPVT.

Nonnullis etiam cum igneus sensus.] Hoc est, cum com-  
buri uidentur nimio calore febris, pulicaris herba, quam  
græci psyllium nominant, conducit.

Permulceriq;.] Græce est διαφλεαφκτέον, à διαφλεαφέν, quod Celsus latine dixit, corpus eius leuiter ex oleo ueteri permulceatur, &c hic autem manibus tantum permulceri debent, somni conciliandi gratia.

## IN XLV. CAPVT.

Olei uox.

νάδος.

Ex absinthio.] Hoc est, ut Galenus ait, in quo absinthii co-  
ma sit feruefacta. Siue aut oleum, siue unguentū, dicas, ni-  
hil refert. Quamquam Orosius olea in quæ etiam aromata  
coniecta sunt, unguenta dici nolit, contra ueterū sententiam.

Nardino.] In græco codice est νάδος, quod signat nardo:  
eadem nimirum locutione qua usus est Celsus, & Scribonius  
Largus aliq; ueteres. Celsus lib. 3. ungi rosa debet, pro rosa-  
ceo. Ut in compositione 210 apud Largum. Idem rosa dilu-  
tum explet concava uulnera, pro rosaceo dilutum.

Emendate  
codicem  
græcum.

Sin autem inflammatorium quiddam.] Codex græcus ha-  
bet φλεγματώδης τὸ pro φλεγματώδεις τι, quod omnes casti-  
gatores Pauli, ceu momenti exigui neglexerunt.

## IN XLVI. CAPVT.

ἀγών.

Rigori.] Medici hodie dictione rigoris uruntur pro græca  
ρίγος quamquam non ita latine Celsus Hippocratis sen-  
tentiam aliquando uertens pro ρίγος horrorem in reddit. Verū  
nos φρίκην horrorem uocamus Inopia itaq; linguæ, ρίγος fe-  
brium, quasi ad uerbum, rigorem interpretamur.

Concertationē naturæ.] In græco codice est: οὐδ' ἐκλύειν  
τῶν ἀγῶνα. Quod Paulus ἀγῶνα dixit, ego concertationē na-  
turæ exposui. Nam in crisi natura certat cū morbo. Si eo fit su-  
perior, bona crisis est: si morbus uicerit, mala. Quamobrē si  
natuta se accingit ad ea quæ offendunt, expellēda, ut in rigo-  
re accidit, moliendū nihil est. Dixi igitur cōcertationē natu-  
ræ dissoluere, uel certamē uel pugnā quā cū morbo habet. Na-  
turæ quidē in græco non est, sed sn̄iæ claritatis gratia addidi.

IN



**A**diutareq; calfactu ] Recenset hic Paulus, quibus modis sudor per crism erumpens, etiam adiuuari debeat, nempe foru mediocri, quiete calido clystere, adeoq; in quiete manere ægros uult, ut sudorem non abstergant.

Recreare. ] Græce est ἀναψύχειν, quod uerbum duo significat, refrigerare, & recreare, seu reficere. Helychius grammaticus dicit idē esse quod ξιπίζειν, euentilare, & ἀναψύχειν interpretatur παρὰ θυμιάειν, hoc est solatium Cōgruit magis id hoc in loco, nempe uires sudorū copia lassas, oppressasq; recreare.

Tenui uelamine. ] περιβόλαιον λεπτόν in græco codice est. Celsus ait: Veste leui, madida, interpretatus sum ἐμβεβεγμένον ab ἐμβρέχω quod est irrigo, madefacio.

Ambæ siquidem. ] Ad calcem & floces uini referuntur. In græco neutrum genus est. ἀμφω ἀναβαλόμενα. ambo ad fouendum applicata, genuino corporis tempore siccantur: siccata meatus per quos sudores erumpunt, obstruuntur.

Qui per ualidam expressionem. ] Græce est, κατ' ἐκέλιψιν, quæ sit natura quasi necessitate quadam oppressa. In doloribus uehementissimis & anima sæpe deficit & sudores frigidi erumpunt. Hi dicuntur fieri per expressionem, ualidam addidi, significantiæ gratia: Quidam pro ἐκέλιψιν, legunt ἑλλείψιν, quod est animi defectum, quod non male etiam hic quadrare potest. Eruditi iudicent.

**H**ypoglottia. ] Formulæ quædā medicamentorū sunt, quæ in tussī, thoracis arteriæq. uiciis assumuntur. Hodie bechicas officinæ, & penidias appellant. Fiunt autē potissimum ex radice dulci, tragacantho, terebinthina, zaccaro, aliisq; ad rē propositā cōgruis. Ceterū Galenus uocat ὑπογλωσσίδας.

Lana sulphure imbuta. ] Græce est ἔριον τετραοισμένον, ad uerbum sonat: Lana sulphurata. Orosius corripienti studio potius quàm ueritatis, uertendum clamat, sulphure suffita. Quomodo autem lanæ suffiatur, nusquam me legisse fateor, homines suffiri sulphure in tussī lego Lanam autem ut pice, aut alio pingui, ita sulphure imbuī. Imbutas sic applicari. Nā suffitus parum in lana proficit.

Pingue ] Græcus codex habet καὶ ἡ λιπὴς, pro ἡ λιπὴς, accipimus pro pinguitudine, aut oleo, aut quacunq; re pingui.



Permulceri.] Hoc est, molliter cōtrectare, supra interpretatus sum διαφιλῶφᾶν permulcere, ex Celsi more.

## IN XLIX. CAPVT.

Sternutamenta.] Vide sextum Oribasii, quomodo autem siant: Galenus tertio de symptomatū causis explicat. Hic autem Paulus remedia persequitur sternutationis, quæ in febribus molesta esse solet.

λάγων.  
κενῶν.  
Corrige  
græcum  
codicem.  
Castigato  
codicem.

Ilium intentio.] Græci λαγῶνα & κενῶνα eam partē esse uolunt, quæ latinis dicitur, Iliā. Quidam uero male ὑποχόνδρια uertūt Iliā, in bonis autoribus parum uersati. In codice impresso est ἐντασις lege ἐντασις, Neglexerunt Aristarchi.

Summatum partium.] Hic Orosius debet exemplari suo. Nam omnia quæ mihi uidere contigit habent, τῶν ἀκρῶν μῶν, quod est, summorum, muscutorum pro τῶν ἀκρῶν μερῶν.

Mollis contrectatio.] Quod ante dixi permulcere, hoc molliter contrectare interpreter. Nam idem esse puto. Græca uox est, διαφιλᾶφῆσις.

Spongiæ ex mari uacuæ.] Quidam in codice græco legūt pro κενῶν, quod est uacuæ, καινοί, hoc est, recentes. Vtrunq; instituto conuenit: quam tu malis lectionem sequere.

## IN L. CAPVT.

Vel attemperatos.] Cibi fastidium aliās ex humore pituitoso, aliās ex bilioso nasci solet Si pituita in stomacho redundat, uomitu educenda est, si bilis supernatat, deorsum euocanda. Vbi uero totum corpus purgare uoles aliter faciendum docet Hippocrates. Quod si in primo uenis crudi humores semicocti; habeantur, dissecandi, cōcoquēdi; quod Hippocrates πεπασμόν, quasi mutationē. Huius autē seculi medici perperam digestionē appellant. Si in extremis uenis & corporis habitu sint infixi, relaxandi ueniūt. At biliosi humores, & melancholici, q̄ ultra sanguinis terminū processerūt, caloris uiolentia expelli prorsus debēt: Si in stomacho nausēā excitent per inferiora: si in toto corpore biliosi, quod æstare potissimū accipit, uomitu purgari debent: melancholicus autē infra semper Porro cum iam educūtur, necesse est eos infrenare, coercere; ne transitu partes afficiant. Item meliores hoc agēdo in locum restituere Quā rationē, seu potius, ut Galenus ait, cacochymia curationē græci ἐπίκρασιν nominant. Verba Galeni & Methodi in hunc modū habēt: χρὴ γὰρ δηλονότι κατὰ τὰς

πεπασ-  
μός.  
Nota.

ἐπίκρα-  
σις.



τὰς τοιαύτας ἐναντιώσεως τῶν ἐνδύσεων κατὰ βραχὺ μὲν ἐκκί-  
νῃ τὸ μοχθηρὸν, κατὰ βραχὺ δ' αὐτ' αὐτῷ το χρηστὸν ἐντιθέ-  
ναι. καλεῖται δ' ἐπίκραςις ὑπὸ τῶν ἰατρῶν, ἡ τοιαύτη θερ-  
πια τῆς κακοχυμίας. Paulus igitur recte etiā dixit: ἢ τοι ἀπορ-  
ξίψαντα ἐκκρίνειν, ἢ ἐπικεράσαιτα, βελτίους ἐργάζεται. Quod  
est: Vel abstergēdo excernūt, uel attēperando, cōbēcēdo, miti-  
gando furorē illorū, obtundendoq; meliores in locum relli-  
tuent. Hippocrates libro de ratione uictus in morbis acutis  
materiā eorū quæ attēperāre possunt, cōmemorat. Galenus  
autē eius interpretēs paulo ἀpertius in hunc modū disserit: de  
torminibus orationē instituens: σκοπὸς δὲ εἶναι αὐτοῖς, τὸ  
μέντοι καθάραι τῆς κακοχυμίας, τὸ δ' ἐπικεράσαι, τὸ δ' ἐπιξη-  
ράναι, τὸ δ' ἐμφύξαι. τὸ μὲν ἔν γάλα τὸ δύνειν, καθάριον δύνω-  
ται, καὶ ἐπικεραύναι, τὸ δὲ τῷ λίνῳ σπέρμα ξηραίνειν τε καὶ  
φύχειν, τὰ δ' ἐκ τῶν πυρᾶν ἄλφιστα, τὸ ἐπικεραφικὸν ἔχει κα-  
λῶς δ' αὐτοῖς ἀνάμεικται, καὶ τακρίθινα, ξηραίνοντα τε καὶ  
φύχοντα. οἱ δὲ Αἰγύπτιοι κύαμοι μετρίως φύξαι δύνανται.  
τὰ δὲ ὡὰ καὶ ἡ σέμιδαλις, καὶ ὁ χόνδρος παχύχυμα καὶ εὐχυ-  
μα, καὶ ἐπικεραφικά. Hoc est: Eo ipsi spectāt, ut uiciosum hu-  
morem partim purgent, partim attēperent, partim desiccant,  
partim refrigerent. Lac itaq; asininum purgare potest, & attē-  
perare. Lini uero semē siccare, & refrigerare. Triticea polēta,  
attēperandi facultatē obtinet. Recte ipsis & ordeacea admix-  
ta est, quæ & siccant, & refrigerant Aegyptiæ autē fabæ, medio-  
criter refrigerare potest. Oua similago, & chondrus crassi bo-  
nīq; succi, & attēperatoria existunt, &c. Vides igitur, quō Ga-  
lenus utatur dictionibus ἐπικεράσαι, & ἐπικτεραύναι. Item  
ἐπικτεραφικόν, & ἐπικραφικά. Galenus 12. Methodi de uinis  
fuluis agens scribit ἐπικτεραφικὸν δ' εἰσὶ καὶ θερπτικόν, quod  
postea interpretatur τρέφει δὲ μάλλον, καὶ κακοχυμίας ἐπα-  
νορθῶνται. Hoc est: Nutriunt magis, & prauitatem humo-  
ris corrigunt, emendantq;. Linacer superiorē sententiā nescio  
quo modo exponit, certe dictionis uim ignorasse uidetur. Nā  
quid sibi uult, præterea mistibilia sunt, & nutriētia? Dicere. n-  
oportebat, attēperatoria aut sunt (intellige malorū humorū,  
bonos in locū reponēdo, & qui nondū longius terminos cō-  
coctionis excesserūt, reducēdo, & crimoniam ipsorū obtundēdo.)  
Ne aut putes bilē absolutā, aut flauā, aut nigrā meliorē reddi  
posse: imo nec falsam pituitā, eoq; nemo doctus medicus hos

Aduerte.



Castigato  
exemplar  
græcum.  
Restitue  
exemplar.  
Emendato  
græca.

humores alterandos, cōcoquendosq; uel ut barbari dicunt, digerendos dixerit Sed purgādos potius, meatibus per quos trālibūt, adaperitis, medicamētis in id efficacibus. Ne aut acrimonia sua & rosione infestēt, ut in torminibus docuit Hipp. cibi & potus ἐπικτηρατικοὶ assumūtur, quibus potes etiā syropos quosdā mitigatorios annumerare. Cæterū male in codicibus græcis πορρίφαινα, qđ est, proiiciētes, pro ἀπορρίφαινα, qđ signat abstergētes Præterierūt id Orosius, & Gemus & alii.

Potissima uero polēta ] Codices græci oēs male cōgruā habent lectionē hāc, περατέον συνακτάσαι τὴν ὀρεξιν, μάλιτα δὲ ἀλφίτων, ῥιπάλιτα δὲ ἀλφίτων, aut μάλιτα δὲ δίαλφίτων.

Non tamen ab iis multum ] Hic quoq; deprauatus est codex græcus. Habet. n. μὴ πόρρω μὲν τοι τοῖς πυρετῶν χρεῖς, pro μὴ πόρρω μὲν τοι τῆς τῶν πυρετῶν χρεῖας.

## IN LI. CAPVT.

SI uero in grandem famem. ] Apud græcos una dictio grandem famem signat composita ex βῆς & λιμός. Quicquid enim grande illi nolunt significare in una dictione per ἵππος, & βῆς, quod est apud nos si uerbum ex uerbo interpreteris, equus & bos, explicant, ut ἵππος ἐλινεν, βέλμος, &c. Cæterum eadem fere habes remedia bulimi apud Gal. lib. 8. de compositione medicamentorum secundum locos. In sequētib; uertit ὀξύτης pro sœuitia furore, ad uerbum sonat acumine.

## IN LII. CAPVT.

QVONIAM igitur à pituita. ] Galenus de symptomatum causis lib. i. scriptum habet. Canina appetentia fit, cū uel ob acidi humoris uicium uētricus infestatur, uel ubi totum corpus immodice digestum dissipatumq; , continua nutritione indiget, &c. Cæterum in Aphorismorū libri secūdi commentario, cap. 20. curationē hanc ad uerbū persequitur.

Aduerte,

Incidant, abstergeantq; ] Superius & hic male in codice Græco ῥίπτουσιν, pro ῥύπουσι habetur, unius literæ mutatione: quod ceu nullius momenti castigatores Pauli neglexerunt, Quamquam ad sensus puritatem non parum faciat. Quippe diuersa sunt, proiicere, & abstergere.

Pinguia. ] Galenus addit, καὶ ὡς ἂν ἐπικτις, ἐλαιώδη τῶν ἐδεσμάτων, hoc est, & ut ita dicam oleosa esculenta.

## IN LIII. CAPVT.

PARTICULARUM per quas ] Hæ sunt, stomachus, os uentri-  
culi,



culi, ipse uentriculus. Galenus commentario quarto in opus de ratione uictus in morbis acutis, partes commemorat, quæ aliquando sitim procreare soleant. Idq; in hunc modū: πάντων μὲν πρῶτον καὶ μέλιστα τὸ τόμα τῆς γαστρός, ἐφεξῆς δὲ ἡ γαστήρ, καὶ μετὰ ταύτην ὁ τόμαχος, εἴτα πνεύμων, εἴτα νῆστις.

Prauas autem potiones ] Codex Græcus deprauatus est. Emendatur  
codex. Habet enim μοχθηρῶν δ' ἐπιθυμῆσι ποιότητων. Hoc est, prauas aut appetunt qualitates, pro πομάτων, quo edst, potiones. Orosius cum aliis Aristarchis negligenter hoc præterit.

Cæterū siti pressos ] Hæc apud Gal. lib. i. de symptomatū causis inuenies. Habet autem ille paulo ampliora in istū modum: ἀπαύτοις δὲ δίψῃσι καταληφθέντες, ἐξ ὧν περ καὶ ἀποθανόντας οἶδα, τύντε καταφαγόντα τὴν ἐχίδνα (ἢν δ' ἂν ἴσῃς) καὶ τὸς ἐκ τῆ οἴνου πίνοντας ἐκ περιτάσεως περιτὰς, ἐν ᾧ τοῦτον τὴν θήριον ἐναποτεθήκη, καὶ τὸν ἐξ οἴνου παλαιῶ. μεθυθέντα, καὶ τὸν ἀποκαρτερεῖν ἀποβελήσαντα, καὶ τὸς ἐν τῷ πλῶν ἐπιλιπόντος τῆ ὕδατος ὧν ὅσοι τῆς θαλάσσης ἐτόλμησάντι πιῖν ἀμετροτεροῦτε διψήσαντες τῶν ἄλλων, καὶ τινες μὲν αὐτῶν ὑπαχθέντες τὴν γαστέρα, καὶ διχθέντες σφοδρῶν ὀξύτερον ἢ κατὰ τὴν λείπῃς ἀπέθανον, &c. Vide igitur an ex hac lectione, Pauli codicem in quibusdam uelis castigare. Ego sane saluo aliorū iudicio, legerē δίψῃσι δ' ἀπαύτοις καταληφθέντες, ἐξ ὧν περ καὶ ἀποθανόντας οἶδα τῶν φαγόντες ἐχίδνας διψάδας, καὶ τὸς οἶνον παλαιῶ μεθυθέντας, καὶ τὸς ἐν τῷ, &c.

Rosaceo cum impetu salientis modo ] Græce est μετὰ κρηνισμῶ γινόμενη, hoc est: Cum crunismo facta: à uerbo κρηνίζειν, quod est, cum impetu decidere Gal. lib. 8. Methodi utitur uerbo κατακρηνίζειν in hac sententiā: εἰ δ' ὕγρον ἐν τῷ προσφερόμενον, ἐξ ὑψηλῆς ἀτον βάλλοντες, καὶ οἶον κατακρηνίζοντες id est: Sin autem id quod adfertur, liquidum fuerit, ex altiore loco deicientes, & in salientis modum fundentes. Ibidē usurpat dictionē κρουνός. ἐτι δὲ μάλλον εἰ κρηνός ὕδατος ψυχρῶ κατακρηνίζει τῆ ἀγχείου φύχει τὸ ὑγρόν. Hoc est: Præterea magis humore refrigerat, si defiliens aqua frigida uas illidat, &c. Cæterum superfundimus aliquando liquores, ut in hoc symptomate, syncipiti sublata in altū manu, p. med. ocré lanæ hapsū.

Iam dilutum. ] Sic uocamus humorem in quo aliquid maderit, aut maceratū per horas aliquot sit. Recētiore medici infusionē appellāt, ut infusionē rheubarbari, agarici, cotoneo-



ἀπόβγει-  
μα  
rum Græci ἀπό βγειμα dicunt.

## IM LIIII. CAPVT

**M**elius autem facit myxion.] Myxion uel myxa, uel my-  
schion fructus est pruno similis. Galenus sericon appellat  
forte hodie officinis dicitur sebesten.

Salem indicum.] Hic sal nimirum est saccharū quod nos  
candū appellamus, natura non arte, proueniens quanquā ho-  
die Venetiis & alibi artificio naturam imitentur. Auicenna  
interpretatus hunc locum Pauli, saccharum tabarzer ponit.

## IN LV. CAPVT.

Textus  
græcus ui-  
tatus.

**I**mbibito.] Similia apud Galenum lib 7. medēdi Methodi.  
Eadem uero apud Oribasium sexto. Sed perperā hic in Co-  
dice impresso legitur ἀναπέμπομενον, quod est suriūm missō,  
pro ἀναπεπομένε quod ualet imbibito ab ἀναπίνομαι, inde  
ἀναπέπωμαι. Sic habet Galenus loco supra citato, ἐνίστε in-  
quiens, δὲ εἰς αὐτὰς τὰς χιτῶνας, ὥς ἂν ἐπιποιτῇ, ἀναπεπομένον  
ἢ ἐμπεπλασμένον. Hoc est. Nonnunquam uero in ipsas tuni-  
cas imbibitus, ut ita dicam, uel impactus.

## IN LVIII. CAPVT.

**P**orrò ubi concoctrix facultas.] Ex hac sententia opinio  
quorundam de remediis spinæ applicandis in uētriculi af-  
fectibus, satis refellitur, etsi euidentia ipsa quæ in confectioni-  
bus apparet, quid in hac re faciendum sit, aperte doceat.

Vel manna uino macerata.] Non in dandi casu, legenda  
sententia est, sed nominandi. Corrige igitur codicem græcū  
ita. ἢ μαίην ἐν οἶνῳ φερασθῆσα.

Agathium.] Pastillus est, qui retinendi suppressendiq; po-  
testatem habet. Vide septimum.

## IN LX. CAPVT.

Typhe.

**T**yphe.] Specie filigni nō dissimilis, simplici culmo, grano  
multiplici, tunica uelato, atq; leuissimo, radice numero-  
sa, largior eius in Asia prouētus regione, ut uult Galenus, quæ  
super Pergamum sita est. Hanc agricolæ, quod triticum in op-  
pida conuehi soleat, ad panificium usurpant. Huiusmodi igitur  
arista, hoc est, spicæ apice narium foramina pungere inte-  
rim præcipit Paulus, ut irritatus sanguis largius profluat.

## FINIS LIBRI SECVNDI

## COMMENTARIORVM.



# COMMENTARIORVM IN PAVLVM AEGIN.

## LIBER TERTIVS.

### CAPVT I.



**T**ERTIVS hic liber de omnibus totius corporis affectibus particulatim agit: & singula unicuique particulæ cōuenientia remedia cōplectitur, Primum autē cuiusque morbi curandi Methodū artificiosam exponit, quæ ex causarū notitia, partis tēperamento ægrique natura, & aliis indicationibus sumitur. Deinde sic ad ea ueniendum auxilia præcipit, quæ ipsis locis affectis induci debeant, Græci τοπικά nominant. Quod Galenus lib. 14. Methodi pulcherrime docet. Cæterum hic liber Pauli partim ex Galeni opere de compositione medicamentorum secundum locos, partim ex octauo Oribasij trāscriptus est: admixtis interim remediis quæ Paulus ipse usu comprobavit.

### IN I. CAPVT.

**Q**uemadmodum stirpium.] Ex 1 cap Galeni de cōpositione medicamentorū secundū locos ad uerbū hæc sunt transcripta. Iam 14. Methodi pene eadē habentur. ascribam autē uerba Galeni, maioris perspicuitatis gratia: ἐδείχθη δὲ ὅτι τῶν διαπνεομένων χυμῶν ὅσον ἰλυῶδες ἐστὶν ἐξ ἀρχῆς τε ἐλθέως, τὰς τρίχας ἐγενήσῃ, καὶ τὴν λόγῳ καθ' ὑπόφρυσιν αὐξάνει. τὰ δ' οὐκ ὅτι αὐτοῖς ἀπόλλυται παύτα πασιν ἢ μοχθηρὸν γεννηθῇ, φθαρείσθαι τὰς τρίχας ἀσχημαῖον ἐστὶ. καὶ γὰρ οὐκ αὖτε φυτόν

Pilorum origo de nutrimento.



τὰ φυτὰ κατὰ διππὴν αἰτίαν ἀπώλλυται, ποτὲ μὲν ἀπορέντα  
 τῆς τρεφούσης ὑγρότητος, ἐπὶ δ' ὅτι ἐκ οἰκείας χρώμενα. τελέως  
 μὲν ἀπολλυμένοι τῇ τρέφοντος χυμῷ τὰς τρύχας ἢ φαλάκρω-  
 σις γίνεται, μοχθηρὴ δ' ἀποτελεσθέντος, αἰτ' ὁφιάσις καλεῖται  
 ναι, καὶ αἱ ἀλώπεκες. Hoc est, ut rudiores, intelligant: Ostēsum  
 uero est ex humoribus, qui per latētes meatus perspirant, li-  
 mosum quicquid est, id, & statim ab initio pilos producere, &  
 reliquo sequenti tempore, ueluti materiā suggerēdo augere.  
 Hoc igitur, cum uel in totū perit, uel prauū generatū fuerit,  
 pilos corrumpi necesse est. Quandoquidē etiā stirpes duplici  
 ex causa pereunt, interim sanē humiditate quæ ipsas nutrit,  
 destitutę, interim nō propria utētes. Vbi humor pilos nutriēs  
 prorsus interiit, caluicium prouenit. Cum autē uiciosus est red-  
 ditus, & opiafes, & alopecię excitātur, &c. Celsus hæc duo po-  
 strema uicia cōi uocabulo Areas appellat, quod nimirū lo-  
 ca pilis uacua eos in capite repræsentēt. Oroscius reprehēdit  
 hic me qđ Celsum imitatus dixerim de areis, hoc est alopecia  
 & opiafi. Recte facit literator, interpretādi muneris imperitus.

Caluiciū.  
 Ophiafis.  
 Alopecia.  
 Area.

Nonnullæ uero alienis.] Græce est ἀλλοτρίοις ἐαυτῶν, qđ  
 ad uerbum sonat, succis alienis à seipsis. Galenus paulo clarius  
 dixit: ὑγρῶς ἀλλοτρίοις τῆς ἐαυτῶν φύσεως, quod est Humori-  
 bus alienis à sua ipsorum natura Atq; ita nos reddidimus, po-  
 tius indicantes esse, dictiōnē sniæ addere, quàm rē obscurare.  
 Quemadmodum igitur quædā alimēta sunt homini, quædā  
 sturno propria, ita herbæ quoq; idoneum, familiaremq; natu-  
 ræ suæ humorem quo alantur, attrahunt, alienum respuunt.

Castigatur  
 codex Græ-  
 cus.

Inter se.] Deprauatus codex est Græcus, tū Venetiis, tum  
 in Germania impressus. Habet enim διαφέρουσα τῶν ἄλλων,  
 pro διαφέρουσα τῶν ἀλλήλων. Rursus hic Galenus apertius  
 dixit: ὀνόματα δ' ἐσχικῶσαι διαφέροντα παρὰ τὸ σχῆμα Hoc  
 est: Nomina autem secundum figuram diuersa habentes.

Græcus  
 mutilus in  
 sauratur.

Quoniam in Ophiafi.] Codex Græcus hic mutilus est.  
 Quid n. sibi uult ὅτι παραπλήσιον ὀφεί το βεβλαμμένον φαί-  
 νεται μόριον, nisi addat in quo affectu. Addendū igitur necessa-  
 rio ex Galeno nō nihil est, legēdumq; in Paulo ὅτι κατὰ τὰς  
 ὀφιάσις παραπλήσιον, &c. Oroscius & Gemus. nō animad-  
 uerterūt, tam bonis alioquin ut ipsi gloriānt, exēplaribus usi.

Oroscius.

Deinde loco uitiato.] Hoc ubiq; obseruandum præcipit  
 Galenus, ut semper totius corporis uacuatio præcedat, nisi  
 admodum



admodum exiguus sit affectus. Dixi loco uiciato auxilia inducimus, pro τοῖς τοπικοῖς ἀποθεραπεύσαμεν βοηθήμασι, quod est, localibus persanabimus remediis.

Si igitur color ad nigrius. ] Hoc est, si nigrior, albidiorue conspiciatur. Nam quod Paulus ἡ μὲν ἔν ἐπὶ τὸ μελάντερον ἢ λευκότερον ἢ χροῖα παρατραπέν dixit, Galenus in methodo in hunc modum: ἡ μὲν γὰρ λευκότερα τῶ κατὰ φύσιν, καὶ ἡ μελανότερα. Quod est, si albidior quam pro naturę habitu sit, & si nigrior.

Antidoto Hiera. ] Intellige, hiera diacolocynthidos, cuius descriptionē habes lib. 7. Pauli Archigeni ascriptam. Scribonius autem Largus eandem pene ad uerbū habet. Officinę uocāt Hieram cōpositam Galeni: uerum in multis adulteratam. Quę uero ex aloe, & aliis sex rebus, nēpe cinamomo, xylobalsamo, asaro, spica nardi, croco, & chiamastiche, cōstat, simplex dicitur. Et hęc in officinis, non parum ab illa Galeni discrepat. Primum sane pręter medicamenta quę ab illo numerantur, duo insuper adiecta habet, puta xiloaloen, & cassiā, unū supposititiū carpobalsamum, loco xylobalsami. Deinde pondera etiam diuersa continet. Nam omniū partes equales habet. Galeni autem hiera, aloes cētum, aut cum pręstatiore fieri cupit, aloes drach. nonaginta, aut etiā octuaginta recipit, quorū uero sex: ubi de capite sollicitudo est, croci tm̄ quinq;.

Hiera dia-  
colocyn-  
thoidos,

Cataporia ex aloe ] Hęc recipiunt cucurbitę syluestres. quam colocynthida uocant, partem unam aloes, & scammoni singulorum partes duas. Galenus hic absinthii succi partē unam admiscere solebat: antea quoq; mastichen chiam, & bdellium, rediguntur in granula Ciceri similia. His fere respōdent Pilulę nostrę Cochię à Rasi descriptę.

Dein ad pręsidia. ] Cum iam purum ex purgatione corpus fuerit, humor qui in cute continetur medicamentis digerentibus discuti debet: diligentia adhibita, ne adeo calida, acriq; admoueantur, ut cutis exulceretur. Ad hęc ne nimiū siccant, prouidendum est nam talibus non tantum uiciatus, sed etiam utilis qui confluit, absumitur. Gręce erat ἐπὶ τὴν τοπικὴν χωρὶν ἐπὶ μέλειαν quod ad uerbum sonat, ad locale ueniendum curationem, sed Latinius est ut reddidi.

Methodus  
curationis.

Primę asperitatis. ] Locutio est Varronica pro asperrimo. Gręce erat τὸ τραχύτατον.

Aliud



Additū est  
hic ut cu-  
riosis fiat  
satis.

Aliud experientia prob.] Hoc medicamentum in Codice Ioannis Lascaris manu scripto, non habetur: nec compositio plane colaret, ac peregrina plane uidetur.

Vnciæ octo.] Habebatur in Græco & cum superscripto o sicut alia pleraq; absurda. Miror Oroscium in tanta ueterum exemplariorum copia hoc nō monuisse lectore, cum tamen in sequenti medicamento adnotet legendum μος προ κινος.

Euphorbiæ, thapsiæ, baccarū lauri.] Male in Codice Græco habetur δαφνίνον quod est laurim pro δαφνίδων ut Galenus habet. Nam postea mentio laurini fit. Præterea Galenus in eodem medicamento à Paulo ratione ponderū dissentit. Legit enim Euphorbij, thapsiæ, & baccarum lauri, singulorū drachmæ duæ, sulphuris uiui, hierati singulorum drachma: ceræ drachmæ sex, &c. Neglexerunt Aristarchi.

Oroscius  
& corre-  
ctor Basi-  
lex.  
Oroscius,  
& Gemu-  
sæus.

Nasturcii.] Impressus Codex tum Veneris, tum Basileæ habet καρδαμώμα. Sed Galenus & ipse sensus requirit καρδά- μος quod impetigines & lepras discutit, eade n̄ ui præditum qua sinapi. Nec hoc à castigatōribus animaduersum.

Recinum aut ueteris.] Paulo ante etiam deest particula disiunctiua in codice Græco, habet. n. κικίνης παλαίου ἐλαίου: cum legendum sit ex Galeno κικίνης ἢ παλαιῆς ἐλαίου. Nam si ricinum deest, etiam commune uetus oleum eadem præstare potest. Omiserunt correctores.

Leporum uentriculi quinque.] Ex Critone hæc sunt, citāte Galeno. Verum scriptura illius à Paulo uariat. Galeni codex habet κοιλίας ἕξ hoc est uentriculos sex. Paulus tantum habet πέντε. Vide utrum malis sequi.

His adiciantur.] Græci Codices omnes deprauati sunt hoc in loco. Nam habent, πρὸς τοῖς λάμβανε τὸ τρίτον, μυρσίνης, ἀκραιμόνων, ἀκακίας κάρπυ, &c. Quid quæso hinc colligi possit? Legendū igitur cū Galeno cēseo in eū modū: πρὸς τέττοις λάμβανε μυρσῶν, μυρσίνης ἀκραιμόνων, ἀκακίας καρπῶ, &c. Pondere non nihil apud Galenum uariant.

Quolibet oleo aromatis imbuto.] Sic interpretatus sum ὡς θέλεις ἢ ὅσµατι. Celsus dixisset, quolibet unguento. Nam Græca vox ὅσµα nihil aliud signat quā unguentum ex oleis succisū præparatum, cui ex aromatis iniectis, odor suauior, & gratia accesserit. Non autē sum ignarus ὅσµα apud alios quosdā aliter accipi, ut apud Plinium lib 13 cap. 1. ubi habet



habet in hunc modū: Ratio faciēdi duplex, succus & corpus. Ille olei fere generibus cōstat, hoc odorū, hac stymmata uocant, illa hedysmata, &c. In qua oratione plane à Galeno, cæterisq; Græcis dissentit. Nam olea ipsa quæ in unguentis sumuntur, hedysmata uidetur appellare: stymmata uero aromata. At Galeno & Dioscoridi stymmata, alia medicamēta aromatica, nempe quæ spissitudinem unguento cōcilient, appellantur, unde etiā spissamenta possis nūcupare, alia uero hedysmata, nimirū quæ gratiā odoris & suauitatē eis imprimant. Vide Dioscoridē in unguēto cinamomino, & Nardino aliisq; cum paucis. Galenus uoces Hippocraticas interpretans, hedysmata, inquit, pro ipsis aromatis apud Hippocratem accipi.

Anemonæ flos tritus ] Oroscius hic in græco codice legendum censet, ἀνεμώνης τὸ ἐντὸς μέλαι τρίψας μετ' ἐλαίου μυρσίν, hoc est: Anemonæ interior pars nigra, cū oleo myrreo trita, ut habetur apud Archigenem, citante Galeno lib. 1. de compositione medicamentorum secundū locos. Vide quid reprehendendi libido faciat. hunc locū adfert, de medicamentis nigrefacientibus, ab Archigene comprehensum, cū paulo superius singulare caput extet de fluidis capillis, de remediis illos conseruātibus, unde Paulus hanc orationem ad uerbum planē transcripsit. Habet enim Galenus ex sententia Heraclidis: ἀνεμώνης τὸ αἶθος τρίψας μετ' ἐλαίου, κατὰ χρίε. Iam flos ipse non aduersatur aliqua ex parte pilis promouendis.

Stercus caprillum. ] Apud Græcos proprie dicitur stercus caprillum σφύραθος, teste Galeno lib. 10. de simplici medicina, ubi habet συνεχέστατα μὲν ἐν χρώμετω ταῖς τῶν αἰγῶν κύπροις, (σφύραθσι δ' ἰδίως δνομάζονται.) Quod est: Frequentissime igitur caprarū stercorebus utimur, sphyrathi autem proprie nominantur. Oroscius nouus interpres, aliorum autē, si diis placet, corrector, filum caprillum exponit.

## IN II. CAPVT.

Cinere lixiui. ] Paulus lib. 7 lixiuium, quod græci κοιλία Lixiuiorū appellant, cineris lotionē esse dicit: enumeratq; eius differentias, Aliud. n. ex cinere, fici, caprifici, sarmentorū, & tithymallorū confit, quod uim absterforiam maxime, siccantemq; & exedentē propemodū obtinet. Si calx admisceatur, urentē, πρωτότακτος. Si calx admisceatur, urentē, πρωτότακτος dicitur, quasi primum lixiuiū. Interim ex sola fit calce. Iam quoddā ex sapone præparatur, unde σαπωναρική ρική. κοιλία



**κονία.** κονία puncupatur. At nomē κονίας plura signat, nēpe calcem ipsam, & lixiuium, cineremq;. Solet aut aliis adiungi, quæ ipsum, quæ de re intelligi debeat, interpretentur, utpote κονία τᾶκτη, pro lixiuio liquido, κονία ἄσβετος, pro calce uiua accipitur, cum ἄσβετος per se calcem non extinctam signet, ut τῆ ταυος ἄσβετος. Porro cū κονία ἄσβετου ponitur, hoc est duo substantiua alterum in nominatiuo, alterum in genitiuo, lixiuium calcis intelligendū uenit. Cæterū apud latinos scriptores lixiuii uox aliis atq; aliis dictionibus iuncta, diuersa etiā significat. Primum apud Varronem, Colnmellā, Plinium frequenter habetur Cineris lixiuiæ, cineris lixiuii, è cinere lixiuium, pro simplici lixiuio. Deinde apud Largum, unde Galenus aliquot medicamenta transcripsit, cōpositione. 228. Hæc terere oportet ex cinere lixiua. In sequenti rursus. Cum cinere lixiui diutius terere. Paulo post in altera: Teruntur ex cinere lixiua qua utuntur culinarii, sicut apud Paulum Aeginetam κονία πιλοποιητικὴ pro lixiuio quo pilearii utūtur. Legendū est in Codice græco per simplex i nō per κ, ut quidam faciūt, putantes à πύλου quod est lutum, πιλοποιητικὴν κονίαν appellari, ut sit lixiuiū quo figuli utūtur: cū tamen nullū eius ut mihi uidetur usu n habeāt. Quare locus in 6. Methodi deprauatus Linacrum interpretem decepit: aliosq; non paucos eum citantes. Verba græca sic habent, μηδὲν ἐν τῷ παραχεῖν μα φέρμακον ἔχων, ἡ τῆσα κονίαν τᾶκτην, ἑωρακώς ἐκ γαιτόνων τῆ κάμνοντος πιλοποιόν. In qua oratione πιλοποιόν legēdum est. Galenus aliquando κονίαν πιλοποιητικὴν, Aliquando ὕδωρ πιλοποιητικόν, pro eadem re exponit: ut lib. 6. de cōpositione medicamentorū secundū genera in hūc modū, ἄλλη ἡ δὲ τῆ ἀφρονέτρικῃ, ἡ ἐχρήσατο λάργος κυρὲ λίτραν ἃ τερμινθίνης λίτραν ἃ μάννης λίτραν ἃ, ἀφρονίσρου λίτραν ἃ ἐλαίου ξέτυν ἃ, ὕτος πιλοποιικῆ ξέτυν ἃ. μίσκος ὡμῆ Γο β. σιντήθει κατὰ τρόπον. Largus composuit. 2: 6. temporis iniuria non nihil mutilus est. Verba ipsius hæc sunt. Ceræ pondo libra, resinæ terebinthine pondo libra, nitri rubri pondo libra. Hæc teruntur ex cinere lixiua, postea cum olei cyathis sex liquefiunt ad ignē: quibus adiicitur thuris pollinis selibra. Vides hic ὕδωρ πιλοποιόν nihil aliud esse quàm cinerem lixiuium, aut lixiuiū, aut quomodocunq; uoles appellare. Atq; ita ego etiam antea sum interpretatus. Paulo post Galenus eodem in lib. τὰ ξηρὰ διαλύεται



λέται πιλοποιική hoc est arida dissoluuntur lixiua, ubi simpli-  
citer πιλοποιική dixit pro κοία πιλοποιική. Apud Plinium ci-  
neris uox simplex interim pro lixiuio usurpatur: nempe ex  
Dioscoride uertit dictionem κοίαν. Ruellius uir alioqui anti-  
quæ eruditionis etiam in postrema editione lib. 6. Dioscori-  
dis κοίαν πιλοποιικήν uertit cū luto suo lixiuiū, quā accō-  
modate iudicent alii, certe lutum nemo potui dabit, sed lixi-  
uium, lacte in uentre coagulato. At Orosius noster nō tan-  
tum sensu inaccommodato, quod de me dicit, sed longe om-  
nium absurdissime uertit calcē qua in tectoriis, dealbandisq;  
parietibus tectores utūtur. Vide optime lector quā sit qui-  
busdam maleferiatis hominibus innatum, alios reprehende-  
re in iis etiam quæ ipsi non intelligant. Iā pondus uiciatū in  
Codice græco non aduertit Aristarchus. Nam pro, < δ, qd  
est drachmæ quatuor, reponēdum δ hoc est sextarii quatuor:  
Idem itaq; est κοία πιλοποιική κοία πιλοποιήμη, ὥς πι-  
λοποιικήν, ὥς πιλοποιήκον & τὰ κτὴ τῶν πιλωταρίων.

Ruellius

Orosius

Græcus co-  
dex depre-  
uatus Oro-  
scij.

## IN III. CAPVT.

**P**Orriigo ] Sic interpretatus est celsus πυτυρίασιν. Plinius  
etiam surfures secundum græcæ dictionis etymologiam  
appellat: quēadmodum interpret Auicennæ. Vide Galenum  
lib. 1. de compositione medicamentorum secundum locos.

Resoluuntur. ] Græce est: ἐπὶ ὠπότης, quasi dicas, esto  
particularum eliquatio, uel particulæ eliquantur. Celsus re-  
soluuntur, quem imitatus sum Nam quædam ueluti squamu-  
læ surgunt eaq; acutæ, resoluuntur.

πυτυρία-  
σιν.

Creta sutoria. ] Sic interpretatur Largus μελαντηρίαν, cō-  
positione 218. Aluminis inqueiens rotundi, melanterius quæ  
creta sutoria dicitur, qua ligulæ calceorum denigrantur. Di-  
uersum est ab atramento sutorio si Dioscoridē consulas, quā  
quam Orosius exponat atramentum sutorium.

Melante-  
ria.

Orosius

Cerusæ singulorum drachmæ ] In græco codice habeba-  
tur Γο. β. quod est Vnciæ duodecim ego autem legendū cen-  
seo > β hoc est drachmæ duodecim. Itaq; etiam habet Ale-  
xander, & magis conuenit.

Viciatus  
codex græ-  
cus. ἰχῶ-  
ρες quid.

Ex quibus sanies. ] Græce est: ἀφ' ὧν ἰχῶρες ἀποτίκονται.  
Interpretes latini mirū in modū cruciantur, dum græcam uo-  
cem ἰχῶς explicare studēt, alii namq; imitantes Pliniū ubiq;  
sanem interpretātur, alii serosos humores & acres, tenuisq;  
quidam



Calidæ.  
Frigidæ.

Interpreta-  
tio ἰχόρος  
apud Ga-  
lenum.

Sanies.

quidam sanguinis cruorem, quidam ut Celsus ipsum sangui-  
nem Aristoteles ἰχώρ δὲ, inquit, ἐστὶν ἀπιπτον αἷμα, hoc est  
Ichor autem est sanguis crudus. Ex hac tanta uarietate, cer-  
ti aliquid adferre conabimur, quod in authoribus exponēdis  
tuto seq. possis. Itaq; ἰχώρες aquosæ, serosæq; & superius san-  
guinis humiditates existūt nūc acres & calidæ, nūc pituitosæ  
& frigidæ. Galenus lib 6. de sanitate tuēda ita scriptū reliquit.  
ὅταν μὲν γὰρ ἡ μὲν ὅλη τῆ σῶματος κρῶσις ἢ χολώδεα, τὰ  
δὲ κατὰ κοιλίαν ἀτονώτερα, σπρίζεσθαι δεῖται διὰ τροφῆς ἐν-  
τομάχου. μὴ γενομένου δὲ τούτου, καταρρέουσιν ἰχώρες εἰς ἀν-  
τήν, ὅς ἀσπρίσει τὸ σῶμα περὶ ττῆς. Paulo post, εἰάν δὲ μὴ μήνον  
ἢ κεφαλὴ θερμὸς ἰχώρας ἐπιπέμπει τοῖς κατὰ γαστέρα χωρίοις.  
Rursus de frigidis in hunc modum. ὅταν ἡ τοιοῦτο εἰς θερμὴν γα-  
στέρα καταρρέουσιν ἐκ τῆς κεφαλῆς οἱ ψυχρὸι καὶ φλεγματώδεις  
ἰχώρες, &c. Hippocrates lib 4. de ratione uictus in morbis acu-  
tis δρυμέας καὶ χολώδεας ἐχώρας dixit, quod Galenus inter-  
pretatur in eum modum, ὅτι δὲ ἰχώρας ὀνομάζει τὰς λεπτὰς  
ὕγρότητας, ἐνδηλον. Galenus autem lib. 2. de elementis: ὡς ἐν  
ἐν τῷ γάλακτι τὸ μὲν ἐστὶν ὕδρως, τὸ δὲ τυρός, οὕτω καὶ ἐν  
τῷ αἵματι τὸ μὲν οἶον ἰχώρ αἵματος ἀνάλογον ὀρῶ γάλακτος,  
τὸ δὲ οἶον ἔλυσ τις καὶ τρέξ, &c. Quādiu igitur in corpore ad-  
huc sunt ἰχώρες aquosæ serosæq; humiditates sanguinis, uel  
aquosi humores sanguinis latinè dici poterunt. Nam ipse Ga-  
lenus eosdem nunc pituitosos, nunc biliosos χύμους, quod est,  
humores nominat. Vbi uerò extra corpus aut uiuū, aut mor-  
tuum eruperint sanies appellari debent. Vt apud Galenū te-  
nue in ulceribus excrementum ἰχώρ, nobis sanies non incom-  
mode exponitur. Item in capitis uitis quæ ἰχώρας nuncupan-  
tur ἰχώρες sanies recte dicuntur. Plinius in assati iecoris saniem  
appellauit: humorem, qui abs iocinore, uel pulmone, uel alia  
parte dum affatur, emanat. Cæterum Paulus hoc in loco ap-  
posite dixit ἀπατίκονται, hoc est, eliquantur, sicut in corpori-  
bus mortuis per solis æstum fieri solet. Atq; hæc sanies crassa  
uiscoσάq; existit.

Medicamentum ex charta, xerion.] Huius descriptio est  
in septimo. Vocatur autem xerion quod aridum sit, & in pul-  
uere accommodatur.

Ad Achoras, recrementum.] In impresso codice habetur  
πρὸς ἰχώρ, ὅντας, hoc est, ad eos qui saniem habent, ego autem  
puio



puto legendum πρὸς ἀχωρεῖντας, hoc est: Ad eos qui Achoras experiuntur. Nam titulus idem habet, nēpe ad Achoras, non ad ἰχωρεῖς. Quanquam Oroscius ἰχωρεῖντας legendū cēseat.

## IN IIII. CAPVT.

**C**apitis dolor.] Hæc ex lib. 2. Galeni de cōpositione medicamentorum secundum locos transcripta sunt. Paulus Oroscius, autem σύμπτωμα dolorem esse refert, ubi Galenus διαφέρει ponit. Ille hunc superuenire intemperiei, hic affectum ipsum esse pronunciat. Rursus apud Galenum plures causæ commemorantur, una sane, simplex intemperies citra humores, altera, horum qualitas, tertia ipsorum copia, item obstructions humorum, vaporumq;. Alia adhuc, quarundam capitis partium imbecillitas, interim externa quædam causa, quam græci προκαταρκτικὴν nomināt: ego sæpe primariā interpretatus sum.

Nisi caliditati aut.] Deest particula in codice græco impresso. Tu igitur lege μετὰ θερμῆς ἢ ψύξεως, quod est, cum caliditate, aut frigiditate. Deerat enim ἢ.

Prodest fronti & temporibus.] Recte hoc dicit, nā per initia spinalis medulla dolorem non experitur, eoq; posteriora capitis ungi non debent.

Pastilli ad cap.] Alexander medicus hūc pastillum describit. Sed pondera nonnihil in quibusdam medicamentis uariāt. Cōmendat enim ad diuturnos dolores, omnibus aliis remediis nihil proficientibus. Vbi Paulus, ex somniferis aliquid, dicit, Alexander opii momentum iniijciendum præcipit.

At si frigus.] Ad uerbum ex Alexandro hæc ut superiora mutuatus est Paulus. Facies non cōcidit, hoc est, non macrior est reddita, ut ex calore, sed colorem decoremq; amisit, pallida effecta. Sic ἀχρεν, quod est sine colore, ex Celso interpretatus sum. Sanguis enim ob frigiditatem partes externas relinquens, intro refugit, unde pallor uecessario superuenit.

Præsertim si recrementa.] Hoc est, si ex crassis, glutinosiq; humoribus dolores sint excitati. Græca sunt ἡ καὶ παχύνεται γλισχρὰ περιπτώματα ἐν. Quæ uerba satis obscura in hunc modum intelligi debent, si humores crassi uiscosiq; in capite tenacius hærentes, dolorem excitarint.

Si biliosus humor.] Hæc & sequentia ex Galeni secundo de cōpositione medicamentorum secundum locos, nullo uerbo mutato, habentur. Cæterū ambo præcipiunt, tū Gale-

PAVLI AEGIN.

Cc nus,



Quomodo  
biliosus hu-  
mor præpa-  
rari debet.

nus, tum Paulus primū balneū tēperatū, inunctionē, cibū po-  
tumq; refrigerantē. Deinde offerūt medicamēta bilē educen-  
tia: qđ sane Alexāder medicus suo seculo clarissimus in hūc  
fere modū exponit Cōuenit igitur, ut superflua medicamen-  
tis bilē ducēdæ idoneis educātur. Verū ut hoc secundū rōnem  
feri possit, corpus antea præparari humectariq; debet, cibis tē-  
peratis, balneis & unctionibus. His. n. p̄ obe cōtēperatus, reso-  
lutus, & quasi imbecillior effectus humor, facilius expurgabit.

Ab sinthij diluto. ] Hoc est, ut officinæ uocāt infusione: tūc  
nim rū cū pauca bilis stomachi tunicas imbuerit, irrigarisq;

Vel aloe ] Scammonia nunquam exhiberi debet, nisi ma-  
xima bilis copia dolorē excitarit, aut alia uiolēta medicami-  
na. Picra autē prodest, ubi crassi aliqui succi bili sint permixti.

συμπά-  
θεια quid.

Lege con-  
fortij.  
Cōsensus.  
ἐκμοχλε-  
σαι.

Si caput confortii lege. ] Græce est συμπάσχει, hoc est cō-  
patitur. Cellus lege confortij, alij per consensum patitur, ex-  
ponūt συμπάθεια namq; est, cum pars aliqua corporis, alte-  
rius malo, uel confinij, uel connexus, uel cōmunicationis gra-  
tia condolefcit. Huic contraria ἰδιοπάθεια, uel πρωτοπάθεια cū  
per se, & suo uicio tantum afficitur: quem affectum primariū  
nominare licet, & ἰδιοπαθεῖν, primario affectu laborare.

Emolliemur ] Verbum græcum est ἐκμοχλεῖσαι quod de  
pertinaciter hærentibus proprie dicitur, ut de uiscosis, crassis-  
que humoribus partem aliquam tenaciter obsidētib; item  
de induratis affectibus, μοχλεῖσαι idem est quod κοινῆσαι, libro  
septimo ait: ἡ πρὸς τὸ μοχλεῖσαι ἰδιάθεςιν ἐσκληρωμένῃ, de  
medicamentis efficacioribus sermonem habent. Propterea  
mihi uisum est, emoliri uerbum non incōmode hic usurpare.

#### IN V. CAPVT.

παρά μόνι-  
μος.

V Terq; hic affectus. ] Ad uerbum ē Galeni secundo de cō-  
positione trāscripta sunt, nisi quod pro hac dictione, per-  
manens, Paulus παρά μόνιμος, Galenus χρόνιος καὶ δύσλιτος,  
hoc est, diuturnus, & solutu cōtumax, habeat. Celsus acutum  
& pestiferum morbum appellat κεφαλαίαν.

Hiera quam ex acueris. ] Scammonio, aut ueratro adiecto  
hiera uehementior redditur. Atq; id περ ὀξύνακτας intel ligi-  
tur, Nam ὀξύεις idem est quod acutum reddere, intendere, ue-  
hementiorem efficere.

Vnguenti irini ] Ad uerbum habetur hoc in Alexandro.  
Apud Galenū uariat nonnihil hoc modo. Vnguenti Irini ex-  
pressionis,



pressionis, castorei, singulorū pars una, baccarū lauri pars una  
uiticis seminis pars una, rosarū ficcarū, pars una, rutæ summi-  
tatum partes quatuor. Aceto resoluta excipiuntur cerato, &c.

Dum intabescerent. ] Sic reddidi ἕως τὰ κεράσια, Celsum  
imitatus Oroscius improprie usq; ad eliquationē dici iubet.

Partem affectam irrorabit. ] Lege in græco κατήκει pro κα-  
τέωνι, quod est, κατέβρεχε κατηντλει, superfundebat, asperge-  
bat non inspergebat ut uult Oroscius.

Oroscius.

καταιο-

νείν.

Oroscius.

Dropbx ] Huius descriptionē habes in septimo Pauli ad  
finem, ubi etiam sinapisimus exponitur. Hæc sunt medicamē-  
ta noxios humores in summam cutē euocantia, μετάσσυγκι-  
τικά græci nominant. Sic etiam Celsus uerbum hac uidetur  
interpretari, ubi summam cutem, inquit, relaxari, euocari-  
que corruptū humorem, & habitū corporis mutari expedit.

μετασυγ-  
κιστικά.

Malagmate, quia liquidum est parygron ] Galenus lib. 7.  
de compositione medicamentorum secundum genera, inter  
malactica ponit, quod recipit adipem suillum curatum, cerā,  
& argenti spumam. Eoq; merito interpretatus sum dictionē,  
contra opinionem Oroscij. Male est in impressu παύγρω.

Sani. ] Lege in codice græco ὡς μετὰ λειψὸν ὑγιᾶς γίνε-  
σθαι παντελῶς τοὺς κάμνοντας, ut habet Galenus libro secun-  
do iam sæpius citato, ad calcem.

Corrigen-  
dus codex  
græcus.

Apophlegmatismus. ] Nunc uerto medicamentum, quod  
pituam per os educat, nunc quod saluam moueat. Ut hoc in  
loco, Celsum imitatus in capite de Cephalæa, cap. 4. Cæterū  
in græco codice habetur το.β. quod est, uncia 14. ego puto  
β. legendum, sicut interpretatus sum.

Nota.

## IN VI. CAPVT

AT quæ mentis alienatio. ] Quia multa in hoc caput uo-  
culæ incidunt, idem propemodum significantes, non abs-  
re fuerit, eas curiosius in utraq; lingua distinguere. Mētis igitur  
alienatio uerti pro græca dictione παρακοπή. Nam in fe-  
bris uehementis statu, ut ait Galenus, accidit ægros παρακό-  
ψαν, παραχθῆναι, παραληρῶσαι, & παραφρονῆσαι, quæ latini  
exponunt, mente alienari, mente non cōstare, aliena loqui, de-  
lire & desipere. Si autem hoc continuè accidat, phrenitis di-  
citur. At si in statu demētia superueniat in declinatione au-  
tem cesset, delirium, non phrenitis est appellanda. Celsus eā-  
dem ponit distinctionem libro. 3. cap. 18. Phrenitis, inquit,

παρακό-

ψαι

παραχθῆ-

ναι.

παραφρο-

νῆσαι.

Phrenitis.

Dementia.

Delirium



tum demum est, cum continua dementia esse incipit.

Læmæ.  
Orosius.

Vel læmis, hoc est. ] Orosius male exponit λημώντας, id est lippientes. Non enim Læmæ lippitudinem signant alioqui omnes quibus Læmæ in oculis innatāt, ut hectica uel potius marasmo cōfecti, lippitudine laborarēt, supra dixi Pliniū dictionem græcam usurpare. Celsus pituitam interpretatur.

Coma.

Coma ] Galenus commētario in primum τῶν πρὸς ῥῆτι κῶν refert, Coma & Cataphoram apud Hippocratem idē esse. Sed Coma duplex inuenitur pro humoris ratione. Nam cum per se est, ex pituitoso generatum humore, grauis sopor, & quasi inexpugnabilis dormiendi necessitas. Quod si biliosus humor mixtus præpolleat, uigilās coma dicitur. Quo qui detinentur, nequeunt uigilantium munia subire, sed tum palpebras claudere cupiunt, tum dormire sperant.

προσφό-  
ρος.  
Panis lo-  
tus.

Commodum incident ] Hoc est, opportunitate & occasione sumpta se ingerent. Hoc enim apud græcos προσφόρος ἐντυχάνειν significat.

Panis quoq; aqua lotus. ] Galenus panis eluēdi rationem inuentam esse scribit, ut obstructionem in cibo impedirent. Nam hic panis lotus quā minimum habet crassicie, glutinisq; utpote ex terrestri ac graui, aereus, levisq; factus.

Duracina,  
Rhodaci-  
na.

Peponis duracini. ] Sunt qui non duracini legendum censeant, sed rhodacini, quanquam Palladius. Paulus, aliiq; recentiores græci ut Constantinus δωράκινα legāt, quos Palladius ubiq; imitatus, duracina conuertit, quicquid sit siue rhodacina, hoc est, à Rhodo nominata, siue duracina à duritie, persica proferas, non multum interest. Plinius etiam cerasa, & uuas duracinas nuncupat: Tu utrum malis sequere:

ὥμῃ λύ-  
σις.

Hordeacea farina. ] Græce est ὥμῃ λύσις quasi dicas cruda solutio, uel cruda farina ordeacea, ad differētiā polētæ quæ torretur Verum latini interpretes crudam omittunt, iestori id intelligendum relinquentes. Aliquando etiam de aliorum farina ὥμῃ λυσις dicitur, uerum tunc apponitur frugis nomen, ut πυρίνη ὥμῃ λυσις, ἢ λινοσπέριμος. Sæpe ex superabundanti κριθίνη ὥμῃ λυσις nominatur,

#### IN VII. CAPVT.

ἄσπι.  
Orosius,

M Vltus angor. ] Caput hoc ex octauo Oribasij transcriptum est. Græce habetur πολλὴ ἄσπι quod interpretatur pleriq; sicut etiam Orosius, fastidium, cum uerè hoc loco sit dicendum



dicendum multus angor. Nā adeo torquētur, ut nesciant qd  
ipsis sit agendū. nunc lecto se erigunt, nūc rursus decūbunt ui-  
tæ quasi pertæsi. Morbus hic intra septimum sæpe iugulat.

Tumore molli. ] Sic reddidi *οἰδημα*, qui tumor premēti-  
bus digitis cedit, eoq; dixi, molli. Tu si libet dicas, cū edemate. *οἰδημα.*

Emissicii. ] Hoc est, qui foras propelluntur, dolore nimio  
exprimente. Græce est *προπετῆ γίνονται*.

Porro utitor. ] Post totius corporis uacuationem deriua-  
tionemq; per propinquiores particulas ad topica uenit reme-  
dia. Primum aspergines ex hydrelæo, aut uino & oleo, ut in  
aliis partibus inflammatis conueniunt: deinde cataplasmata  
ex pane, aut farina hydrelæo subacta, quæ ad maturationem  
perducunt. Id enim uerbum *πεπαίνειν* significat.

## IN IX. CAPVT.

**L**ethargus. ] Oribasius lib. 8. omnia ad uerbū habet. Gale-  
nus cōmentario in primū prorrheticon, in hūc modū scri-  
ptum reliquit. *φρενίτις μὲν γὰρ ἡ ἀκρεβής, καὶ ἁμικτος ἐτέρω  
ιοσῆματι γίνεται χολῆς ξανθῆς καταλάβεσθης τον τόπον ἐν ᾧ  
τὸ πῆς ψυχῆς ἡγεμονὲν ἐστὶ. λήθαργος δὲ τὸν αὐτὸν τόπον ὑγρα-  
ναυτότε καὶ διαβρέξεαιτος φλέγματος.* Consentinnt hæc cum  
Paulo, nisi quod ipse pituitam frigidiorē habeat.

Caros. ] Vide Galenum secundo commentario Prorrh-  
eticorum, ubi refert tres quasi species Cari, nepe morboſi, quo  
de hic agitur, medii ut ex uino contracti, & boni qui post lon-  
gas uigilias solet accidere. Cæterum arteriæ Carotides à ca-  
ro nomen habent, quanquam si intercipiuntur, nō statim mu-  
tum animal, aut soporosum euadat, sed omnes arteriæ quæ su-  
pra uulneratas partes habentur, pulsum amittūt. Interpretari  
licet, soporem ueternosum.

Cari spe-  
cies.

Februm accessionibus. ] Emēda codicem græcum, ac pro  
*παρόξυσμο* lege *παροξύσμοις*, quod Orosius & castigator Ba-  
siliensis studio, opinor neglexerunt.

Orosius

Membranæ custode. ] Sic interpretatur Celsus lib. 8. cap.  
3. Quomodo os excindatur. Hæc autem sunt ipsius uerba: Fa-  
ctis foraminibus eodem modo media sæpe, sed multo circū-  
spectius excidenda sunt, ne forte angulus scalpri eandem mē-  
branam uiolet, donec fiat aditus, per quem membranæ custos  
immittatur, *μηνυγροφύλακα* græci uocant, &c. Nunc quid sit  
mēbranæ custos, audi. Lamina, inquit, ænea est firma, paulum  
Cc 3 relima,

Membra-  
na custos



μικρογγο-  
φύλαξ.

resima, ab exteriori parte laevis quæ demissa est, ut exterior pars eius, cerebro propior sit, subinde ei subiicitur quod scalp- pro discutiendum est, ac si excipit eius angulum, ultra transire non patitur, eoq; & audacius, & tutius scalp- malleolo sub- inde medicus ferit, donec excisum undiq; os eadem lamina le- uetur, tolliq; sine ulla cerebri noxa potest, &c.

Nota.

Quæ cito transcunt ] Hoc est, quæ cito per totum corpo- ris habitum rapiuntur, quale est quod etiam Diacalaminthes inscribitur. Habes utriusq; compositionem apud Galenum libro quarto de sanitate tuenda. Græce est τινὸς τῶν ὀξυπόρων. Non intelligit hic Paulus, quæ per alium cito transcunt.

Ijs autem qui in uetustatem. ] Id est, quibus morbus in ue- tustatem incidit, quiq; tremuli sunt. Nā postea ob diuturnita- tē morbi externarumq; partiū imbecillitatē, tremor accidit.

βομβύ-  
λια.

Angustioris uasculis ] Sic interpretatus sum βομβύλια. Nā Hesychius ait: βομβυλίδος ποτήριον γένος κατὰ μικρὸν πό- τον τᾶξαιτος, ὅθεν διὰ τὸν ἥχον οὕτω καλεῖσθαι. Cūuenit igi- ut eiusmodi poculis dulcis aliqua potio ita affectis instilletur.

#### IN X. CAPVT.

I Nterim rubore tincta est. ] Græce erat ἑρδυθος αὐτοῖς ἐπαν- θῆ. Hoc est, rubor eis efflorescit, uiuidus est. Auicenna hoc caput ut alia pleraq; in suum librum quasi transcripsit, muta- to ordine tantum, uocatq; affectum Subet asahari.

Qui uero malo uicti sunt. ] οἱ δὲ κρατηθέντες. Celsus uer- tit malo uicti. Opponatur ijs qui mediocriter habet: qni mor- bo possunt resistere.

In ijs autem periculum maius est. ] Reddidi sic græca hæc χάλεποι δὲ μᾶλλον εἰσιν, quod est, difficiles autem magis sunt curatu scilicet, quibus uigiliæ sunt continuæ.

#### IN XI. CAPVT.

Causa pru-  
dentia.  
Stultitia.

C Ausam habent communem. ] Subintellige, mentis noxa, & memoriæ iactura. Fatuitatis causam Galenus commē- tario in libellum Hippocratis de natura hominis ita memo- riæ prodidit: τὸ μὲν ὅξιν καὶ συνετὸν ἐν τῇ ψυχῇ διὰ τὸν χολώδη χυμὸν εἶναι. τὸ δὲ ἐδραῖον καὶ βέβαιον διὰ τὸν μελαγχολικόν. τὸ δ' ἀπλὸν καὶ ἡλιθιώτερον διὰ τὸ αἶμα, τὸ δὲ φλεγματος ἢ φύσις εἰς μὲν ἡθοποιῖαν ἄχρητος. Quæ uerba olim sic reddide- ram: Acumen ingenii & prudentia ex bilioso humore nasci- tur. Cōstantia uero & firmitas ex melancholico: simplicitas stoliditasq;



soliditasq; ex sanguine: pituitæ uero natura ad mores fingē-  
dos inutilis, &c. Cæterum communem causam refert Paulus  
& mentis noxæ, & memoriæ iacturæ. Male habebatur in græ-  
co codice καὶ νῦν pro καὶ νῦν, ut annotauit Orosius quoq;. Sed  
hoc sane debet exemplari suo. Quod autem τὴν συντάξιν uer-  
terit, illic consistentem, cum dicendum esset, constituentem,  
efficientem eruditioni suæ & ingenio debet. Nam si cōsisten-  
tem, hoc in loco Paulus dicere uoluisset, non opus erat arti-  
culo τὴν, qui ueluti autorē & opificē demonstrat. Sic etiā Gal.  
intelligit lib. 3. locis affectis, unde hæc partim descripta sunt.

Vitiatus co-  
dex græ-  
cus.  
Orosius.

Vel utiq; in humiditate inspersa. ] De ea nimirū dicit hu-  
miditate, quæ per totū corpus cerebri dispersa est: Gal. tertio  
locorū affectorū habet sententiam eandē, sed paulo apertius.

## IN XIII. CAPVT.

**V**ertiginum affectus. ] Vide Galenum libro tertio, de locis  
affectis Alibi autem refert causam inordinatam flatuosi  
spiritus motionem, qui uel in cerebro generatur, uel ab infe-  
rioribus sursum fertur.

δίνη.

Rotas, uortices uē. ] Græce est οἶον τροχούς ἢ δίνας. Gale-  
nus τροχὸς ἢ δίνος ἐν ποταμοῖς, hoc est, rotas uel uortices in  
fluminibus Nā δίνη συστραφὴ ὑδάτων, At δίνος, ait Galenus,  
ὀνομάζεται, ὅταν ἡ κεφαλὴ περιφέρεται, φαντάζεται ὅταν δὲ  
σκοτώδης ἢ ὀφθαλμοὶ τῷ δέ φάνηται σκοτὴ δίνος καλεῖται, &c.  
Apud latinos uertigo alterum nominari potest, alterum si ad  
uerbum interpreteris. Tenibricosa uertigo.

δίνος.

Vertigo

Medicamentis quæ odore mouent ] Hoc est, quæ naribus  
odoranda adhibentur, atq; ita cerebrum commouent, græce  
dicuntur ὁσφραίντα Celsus, quæ odore mouent, conuertit.

ὁσφραίντα

## IN XIII. CAPVT.

**M**orbus comitialis. ] Vide Galenū lib. 3 de locis affectis,  
& Oribasium in 8. unde Paulus hac ad uerbū transcripsit,  
Græci μωραὶ ἐπιληψίαν, quæ dictio cōprehensionē, retēsi-  
onem, obturationemq; significat. Nā spiritus animales hoc in  
morbo detinent, adeo ut in mēbra corporis distribui nequeāt.

Vel certe aliis quoq;. ] Græce est ἡ γυναικαὶ ἐξ ἀναδ' ὁσφραίν-  
εταί, ad uerbū sonat: Vel ēt ex aliarū partiū d. stri-  
butione, quod est, uel ēt aliis partibus cerebro cōcantibus.

τάσις.  
ἀπρὸ αἰ-  
σθησέως.

Voluntatis & consilii expers. ] τάσις ἀπρὸ αἰσθησέως in græ-  
co codice habetur, quod est: Status qui citra uoluntatem &

Cc 4 propositum,



propositum, fit, ueluti angustia, aut tristitia. Aristoteles distin-  
guit προάρεσιν ab ἀκυσίον. Illa. n. fit cū ratione & intelligen-  
tia, ἀκούσειον cōtra. Possis itaq; dicere, inuitus corporis & ani-  
mi status. Galenus libro suprā noīato ait; Dormiētes spirāt,  
quāuis nulla alia accedat actio, quæ uolūtate & cōsilio regat.  
Itē μηκέτι παρακοληθῆν ἐαυτῶ, quod est: Non amplius cōsta-  
re mēte & intelligētia: ad uerbū uero sonat, seipsum assēqui.

παρακ-  
λῆσθαι  
ἐαυτῶ.

Eorum quæ perceperat. ] In græco duæ tantum dictiones  
habētur, τῶν προσεχῶν λήθη, Suidas προσέχειαν interpretatur  
πρωσοχὴν hoc est, meditationem, perceptionemq;. Sunt qui  
malint τῶν προσεχῶν λήθη exponi propinquorum obliuionē,  
uel necessariorum.

Mēstruis purgationibus. ] Græce est simpliciter κατὰ τὰς  
καθάρσεις, mox addit ἢ τὰς κινήσεις, hoc est cū in utero habere  
cœperint Celsus apte dixit. In pueris, ueneris, in puellis men-  
struorū initiū tollit. Paulus hoc pubertatis uocabulo cōprehē-  
dit. Vide Aphorismū septimū lib. 5. eiusq; cōmētariū, Galeni.

Si infans adhuc fuerit. ] Galenus exigū quidē, sed elegan-  
tem puero eomitāli cōmēnariū dicauit: in quo morbi hu-  
ius omnē curandi methodum & rationem est cōplexus. Re-  
liquarum ætatum meminit etiam lib. 3. de locis affectis.

Viciosus  
græcus  
codex

Sinapis  
mus.

Mane passum auferetur, ] Codex græcus habet κεράσαν-  
τα, pro αἰγάσαντα, quod Orosius annotauit. Gemulæus ut  
exiguum nimis præteriit.

Sinapisinus. ] Nempe ut noxii humores ex alto corpore  
in extima euocentur. habes autem sinapis oblinendi rationē  
lib. 7. Pauli abunde & eleganter expōitum.

Iam etiam acrium ciborum esus ] Græce est δρυμφογία.  
Celsus de eodem morbo uerba faciens, acria, inquit, assumat.  
Marcellus Dioscoridis interpres, male conuertit uomitionē  
acrium ciborum esu concitatam.

Vidi autem quandoq; puellum. ] Galenus hoc cōmemo-  
rat lib. 6. de simplici medicina, ubi de herba Glycyfide dispu-  
tat. uidi inquit puerū totis octo mensibus, morbo liberū &  
cū forte fortuna radix à collo cecidisset. rursus cōstictatū, &c.

Inuasuro quidem symptomate. Addidi ad euidentiorē in-  
tellectum, communicare morbum aliās obscura nimis esset  
sententia, ἐπειδὴν αἰσθάνονται μορίον, id est ubi senserint par-  
ticulam, intelligendum affici, uel à particula morbum exci-  
tari.



tari. Hæc dixi ne Aristarchi nostri aliquid me præter sensum Pauli assuisse clamitent.

Cum autem remitti.] Græce est ἐν δὲ ἀνέσσειν ἀποθερα- ἀποθερα-  
πεύειν. In remissionibus autem apothetrapia uti Est aut ἀπο- πεύειν.  
θεραπεύειν corroborare & firmare corpus, nec non uindicare  
à lassitudine. Sequitur autem omnium exercitationem ma-  
gnam ne corpora in lassitudinem incidant. Hic autē post ac-  
cessionem corpus ante agitatū recreare nonnihil oportet,  
uel particulam, unde morbus excitatus est. firmare caustico  
medicamēto, qđ calorē in eo excitet, ne amplius in eā humor  
frigidus, aut superuacuus cōfluat, & inde ad cerebrū feratur.

Incōueniens ē sublimi cōspectus.] Sic exposui καὶ τὸ ἀτο- ἀτὲν ἰζεν.  
νίζεν ἐξ ὕψους, quod ad uerbū sonat inconniuerter conspiciere  
ex alto. Celsus uertit clare ē Græcis, loci præcipitis cōspectus.

## IN XIII. CAP. VI.

**M**Elancholia.] Galenus de hac multa lib. 3. de locis affe-  
ctis Oribasius eadē lib. 8. habet. Cæterū uno oēs cōsensu  
dicūt insaniā, mentē ipsā occupare, nūc cerebro ipso peculiari  
uicio laborāte, nūc toti⁹ corporis affectionē simul experiūte.

Per se ægrotante.] Ita interpretatus sum Græcam dictio-  
nem, πρωτοπαθὲντος quasi primario affecto exponas. Idem  
uero est, per se apud idoneos scriptores, quod nimirum nullo  
alterius consensu.

Homines auersantur.] Misanthropia est eiusmodi animi  
affectio, qua quis in solitudine uiuere cupiat, uitet hominum  
confortia, ut Homerus de Bellerephonte scriptum reliquit.

Qui miser in campis mœrens errabat Aleis,

Ipsē suum cor edens, hominum uestigia uitans,  
ut Cicero uertit. Dicimus etiam μισανθρωπῆν, & apud Hip- μισανθρω-  
pocratem ἀπανθρωπέειν, hominum cōsuetudinem auersari. πῆν.

Inane uiolēter tractent.] Ita exposui διαχειρίσθαι Cel- ἀπανθρω-  
sum secutus in capite de phrenitide, ubi habet: Alii; consur- πείθειν.  
gunt, & uiolenter quædam manu faciunt. Non sum ignarus διαχειρί-  
διαχειρίσθαι ab Hesychio exponi φονεύειν, quod est occide- σθαι.  
re, uerū hoc non semper contigit. Tractant quidem uiolē-  
ter eos, tum feriendo, tum mordendo, tum alia faciendo. Ne-  
que hic debebat Oroscius nimium esse grammaticus.

Qui igitur ex primario.] Hæc ex libro tertio de locis affe- Oroscius.  
ctis ad finē transcripta sunt Reddidi πρωτοπαθεῖν, primarium  
affectum,



affectum, qui non ex alterius partis dolentis consensu oritur. Cæterum omnia remedia melancholiæ Galenus loco supra citato enumerat præter hoc, una cum decenti animi delectatione, quæ Græcis dicitur *θυμωδία*.

*θυμωδία.*

*γύργα-  
θον.*

Aut gestandi grabato intra lecticā insanientibus peculiar-  
rem.] Celsus ē inquit, maxime suspensi lecti motus. *γύργα-  
θον κλινὴ ἐκῆ τὰς παρτέτους καὶ διαμεινώδεις τροβῶσι.*

IN XV. CAPVT.

*Incubo.*

**E** Phialten.] Hunc affectum appellauī Incubonem secutus  
Scribonium cōpositione centesima, ubi inquit: Facit hæc  
compositio ad suspirium, & ad uocis abscissionē, & subitas præ-  
focaciones ex qualibet causa ortas, & ad eos qui sapius existi-  
mantur ab Incubone deludi. Plinius nocturna delubria noīat.

*Nocturna.  
delubria.*

IN XVI. CAPVT.

**Q** Vi lycanthropia detinētur.] Hic morbus apud Latī-  
nos nomē nullum habet: si ad uerbum interpreteris,  
Lycanthropi sonat lupini homines, hoc est, qui lupos imitan-  
tur. Auicenna integrum caput de Cutubus hinc transcripsit.

*αἰδράνες.*

Oculi ad uidendum imbecilles.] Græce est, *αἰδράνες*, quod sonat, uident imbecille. Nam *αἰδράνες* idem quod  
*αἰδρείες*. Auicenna: Oculi ipsorum sunt debiles & submersi.

IN XVII. CAPVT.

*Nota.*

**A** Mores.] Barbari uocant, amor ereos, quasi dicas, amor  
amoris. Nam *ἔρεος* Græcis amor appellatur. Auicēna ijscī  
nūcupat, ex Paulo multa transcripsit. Habet autem diuersum  
de oculis, & sunt, inquiēs, omnia membra arefacta, præter ocu-  
los. Paulus refert: Et cum reliquæ corporis partes non colla-  
bantur, soli hi amantibus concidunt.

*αἰσίοις.*

Pulsus propriè nullus.] Vide Galenū in libello *περὶ προγι-  
νώσκων*, ubi se mulieris amorē ex pulsu deprehēdisse testatur.

Balnei abstinētia.] Orosius legit, *παλαιοίαις*, hoc est bal-  
neorū abstinētiis. *αἰσίοις*, hoc est, uinculis ut exponit: quasi  
amātes in uincula sint cōiiciēdi: At sequēs snīa Pauli facit, ut  
*αἰσίοις* legendū cēseā. Nā prudentiores inquit, ad balnea,  
cōpotationemq; eos ducendos præceperūt. Tu aut cādide le-  
ctor, utrā malis scripturā sequere. Nā haud ita multum refert.

IN XVIII. CAPVT.

**Q** Vando cōmune quidem.] Ex tertio Galeni libro de  
locis affectis, & deinde ex octauo Oribasij hæc colle-  
cta sunt



& sunt. Galenus aut̃ nō meminit dictionis, hemiplagias, quæ ἡμιπλαγία. idē signat quod paralyſis. Ad uerbū ſi interpreteris, ſonat ſemiplexia, hoc eſt in dimidia parte percuffio. Nā uerbū πλῆται, unde apoplexia, & hemiplagia deriuatur, ferio, percutio apud nos ſignificat: unde non omnino male tali percuffos affectu, attonitos Celfus noīat, quorū ſcilicet, & mēs, & corp⁹ ſtuper.

Commune neruorum principium ] Cerebrum omnium neruorum tam ſenſilium, quā mouētium ſons & origo exiſtit. Medulla uero ſecūdario neruorū mouentium principium dicitur. Nam & ipſa à cerebro propagatur. At in hoc affectu Quomodo fiat apoplexia, primum anteriores uentriculi, deinde medius poſtremo ij qui in cerebello habentur, obturantur adeo, ut ne pauſillū quidē ſpiritus animalis ad medullæ ſpinalis neruos deriuetur. Vnde ſenſus, motusq; intercidat, aboleaturq; necesse eſt.

Ita ut pariter principis animæ. ] Tres ſunt ſecundū Platonis, Ariſtotelis, & Galeni ſententiam in humano corpore animæ ſpecies. Vna θυμοειδής, altera ἐπιθυμητική, tertia ἡγεμονία, uel in neutro genere τὸ θυμοειδές, τὸ ἐπιθυμητικόν, τὸ ἡγεμονικόν, ἢ λογιστικόν, ἢ λογιζόμενον. Prima in corde ſedem, ac domiciliū habet. Scđa in iocinore. Tertia quæ aliarū dux & princeps eſt, in cerebro. Merito igitur ea impeditur, uētriculis oībus obſtructis, p̄ſerim medio, ubi ratiocinatio cōſiſtere diciť.

Sin autem in altera ] Hoc eſt, ſi alterius partis cerebri tantum, ſinus, aut uentriculi, aut quomodocunq; appellare uelis, impediti, obſtructiq; fuerint.

Voce inter mortua. ] Græce eſt ἀνάνθοι, quod ad uerbum ſonat, ſine uoce, ut apud Hippocratem ἀνάθυος. At Galenus interpretatur, ἀλόγως, quod eſt ſine ſermone. Nam ἀνθ' etiā ἀνδρ' λέγως dicitur. Intellige igitur uoce inter mortua, pro ſermone edere non ualentes, quippe omnes nerui, tum ſermo nis, tum aliarum actionum duces, ſpiritu animali ſunt deſtituti.

Toruli eleuantur. ] Hoc eſt, ipſæ uenæ attolluntur, quod capitis repletionē teſtať Græce eſt τῶν σφαγιτίδων παρμα.

Ipli inhæſcunt. ] Haud ſcio cur Oroſcius ἐγκείμενα moleſta uerterit. ἐγκέμαι enim ab ἐν & κέμαι uenit. Nec pituita ſolum ori moleſta eſt. Imo non adeo moleſta eſt iis quibus ſenſus omnino periit. Rectius igitur quæ inhærent, aut eo decumbunt ex capite, auferantur.

Cibus mollis, diſtribui facilis ] In codice Græco habetur παράλη.



χυλώδης  
τροφή.

παράληφύμεθα τὴν ἀπαλὴν καὶ ἐν διόικητον, καὶ χυλώδην τροφήν, quod est: Assōmemus tenerum, & distribui facile, & succulentū nutrimentū Celsus lib. 3. de morbo comitiali inquit: Neq; sorbitiones autem bis, aliq; molles, & faciles cibi, &c. At per χυλώδην quod nos reddidimus succulentū, intelligit cibum ex cremore, uel prīsanā, uel chōdri, uel alterius frumētī. Nā χύλος cremorē significat, qui in sorbitionibus dari solet.

Vnctioni uero accommodata. ] λιπάσματα τε σύγχρηστα τριαῦτα. In Græco exemplari est, quod Celsus expressisse vī: Vnctione uero, inquit, aptissimū est uetus oleū. Ad uerbum sonat Græce, pinguedines quæ illini queant, huiusmodi sunt.

ἐνταρι-  
χεύεται.

In quo scilla intabescit. ] Græce est ἐνταριχεύεται uerbum, quod signat proprie ægros abstinentia immoderata exicare. Ita scilla in Sole eliquescit, consumiturq; . Celsus etiam dicit: In quo scilla intabescit.

Vitiatus  
codex  
Græcus.

Attendentes. ] Male in codicibus Græcis legitur πρόεχοντας, pro προσέχοντας, hoc est aduertētes. Deinde in eadē snīa: διὰ τὸ μὴ συναιδανέσθαι ἢ μὴ ὑπερκαυθῶσιν pro διὰ τὸ μὴ συναιδανέσθαι μὴ ὑπερκαυτῶσιν. Quo in loco dū Orosius alios reprehendit, nec locū Græcū emendat, & male uertit ὑπερκαυθῶσιν, ne uehemēter urantur: cū Paulus uelit uehemēter quidem, sed nō nimīū, nō supra modū, nec magis quā cōuenit.

Orosius.

φοινγμοί.

Cutis ruborem. ] Sic interpretor τὰς φοινγμὲς, Celsus habet: Prodest etiam torpentis membri summā cutem exasperasse, uel urticis cesam, uel imposito sinapi, sic ut nbi rubere cepit corpus, hæc remoueantur.

Orosius.

Feculæ. ] Græce est φέκλης quæ fex combusta dicitur. Gal. lib. 1. de compositione medicamentorum secundum locos ad Achoias, inquit, τρυγὸς οἶνοι κεκαυμένης, ἢν ῥωμαῖσι φέκλιν καλεῶσιν. Latina itaq; dictio est fecula, quam Græci imitantes φέκλιν nominant. Largus etiam utitur pro fece uini combusta. Hoc ignorabat Orosius, dum alios reprehenderet.

Canina cō-  
uulsio.

Canum more conuelluntur ] Verbum è uerbo reddidi. Largus autem interpretatur quid sit spasmus caninus, his uerbis. Facit ad κυνικὸν σπασμὸν, cum in utramlibet partem deprauata est facies. Celsus libro quarto habet: Circa faciem uero morbus innascitur, quem Græci κυνικὸν σπασμὸν nominant. Is cum acuta febris est, os cum motu quodam peruertitur, ideoq; nihil aliud est, quā distentio oris.

Per



Per narium clysterē.] Græce est διὰ ξινεγχύτης, hoc est ad ξινεγχύ-  
uerbū per nariū infundibulū, per quod medicamenta in nares της.  
infundūtur. Quēadmodū ωτεγχύτης, clyster auricularius, & μη  
τεγχύτης uterinus. Celsus lib. 4. cap. 2. fere eadem.

Per rectos siphones.] Sic uidetur Galenus significare, qui καθετήρ.  
καθετήρας lib. 5. Methodi εὐαυτρήτους, quasi recto foramine  
præditos canales interpretatur. Oroscius rem medicam ex Oroscius.  
Celio maluit discere.

Lentisci.] Male in utroq; exemplari habetur σχόινον, quod Codex  
est iunci odorati pro σχίνε, nam astringentia in hoc morbo Græcus  
requiruntur. depraua-  
tus,

Vitulinumq; & oleum.] In Græco codice deest particula  
καί. Nam habetur tantum, στέαρ βουίν, και χήνιον και μολόχινον  
ἐλαιον. Cum sit legendum: και ἐλαιον in fine. Nam molochi-  
num oleum nullum dicitur.

Corrige  
Græca.

Cum communi curatione.] Hoc est præter communem  
resolutorum curationem, quæ medicamētis extrinsecus adhi-  
tis, aliisq; absoluitur, etiam hæc quæ sequuntur, facies.

Nostri ætate.] Quod Paulus suo tēpore accidisse in mor-  
bo colico commemorat, nos quoq; nostra ætate frequenter  
uidemus. Nempe ex magno, diuturnoq; colico cruciatu ar-  
tuum resolutionem, præsertim brachiorum, quanquā & cru-  
rum imbecillitas summa adfuerit. Iam ex febris quæ humori-  
bus ad intestiua cōfluētibus, ibiq; dolorē uehementū excitan-  
tibus finita fuerit, secuta est artuum resolutio, quod nuper in  
Canonico quodā, sed non iuxta regulā uiuēte, lum expertus.

## IN XX. CAPVT.

Cum particulæ corporis in anteriora.] Hoc Celsus paucis  
comprehendit: Cum mentum inquiring, pectori annecti  
tur, emprosthotomos, cum scapulis opisthotonos: cum rectā  
& immobilem ceruicem intendit, Tetanus dicitur.

Optimum itaq; præsidium.] Hippocr. lib. 4. Aphorism. se-  
ctiōne 57. Qui conuulsione, aut distentione neruorum tuen-  
tur, febris superueniente liberantur.

Nonnunquam & risus ipsis Sardonijs oboritur. Dioscori-  
des lib. 6 sardona ranunculi genus esse testatur, quæ uescenti-  
bus mentem adimat, & quadam neruorum distentione, dehi-  
scere in rictus ora cogat, ita ut imaginem ridentium præbeāt.

Risus Sar-  
donius.

Cucurbitulas ad mouere cum lancinatu.] Græce est μετά  
ἀμυχῶν,



ἀμυχῶν, quod sonat cum uibicibus excitatis. Sic intelligo hoc loco lancinatum scalpelli.

**Orosius.** Abstergere, ne imprudentes. ] Dum Orosius alios reprehendere instituit, ipse corrigendus uenit, qui tam impure, & nullo sensu penitus uertit, ne perfrigerati occultentur. Videtur autē lexicarius adhuc esse interpres, μή λάθωσιν ψύξαντες, quod ad uerbum sonat, ne lateant refrigerantes, hoc est, ne imprudentes, nescii, ac non aduertentes, refrigerent particulas.

Hydromeli spissius. ] Sic exposui ὑδρόμελι λιπαρὸν, hoc est ad uerbum, hydromel pingue. At nulla pinguetudo in eo habetur. Sit itaq; λιπαρὸν ad pinguetudinis crassitiem incoctum. Nam ad dimidias eoqui præcipit.

**Orosius.** Et laserpicii radices. ] Nescio cur hic Orosius succum laserpitij intelligi uelit, cum apud Galenum Dioscoridemq; ipsum, ubi liquoris mentionem facit, ὁπὸς ponitur. Adeoq; in opisthotonicis. At radicē tum in puluerem redactam, tum decoctam sæpe & in his, & in aliis affectibus dari legimus, ut plane nō sit, quod Orosius in hoc loco uersionē nostram reprehendat.

**Male græca,**

Quin potius in exemplari græco legendū putet ἐμπλαστὲντα pro ἐμπλαστῆντα & ἀφέψημα αὐτῆς, ἢ ἀφέψηματι. ut sit decoctum ipsius radices. Quid enim est, silphij radices cochlearia duo, aquæ mulsæ cyathis tribus inspersa, uel decocto ipsius dare? Quorsum referri debet, decocto? ad mulsam ne? quæ iā cocta est, quantū opus est. Itaq; ad radicē magis cōpetit. Ea. n. uel pulueris modo inspersa, uel decocta exhiberi pōt.

**Græca uitiata.**

Myrrhæ drachma ex mulsâ, hyssopiq; decocto ] Hic rursus codex græcus deprauatus est, habet enim ἡ σμύρνης < α μελικράτω ὑσσώπω τε ἀφεψίμα. Cum nimirum legendum sit ἡ

**Orosius.** σμύρνης < α σὺν μελικράτῳ, ὑσσώπου τε ἀφεψίματι, quod Orosius & Basiliensis castigatores non aduerterunt.

Nardi. ] Dictum est pro nardini, ut apud Celsum & Scriboniū aliquādo Rosæ pro rosaceo, nardi pro nardino usurpatur.

#### IN XXI. CAPUT.

**T**Remoris origo ] Vide libellum Galeni de Tremore, quē nos aliquando latinitate donauimus, ubi habet : τρέμος μὲν ἐν γίνεταί τῆς ὀχέσεως καὶ κινήσεως τὸ σῶμα δυνάμειως ἀρρωτία. ὃ γὰρ ἐξ ἐαυτῶν δὴ περὶ τὰ μόρια τῶν ζώων οὕτως οὐτα βαρέα καὶ κάτω φέρεται πεφυκότα, τὰς εἰς ἅπαντα τύπον ἔχει κινήσεως. ἀλλ' ἡ διὰ τῶν νεύρων τοῖς μυσὶν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἐπιπεμπομένη



πεμπομένη δύναμις. ὅον ὀχμήτι, καὶ πτέρωμα τῆς κινήσεως  
αὐτοῖς εἶναι, ἢ ὅταν μὲν ἀπολέσῃ τελέως ἀπόλλυσι δὲ τὰ παρα-  
λελυμένα, καταφέρεται καὶ πίττειν ἅτω δῖκην ὀρνίτου πτεροῦ-  
ξυνοαυτος. ὁθεν ὁδε μίαν κίνησιν ἀπολέπεται τοῖς ὅτω παθῶσιν.

Hoc est ut linguarū rudes intelligant: Tremor itaq; fit imbe-  
cillitate facultatis, quæ corpus uehit, mouetq;. Quippe ani-  
maliū particulæ, tā graues cū sint, & deorsum ferri natae, nō ex  
seipsis nimirū motiones, in oēm locū habent. Verū facultas,  
quæ à principio per neruos musculis trāsmittitur ceu uehicu-  
lū quoddā, & alia motionis ipsis existit, quā cū prorsus perdid-  
erint, perdūt autē resoluta deorsum feruntur, caduntq; auis pē-  
nis destitute modo, unde nullus motus ita affectis relinquitur.  
In oleum descendant. Hoc est in solum oleo repletum, quo  
olim uti solebant, resoluti, contracti, arthretici, tremuli, Græ-  
ce est. ἐμβιβαστέον εἰς ἐλαίον. Celsus descendant in soliū, ait.

Tremor.

## IN XXII. CAPVT.

**Q** Vanam ex affectione corporis.] Hoc in omniū par-  
ticularum morbis obseruādum docet Galenus, ut cor-  
poris primū affectionem, quam uulgus dispositam appellat,  
græci διαθέσιν, intueamur. Nam hac neglecta, quicquid parti-  
culis admoueamus, sinistre accidit. Cæterum hoc te admoni-  
tum uolo candide lector, ubi in uersione mea dictionem inue-  
nis, affectionem, pro διαθέσει, positam esse, intelligas. Nā di-  
spositio hoc in significatu apud idoneos autores nō usurpat.

Affectio.  
διαθέσις.

Perturbatio humiditas oculi est, & calor cum rubore natu-  
ræ alieno. Postrema clausula, naturæ alieno, male in codice  
græco habetur, περὶ τὸ κατὰ φύσιν. Vbi legendum παρὰ τὸ  
κατὰ φύσιν.

Græca de  
prauata.

Membrana adnata.] Intelligo membranam coniunctam,  
siue coniunctiuam, ut barbari appellant. Græci τὸν ἐπιτεφυκό-  
τα, eo quod aliis quæ oculum ipsum constituunt, tunicis ex-  
trinsecus adnascatur, ligamentum & ipsa existens toti q; oculo  
ad ossa circumiacentia, ex pericranio ducens originem.

Membra-  
na adnata.*De defluxionis impetu.*

Angiologiam, arteriotomiam, hypospatismum, & petiscy-  
phismū.] Omnes has rationes Paulus libro. 6. cōplexus est.  
Prima est uenarum in fronte ad tēpora præfectio quod in he-  
micranis etiam fieri solet. Altera est arteriarum retro aures

Angiolo-  
gia.  
Arterioto-  
mia.  
Hypospa-  
tismus.  
Petiscy-  
phismus.

per



per transuersum sectio. Tertia est ab instrumento chyrurgico appellationem sortita, quasi dicas spatæ submissio intra partes quæ à subiectis liberabuntur. Quarta ratio est, qua diuisionem in fronte à tempore ad tēpus transuersum molitur, cura tamen adhibita ne tēporaliū musculorū motus uioletur,

Oroscius.  
Specularium.

Recte huic specularium.] Hic legit Oroscius σφεκλάριον, ut significet σφέκλιν, hoc est, ficulam, cupiditate magis reprehēdi, quàm rōne adductus. Diligēs homo nō legerat apud Galenum hoc remediū citari pro lapide speculario: nec etiā apud Paulū qui lib. 7. hunc in modum habet: σφεκλάριον, οἱ δὲ διὰ μὲν φ' σφεκλάριον. ὅτι τις, ἀντι σφεκλῶν ἐν ταῖς δούρεσι χρεῶνται, διὸ καὶ διαφανὲς μροσαγορεύται γυψῶδες ὑπάρχον τὴν ὁσίαν, δύναμιν ἔχει παραπλήσιον τοῖς κεκαυμένοις ὀφθαλμοῖς ἢ γυν ὀφθαλμοῖς. Si uerò fex cōbusta ἢ ardens est, natura oculis ut ille putat, adhiberi deberet, certe elote elotā esse oporteret.

Ξεροφθαλμία.

Xerophthalmia.] Celsus lib. 6. interpretatur aridam lippitudinem Est enim, inquit genus aride lippitudinis, ξεροφθαλμίαν græci appellant, neq; tument, neq; fluunt oculi, sed rubent tantum, & cum dolore quodam grauescunt, & noctu præ graui pituita inarescunt.

Ertropion.

Ertropion.] Hoc uiciū est inferioris palpebre, qđ parū sursum artollitur, sed pēdet & hiat, neq; pōt cū superiori cōmitti. Id interdū accidit ex mala curatione, interdū ex senectute.

Aegilops.

Aegilops] Est ueluti parua fistula maioris anguli, per quā pituita assidue distillat. Nonnunquam etiam exeso osse usq; ad nares penetrat.

Oroscius.

Lixiuio quod ex cinere & calce.] Græce habetur absolute πρωτότακτω, quasi dicas, primario lixiuio. Paulus lib. 7. habet: εἰ δὲ προσλάβῃ καὶ τιτάνου ἢ τέφρα καυτικὴν ἐργαζέται τὴν κονίαν ἢ δὴ καὶ πρωτότακτον ὀνομάζουσι. Quæ uerba Oroscius non uidetur intellexisse, dū interpretatur cinerē lixiuium, qui primus distillauerit, secutus Hermolaū, Recte igitur quis interpretetur lixiuium, quod per cinerem & calcē distillauerit.

Cum manus opera.] Hoc remedium in exemplaribus uulgatis non est, sed in Lascaris codice manuscripto additū inueni. Si itaq; placet ascribere, aut expūgere, per me certe licebit.

Chalazion.] Celsus sic appellari dicit, quod mobilia, & digito huc, illuc impellantur curationem manu præstandam docet libro sexto.

Encanthis



Encanthis naturalis.] Varijs de causis hoc uicium gigni so- Encanthis.  
let. Interim ex ungue parū exciso, uel ob tuberculum, quod  
palpebras parū deduci patiē. Quod si ungue carūcula nimiū  
abscindat putrescit foramē per quod postea humor descēdit,  
ac uiciū superiori cōtrariū nascit, quod grēci ξυάδα nomināt.

Tertia samia.] Duplex ea terra apud Dioscoridē habetur, ξυάδα.  
una simpliciter terra samia dicitur, altera γῆ ἀστῆρ, hoc est, ter- Terra sa-  
ra aster, quasi dicas, terra stellata. Celsus itaq; , ubi posterioris mia du-  
mentionem facit: Terræ, inquit, samia, quæ ἀστῆρ dicitur. Nō plex.  
ut Oroscius uolebat, terræ alteris, obscure nimium. Ceterum Oroscius.  
ante hoc medicamētum in græco exēplari est διὰ μύλα per-  
peram pro διὰ ἀμύλα, quod etiam Oroscius annotauit.

De oculis purulentis.] Duæ sunt apud Græcos dictiones.  
quæ fere in omnibus sibi respondent, nempe ὀφθαλμὸς, & ὀφθαλ- ὀφθαλμὸς.  
μιον. Prima significat pus subesse membranæ corneæ. Largus ὀφθαλμιον.  
& Celsus uocant oculos purulentos: altera dicitur, teste Ga-  
leno, quasi ὀφθ & ὠπας, hoc est, sub oculis. Ac ueteres latini  
hoc uicium appellant, suggillata, genere ecchymomatum cō-  
prehensa. Parum prudenter Oroscius, dum in aliorum erra- Oroscius.  
tis castigandis occupatur, ipse in grauissimū incidit. qui ὀφθαλ-  
μιον, quod est, purulentum, conuerterit suggillatum.

Floris æris.] Hoc medicamentū in impressis nō habetur, Arida me-  
sed in manuscripto codice Iani Lascaris scriptum inuenitur. dicamēta.

Contritīs ad læuorem aridis.] Hoc est, aridis in tenuissi- ξηρά.  
mum puluerem reductis. Græce est λεάνας τὰ ξηρά, hoc est, le-  
uigans arida Celsus autem de Aridis mentionem facit libro  
quinto, capite uigesimo secundo in hunc modum: Quædam  
misturæ medicamentorū sunt, quibus aridis, neq; coactis uti-  
mur, sic ut inspergamus aut cum aliquo liquido mista illina-  
mus. Alia medicamenta sunt his apposita, nempe quæ liquari  
possunt. Hæc græcis τηκτά nominantur. Vbi itaq; Galenus Liquida.  
aliisq; habet τὰ τηκτά τηκονται, τὰ ξηρά δὲ λεάνειν δὲ ἢ λειο- τηκτά.  
τρίβειν. Latini scriptores exponunt, quæ liquari possunt, ad  
ignem eliquētur, arida conterantur: Celsus inquit lib. 5. ari-  
da ex eo conteruntur. Rursus arida medicamenta cōtrita hu-  
more non pingui coquuntur. Item arida ex aceto teruntur.  
Largus simili utitur locutione, & uerbum λεάνειν δὲ læuiga-  
re oportet, interpretatur. Quæ cum ita sint, immerito Oro- Oroscius.  
scius nos reprehendit, negans latine, & fideliter dictum, aridis

PAULI AEGIN.

Dd contri-



contritis, cui magis placet, pulueribus dilutis. Et si apud nulum idoneum scriptorem huiusmodi locutio inueniatur.

Orosius. Sublinimus medicamentis.] Hic quæso candide lector animum aduertas cauillationis Orosii. Damnat me quod uerterim ex græco τοῖς πρὸς τὰς παλαιὰς διαθέσεις, medicamentis quæ ad ueteres affectiones inscribuntur, ipse enim mauult dici collyriis. Quasi uero collyria non sint medicamenta. Certe ego à præceptoribus meis olim didici substantiam collyriorum, esse & dici medicamenta: ipsum uero nomen collyrii, formam medicamenti indicare. Celsus lib. 6. ita inquit: A secundo die graui quoq; lippitudini per medicamēta recte succurritur. Item in collyrio trygodes. Quo grauior quoq; inflammatio est, eo magis liniri medicamentum debet.

## IN XXIII. CAPVT.

AN ob exteriorem causam acciderit.] Ex octauo Oribasij hæc mutuatus est. Exterior autem causa est uentris frigidior, aut lauacrum aquæ frigida, similiaq; Hæc itaq; solent interrogari, an ægrotus in ambiente frigido obambulauerit, uel lauacionem frigidam expertus, uel alio modo fuerit affectus. Græcus codex habet ἡ καὶ μιντος ἀνακρίσεως, ubi ἀνάκρισις idem ualeat quod ἐξέτασις. Nonnulli autem lexicarii interpretes contemperamentum uertunt.

Cucurbita ex aqua calida.] Idem Galenus commemorat ex Apollonio, lib. 3. de compositione medicamentorum secundum locos in hunc modum: πυρίαις δὲ χειρῶν ταῖς διὰ τῶν σπογγῶν εἰς θερμὸν ὕδωρ ἀμποβεβρεγμένοι, τῶν ἱκανῶς τε ἐκ τεθλιμμένων, καὶ ταῖς διὰ τῆς σικύας Hoc est: Fomētis aut utēdum est, quæ per spongas fiunt, in calidā aquā intinctas, easq; abundē expressas. Itē illis quæ per cucurbitam adhibētur, &c. Ego itaq; προπυριουμένη ἰ Paulo, uerti foru prius facto Quāquam possis dicere, cucurbita prius aqua calida concalfacta.

Per specillum lana.] Græce est διὰ μιλῶτιδος, quasi dicas specillum auricularium, ut Celsus etiam exponit. Nam eodē capite meminit specilli lana inuoluti, specilli auricularii, & clysteris auricularii, strigilisq;.

Vel etiam arundine.] Apollonius etiā sententiam recitat, uapore per arundinem perforatum elato. Erit autē alterum arundinis extremum concauitati euriculæ accommodatum, alterum in ollam cutus operculum foramen habeat incubet.

Decoqui-



Decoquitur in olla absinthium, cuius uapor auditorio meatus insinuat. At hic nullū forū arundine adhibere præcipit.

Verum exugi humorem, si quis, forte in aurem receptus sit.

Sin aut pauca.] Græcus codex mutilus est, nec Orosius, nec Basiliensis castigat aduertit. Deest enim ἡ δὲ, ad integram sententiam explendā, quæ sic legi debet: εἰ μὲν ἔστι πολὺ διὰ τὴν φύσιν, καὶ τῆς καλαμίδος αὐτὸ ἐκμηζάνειν δέ. εἰ δὲ ὀλίγον, &c.

Græca mutila.  
Orosius.  
corrector.  
Basiliensis.

Cardamomi & nitri.] Galenus libro iam citato legit καρδάμυς ἰκαίδον, καὶ νίτρον βραχὺ σύκε σαρκὶ χωρὶς κεχραμίδων ἀναλαβὼν πρίησον κολλύριον, &c. Quod est: Nasturcii, quod satis, & uitri paululū fici carne sine granis exceptū, in paniculum redigito, &c. Verum cardamomi & cardami quod est nasturcii, eadem fere potestas est: nisi quod nasturciū sit ualētius.

Idq; in aurem demittendum.] In græco codice hæc clausula quidem non est, uerum à me addita, ad sententiam absol- uendam. Alexander etiam in hunc modum ex Galeno pro- fert. Hoc te celare nolui.

Nota.

Hyssopum medicamentum.] Hyssopum & herba, & medicamentum appellatur. Verum ubi herba notatur, simplici uocabulo hyssopum dicitur, ubi medicamentū additur ipsa medicamenti dictio. Quanquā in eo nulla sit hyssopi herbe mentio, sed lanarum potius succidarum. Nonnulli autem adiiciūt hyssopum herbam.

Bulborū, polentæ.] Admonuit Orosius græcum codicem esse uiciosū, q̄ habet: βολβῶν ἀφρών pro βολβῶν ἀλφίτων, &c.

Græca uiciata.

## IN XXIII. CAPVT.

Linamento ex ellychniis cōtorto.] Varia sunt apud græcos λινάμηνων, hoc est, linametorū genera. Aliud uocāt στρεπτόν, quasi dicas tortile, aliud ξηρόν, hoc ē, rasile, aliud τιλτόν, qđ est cōcerptū filatim, aliud ἑλλυχνιωτόν ex ellychniis præparatū. aliud πριαιπισκωτόν à pudēdi humani similitudine nuncupatur: aliud, quod cunei formā referat, aut quia cunei modo foramina obturet, aut cōiuncta separet, σφήνισκος dī. Vt Paulus sexto uocat σφήνισκος στρέπτης ἐκ ξάκης, hoc est, cuneolos intortos ex pāniculo. Adhuc aliud est λινάμηνος græcis dictū, implicitū in longitudinē linamentū, si Celso credimus, qđ alibi uocat linamentū inuolutū & oblongū. Sicut στρεπτόν linamentum implicitū, seu intortū simpliciter appellari possit.

Linamētōrū genera.  
στρεπτόν.  
ξηρόν.  
ἐλλυχνιωτόν.  
πριαιπισκωτόν.  
σφήνισκος.  
λινάμηνος.



ἐρεγμός,

ἀλδύρον.

κνάμινον.

ἔτιος.

λέκυθος.

Oroscius.

ἐρεγμός.

Ephelis.

Lenticula.

Suggillata

Parulis.

**P**Tisanæ fresæ.] Hoc est confractæ. Græce est ἰσῆως ἢ πτισάνης ἐρεγμῆ. Vt ἐρεγμός significet omne id quod fresum est, uel ipsam confractionem, omnium scilicet, leguminū, nomine tamen ipsorum appposito, ut κριθῆς ἐρεγμός. Cum uerò simpliciter ἐρεγμός ponitur, de faba fresca dicitur. Quæ si molam experta sit: ἀλδύρον κνάμινον & ἐρέγμινον ἀλδύρον appellatur. Ferculum autem ex faba, cicere, & reliquis leguminibus fresis paratum, ἔτιος, ex fresorum autē farina pulmentariū, λέκυθος Galeno cum alibi, tū in libello de bonis malisq; succis generandis nūcupatur. Quoties autem in Paulo aliisque græcis inuenitur κνάμινον ἔτιος, pro faba fresca elixata ad ferculū intelligito. κνάμινι λέκυθος, pro fabæ fresæ farina elixata ponitur. Sic πτισάνης λέκυθος, & ὀρόβινος λέκυθος, aliorumq; leguminum dicitur. Vbi uerò hæc uox λέκυθος sola citra alterius adiectionem ponitur, Lucheum oui significat apud medicos, Oroscius male ἐρεγμός pro lomento tantū usurpauit.

Ad Ephelidem & lenticulas.] Ephelis asperitas quædam & duricies mali coloris est in facie lenticula & in alia parte nōnunquam nasci solet. Celsus ineptias putat curare uaros, lenticulas, & ephelidas.

Suggillata.] Græci uocant ἐπώπια ut antea annotaui. Sūt autem ex genere ecchymomaton, quæ & Hippocrates & alii pleriq; medici appellant cutis affectum, quo uenis in ea tenuibus contusis sanguis inde effunditur, qui ita excretus non uno in loco, nec subito concrescit. Temporis spacio liuescit, nigrescitq; cutis.

Cum melle admoueto.] Galenus habet in eodem medicamēto, ὅξος ἀναλαβών ἐπιτίθει μέλιτος ὀλίγον ἀνακόφας. Hoc est aceto recepta, mollisq; momento subacta.

## IN XXVI. CAPVT.

**D**entium dolorem.] Ex quinto Galeni de cōpositione medicamētorū secundū locos ad uerbum hoc caput est transcriptū, nisi quod ubi Paulus ad inflātionē habet, Galenus & Oribasius ad dolorem dentium medicamenta subscribunt.

Ad parulidas.] Parulis græca dictio est, ἀπαρά qđ est iuxta, & ἐλγίngiua hoc signat gingiuam. Celsus lib. 6. cap. 13. Solent ēt interdum iuxta dentes in gingiuis tubercula quædam oriri dolentia παρυνίδας græci uocant.

Tonfillæ.



Tonfillæ.] Glandulæ quædā sunt in ore utrinq; singulæ penitus sitæ, spōgiis similes, quæ humiditates ex capite recipiant ad fauces humectandis *παρίσθια* græci nominant, quæ si post inflammationem induruerint, *αντίαιδες* appellantur.

*παρίσθια.*  
*αντίαιδες.*  
*κιονίς.*

Vua.] Græce est *κιονίς*, quod ad uerbū sonat columella. Est aut hæc carnosā quædā particula, in summa oris parte suspensa uocis plectrū, recipit ea madorē à cerebro quo superiores palati partes humectat. Si plus iusto humiditatis recipiat, interim laxat, ac fastigata descēdit, interim inflammationē experit, & ne potus, nec cibus deuorari possit impedit. Veteres græci *γαργαρεῶνα* & *κιόνα* recētiore *κιονίδα* appellāt. *ταφην* uero quasi dicas uuā, partē ipsā appellari nō uult, sed affectum Celsus aliisq; latini scriptores et partē, uuā nominant.

*γαργαρεῶν.*  
*ταφην.*

Vbi æqualiter crassā fuerit.] Paulus præter Galeni morē *κιόνα* appellandam particulam censet, ubi in æqualem crassiciem intumuerit. Nam interim tenuis, acuta, albāq; cernitur. Interim una crassa, summa tenuis, & liuida est.

## IN XXVII. CAPVT.

Angina.] Apud recentiores medicos uaria sunt angine nomina nunc per literā κ, nunc per σ, inchoātia. At Galenus cōmētario tertio in prognostica Hippocratis parū interesse dicit, modo de re ipsa constet, *κνίεγχνη*, an *σνίεγχνη* proferas. Ibidem et tres anginae species enumerat ex Hippocratis sententia: Pessimè quiens, agunt, qui uehementer quidē dolent nullū autem in ceruice & faucibus symptoma experiuntur. His succedunt, qui quidem non difficulter spirāt, uerū dolent grauiter, collū ipsis intumescit, fauces apparent rubicūdiore. Postremi neq; dolēt, neq; agrē spirant, ita ut suprema gutturis pars *λάρυγγα* græci nomināt incolumis quidē ipsis permaneat, sed fluxio magna parte biliosior, aut in fauces, aut in collum, aut in utraq; descenderit, &c. Rursus lib 4 de locis affectis quatuor species recenset. Paulus itē noster quatuor enumerat, pro musculorū, uel interiorū, uel externorum inflammationum ratione. Ego sane musculos primum intelligendos puto, qui in ore circa linguā ex omni parte habentur: qui superiores palatum uersus eam mouent: qui inferiores deorsum, Laterales in latera adigunt. plurimi ex offe 8 græcam literē υ referente prodeūt. Deinde duodecim proprios, summæ arteriæ parti quā *λάρυγγα* uocant octo aut, cōes, qui scilicet

*Species*  
*anginae.*

Dd 3 laryngem



laryngem corporibus uicinis colligant. necnon eos qui ceruicem constituunt. Iam musculis qui œso phago subiicitur, inflammatis, angina quædam oriri solet.

φάρυγξ.

Faucium pharinga græci uocant.] Magna harum uocum ambiguitas apud authores inuenitur. Vnde fit, ut pleriq; græcorum librorum interpretes mirum in modum torqueantur & subinde etiam aberrant. Itaq; φάρυγξ duo significat, nempe fauces, & asperam arteriam. Fauces dico regionem intra os, ubi tum gulæ, tum asperæ arteriæ extrema concurrunt. Grammatici genere distinctionem faciunt hoc pacto: φάρυγξ θύλαχῶς σημαίνει τὴν κυρίως φάρυγγα ἢ δὲ εἶναι ἢ ἀχανία ἢ μετὰ τὴν τῆς γλώττης ῥίζαν ὅτε δὲ ἀρτερινῶς σημαίνει πολλάκις τὸν λάρυγγα. Quæ uerba sonāt ita Pharynx feminino genere prolata, proprie dictam pharyngē, hoc est fauces significat: Hæc autem est oris ampla capacitas post linguæ radicem sita. Masculino autem genere ducts pharynx, laryngem, quod est, arteriæ asperæ summum uel ipsam arteriam signat. Hippocrates libro prognosticon per dictionem φάρυγγα in feminino genere fauces etiam intelligit, cum ait: φάρυγξ δὲ ἔλκου μέν σὺν πυρετῷ θεινόν, Paulo post, αἱ δὲ κυνάχαι θεινόταται μὲν εἰσι, καὶ τάχιτα ἀναιρῶσιν, δόκοι μὴτ' ἐν φάρυγγι μηδὲν ἐκδηλον ποιέουσιν, hoc est: Anginæ grauissimæ sunt, & cito interimunt, quæ neq; in faucibus, neq; in collo quippiam manifestum edunt, &c. Hanc sententiam Galenus exponens inquit: ὅτι φάρυγγα τὴν περὶ καὶ μένιν χῶραν τομάχου τε καὶ λάρυγγος ὀνομάζει, δῆλον ἐστίν. Hoc est. Quod pharyngē nominat regionem, gulæ & asperæ arteriæ summo præpositā, nemo ignorat. Rursus φάρυγγα δὲ τὴν ἐν τῷ διαίτῳ τὸ στόμα, καὶ πιλῆσαι τὴν γλώσσαν κάτω φαινομένην ἐν σφυρίαν ἐν ἢ τὰ δύο στόματα εἶναι τότε τῷ τομάχου, καὶ τῷ λάρυγγος. At pro larynge, & aspera arteria positam, non solū in masculino genere, ut Suidas putat, sed etiam in fœminino inuenias: præcipue apud Galenum, ut secundo de placitis Hippocratis & Galeni: τὸ μὲν γὰρ τῆς τραχείας ἀρτηρίας ἢ περὶ δὴ καὶ φάρυγγα προσαγορεύομεν. Ibidem, ἐπὶ δὲ τῇ τῶν ἀπασιν ἐξῆς ὑποδείξομεν σοι τὸ τῆς φωνῆς ἴδιον ὄργανον τὸν φάρυγγα, καὶ τὰς κινῶντας αὐτὸν λῦς. Hic pro larynge accipit: de qua ita scribit, octauo de usu particularū: καὶ τό γε πρῶτον τε καὶ κυριώτατον ὄργανον τῆς φωνῆς ὃ λάρυγξ ὀνομα, τὸ ἄνω πέραις ἐστὶ τῆς τραχείας ἀρτηρίας ἢ δῆ καὶ



ἢ καὶ φάρυγγα καλεῖσιν δμυνίμως τῇ πρὸ τῆ λάρυγγος, hoc  
est: Ac primum, principalissimumq; uocis instrumentū, quod λάρυγξ.  
larynga nominant, superior pars asperæ arteriæ existit, quam  
sanè etiam pharynga uocant, eodem nimirum uocabulo quo  
pharynx (id est, fauces) ante arteriæ asperæ caput, nuncupa-  
tur. Atq; hic in feminino genere ut superius in masculino po-  
situm est nomē pharyngis, contra grammaticorum opinionē.  
Pollux audiendus non est, qui τὸν φάρυγγα masculino gene-  
re prolatum, pro gulæ extremo accipiat.

Pueris raro talis.] Pueris iterim uertebrae colli è loco suo Nota,  
excidūt propter ligamentorū quæ eas cōnectūt imbecillitatē.  
Vnde angina periculosissima oriē, quæ nullis cedit remediis,  
quare ei admouēda manus non est. Intelligenda aut sunt hæc.

Pueris raro talis.] Raro quidem, sed tamen interdum an-  
gina hæc accidit, idq; in pueris magis, quàm adultis, ob cau-  
sam superius dictam. Hippocrates huius meminit lib. 2. περὶ  
ἐπιδημιῶν in istum fere modum: ἂν δὲ τῶν κυναρχικῶν παθή-  
ματα τριάδε, τῆ τράχηλου οἰσπόνδυλοι αἰσώ εἴρεπον. ταῖς μὲν  
πιπλέον, τοῖς δὲ ἐπ' ἐλαττον.

Porro ex strangulatis.] Hippocrates lib. 2. Aphorismorum  
hanc profert sententiam τῶν ἀπαγχομένων καὶ καταλυομένων  
μὴ πω δὲ τεθνηκότων ἐκ ἀναφύξεως οἷς ἀνὰ φρὸς ἢ περὶ τὸ στο-  
μα, hoc est, Quibus strangulatis, solutisq; nondum uero mor-  
tuis spuma circa os extiterit, non restituantur.

Discussis autem colli.] In græco codice est διαλυομένων δὲ Aduerte.  
τῶν περὶ τὴν τράχηλον ἐρυθμάτων, quod antea uerterā. Simu-  
latq; uero colli impedimenta dissoluantur, intelligens nimi-  
rum uincula quibus strangulantur.

## IN XXVIII. CAPVT.

Grauedo.] Celsus libro quarto dictiones græcas elegāter  
exponit, κορύζαν grauedinem nominās, κατὰ στάγμους, uel κόρυζα.  
ut Paulus habet, κατὰ ῥέους distillationes.

Aquiloniis diebus.] Græce est ἐν βορέαις κατὰ σήμεσι qđ  
est aquiloniis aeris statibus seu constitutionibus. Ego Celsum  
secutus sum.

Tussis.] Tussis uariis de causis excitatur, nūc ob intēperiē, Tussis  
nūc ob humores, uel tenues, uel crassos ex alto descēdētes In  
terim ob iocinoris inflāmatōē: iterim ob pulmonis affectū Anapho-  
Anaphoticos.] Interpretatus sum eos q̄ agrē reiciūt, scili- tici.



cer qui crassa glutinosaq; ex pectore reiciunt, hi enim difficulter propter crassiciem educunt. Sunt qui ad sanguinē reijcientes referant, mea opinione, incommode.

## IN XXXIX. CAPVT.

ἀσθμα.

**Q**ui febris expertes.] Galenus lib. 7. de compositione medicamentorū secundum locos copiosius hæc, Aetius item & Oribasius ante Paulum pene eadem tradiderunt: non autem eo compendio quo Paulus, usi sunt. Cæterum ἀσθμα suspirium uerti: quod latine etiā dici possit anhelatio.

Acetum scilliticum.] Valētia hic commemorat medicamenta, purgationemq; fortissimā, ea nimirū ratione, q̄ multas numero partes pertransire oportet, antequā ad pulmonē perueniāt, nēpe os, gulam, stomachum, uentriculū, tenuia intestina, uenas meseraicas, uenas in sima parte iocinoris, item eas, quæ ī gila habētur, hinc uenā cauā, postremo pulmonē.

## IN XXX. CAPVT.

**T**unica oculi ceratoides.] Ex octauo Oribasii hæc sunt transcripta, Dixi autem in pinguetudinem lāguescit, pro modice aut leuiter pingues sunt, græce est ὑπολιπαροὶ φαίνονται, hoc est subpingues apparent. Locutio est Pliniana in pinguedinem languescit.

Explicata sententia.

Suffragantibus qui huc req.] Græce est ἐπιτρεπόντων μὲν τῶν εἰς τὸ ἀσθμα. hoc est ad uerbum, permittentibus quidem ad hoc numeris. Quæ sententia obscura quibusdam uideri possit. Hoc autem sibi uult, omnibus quæ huc requiruntur, indicationibus consentientibus: nempe uiribus, morbi natura, ætate, & aliis id genus reliquis.

Hydrosatū Aetij iunioris.

Hydromalo.] Hoc est potione dulci ex malis Cotoneis, melle & aqua confecta.

Hydrosfato.] Huius etiam misturam Paulus libro septimo exponit, ex rosīs, aqua & melle. Recentiores autē græci, ut actuarius paulo delatiorē compositionem hydrosfatū appellant, ea recipit aquæ libras decem, Zuccari libras quinque, hæc feruescunt una donec spissitudo fiat: postea additur succi rosarum libra. Febribus conuenire dicunt.

Oroscius Castigatur codex.

Idem in (parfam.)] In Græco codice est ἰσως ἐμπεπασμένης. male nimirum, pro ἰσως ἐμπεπασμένης quod Oroscius & Basiliensis castigator mutare noluerunt.

Epithema.] Hæc dictio quidem in Græco non est, sed intelligenda



telligenda uenit. Nā Aetius eam apponit. Cæterū per resinā, intellige terebinthinam, Per medullam, ceruinam. Nam ista sunt excellentiæ uocabula, Per æsypum quod in Græco est, υσσώπω, intellige medicamentum liquidum in septimo descriptum. Aetius legit οισύπου υγρό, hoc est æsypi liquidi. Cæterum iridē siccam mandi detritam, ac in puluerem redactam.

## IN XXXI. CAPVT.

**C**Ruentum sputum.] Tribus potissimū de causis sanguis per os educitur Vel enim ex ea parte aliqua uenosi generis, uel rupta, uel ore alicuius uenæ patefacto Primam διαβρωσιν, secundam ρήξιν, tertiam ἀνατομωσιν Græci appellāt, authore Celso lib. 4. At sanguis uel confertim uel paulatim erumpit. Vase quidē eroso sensim educitur, nisi magna adeo sit iactura, ut etiam pars aliqua pulmonis, uel eius cartilaginis reiiciatur, aut si casus ex alto, uel compressio uel aliud id genus superuenerit. Rupto autem cumulatim prorumpit, ut in aperto quoq; ore fieri solet. Paulus à Galeno dissentire uideē cum ait, εἰ δὲ κατὰ διάβρωσιν ἢ ἀθρόως, ἀλλὰ κατὰ βραχὺ τῆ αἵματος ἀναγωγὴ γίνεται Nam ille quarto de locis affectis libro inquit, αἱ δ' ἐξ ἀναβρώσεως ἀθρόα κενώσεις αἵματος ἐμὶτε προκρυμέναις γίνονται βραχείας τύσεσι καὶ τοῖς εἰς τῶν πνεύμονα δρύμεσι ξείμασι. Hoc est: At cumulatae sanguinis euacuationes ex erosione post pauca fiunt sputa, & acres in pulmonem fluxiones, &c. Quomodo igitur hæc cum Pauli uerbis consentient? Aetius lib. 8. in istum modum litem dirimit: Quibus ex erosione uenarum pulmonis, eductio sanguinis cōtingit, his per interualla modica sigillatim expuitur. Mox subiicit. Fieri etiam potest ut ex erosione sanguis coaceruatim erumpat. Cum enim præcedenti tempore paulatim quis expuerit sanguinē, nec diebus infecutis uel casus, uel alia quædam causa uiolenta superuenerit, sanguinis tamen eruptio multa prodierit, magnam subesse erosionē oportet, &c. Itaq; primis diebus paulatim ex erosione sanguis reiicitur. Si aciores fluxus in pulmonem destillarint, quæ magnam erosionē pepererint, confertim prorumpit. Non possum satis hoc in capite Oroscium demirari, qui pro dictione Græca πλήθος multitudinem uerterit, tantus medicus ut ipse uideri uult.

Querens membrana ] In Græco est δριὺς τὸ ἰνώδες, καὶ τὸ ὑπὸ τῷ κελύφει τῆς βελάνης. In septimo tantum, ὑμενώδες legitur.

διαβρω-  
σις.  
ρήξις.  
ἀνατό-  
μωσις.

Oroscius.



**Mēbranæ  
quercus.**

legitur. Dioscorides habet τὸ μεταξὺ τῆ φλοιῶ καὶ τῆ πρεμνοῦ ὑμενωδὲς. Prima est interior & subiecta corticis tibia quæ ligno cta ὑμενωδὲς itaq; sit ὑμενωδὲς. Vtraq; astringendi vim obtinet.

**Lectionem  
obserua.**

Phagi autem & ilicis mēbranæ præstantiores sunt. Gal. lib. 6 de simplici medicina eadem fere habet σφοδρύτερον δ' ἔτιστύρει φηγὸς καὶ πρίνος. Intellige τὸ ὑμενωδὲς.

**ὁπόραι.**

Cochleare unum. Exemplum Græcum Basilensis habet κοχλιάριον, id est hoc est cochlearia uudecim. quæ mēsurā magna est nimis, eoq; legendum κοχλιάριον. α̃.

Fructibus ] In Græco erat ὁπόρων, alias uerti poma, quod scilicet lignosi nihil habeant. uerum hic recenset etiam malū punicum extrinsecus durum, ob quam causam, fructibus, dixi, quia latius patet, fructus quā poma. Et differētia superius exposita nonnunquam confunditur.

#### IN XXXII. CAPVT.

**ἐμπύμα**

**P**uris illuuiēs. ] Sic interpretatus sum ἐμπύμα: quasi dicas puris in parte aliqua collectio. ἐμπυοι Purulenti Plinio uocantur. alii exponunt, pectore suppurati.

#### IN XXXIII. CAPVT.

**Iugulum  
præcordia.**

**P**leuritis. ] Celsus interpretatur laterū dolorem lib. 2. & 4. Huic, inquit, accedit febris & tussis. In Græco uerbū est συνεδρεύεται, quod signat, simul accedit, assistit, ac quasi indiuidua est.

Viq; ad iugulum & præcordia. ] Alii dicunt usq; ad clauiculam, & hypochondria. Ego Celsum imitor, qui clauiculam seu κλειδὰ iugulum exponit, & ὑποχόνδρια, præcordia. Distinguit autem postea, quando ad iugulum dolor, quando autem ad præcordia pertingit.

**Pulsus  
ferrans.**

Pulsusq; durus & ferræ modo inæqualem. ] Hæc pulsus species secundo libro exposita est. Galenus eam aperte interpretatur libro quarto de pulsuum causis in hunc modum: εὐλόγως ἐν σκληρότερος ἀπασιν τοῖς ἐπὶ φλεγμονῇ πυρέττουσιν ὁ σφυγμὸς γίνεται, καὶ προσέτι γε διὰ τὴν ἐδυσκрасίαν τὴν ἐν ταῖς ἀρτηρίαις ἀνώμαλος κατὰ μίαν προσβολὴν, καὶ δὴ λον ὡς ἀμφὸν συνελθόντων τὸ εἰρημένον ὑπότιναι εἶδος εὔται τῷ σφυγτῷ σφυγμῷ, τὸ οἷον ἐμπρίον τὴν αβὴν. οὕτω γὰρ ἀνάγκη φαντασιεῖσθαι τὸν ἀπτόμενον ὄργανον σκληρὸν τὴν προσβολὴν ἀνώμαλον ἔχοντα. Hoc est: Bona itaq; ratione omnibus qui ob inflammationem



flammationem febricitant pulsus oboritur durior. Præterea ob intemperiem arterias obfidem inæqualis in uno ictu, & nimirum ambobus coeuntibus pulsus erit species à quibusdam dicta, ueluti ferra tangentis manum secās. Ita enim necesse est imaginari eum qui tanget durum instrumentū quod occursum habet inæqualem.

Quæ nihil emolitur.] Hoc est, quæ nihil exspuitur. Sic Celsus loquitur libro quarto.

Atq; si tumor purulentus.] Hoc est ex inflammatione musculorum externorum collectus, nisi dissipatur, in exteriorem partem scalpello incidi debet. Græce est ἐπὶ τὰ ἐκτὸς ἐπιτμηθῆναι παραγίνεται, quod ad uerbum sonat, ad exteriora incidi cōmodo est. Nam παραγίνεται signat βοηθεῖν, ἐπικερῆναι. Hoc Orosius in Albano quem ferè in singulis uerbis reprehendit, non adnotat.

Illa nanq; nisi uel extra, uel intus.] Hoc est, nisi per os, uel per aluū fuerit expurgata. Foras. n. per cutē purgari non pōt.

Remedium est sanguis dimissus.] Non dicit quæ ex parte mitti debeat Hippocrates sane lib. 4. de uictus ratione in morbis acutis manifesto docet his uerbis: ἢν μὲν ὁδὺν ἀνω περᾶν ἢ πρὸς κληίδα ἢ περὶ μᾶζον καὶ βραχίονα τέμνειν χρὴ τὴν ἐν τῷ βραχίονι φλέβα τὴν ἄνω ἐφ' ὁκότερον ἂν ἢ τῶν μερῶν κατὰ τόδε. Hoc est: Siquidem dolor sursum ad iugulum, aut circa mammas, aut brachium pertinent, internam brachii uenam secare oportet, illa nimirum parte, qua dolor fuerit. Galenus exponens hæc ait: Cubiti internam incidere conuenit illius partis, qua dolor fuerit. Oribasius capite de sanguinis missione habet: Pleuriticis autem ex ipsa parte quæ dolet auferendus est sanguis. Hæc obiter posui candide lector, ut isti Arabum sectatores uideant, ueteres illos ex eadē parte initia semper, non ex aduersa sanguinem detraxisse.

Pleuriticis  
unde mit-  
tendus san-  
guis.

Solidiore utetur cibo.] Græce est καὶ τῇ ἀδρότερά. Nam λεπτότερα, hoc est tenuior, seu qui extenuet, ut est, multa fortitio ex prisana chōdro, aliisq; opponitur δρότερα, q. recte dicitur solidior, qui uidelicet magis nutrit. Gal. interpretatur ἢ παραύξουσα τροφή, quod est adaugēs alimentū, quod Celsus dicit ualētis materiæ. Vt enim tenuis cibus corpori parū adiicit, aut nihil, sed uires tm cōseruat pro tātillo tēpore, sic solidior plus corpus alit. Nō est quod Orosius alios reprehēdat, uertētes

Cibus so-  
lidior.  
ἀδρότε-  
ρον.

ἐδρότερον



ἁδρότερον solidius. Non nego aliquando plenius posse dici.

## IN XXXIII. CAPVT.

**C**ordis affectus.] Gal. cum in quinto de locis affectis, tum uero secundo in librum Hippocr. de ratione uictus in morbis acutis commentario de cordis affectibus pene eadē tractauit Principia itaq; tria in humano corpore existunt, cor, cerebrum, hepar. Hæc autem interim per se afficiuntur, interim ex consensu tum mutuo, tum aliarum quarundam partiū. Corde itaq; affecto per se, præsens est periculum: secundum locum obtinet cerebrum, postremum iecur. At si ex uentriculi dolore, cor afficiatur, syncope oritur, si cerebrum consentiat, delirium, uel conuulsiones.

Syncope  
differētiæ.

Syncope appellatam.] Syncope totius habitus est resolutio. Sunt autem aliquot eius species, cardiaca scilicet, quæ intemperiem cordis, uel inflammationem, uel erysipeles sequitur. Stomachica quæ ab oris uentriculi affectū, corde simul confortii lege dolēte generatur. Flatuosa, ex cruditatib. cōstitui ē.

παλμός .  
Palpitatio

Novi inquit.] Lib 5. de locis affectis hanc historiam commemorat Galenus, unde etiam hæc sunt transcripta. Est autē palpitatio quam Græci uocant πάλμον, qui est teste Galeno περι τρύμου καὶ παλμῆ, καὶ σπασμῶ, καὶ ῥίγους: διατασις καὶ συνήκησις παρὰ φύσιν, ac omni parti accidit palpitatio, etiam immobili. Causam eodem libello Galenus ostendit his uerbis πνεῦμα παχὴ καὶ ὡτμᾶδες ἐκ ἔχον διέξοδον, hoc est spiritum crassum, & uaporosum qui non habeat exitum. Cordis autē palpitationem humor aliquando generat, in ambiente cor tunica quam pericardion: Anatomici uocant, collectus.

## IN XXXVII. CAPVT.

**N**am si sola.] Ex octauo Galeni de compositione medicamentorum secundum locos, & ex Oribasio hæc sunt tractata. Paulus dixit, sola, ubi Gal. habet ἀμικτὴ τῆς τρωατικῆς διὰ μέως hoc est, non admixto corroborante præsidio.

Oroscius.  
Castigatur  
codex.

Oroscius.  
Deprauatus  
eodex.

Omphacii drachma.] Omphacium est uuxæ acerbæ succus: quem Barbari agrestem uocant Male in Codice Græco legitur ὀμφακίνης pro ὀμφανίου. Oroscius neglexit.

Augendus autē.] Vitiose legitur in Græco exēplari παρὰ ξεν pro παρὰ ξέν, quod ēt uterq; Aristarchus præterit.

Aloe trita inspargitur.] Græcus Codex perperam habet ἐπιπλάσσειται pro ἐπιπάσσειται nec hoc, aduertentibus Aristarchis,



starchis, sicut ēt paulo post ἐμπλάσας pro ἐμπάσας habet.

*De cibi fastidio.*

**S**I cibus quodammodo præter uolūtatem.] In Græco Co  
dice est, εἰ βιασθέντες τὴν πρᾶξιν αὐτῶν τυχόντων. Huic respondet  
Gal. hoc ad Glauconem primo: οἱ δὲ εἰς τοὺς στόμαχος φαύ  
λως ἴσχουσιν ὥστε ἀποστρέφονται τὰ σιτία, καὶ εἰ βιασάμενοι  
λάβοιεν, ἢ μὴ κᾶτεχον, ἢ μὴ πέττειν καλῶς, hoc est, quidam ue  
ro statim os uentriculi habent affectū, ut cibos auersentur, &  
si coacti assumpserint, aut nō retineāt, aut male concoquant.

Quam Romam Meleam.] Cōstātinus Cæsar Meleæ præ Melca.  
parationē lib. 18. de agricultura tradit. Est aut lac in feruētes  
ollas, quæ iam acetū incalescēdo absorpserint, reconditū aci  
dumq; redditū, ut species eius quod oxygala dī, uideri queat.

Conditio.] Constantinus Cæsar lib 8 conditi præparatio- Conditū.  
nem in hunc modū tradit: πεπέρως πεπλυμένον καὶ ἐφυγμέ  
νον, τριβομένου ἐπὶ μελῶς γράμματα ἢ μελιτος ἀττικῆς εἶναι. α.  
αἶνον παλεῖν καὶ λουκῆ ξετας δ.

Maloplacuntion.] Hoc est placentula ex malis Cotoneis.  
Paulus lib. 7. latius exponit.

Sorbitionibus ex oleo.] In Græco codice εὐτὸς male le- Castigatur  
codex.  
gitur pro ἐκ τῆς ἐλαίου. Gemusæus uitiosum reliquit exēplar.

Aloe, masuchæ.] Masucha cōpositio, nō simplex remediū  
existit. habes eius descriptionem lib. 7. Pauli expressam.

IN XXXVIII. CAPVT.

**C**Um tormine intestinorū.] Græca dictio est στρέφον, quæ  
Largo tormina intestinorum significat, quanquam & do  
lorem stomachi haud absurde interim interpreteris licet.

Exigua caliditate.] In Græco est, ὑποθερμότης χλιαρᾶς,  
quasi dicas caliditate tepida Aetius mediocri dixit.

IN XXXIX. CAPVT.

**C**holera est immodica.] Cholera commune stomachi &  
intestinorum uitium uideri potest. Nā simul & deiectio,  
& uomitus est, præterq; hæc, inflatio, intestina torquentur Bi  
lis supra, infraq; erumpit.

Hydromalum.] Hoc est aqua ex malis Cotoneis præpa  
rata scripturam eius habet lib. 7. Paul. sumitur autem & per  
se potui, & cum micis panis.

Horarios seu fugaces.] Alias exposui qui sint horarii quos  
Plin.



Plin uocat temperarios & tempestiuos. Sunt autem hi qui diu offeruari nequeant.

Suum petunculi.] Hoc est suum pedes. Celsus alibi Trunculos nidetur nominare suū pedes inter ea q̄ bani sunt succi.

## IN XL. CAPVT.

Leuitas  
intestino-  
rum.

**L**Enteria.] Celsus ad uerbum interpretatur hāc uocē, læuitatē intestinorū nominans. In hac cibus nō cōtinetur, & quicquid assumptum est, imperfectum protinus redditur.

Cerata ex myrteo.] In græco legitur κερῶτα διὰ μυρσίνης pro κερῶτα διὰ μυρσινίνης quod est, Cerata ex oleo myrteo. Sic etiam Aetius habet.

## IN XLI. CAPVT.

ἀπαραι-  
τητος.

**I**mplacabilis desidendi.] græcè erat ἀπαραιτήτος πτοθυμία πρὸς ἐκκρίσιν. Celsus ponit frequens desidendi cupiditas: ἀπαραιτήτος signat ineuitabilis. Melius sonat hic implacabilis, frequens & assidua est. Quidam τένεσ μὲν scribendum putant à uerbo τένω, quod est tendo.

## IN XLII. CAPVT.

**L**Atini tormina.] Celsus lib. 4. ita inquit, Proxima his inter intestinorum mala tormina esse consuerunt, δυσεντερίαι Græcis uocantur. Vide Galeni librum sextum de locis affectis, Oribasii librum nonum.

Tenesmi mutatione:] Græce est ἀν μεταπτώσεως τήνεσ-μῃ, quasi dicas ad uerbum ex decidentia tenesmi, cum uidelicet Tenesmus in dysenteriam degenerat, transit, mutatur.

Corrigitur  
codex.  
Orosius.

Deinde leuiter subcruenta.] In Græco male habetur οἷα πρὸς γόγον αἵματώδεις pro οἷα πρὸς ὀλίγον αἵματώδεις. Celsus etiam quodam loco interpretatur. Leuiter subcruenta. Orosius & Gemusæus non annotarunt.

Cochlearum integro tostarum.] Græce est κοχλιῶν ὅλων quod sonat cochlearum totarum, quod nostri dicūt, cū toto.

## IN XLIII. CAPVT.

Nota.

**C**olon.] Hoc intestinum apud Latinos scriptores uaria sortitur nomina, nunc intestinum crassum, nunc plenius, nunc laxius appellatur, Paulus dicit, cū pars sit intestini crassi, hoc est, recti. Nam rectum octo fere digitos longum, statim colon uocatur, quod tenuibus est crassius. A sinistro rene ad dextrum super uentriculi fundum fertur, donec sæpenumero & lienem, & iecur attingat. Quod dicet aliquis quod Paulus contra



contra Galeni sententiam à dextra ilium regione peecedere colon pronunciat. Huic respondet Si à tenuibus intestinis numeremus, per dextra ilia prius superuectum colon ad sinistra prodit. Sin à recto incipiamus, à sinistra parte incipit, in dexte riorem obliquum conuertitur.

Ex cruciatur præsertim sensu.] Græce est ἡ ὀδὴν γίνεται, μάλιτα δὲ κατὰ θέτιν τῆ κώλου τρυπανόδου συναιδήσεως γι νομένης. quod ad uerū sonat. Color oritur, maxime uero iuxta sitū Coli, terebrali (ut sic dicam) sensu excitato. Galenus hanc doloris speciem lib. 2. de locis affectis exponit his uerbis, οἱ δὲ αὖ καὶ ἐμὰν τῶ ποτὲ συμβάσαν ὀδὴν σφοδρῶς ἀτῆν, ὥς τρυ πάνω δοκῆν διατηρεῖσθαι κατὰ τὸ βάθος τῆς κοιλίας. Rursus in eodem capite, τὰ μὲν δὴ τριαῦτα τῶν ἀλγημάτων ὥς ὑπὸ τρυπάνος φαίνεται γινόμενα.

Dolor co  
li qualis.

Brassicæ caule probe polito.] Græce erat κραιμβῆς καυλῶ καλῶς ἐξεμμένω. Oroscius intelligit per ἐξεμμένω, cocto, quod ἐξεσμένω potius significasset. Præterea Dioscorides leuiter seruata, si edatur, aluo idoneam: percoctā uero aluū sistere.

Iubebis ut lauent, incalescantq; laconico.] Ad humorem pituitosum concoquendum consulit naturales balneas, & Laconicum. Est autem Laconicū etiam hodie adhuc in usu, testudo, illa thermarū, quæ igne concalfacta uaporem siccū excitat, qui deinde sudorem mouet in corporibus: Columella meminit his uerbis, quotidianam cruditatem laconicis excoquimus, & exusto sudore sitim quærimus. Græca sunt πυριεῖσαι ἐν διαπύροις τοίχοις, quasi dicas desudare intra ignitos parietes. Non opus erat ponere ignitos parietes, cum Laconici uox hoc cōprehēdat, sed ut sciolis quibusdā fiat satis, apposuit.

Laconicū.

Cucurbitæ quàm maximè cū flamma.] Sic interpretatus sum σικύαι ὥς μέγιστα διαπύροι, quasi dicas cucurbitæ quàm maximè ignitæ. Celsus cū flamma dicit, quem inuitatus sum.

Tāquam in crisi, causā.] Paulo pluribus uerbis reddidi hanc sententiam: ὥς περ ἐν κρίσει μετατάσεως τῆς αἰτίας, hoc est ad uerbum, tanquam Crisi causā mutata. Is autem sensus est, Colicus hic morbus tandem ex intestinis materia tanquam per crisim expulsa in alias partes finitus est.

## IN XLIIII. CAPVT.

Leos.] Morbus hic nomē claturam ab ipsa parte affecta, ut Ileos. Superius, colicus, accepit. Nā tenue intestinum, ut ieiunum



etiam dicitur. Incipit, si ab imo incipias à ceco, & desinit in  
ieiunum, in uarios implicatum orbes. Quidam recentiores  
morbum nocant Voluulum.

Voluulus.

Colica affectione.] Hoc Paulus superius dixit ubi habet:  
Inter colicas affectiones hæc est grauissima, quæ in Ileū tran-  
sitionem mittatur.

### IN XLV. CAPVT.

Colicis in dexteriore potius ilium.] Quia per dextra ilia  
superuectum, uentriculi fundo incumbit lineam & iecur  
attingens: deinde ad sinistra prodit, si de superiore ipsius ini-  
tio, ceco intestino, dici intelligas. Nam infra sinistram magis  
partem occupat.

κατ' αὐτὸν.  
κατ' ἱστίν.

Hiusdē lateris ac è.] Hoc signat græce κατ' αὐτὸν & κατ' ἱστίν  
si Galeno credimus. Hippocr prior his dictionibus usus est.

Oroscius.

Hoc inspergi potest.] In codice græco perperam scriptū  
ἐστὶ κατὰ πλάτος, pro κατὰ πάτος. Nam de puluere, nō empla-  
stro mentio est. Aristarchi libenter omiserunt.

Acroto-  
meli.

Phylli; momēto ex mero & melle.] Hoc est, phylli mo-  
dico cū mulsō. Nam ἀκρατόμελι nihil aliud est, quàm οἶνόμε-  
λι. Contrariū est μελίκρατον, quod uidelicet ex aqua & melle  
confit. In græco erat εὐκρατομέλιτος pro ἀκρατομέλιτος.

Iniectione recti syphonis.] Lib. 7. hanc rationem indendi  
canalis recti in uesicam habes expositā. Vocant καθετηρισμόν  
ab instrumento κατετήρης. Solent autem quasi lationes corpo-  
ris simul adhiberi, ut calculus facilius excidat.

Hermo-  
laus.

Ex uino & oleo rosaceo, uel ex aqua & oleo.] Græce est ἐξ  
οἴνου ροδίνου ἢ ὕδατος ροδίνου. Quidā de uino rosaceo, & aqua rosa-  
ceo intelligunt: male nimirū quia ροδινὸν per se oleum rosa-  
ceum significat. Hermolaus barbarus in corollario suo, pace  
illius dixerium, oxyrhodinū interpretatur, acetum rosaceum,  
pro aceto & oleo rosaceo, ut Galenus, & alii græci accipiunt.

Depraua-  
tum exem-  
plar græ-  
cum.

Archigenes in epistola.] Idem refert Aetius sermone un-  
decimo. Ad finem deest particula, in græco habetur enim σι-  
κίου σπέρμα κακαθαρμένον ἀριθμῶ. λ. cum legendum sit, σικίου  
ἱμερῶ σπέρματος κακαθαρμένον κόκκους ἀριθμῶ. λ. Paulo post,  
amyli cochlearia duo. Perperam character, qui heminam si-  
gnat, ac legendum est. Κοχλ. ut sit cochleare. Iterum: σικίου  
σπέρματος ἵε pro σικίου σπέρματος κόκκους ἵε.

Nonnihil



Nonnihil ex uena laxant ] Hoc est ut latius exponit Aetius, ex uena caua propter amplitudinem osculorum remittunt. Interim per circuitus hoc mali repetit. Per initia ægri nihil mali sentiunt, eoq; nihil tentandum. Sin autem perseueret, occurrédū, alias grauissima symptomata solēt prouenire.

Aut lixiuium. ] Simplici uerbo dixit Paulus ἡ τὰ κτην, quod antea quoq; annotaui.

Diabetes. ] Multa nomina hic affectio habet, uide Galenū Diabetes. de locis affectis lib. 6. Venit à uerbo διαβημι, quod signat, pertranseo. Potus enim quàm primū assumptus est, statim trāsit,

Rosato. ] Forte legendum in græco pro ξοσάτῃ ὑδροροσάτῃ. Nota. Nam apud Paulum in septimo nulla est mētio rosati, sed hydrorosati, ubi etiam Rodomelon exponit.

Musculus qui ceruicem. ] Musculus hic transuersis constat fibris, uariaq; habet officia. Primum quidem uesicam claudit, licet sine illo claudi possit. Deinde post emissionem urinæ cōtractus undiquaq; id quod in meatu est propellit. Præterea quicquid in exprimente in urinarium meatum incidit, id ne diutius immoretur ibi efficit, sicut cūm urina mordax est.

Ex anatome cōstāt

Resolutionem repræsentat. ] Græce est παραλύσεως ἔμφασιν ἐργάζεται, quasi dicas, resolutionis emplasm efficit. ἔμφασις autem est repræsentatio rei cuiusdam, aut adumbratio.

In succum quidem conuersa. ] Hoc est in chylum medici dicunt, & ut latinam dictionem per græcam interpreter. Habet autem Paulus χυλοποιηθέντα, quod est in succum seu chylum redacta beneficio uentriculi. Simile uerbum Gale. lib. 8. de compositione medicamentorum secundum locos habet, ut antea quoq; annotaui: neυπεχύρωτα quasi dicas exuccata, sed hoc plus signat, chilum scilicet à iecinore attractum ita ut liquidior pars sit distributa, siccior ueluti recremētum relicta. Dicimus itaq; Chilū ἐκχύρωτον cum & uentriculus probè concoxerit, & iecur attraxerit, ubi uero ille quidem concoxerit, iecur autem attrahendi uim habeat infirmam, ἀνεχύρωτα & liquida excernuntur.

χυλοποιη-  
θέντα.

Bilis insigniter colorata. ] Hoc est bilis colore suo abunde exaturata per aluum descendens uel deiectio meræ bilis. Nā Gale. apud Hippocratem interpretatur κατακροεῖα, τὰ ἀκροτοχολῆ διαχωρήματα.

κατακρο-

Quādo iecoris substantia. ] Græce est ἡ δὲ καὶ τῆς ὑπὸ τῆς ῥῆς.

PAULI AEGIN.

Ec

αὐτῇ



αὐτῇ συντηκόμενης τῇ ἡπατός, quod ad uerbum sonat. Iā uerò etiam iocinoris substantia cum ea colliquefcente : Cū ea , intelligibile. Nam ubi humor fermè consumptus est, corpus ipsum contabescit cuiuscunq; partis :

φλόγωσις Flāmeus ardor ] Sic fere ubiq; sum interpretatus dictio-  
nē φλόγωσιν. Inflammationē uerò φλεγμονήν, secutus Celsum.

Chamæpyteos radice ] Paulus apud Galenū & Alexandrum medicū uariat Nam Chamæpyteo; drachmæ octo ponuntur. Verum Aetius cum Paulo consentit.

Troximū. Adhæc intybum, troximum, & sonchus ] Troximum hoc est, eris per se esui aptum significat. Sereos autem genera tam hepatis affectibus cōueniunt, ut etiam cruda comedi possint.

Exemplar græcum uicinosum, In qbus calor intenditur. ] In codice græco habet, τὰ τοῖς γερμοῖς ἢ τὰ τῆς θερμότητος Balthē. corrector hoc nō castigauit. Corruda. ] Græce est μύρακη, quæ latinis Corruda dicitur, hoc est asparagus syluestris.

Illud aut in summa præcipiendū ] Hoc Galeus lib. 8 de cōpositione medicamentorū secūdū locos cōmemorat. iecur & stomachum semper astringētia cum relaxantibus requirere. Aliàs sæpe stomachicis syncope iocinorosis interius suscitāt.

Copton ] Sic dicitur medicamentū quod tunditur. Est aut malagma lib 7. ad duriciem stomachi & iocinoris inscriptū.

#### IN XLVII. CAPVT.

Cottabismus.

Cottabismi. ] Cottabismus olim ludus apud Græcos erat, quo uinū ex alto fundebāt, strepitū faciētes Hic aut possit accipi pro superfusione in partē aliquā, aut pro ruboris excitatione quo sanguis in exteriora eliciatur, hæc dū meliora occurrūt, boni consule

#### IN XLVIII. CAPVT.

VT corpus albido, & pituitæ colore. ] Græce est, ὡς λευκὸν καὶ φλεγματῶδες τὸ σῶμα φαίνεσθαι ad uerbū sonāt hæc, ut album & pituitosum corpus appareat. Dicit aut de externo colore apparente. Eoq; albido & pituitoso colore uertendum erat, quanquam parum refert dicere, album & pituitosum apparet, mortuus instar. Ex nono Oribasij sumpta sunt.

Codex græcus uicinosus.

Coqui autem possit etiam in aqua. ] Herperam in codice, græco legitur ἵδασσι pro ἵδασι. Caterum πινωμέναις de futuro intelligendum est.

ψαμμοπός quid.

Ad hæc in arena cōtecti desudent. ] Sic interpretatus sum ψαμμοπὸν. Solēt aut hydropici in arena à sole ex calfacta sepeliri



peliri capite excepto, ut humiditas meatib<sup>9</sup> apertis extrahat.

Quia si cum febris aqua subter cutem. ] Si duo uno tempore uicia infestent, uehementiori insistendum, altero nō neglecto, quod Paulus per uerbum τὸ κατεπείγον signat.

τὸ κατὰ  
πείγον ὡς  
urget.

Corpus emaciant, colliquantq; releganda Quidam nasutus propter malè impressum codicem latinum hic me corrigendum censuit, q̄ liber habuerit eligenda. Quasi uero nescierim quid sit περιαιρετέον. Gemusæo Luteriæ indicant legendum releganda pro eligenda.

περιαίρε-  
τέον.  
Calūnia.  
παράκέν-  
τησις.

Ad perforationem ueniendum. ] Græcè uocatur hæc chirurgiæ administratio παρακέντησις, hoc est pertusio & pūctio. Nam cos qui ascate laborant, ad peritonæum usq; imo in uēte diuidunt, sicut lib 6 de hydropicis comprehensum est.

## IN XLIX. CAPVT.

**C**Um lien melancholicum ] Galenus lib 9. de cōpositione medicamentorū secundū locos. Oribasius lib. 9. & Aetius 10 sermone de liene in eandem ferè sententiam tradiderūt.

Centaurij ] Male habet codex græcus ταυρίου pro κενταυρίου, nec tamen hoc castigator Basiliensis.

Ceræ libra, terebinthinæ. ] Græcus codex habet κηρίων τερεβινθίνης, pro κέρυ λίτρα. ᾱ. τερεβινθίνης λίτρα ᾱ. Oroscius cum Basiliensi hoc neglexit.

Cinis ex officina fabrilii. ] Cinis hic est, quem ferrū dum in officinis fabrilibus ignitur, ac malleo tunditur, abijcit Verba græca hæc sunt, καὶ ἡ τέφρα τῶν χαλκίων: ubi Oroscius interpretum censor, pro χαλκίων legendum putat κοχλειῶν At Gal. lib 9. iam citato, primum aquam in qua ferrum ignitum sæpius extinctum sit, potui lienosis præbet. Paulo post Cataplasma ex cinere fabrilis officinæ obducendum exhibet, hoc pacto inquit, καὶ ἡ τέφρα ἐκ τῶν χαλκίων μετ' ὕδατος.

τέφρα  
χαλκίων.  
Oroscij  
error.

Acetabulū cum oxymelito. ] Lectio codicis græci deprauata est: habet enim ξύβαφον πάντα ἢ ὄξυμέλιτος, ἀναγαλλίδος, pro ὄξύβαφον μετὰ ὄξυμέλιτος, ἢ ἀναγάλλιδος.

## IN L. CAPVT.

**S**I enim febricitante ægro ] Græca sonant, εἰ μὲν γὰρ ἐπὶ πυρεκτικῇ νόσῳ ἀθρόως γηγόνω δ' ἵκτερος ἀποπάυσιν τὸν πυρετὸν, hoc est ad uerbū. Si. n post febrilē morbū subito ortus agquatus febrim finierit. Vide nonū Oribasij, & decimū Aetii.

Ec 2

Si absq;



Excremen-  
ta alba.

Si absq; febris alba deijciantur.] Alba quia bilis in meatibus obstructa ad intestina non potuit descendere, quæ excrementa tingeret.

χρυσάτ-  
τικόν γλυ-  
κύ.

Seminis aut atriplicis scrupuli octo cum Chrysattico, aut alio passo.] In græco exemplari habetur, μετὰ χρυσάττικον ἢ ἄλλου γλυκέως Aetius meminit passi Chrysattici. Alexander item sæpius citat, dicitur esse coloris aurei. Scribit Dioscorides atriplicis semen cum mulla Ictericis conuenire.

#### IN LI. CAPVT.

ἐξόμφα-  
λον.

Causam umbelici prominentis.] Hoc uitium uno uocabulo Paulus uocat lib. 7. ἐξόμφαλον, quod uidelicet aut rupto in ea parte peritonæo, prolapsq; aut omento, aut intestino, interim ocioso humore umbilicum subeunte: interim carne subnata, alias sanguine ob uenæ, aut arteriæ rupturam concreto alias spiritu indiderim collecto, generatur. Celsus etiam caput facit de umbilico prominente.

ἐρεγμός

Fabæ fresæ corticum.] In græco est ἐρεγμὲ λεπύρων. Significat autem ἐρεγμός fabam fresam seu fractam. Dicitur autem etiam de aliis leguminibus confRACTIS, nomine ipsorum appositum. Quāquam hic possit simpliciter de faba dici καταχρηστικῶς, ut sit fabæ corticum, tu utrum malis sequere.

#### IN LII. CAPVT.

ἐνίσκος.

A Sellorum domesticorum qui tacti conduplicant se in orbem Sic interpretatus sum ex Largo ὀνίσκων κοτοικιδίων τῶν σφαιρουμένων. Ipse autem addit in pilæ rotundissimæ similem. Caterum uaria habent nomina, πολὺ ποδῆς enim græcis κομβαρίδες Dioscoridi, κύαμοι Galeno appellātur. Nascuntur sub aquariis uasis ut ait Archigenas: imo etiam omnibus locis humidioribus.

ἄσβετος,  
κονία.  
κονία ἄσ-  
βέτου.

Calcis uiuæ partibus duabus.] In græco est ἄσβετου κονίως. Nam ἄσβετος κονία. In extinctam calcē significat. Si autem κονία ἄσβετου ponatur, pro Lixiuio calcis accipiendum est.

#### IN LIII. CAPVT.

Nota.

Amolyn-  
to.

Aqua frigida perfuso.] Græce est προκατατλήσας ὕδατι ψυχρῷ. ante hoc προκατατρίψας habetur, uidetur legēdum προκατατρίψας, ut scilicet prius intro reprimatur. Nā quid confert prius intestinum confricare, quod προκατατρίβειν signat, nolui tamen immutare, quod non haberem quem sequeretur. Medicamento tam spisso.] Sic uerti ἀμολύντω χρώ. Signat autem



autem ἀμόλυντον non nominans à uerbo μόλυνω Coquuntur  
medicamenta nunc, ut liquida permaneant, nunc ut dura sint.  
Liquida immirtentis digitos inquinant. dura ac spissa non  
item. Est itaq; ἀμόλυντος spissitudo qua digitis, aut manus non  
inquinantur, quanquam Orosius uerterit, postquam ex co-  
ctura recrementa iam separata fuerint.

Erratum  
Orosij.

## IN LIIII. CAPVT.

**T**enuissimæ parti.] Sic fere ubiq; παμπάλυν sum interpre-  
tatus: aliquando pollinem, quod Orosius reprehendit,  
mihi uero placet, cum alios et doctissimos ita uertisse uideam.

Error Oro-  
scij.

Aphthæ ulcere pressos ὀφθαλμούς in græc ohabetur, quid  
sit ὀφθαλμὸς alibi exposuimus.

ὀφθαλμ-  
τες.

## IN LVII. CAPVT.

**P**riapismus.] Galenus ad uerbum lib. 10. hæc habet: Vbi  
male in codice græco ἐνέματων legitur pro ἐμμοτων, quod  
miror correctorem Basiliensem non aduertisse.

Nymphæam igitur.] Vulgo nenupharim appellat insigni  
refrigeratoria ui præditâ. Duplex est eius species: de qua alias.

## IN LVIII. CAPVT.

**D**e particulis inefficacibus.] Hoc loeo particulâs intelli-  
go, eas corporis partes, quæ generationi dicatæ sunt. Bar-  
bari caput faciunt de frigidis & maleficiatis.

Particulæ.

Priuatim stellio cōcrematus.] Hoc ex Oribasio sumptum  
est. Aetius sermone. 11. mentionē facit, aliorumq; cōplurium.

Satyriace.] Hoc est medicamentum, quod penem erigat,  
à satyris dictum, qui naturalibus arrectis depinguntur.

Satyri.

## IN LIX. CAPVT.

**S**in etiam altè descenderint.] In græco est εἰ δὲ καὶ βάθος  
αὐτοῖς τι συνελθῇ, hoc est: Sin autem profunditas etiam que-  
dam ipsis adfuerit.

Iuuat resina fricta.] Hoc est, sicca & retorrída. Duplex, re-  
sinæ species est, sicca & liquida. Sicca præparatur, ut Dioscori  
des memoriæ prodidit. Liquida utribus conditur, quanquam  
idem autor ex iisdem arboribus alias esse siccas, alias haberi  
liquidas autumnat. Sicca græcis φρυκτὴ nominatur, liquida  
ἢ ἐκ τῶν κεραμύων ὑγρὰ, hoc est si ad uerbum exponas, retorri-  
de, & ex utribus, seu dolijs liquida.

Resinæ.

Puluis inspergitur parti uino prius.] Hoc est, ista in pulue-  
rē redacta. Textus græcus deinde sequens deprauatus est,

φρυκτὴ.

Ec 3 habes



habet enim προαπονίπτων ἀπὶ πρὸς προαπονίπτων οὖν, ut ego  
cōuertī. Nec Orosius nec Basilienſis calligator animaduertit.

Triginta numero.] Viciōſus eſt codex græcus, ut qui ha-  
beat < α hoc eſt drachmam unam pro λ quod ſignat trigin-  
ta, ſacili nimirū lapſu. Galenus & Oribalius unde Paulus ſum-  
pſit, lectionem hanc confirmant.

Hemor-  
rhoidum  
differen-  
tia.

τυφλῆ.

Situs he-  
morrhoi-

ἀποσι-  
τες.

Oris uenarum quæ quod,] Ita ſimplicem dictiōē græcā  
αἱμορροΐδες ſum interpretatus. Sunt autem uenulæ quædam  
recti inteſtini, ore hiantes, eo quod ſtato tempore ſanguinē  
crāſſum ſeculentumq; excernunt, hæmorrhoides appellatæ:  
cum autem aperto non ſint mihiq; excernūt, ſed tumidæ ap-  
parent, ſanguine in eis ſuppreſſo, τυφλῆ græcis, Cæcæ, quaſi  
foramen nullum habentes, latinis uocantur. Differunt autem  
ſitu & origine, ſi Galeno in Anatomicis fidem accommoda-  
mus, aliæ ſiquidem in recto inteſtino, aliæ in ano, aliæ in cir-  
culari muſculo aluum conſtringente qui σφιγκτήρ appella-  
tur, conſiſtunt. Atq; hoc eſt quod Paulus dicit, quædam ſupe-  
rius deliteſcunt, non apparentes, ob loci longinquitatem.

Quantum ad originem attinet, aliæ uidentur ex ramis uenæ  
portæ, qui omento, lienī, uentriculo communes ſunt, propa-  
gari: aliæ ex cauæ uenæ diuaticatu in crura factō, ubi grandis  
arteria cauam uenam conſcendit. Hæ itaq; uel ex porta, uel  
ex caua ortæ nunc iuſto largius profluūt, nunc ſupprimuntur,  
quando remedia adhibere conuenit. Sin autem mediocriter  
fluant corpus multis morbis liberant.

Infeliciter contabescere.] Sic reddidi τὸν τρόπον ἀποσίτες  
γίνεσθαι. Abuſus eſt Paulus uerbo ἀποσίτες pro ἀσίτους, hoc  
eſt: ἀτρώφες γίνεσθαι, qđ ſignat, cibū nō ſentire, contabescere.

Quare cum plures ſint hæmorrhoides.] Ex Hippocrate  
ſumptum eſt apho, lib 6. ubi habet, αἱμορροΐδας ἰκθέντι χρο-  
νίας, ἂν μὴ μία διαφυλαχθῇ κίνδυνος υδρωπα εἰργινέσθαι ἢ φεί-  
σιν. Miror cur Aetius à Galeni ſententia, aliorumq; fere om-  
nium græcorum diſceſſerit, nullam eſſe relinquendā cēſens.

Quædam uero ſuperius.] Hoc eſt, quædam in recto inte-  
ſtino habentur: quæ ſuperiorem locum occupant, quam quæ  
in ano, & circulari muſculo apparent.

Cæcæ autem.] Hoc eſt cum apertæ uenæ, dolorem mo-  
uent, copia humoris melancholici grauata.

Cretæ ſutoriæ, aluminis rotūdi ſingulorū.] In græco codi-  
ce deſt



ce deest ἀνά, & τρογγύλης per se signat alumen rotundū, sicut σχιστὴ scissile. Aliqui tamē pro μελαντηρία, legunt τυπτηρία.

Recremēti plumbi rus syriaci singulorum drachmæ.] In uulgaris codicibus græcis habetur uncia octo. Verū Galenus & Oribasius habēt drach octo, quod nō annotauit Orosius.

## IN LX. CAPVT.

**C**irca statum menstruale tempus.] Græci uocāt certum, præfinitumq; tempus προεσμια, uel προεσμια τακτην & προημερίαν ut Budæus etiam annotauit.

προεσμια.

Detrahetur autem sanguinis.] Hodie sumus timidiore quā ut libram integram una uice detrahāmus, tantū abest, ut libras duas & dimidiam auferāmus.

Est autē pressus.] Descriptio pessarii. In græco codice autē superfluum est ἤτοι, uel in hunc modum legi debet: πεισσοῦς δε ἐστὶν ἔριον διεξασ μένον ἤτοι καὶ σφαιρωθῆν. Aliqui legēdum putant ἤτοι καὶ, hoc est, uel aliquid.

Amus, sion.] Malè in exemplari græco impressio σίων habetur, pro σίον aut σίσιον utraq; uim semina prouocandi menses obtinēt. Paulo post κερκίδες pro κεδρίδες substitutum est.

## IN LXII. CAPVT.

**O**B legitimum partū.] Hoc est, absolutum, perfectumq;. Nam postea dicit, uel ob abortum, illegitimū scilicet partum profluuiā accidere. Verum quæ ex naturali partu fiunt, sua sponte plurimum cessant. Erat in græco ἐπὶ τελείᾳς ἀποτέξεσιν, quod Orosius noster uertendum censuit. In fine patris, quā eruditè, uel mediocriter literatus indicare poterit.

ἀπότεξις  
τέλεια.  
Erratum  
Orosij.

Vel cōbustæ ipsius cinis.] Lege in cod. græco pro κενυμένον, κενυμένον αὐτῆς ἢ σποδία, qđ castigatores omiserunt. Paulo post κηκίδα βράθυ hī, tu fac κηκίδος βραχὺ. Quod ēt annotauit Orosius ex suo exemplari.

## IN LXIII. CAPVT.

**V**ntio ex melle.] Sic Gale. libello de prænoscendo præcipit in uxore Boethi, Romanorū cōsulit. Ita fere sonāt uerba ipsius: εἰκόησας τὸν σκοπόν τῆς διαίτης ποιήσασθαι, διατεπέματος ἐλαχίστου καὶ τριψέως ὅλας τὸ σώματος, ἐπιτεχρίσεως ὑποσκύδαζομένης, ἐδίαπίττησαι καὶ κηκίδος, ἀλλὰ διαμέλιτος μόνῃς μέχρι πλείονος μὲν ἐφωέντος, hoc est ut rudiores intelligat: Cōsideraui scopū intētionēq; mētus istituere ex portione paucissima, ex totius corporis frictione, & ppea unctione ita pparatus, nō ex pice, & resina, sed ex melle solo diutius incocto.

Ec 4 Quercus



Corrigitur  
codex Oro-  
scius.

Quercus liber.] In græco codice habetur δρυὸς τὰ ὑπὸ τῷ φλοιῷ τῆ πρέμνι τὸ ὑμενῶδες. Galenus ita legit, δρυὸς τὸ ἐν τῷ φλοιῷ τῆ πρέμνι τὸ ὑμενῶδες. Dioscorides, τὸ μεταξὺ τῆ φλοιῷ καὶ τῆ πρέμνι ὑμενοειδές. In Paulo igitur legēdum cenleo: δρυὸς τὸ ὑπὸ τῷ φλοιῷ τῆ πρέμνι ὑμενῶδες. Quod Oroscius neglexit, & castigato Basiliensis.

## IN LXIII. CAPVT.

DE inflammatione uteri.] In ipso titulo græcum exēplar deprauatum est Habet enim παρεγκλίσεως pro παρεγκλίσεως, quod etiam Aristarchi omiserunt.

Tendo me-  
dius inter  
neruum &  
ligamen-  
tum.

Dolor capitis, tendinis.] Hic nimirum intelligit tēdinem in utraq; capitis parte situm, corpus tenue, ac fibrosum, quod excrescentiam uermicularem ad particulas natibus cerebri, utrinq; adiacentes, illigat, ne errabunda uagetur, uel neruos in sincipite intelligunt

πίλημα.  
Error  
Oroscij.

Per hapsū.] Sic reddidi πίλημα contra Oroscij opinionem. At Celsus libro septimo ita inquit: Tum multo is oleo perungendus, inducendusq; hapsus lanæ mollis, tepido oleo repletus, &c Quid sibi uelit uelamē Oroscij, nemo facile intellexerit Ex lexico suo ita exponendum censuit.

## IN LXV. CAPVT.

Oroscius. PRæterea uero inordinatæ.] Oroscius græcum codicem deprauatū dicit, legendūq; putat πυρετοὶ δὲ ἀτακτοὶ μετὰ φθίκης ἐν ταῖς ἐπισημασίαις γίνονται, hoc est: Febres autem inordinatæ cum horrore in accessionibus sunt, &c, At ἐπισημασίαι, per se febriū accessiones significant: nisi forte inflammationum accessiones, aut in purē generādo intentiones naturæ intelligere uelimus. Tunc enim, ut ait Hippocrates, dolores ac febres accidunt magis quā in iam confecto. Vtram tu malis, sequere lectionem. Certe omnia antiqua exemplaria quæ mihi uidere contigit, impressi codicis uerba habent.

ἐπισημα-  
σία.

Aut candidum oleum.] In græco est λευκασμένον ἔλαιον hoc est, dealbatum oleum. Quomodo oleum fiat candidum, ex Dioscoride condisces.

## IN LXVII. CAPVT.

εἰδεχθεῖς. TURpem humorū colluuiē.] Græce est εἰδεχθεῖς, hoc est, turpem aspectu, qualis in Elephanticorū facie aliisq; partibus uideri solet. Vsus est eo uocabulo lib. 4. in hac snia. Habet. n εἰδεχθέμενον δὲ πῶς μόνον τὸ πρόσκειπον. Hoc est: Faciem autem



autem solam aspectu quodāmodo terrā hortidā & deformē.

Amurca ] Hoc sedimentum in æneo uase ad mellis spissitudinem decoqui solet. Interim torrei in duriciem, seu puluerem. Ac postea etiam aliis liquidis commisceri.

## IN LXVIII. CAPVT.

**H**elleborismus. ] Paulus lib. 7. aliquot rationes tradit ueratri exhibendi. Tu inde colligito.

Metasyncritidem. ] Superius exposui, quid sibi uelit *μετασυγκριτικόν*, quod alii male recorporatum interpretatur, nisi forte intelligas noxium humorē euocando restauraticium.

## IN LXIX. CAPVT.

**S**anguinis uero eruptionem. ] Cū mola scilicet in utero affligit, ita curabimus, ut sanguinis profluuium, quod in immoderata purgatione ex abortu potissimum accidit. Item sicut muliebrem fluxum, de quo supra quoque est comprehensum Basiliensis corrector dictionem unam expunxit superfluā esse ratus. Nam legit. *τὰς δὲ αἰμορροαγίας ὥς περ καὶ τὸν ῥῆν*. Ego ex ipso sensu & exemplari ueteri legendum censeo: *τὰς δὲ αἰμορροαγίας, ὥς περ τὰς αἰμορροαγίας καὶ τὸν ῥῆν*. Primum *αἰμορροαγίας* refertur ad id quod Paulus ante in eodem capite dixit: *τισὶ δὲ καὶ αἷμα φέρεται*, hoc est quibusdam uero etiam sanguis effertur. Secundum *αἰμορροαγίας* ad caput de immoderata purgatione ubi habet: *συνεχῶς δὲ καὶ ἐπὶ ἀμβλώσειν ἰσχυρῶς αἰμορροαγῶσιν*.

## IN LXXII. CAPVT.

**Q**ue interaneum id. ] In græco codice est *οἱ κατέχουσιν* *τὸ σπλάγχνον*, quod est, quæ continent uiscus. Appellat uterum, uiscus. Ego dixi interna eum, nam cor iecur, cerebrum pulmo, lien proprie uiscera appellantur.

*σπλάγχνον.*  
Interaneū.

Quidam uero & totam uulvā. ] Paulus negat totam uulvā posse procidere. At nostris temporibus in una & altera totam procidere extra sinum uidimus, ex cornibus tantum & quibusdam adhuc ligamētis suspensam, cuius rei etiam hodie testimonium adferre possumus.

Vulua pro-  
cidit.

Vaporibus & suffimentis uaporum. ] Verba græca ita habent, *ὑπατμισμοῖς, καὶ θυμιάμασι*, quasi dicas subuaporationibus & suffimentis.

*ὑπατμισ-  
μός.*  
*θυμίαμα*

## IN LXXV. CAPVT.

**I**n uulux ostio. ] Rimæ, aut fissæ uocantur latinis, quæ apud græcos *ῥαγάδες*, etiam nonnulli *τελίδες* ita nomen. Cel-  
sus libro

*ῥαγάδες.*



sus libro sexto rhagadia appellat.

Subliuida & seculenta.] Codex græcus impressus alijs; nonnulli scripti manu habent: *εποπέλιοι και τραγγώδη*, prò *υποπέλιοι και τραγγώδη*, ita etiam legēdum putat Oroscius. Gemusæus autem non aduertit.

μύδιον.  
Volfella.

Volfella præhêsas.] Græce sonat *μυδίων διακρατήσαντας*, Est autem *μύδιον*, ferramētū quo aliquidprehendimus, quod Celsus Volfellam nominat: Neq; quicquam, inquit, cōmodius est quā uolfellaprehēdere, sub eaq; quod uolumus excidere. Græcus quidā autor anonymus ait: ait τὸς δὲ κεχαλασμένας ταφυλάς ἀμέτρως ἐκτέμνομεν μυδίων λαβόμενοι, hoc est: Vuas aut immodice relaxatas uolfella p̄hensas excindim⁹.

#### IN LXXVII. CAPVT.

σφαίρωμα.  
μα.

Gibba natium regione.] Græce legitur *δ δὲ πόνος αὐτοῖς ἀπὸ τῶν κατὰ σφαίρωμα καὶ τὸν βεβῶνα τόπων*. Ad uerbum sonat: Dolor autem ipsis ex locis iuxta sphæroma, & bubonem, &c. Quæ iam pars sit σφαίρωμα, audi. Autor quidam græcus anonymus ita scriptum reliquit: *λέγει δὲ ἡ ὁσφυς εἰς τὸ ἱερὸν ὄσφιν. παρ' ὁκότερα δὲ τέτοι ταῖς χῖα ἐστὶ, ἐφ' οἷς οἱ γλῆστοι διὰ τὸ ὄσφιν εἶναι ὑποκειμένα μέγιστα εἶθ' ὑπεστρώθῃ αὐτοῖς ὥματα σαρκώδη, ὧν τὰ κυρτώματα ἐκτὺ περιφερῆ εἶναι, σφαιρώματα πρῶταγορεύεται*. Hoc est ad uerbū: Desinūt autem lumbi in os sacrum. Vtraq; huius parte coxæ sunt super quas nates eo quod ossa subiecta sint maxima. Hinc carnosaf corpora ipsis substrata sunt, quorum gibba, inde quod rotūda sint, σφαιρώματα, quasi orbiculata appellantur.

In quibusdā & uomitus à radiculis.] Ita ferē semper Celsus intermittatur, *ἐμετος ἀπὸ ραφανίδων* intelligit autem raphabum. Vide septimum librū, ubi de uomēdi modis præcipit.

Oroscius.

Lixiuio.] Sic græcis *κονία*, aut *κονία* τακτὴ uertimus. Male Oroscius hic *κονίαν* πρῶτακτὴν lixiuium uertit cinerē, qui primus destillauerit, cum πρῶτακτὴ sit lixiuiū quod cinere & calce adiecta sit, apud Paulum in septimo.

#### IN LXXVIII. CAPVT.

Non sola particularū.] Vide Galenū lib. 10. de cōpo. medicamētorū fm locos Oribasij nonū, & duodecimū Aetij.

Et cum absunt.] Deest in græco codice particula *καὶ*, ut sit *καὶ χωρὶς*. Vult itaq; Paul ut lauēt & cū defluxiones adsunt, & cū nō adsunt, Oroscius & Basilienfis corrector omiserunt.

Statim



Statim igitur cum quis morbum primum experiri ceperit, sanguinis missio erit tentanda. Nam quas iam fluxio frequenter infestari, ij plus ] Pauli sententia est, ut quāprimum quis fluxione ceperit infestari, mittendū sanguinem curet. Vbi autem iam saepe eadē fuerit conflictatus, praecipue in frigidioribus natura, & imbecillibus. Nescio quid Orosio in mētem uenerit, legenti ὡς εἶγε φθάσαντες ἡδὴ πολλάκις ἐδύματι θῆναι, βλάπτονται, &c. Cum & ratio, & uera sententia in hunc modum habeat ὡς εἶγε φθάσαντες ἡδὴ πολλάκις ἐδύματι θῆναι, βλάπτονται, &c. Nō sum ignarus Aetium ferē cū superiori sententia conuenire, ubi habet: Quare necessaria maxime est sanguinis, ac reliquorum humorum in fluxionibus sanguineis, detractio, praecipue in ijs qui sanguine redundant, ac reliquis humorum recrementis. In his enim antequā dolores oboriantur, uenam secare oportet, bis in anno, &c. At Paulus de iis mentionem facit, qui iam ex sanguineo temperamento, ad pituitosam inclinant temporis processu, naturaq; frigidiores, ac imbecilli sunt, quæ duo sanguinis missionē recusāt.

Orosius.

Anxietatem, & cibi fastidium. ] ἀσώδης καὶ ἀνορέκτης, hoc est, anxios & inappetentes. ἄσκη quid sit, antea sum interpreta- tus. Aliqui nauseabundos hic exponunt.

Nec miraculum est si materies. ] Hoc est humor pituitosus per se frigidus, ubi accensus, inflammatusq; fuerit temporis spacio, ut uiridia ligna, æstuat, incandescitq;, & si bilem habuerit admistam, tanto facilius accenditur. Eoq; dicit, ut bilis admistionem omittam.

Bulbi per se: uel cum polentæ polline ad ruborem usque suffricti. ] Orosius legit ἕως συμμίζεως, hoc est, ad cōmistiōnem usq; idq; ex suo antiquo exemplari cui plus credit, quā rationi & ueritati. Nō enim ad commistionem usq; sunt infricandi bulbi, sed ἕως ἀμύξεως, quod est ad ruborem usq; in cute excitatum, unde tumor relictus discutitur.

Orosius

## IN LXXIX. CAPVT.

○ Lei lentiscini ] Deest in codice impressio τὸ ἀνταρκες, qđ Orosius præ nimia diligentia præterit:

Minii, ] Sic uerti μίλτς, Celsum imitatus qui μίλτον σποικὴν reddit minium Synopicum. Manardus reprehendit Barbarum, quod μίλτον exposuerit minium, & non potius rubricam.

Calcis



Oroscius.  
μοτρί.  
Emmoton.

Calcis uiuidæ. ] Hoc est, calcis non extinctæ, Verba duo græca idem significant. ἄσβετος, & ζῶσι. Sed primum calcem uiuam per se positum signat, dū dictione ζῶσι, calcē tantum, Emmoton. ] Hoc est, medicamentum, quod linamentis filatim conceptis excipitur. Nam μοτρί linamenta græcis appellantur, quibus oræ uulnerum obturari solent.

## IN LXXX. CAPVT.

Clauis ] Celsus inquit: Clauus autem nonnunquā quidem etiam alibi, sed in pedibus tamen maxime nascitur, præcipue tamen ex contuso, quamuis interdum aliter, doloremq; etiam, si non alias tamen ingredienti mouet.

Syringiacus puluis. ] Hoc est puluis qui fistularum callis exterendis conuenit. Dixit græce Paulus συριγγιακὸν ξηρὸν quasi syringiacum aridum.


## IN LXXXI. CAPVT.

IN græco codice habetur τυμμάτων, quasi dicas spissamen torum. Oroscius τύμμεως legendum ex ueteri exēplari putat Mihi autem uidetur ῥέσπον, quod est, lupinorum, ut superius etiam habetur. Nam de coctione metallorum, præsertim stymmeos in hac re nihil apud bonos auctores habetur.

Ne manus inquinent ] Hoc est, tam scissa durāq; fiant, ut digitos iniectos non inquinent, ea enim est emplastrorum crassities. Græci eam ἀμόλυντον appellant, ut superius annotaui. Hic disiuncto uerbo dixit Paulus, μὴ μόλυνέτω. Atq; hæc contra opinionem Oroscii, qui in hoc ipso uerbo reprehendendum me censuit.

## FINIS LIBRI TERTII

## COMMENTARIORVM.





# COMMENTARIORVM IN PAVLVM AEGIN.

## LIBER QVARTVS.

### CAPVT I.



LEPHANTIA, Morbus hic Græ-  
ca tantum habet nomina, uocaturq; Elephan-  
ἐλεφας, ἐλεφαντίασις, ἐλεφαντία, A tia.  
quibusdam λεοντίασις, aut σατυρία-  
σις. primam ab elephāto, aliam à leo  
ne, & satyris nomēclaturam accepit.  
Est autem is nimirum, qui uulgo di-  
citur lepra Græcorū enim lepra cu-  
tis tm̄ asperitudo est. Iā barbari ele-

phāsim uocant pedum tumorem quendam, qui febribus su-  
peruenire solet, ne te fallat interim nominum diuersitas.

Extrema decidūt.] Hoc est digiti pedū manuūq; auricula-  
rū summa, pili, nasus, sed hæc posterius. Istā speciē efficit atra  
bilis ex flaua supra modū naturæ adusta, quæ ideo pernicioſa  
esse uidetur Galeno qđ uehemēter crudat, & terrā fermēte.

Neq; tamē eminētiæ tuberosæ.] Sic reddidi μήτε μήν ὀχ-  
θῆς Sunt. n. ὀχθοὶ tumores uerrucosi, tuberosiq; in elephāticis ὀχθοί,  
apparētes. Vnde ὀχθῶδη ἔλκη ulcere dicūtur p̄tumidis labris.

Sola capitis adustione.] Vide lib. 6. ubi habes expositum,  
quomodo ferramento quinq; excitant crustas in elephanti-  
cis. Est autem eap. 2.

Nunc saltu, nunc magis alteribus.] Miror hic Orosium Orosius,  
nihil uel ex antiquo suo exemplari, uel ingenioso cerebro at-  
tulisse, cū & codex Græcus ip̄pressus sit uiciolus, & multi hoc in  
loco



Halteres.

Aliteres.

ἀφιδρω-  
τήρια.

Ioco impegerint. Primum enim habetur in Græco, τὰ μὲν ἀφαλλόμενος, τὰ δὲ πλέων ἀλκτῆρσι cum legendū sit τὰ μὲν ἀφαλλόμενος, τὰ δὲ πλέον ἀλκτῆρσι. quod etiam antea in meis annotationibus monuerā. Quia igitur Paulus ualidæ exerceri uult elephanticos, præcipit illis saltū, alteres & follis usum. Sunt autem alteres massæ quædam graues, uel ex lapidibus, uel metallis, quales hodie in librandis rebus adhibentur. Galenus lib 2. de sanitate tuenda inquit πολὺ δὲ δὴ μάλλον εἴ τι βᾶρος ταῖς χερσὶν ἄνθρωποις περιλαβὼν ἑκατέρω κατὰ μόνους οἰαπερ οἱ κατὰ παλάμους εἰσὶν ἀλκτῆρες, ἄτρεμας ἔχει προσείνας, ἢ ἀνατείνας αὐτάς, hoc est: Multo autem magis fiet si quodā pondere summis manibus prehenso utraq; seorsum (qualia sunt quæ in palæstra alteres dicuntur) protensis, aut iursum elatis ipsis in eodem consistat habitu. Item eodē in libro exercitii modū præscribit in hunc modū ἐνιοι μὲν καταθέτες ἀλκτῆρας ἐν τῷ πρόσθεν διεσπαστάς ἀλλήλων ὠργύειν, εἴτα ἐν μέσῳ ἴσταντες αὐτῶν αἰσθύνονται προκίποντες τῇ μὲν δεξιᾷ χερσὶ, τὸν ἐν τοῖς ἀριστεροῖς, τῇ δὲ ἀριστερᾷ τῶν ἐν τοῖς δεξιῷ, καὶ αὐτοὶ ἑκατέρον εἰς τὴν οἰκίαν κατατίθενται χάσαν. Ex his satis liquet, quid alteres apud Martiālē, & alios ueteres scriptores fuerint. At litera una addita ἀλκτῆρες, dicti, nō sunt massæ quædā, sed adminicula, quibus in saltu innitimur: quales sunt cuspides, hastæ, arūdines: Galenus horū quoq; mētionē facit libro iam citato, in hanc snīam: καὶ μὲν δὴ καὶ διὰ τῶν χειρῶν ἐνεστὶν ὅς οὐ γυμνάσιον ὁμιόροπον γυμνάσασθαι χωρὶς τῆ κατέχειν ἀλκτῆρας, &c. Hæc exercitia supernis partibus ualēt, lūbis & obliq; spinæ regionibus. Basiliēsis castigator reliq; locū deprauatū.

[Insuper melissæ herbæ.] Quæ herba ita uocetur nōdum apud idoneos authores comperi nec castigatores locum corrigunt. Aetius eam docet Milesiam herbam Sermone 13.

[Conferunt etiam si bibantur.] Quia meatus uiscerum ui quadam peculiari adaperiunt, & aluum etiam mouent comprimendo ea quæ intestinis inhærent.

Eandem habet efficaciam.] Interpretatus sum ἀφιδρωτήρια, quæ desudationes mouent. Sudor autem Celso authore duobus modis elicitur aut sicco calore, aut balneo. Siccus calor est & harenæ calidæ, & Laconici, & Clibani, & quarundā naturalium sudationes, ubi è terra profusus calidus uapor, ædificio includitur, sicut super Baias in Murtetis habemus.

IN



## IN II. CAPVT.

**V**Terq; affectus.] Non de lepra uulgarī hic agit, sed de extraneo cutis affectu, ut antea monui. Vide Oribasii lib. 7.

In qua corpus consumitur.] Græce est μετὰ ἀποτῆξεως σῶματος. Est autē ἀπότῆξις qua semper aliquid à corpore abscedit, eliquatioq; . Sic in externis, lib. 2. de internis usurpat. Nā p̄fora & lepra melantholici cutis tantū affectus sunt. Nam si ἀποτῆξις in uenis & carne proueniant, canceri uocabulum sortiuntur.

Stercoris argenti.] Vno uerbo græce dictum ἐλκυσματος. quanquam etiam σκωρία ἀργυρίου & ἑγκύμα apud Dioscoridem appelletur.

ἐλκυσμα.

Lotariorum rubrorum.] Græce est λωτάρια ἐρυθρά, forte legendum λωτάριων ἐρυθρῶν. Hermolaus barbarus Lotarium rubens quasi diminutiuum loti interpretatur, nisi quis non de siluestri potius dictum accipiat, alii de Aegyptica intelligunt. Citatur apud Paulū lib. 7. Pastillus dia Lotarion ad pudendorum, sedisq; uitia Præterit Orosius.

## IN III. CAPVT.

**P**Leriq; hoc solo impetigines.] Has Galenus lib. 5. de compositione medicamentorum secundum locos nominat μετὰ γράσσης, uoce nimirum ex latina & græca dictione composita, quod contra rationē grāmatica fieri uidetur. Plinius etiā lib. 16. huius meminit, aitq; sub Claudii Tiberii Cæsaris principatu potissimū hāc menti impetiginē inualuisse quidā hanc morbū quē hodie Gallicū, aut Hispanicū uocār, esse opinant.

Orosius.

## IN V. CAPVT.

**L**Euce, cutis.] Leuce uutiliginis species est albida, & altius descendens: in eaq; albi pili sunt, & lanugini, similes. Leuce

Duc uero, alię restant, alphas & melas appellatę Celso. Paulo autem alphas albus & niger. In prima color albus est, ferē subasper, & non continuus: ut quędam quasi guttę dispersę esse uideantur: Interdum etiam latius, & cum quibuldā intermissionibus serpit. Altera colore ab hac differt, quia niger est, & umbrę similis. Leuce quem occupauit, non facile dimittit.

Acu per summa leucen pungito.] Celsus lib. 5. eadē fere habet: Vtrum autem, inquiens, horum aliquod sanabile sit, an nō sit, experimento facili colligitur. Incidi enim cutis debet, aut acu pūgi, si sanguis exit, quod fere fit in duobus prioribus, remedio locus est: si humor albidus, sanari non potest.

Experimentum.

IN



**Stigmata.** **S**tigmata curabis.] Stigmata in uetere medicina dicta sunt non puucta, sed maculis punctorū quantitate & forma decolorata hominis cutis. Porro latinis etiā in usu est ea dictio. Plinius enim & Largus aliquoties usurpant.

Quod matulæ adhærescit.] Hoc est, qđ in urina subsidet, hoc nāq; matulæ solet adhærescere Diosc. oculorū cicatrices expurgari commemorat. **IN VIII. CAPVT.**

**Exanthemata.**

**E**xanthemata.] Pustulæ sunt exiguo Celso, quales ex urtica, uel sudore fiunt. Interim pituitæ eruptiones, ita Plinio appellantur, de quibus hic agitur. Græci ēτ ἐξαιθήσεις, quasi dicas efflorescencias nominant; à uerbo ἐξαίθεσθαι.

**Cuticula.**

In superiore pellicula.] Græce est ἐπιδερμίδα, quā Latine possis interpretari cuticulā. Nā summa pars, & ueluti ipsa cutis efflorescentia existit. **IN IX. CAPVT.**

**S**plenio illitas.] Hoc est, panniculo lienis modo oblongo. Plinius, superimponi oportet splenium è melle decocto.

Salforum esus.] Malè in codice Græco est προσφορὰν, tu fac προσφορὰν, eiusmodi minutias neglexerunt aristarchi interpretum. **IN X. CAPVT.**

**V**τ humoris colluuius habeat emissarium.] Græce est κατὰ ὑπόρρυσιν, quasi dicas, ex confluxu. Quidā Græcus autor habet κατὰ ὑπόχυσιν in eodem significato.

**ὑπόρρυσις.**

**ἐκβράσματα.**

**περιζέματα.**

**πυρκαυτά.**

Calidis eruptionibus.] Sic uerti ἐκβράσματα feruētibus papulis, περιζέματα. Gliscentibus seu manantibus capitis ulceribus, ἀχώρας. Atq; hac auctoritate ueterum.

#### IN XI. CAPVT.

**πυρκαυτά.**

**τὰ**

**A**mbusta.] Latini πυρκαυτά ambusta, uel cōbusta, uel exusta, citra ignis uocabulum additum exponunt, Propriè uero signat usta igne, eoq; Paulus primum πυρκαυτά dixit. Cōbustionem uero ex aqua calente, κατακαίματα ἀφ' ὕδατος. Quauquam & aliæ materiæ sæpe adurant.

**Codex castigatur.**

Oui albumē.] Male in cod. nro legit ὠν ὄλον, pro ὠν ἄλον κεν. Ita ēτ Auicēna habet, & Dioscorides. Annotauit id Oros.

Ordei farina.] Simpliciter in Græco codice est κριθαῖς, qđ est ordeis. At significantius ex Auicenna & Serapione ordeis farina positum est.

Illitumq; lintheolo.] Male Græcè hebetur ἐμπάστων pro ἐμπλάστων. Id qđ neglexit Orosius, & Basiliēsis castigator.

**IN**



## IN XII. CAPVT.

**O**uum integrum.] Græca sonant ὠὺν δλόκληρον χωρὶς τῶν ὀρόβων, hoc est: Ouum integrū sine eruis. Quid sibi uelit, eruis, nō uideo, cū nulla sit ante mentio eruorū facta. Puto igitur legendum, χωρὶς τῶν ἐρέγμων, hoc est, sine putaminibus. Quāuis ēt eruū cælis cōueniat. Hūc locū præteriit Orosius. Orosius.

## IN XVII. CAPVT.

**M**Ali punici corticibus uino incoctis, rhu & polēta.] Galenus eodem ferē lib. 2. ad Glauconē habet. Vnde lectio- nem Pauli corrigendā puto, ut legatur ῥῆτε καὶ ἀλφίτων, pro κηρετε καὶ ἀλφίτων. Nam cera hic nihil proficit, sed sumac, ut barbarorum more loquar, astringendi uī præditum. Orosius. Orosius. Castigatur codex.

## IN XVIII. CAPVT.

**C**Ataplasmate ex ficis siccatis.] Vide librū Galeni iam citatum. Voco autē ficus siccatas ἰσχάδας: quas etiam Caricas nominare licet. Galenus autē habet: Nō autē oportet ipsas caricas assumere, sed aquā, in qua illæ decoctæ itabuerint. ἰσχάδες.

Si uoles magis intēdere.] Hoc est, si uehemētius uoles siccare. Nam Galenus pro ἐπιτένειν habet σφοδρότερον ξηραίνειν.

Galenus autē memoriæ.] Lib. 14. Methodi medendi meminit, unde etiam Paulus hæc quasi mutuatus est. Eadem ferē tradit etiam lib. 2. ad Glauconem, & commentario de Tymoribus præter naturam ubi ad uerbum ista habeatur.

Qui humorum ex loco in locum decubitu.] Græca lectio nonnihil est uiciata, habet enim τοῖς ἀπὸ σκήματος μάλιτα χρόνισσιν ἀποσημασιν, pro τοῖς ἐξ ἀποσκήματος μάλιτα χρόνισσιν ἀποσημασιν. Nam una dictio est ἀπόσκημα. Quam Galenus in hunc modū exponit: ὀνομάζουσι δ' οὕτω τὰς διαβάσεις ἐκείνας, ὅταν χυμοὶ τινες ἐνοχλεῖντες ἐτέρῳ μορίῳ, καταλιπόντες ἐκεῖνο, εἰς ἕτερον μεταφῶσιν. Atq; hic alter modus est generationis abscessuum. Sit itaq; ἐξ ἀποσκήματος quod τρέπω ἀποσκήματος, ut ait Galenus. Differunt igitur inter se ἀπόσημα, & ἀπόσκημα, ut apud idoneos autores licet condiscere. Non aduerterunt nostri aristarchi. Loens castigatur.

Porro abscessuū generationē.] Græcus codex uiciatus nōnihil ē, ubi habet τῆς τῶν ἀποσημάτων γενέσεως, p τῆς δὲ τῶν ἀποσημάτων γενέσεως, dictio δὲ omīssa snīam poterat cōfundere. Orosius & castigator Basiliē. quātūuis oculati nō annotarūt. Codex deprauatus.

PAVLI AEGIN.

Ff IN



**C**Um inflammatio neq[ue]. ] Inuenies penè eadem in secūdo  
ad Glauconem libro. Verti autem *νεκρῆται* membrum  
emoritur, quod alii barbarè exponunt, mortificatur.

## IN XX. CAPVT.

**C**Um bilis flaua nulli mixta humori. ] Hoc est, cū sincera  
bilis, nullū aliū humorē uel pituitā, uel bilē atrā, uel san-  
guinem coniunctum habens Oribasius lib 14. similia haber.

Porri succi cyathi dimidium. ] Viciatus est codex græcus  
impressus. Nam pro *βυ.ζ.* legendum est *βυ. ήμίση.* quod ualeat  
Cyathi dimidiū. Paulo post, myrtei uncia sex, in græco erat  
Γο. ι. S. pro S. hoc est sedecim, pro sex positum. Statim in ea-  
dem linea, Vino diluta, græcus codex habet *οἶνω ήμίση*, pro  
*οἶνω δις*. Nō multo post, cremēti plūbi uncia una S. græce  
erat *σκωρίας μολίβδης ὀξυβάφου* < S. pro *σκωρίας μολίβδης*  
Γο. ι. S. q̄ loca nec Orosius, nec Basiliēsis corrector aduertit.

Codex ui-  
ciatus.

Orosius.  
Basiliēsis.

Circa tedam. ] Hoc est circa lignum ad tedam aptatū, cui  
lana cum alia quædam pinguedine circumuoluitur, ad flam-  
mam alendā, cuiusmodi hodie etiam lucernarum loco utunt.

Thuris, aluminis scissi. ] Hic quoq; diligentiam Basiliensis  
Correctoris desidero, qui lectionē græcā & cōfusam & mutilā  
reliquerit. Nā habet *λίβανου σχισῆς* < ᾱ quod ad uerbū so-  
nat, thuris scissilis drachma nullo sensu, cū legendū sit *λίβανου*  
*σχισῆς, ἀνὰ*. < ᾱ. qđ signat thuris, aluminis scissilis, singul.  
drach distinctione post thuris additā, deinde post *σχισῆς ἀνὰ*.

## IN XXI. ET XXII. CAPVT.

**E**rysipelas. ] Multi inter latinos scriptores interpretātur  
erysipelas sacrū ignē. Celsus aut hūc ab illo separat, eoq;  
malus græca uti dictione q̄ expositione esse obscurus. Vide Ga-  
lenū secundo ad Glauconē: Aetiū lib. 14. & Oribasii septimū.

Abscessorij tumores. ] Hoc est q̄ abscessum representāt. sic  
uerti *ἀποστηματώδεις ἔγκει* quasi dicas apostematici tumores.

Phyma & Phygetlon ] Tubercula sunt tumida. Celsus græ-  
cis nominibus quoq; appellat Bubo à loco nempe inguine,  
cui solet magna ex parte accidere appellationē accepit, quan-  
quam etiam alas, & ceruicem interim infestet.

## IN XXIII. CAPVT.

**O**ribasius ] Lib. 7. huius tuberculi mentionem. Pauli au-  
tem lectio nonnihil est uiciata habet enim, *ἐπεκρῆται δὲ*  
*αὐτῷς*



αὐτῷς ἀνω κάτω pro ἀνωτάτω. Paulo post, τὸ ἐπὶ κάτω pro ὑποκάτω ut sit una dictio. Id qđ Aristarchi nostri omiserunt.

## IN XXV. CAPVT.

**C**arbunculus.] Sic uerti græcā dictionem αἰθρακες, id est, Codex im  
ad uerbum, Carbones Celsus autem, quem libēter in di- pressus,  
ctionibus latinis imitor, Carbunculum nominat.

Quod ulcus est crustaceum.] Habetur in græco εἴπερ εἰσὶν  
ἔσχαρῶδες ἔλκη, quod est, siquidem sunt crustacea ulcera. Ego  
autem legendum puto pro εἴπερ, οἵπερ ut referatur ad αἰθρα-  
κες. Sua sponte præterierunt hoc, Orosius, & Gemusæus.

Depascaturq;.] Sic exposui, μετὰ νομῆς quod est cum de-  
pascione, Sensus est, ita carni subiectæ affixa est, ut eam quoq;  
depascatur. Volui itaq; uersionis meæ rationem reddere, ne  
quis seuerior censor nos à uerbis ipsis discessisse clamet.

Circumscribuntur.] Ad uerbum exposui περιγράφονται.  
Signat autem hoc loco circumscribi, tolli, aboleri. Nam qui περιγρᾶ-  
carbunculi carnem obsidentur, facile tolluntur, qui partes so φεῖται.  
lidas, pertinacius hærent.

Vel & ipsum similiter dilutū.] In Græco codice pro εἰ tu  
fac ἄ, quod etsi exiguū sensum tñ poterat cōfundere. Neglexe  
rūt Censores interpretum.

## IN XXI. CAPVT.

**C**ancer in qualibet.] Hoc caput quasi ad uerbū habet Ae-  
tius lib. 14. Oribasius septimo. Galenus secūdo ad Glau-  
conē. Habet aut lectionē deprauatā in exēplari græco, οἷον ἐστὶ  
τὸ ἐπίθυμον πλῆθος. Γ.δ. S. quæ sonāt ad uerbū, quale est epi- Orosius.  
thymū pōdere unciarū quatuor. At nemo nō medicinæ peri-  
tus intelligit nunquā epithymū dari tāto pōdere Legendum  
itaq; uenit in hūc modū, οἷον ἐστὶ τὸ ἐπίθυμον πλῆθος Γ.δ. S. id Codex e-  
est, quale est epithymū pondere drachmarū quatuor & S. Nā mendatur.  
Dioscorides, aliiq; eiusmodi ferè pōdus admittūt. Miror Oro-  
scium tam grauem interpretū Censorem & Gemusæū, alio-  
qui in medicinis exhibendis peritum hæc non aduertisse.

## IN XVII. CAPVT.

**O**edema latus quidā.] Oīa ex Galeno ad Glauconē, 7. Ori-  
basij 14. Aetii trāscripta sunt. dixi aut indolēs tumor, hoc  
est doloris expers tumor. Vide ēt Galenum lib. 14. Methodi.

Affectus qui hominē premit.] Lectio Galeni libro iam ci-  
tato corrupta est, habet enim τῷ κατέχοντος πλῆθος, quod Li  
nacer exponit multitudinis, quæ hoīem premit, cū legendum  
datur.

Eff 2 sit τῷ



fit τῷ κατέχοντος πάθος, hoc est affectus, qui hominē premit.

Ellychnion  
πλιν.

Tenerrimum ellychnion.] Ellychnion est quod ex papyro. sparta. canabe, aut Itupa tortum in lucernis uritur, dixi tenerrimum, hoc est mollissimum, græci ἀτλάτατον.

### IN XXX. CAPVT.

διαπή-  
δης.

Per subsultum.] Græce subsultus dicitur, διαπήδης Gale- nus lib. 5. Methodi quomodo fiat, exponit in hunc modū. Diapedesis ex tunica quidem ipsa rarefacta, sanguine uero tenuato: interim etiam ex graciliū uasorū adapertū nascit̃, &c. quando aut̃ hoc fit, sanguis ueluti subsiliendo ex uasis prodit.

### IN XXXI. CAPVT.

ξηγμα.

R Vptio.] Vnitatis solutio pro particularum natura, nomē claturā sortitur. In esse græcis κάταγμα quasi fractura dicitur, in carnosus musculorū partibus ex distēctione perueniēs, ξηγμα hoc est ruptura, de qua hic fit mentio. Cum autē filamenta similiter tensa rumpuntur, uulsum. In carne uulnus.

### IN XXXII. CAPVT.

Oroscius,  
Nota le-  
ctionem,

Exactos quidē scirrhos.] Vide secundum ad Glauconē. & quartūdecimū Methodi: Vnde hæc omnia fere sunt trās- lata, quāquā Oribasius antea & Aetius ea quoq; rrāscripserint.

A balneo autem in totum.] Oroscius simpliciter uertit à Lauacris uerò continuis abstineant, quod mihi non placet. Nam uidetur Paulus præcipere ut in totum à lauacris abstineant scirrho laborantes, aut si id non fiat, saltem à frequen- tibus, alioqui dictio συχιν̃ ex superfluo fuisset adiecta. Ego itaq; lego ἢ γιν̃ duabus dictionibus, non ἔχουν ut habetur in exemplaribus. Aetius abstinendū præcipit à balneis medicamen- tosis quæ atramētum sutorium, alumen, aut sulphur respiciant,

### IN XXXIII. CAPVT.

Codex e-  
mendatur.

N Asturcii.] Male in codice græco καρδαμύμ pro καρδά- μου habetur, item σκλήρας pro σκληρίως. In fine ἀμω- νιακὸ θυμιάματος < β. Vbi Gemusæus ex codice Ruelli ζ. legit à quo hic non dissentio.

### IN XXXVII. CAPVT.

Oroscius,

ἄχην.

Q Vercus folia applicata ulceribus.] Vide Oribasii li- brum septimum, ex quo Oroscius græcam lectionem calligādā putat, legēdum ἄχην; ἄχην ἀλείψ pro ἀράχην ut sit pol- len farinæ, nō aranei telū, quanquā hoc ēt recētibus uulneri- bus cōglutinandis cōducatur. Sed malo cū Oribasio legi ἄχην. Anagallis.



Anagallis.] Rursus ex Oribasio, ponendum anagallis, pro ἀνάπλιντοις. Expunge periodum.] Exemplaria Ruellii, & Lascaris ueterem lectionem retinent Corrigitur lectio.

## IN XLV. CAPVT.

**M**Yrrha ] Galenus tertio methodi fusius hæc exponit. Aetius pro myrrha uidetur, legere, myrtus, non omnino male, nam ulceribus conglutinandis, si Dioscoridi credimus, efficax est, præterea astringit, & siccat citra rosionem quod proposito cōducit, facilis erat lapsus σμήρινα ex σμυρδίνη, aut μυρτά. Nota.

Ostreorum ] Aetius habet, ostreorum crematorum, itena in fine habetur singulorum uncia octo nimirum pro drachmæ octo. Nam antiquum lascari exemplar non ʒo. quod est uncia, sed < habet. Orosius & Gemusæus noluerunt hoc annotare Rursus in sequenti emplastro, cadmiæ drachmæ sex. In græco male habetur ʒo. pro < mox sequitur, æris combusti, singulorū drachma, ubi Codex ʒo. hoc est unciam habet. Depurata lectio.

## IN XLVIII. CAPVT.

**S**I inferius spectet. ] Galenus secūdo ad Glauconē hæc ferre ad uerbū habet, unde ē textus codicis Pauli impressi corrigendus est, legēdumq; κατὰ ῥόπιν δὲ ὄντος αὐτῆς ubi habet ἀναρῥόπιν δὲ ὄντος αὐτῆς, cōtrario nimirū sensu, Galenus autē dicit κατὰ ἅντους δὲ ὄντος αὐτῆς. Idem namq; est κατὰ ῥόπον, & κατὰ ἅντες. Omisit Orosius & Basiliensis corrector. Corrigitur græcus textus.

Etenim in cubito ] Sic interpretatus sum ἐν πῆχει, quæ uox græcis significat eā brachii partē, quæ ad manū tēdit interius ulnā quidā recētiore nomināt ἀγκών flexura ipsa recte dī. Venter sanguinē ex cubito detrahi p̄cipiētes, hāc intellexerūt. πῆχυς.  
ἀγκών.

De finibus diruptus. ] In græco codice est περὶ ῥακωδῶν κόλπων. Signat autē ῥακωδῆς idem quod ῥωγάλευς, καὶ διεῖ ῥωγῶς, hoc est fractus & ruptus Venit autē à ῥάκος, quæ uox significat pannū & uestē laceratam. Sicut ῥάκων apud Aristophanē uestem uilem, detritam, & pertusam Hic itaq; ῥακωδῆς abscissui accommodatur in quo cutis pus congeßum integēs, erosā extenuari deteriq; instar pellium detritarum contigit. ῥακωδῆς.  
ῥάκος.

Vt neq; admodum sit durum. ] Mirum est quā Orosius hic memor sui non sit. Antea me reprehenderat, quod dictionē græcā ἀμόλυντον uerterim, manus non inquinans. Hoc autē loco nō uidet à Paulo emplastrū liquidū intelligi, cū dicit μή τε σκληρὰν, μήτε ἀμόλυντον. Galenus ad Glauconē eadē habet. Orosius.



**A**T scopus crustā generantiū. ] Hoc est, eo cōsiliū in crustā generantibus dirigit, ut calefaciāt simul & astringā t. Calx aut calefacit tantū eoq; non ita cōmode adhibetur. Hæc sunt ex Rufo, petita.

## IN LIIII. CAPVT.

**N**eruis uulneratis. ] Paulus hæc fere ex Galeni tertio secundum genera mutuatus est, mutato tantum docendi ordine. Aetius lib. 14. Oribasius septimo habet eadem. Cæterum uocat in neruis uulneratos, νεύρα τραύτους in tēdonibus, τεινον-  
τος. τω τρώτες. Cuiatio autem communis est.

Specillo subunctorio. ] Sic reddidi υπαλέπτρω nimirum à uerbo υπαλέφο quod subiungo significat, deriuato.

Maior conuulsionis metus. ] Male in codice græco habet, δ μὲν κίνδυνος τῆ σκεπαθῆναι, ἢ δ μὲν κίνδυνος τῆ σπαθῆναι. Oroscius & Gemusæus non aduerterunt.

## IN LV. CAPVT.

**A**ncylas ] Celsus & Scribonius eius discipulus, Contractionem, ligationemq; articulorum interpretantur græcorum dictiones ἀγκύλας, & ἀγκυλώσεως.

## IN LVI. CAPVT.

**N**am colligantes nerui. [ Hoc loco intelligit per συνδετικά καὶ νεύρα, ipsa ligamenta, quæ ossa colligāt : uocat autem neruos quod eos imitētur. Nā alibi tres species enumerant, alios qui sensum motumq; præbent, alios qui motui tm seruiunt, ut tendines, alios qui ossa cōpagem ligant, uinciuntq;.

## IN LVII. CAPVT.

Corrigitur  
codex im-  
pressus.

**T**res sunt uniuersæ. ] Aetius lib 9. eundē fere docendi ordinem seruat Celsus duorum generū meminit, Latorum quos etiam peiores dicit, & teretum, Græci addunt etiā ascarides. Habetur in Græco codice ἀσκαρων pro ἄκρων, hoc est extre-  
morū perfriktione potius quàm articulorū, antea notauerā.

**Cochleari.** ] Sic exposui ζωμήρουσιν, qđ Grāmatiti Græci dicūt instrū esse, quo spuma ab ollis tollit. Quia igitur nullum cōmodius uasculū ad hanc rē inueni, cochleari interpretatus sum.

## IN LVIII. CAPVT.

Recentio-  
rum opi-  
nio.

**C**arnem salsam. ] Recentiores medici carnē suillā pingue, salsamq; uolunt subiici. Aetius pingue dine adempta subdi præcipit. Tu uide quos imitari malis, utrobiq; bona est ratio.

Finis libri quarti Commentariorum.



# COMMENTARIORVM IN PAVLVM AEGIN.

## LIBER QVINTVS.

### CAPVT I.



E uirulentis bestiis.] Hoc libro in multis Dioscoridē Paulus imitatur quanquam Galenus etiam librū de Antidotis conscripserit post eū Oribasius, Aetiusq;.

### IN II. CAPVT.

**H**omo adhibēdus est qui uulnus exugat. Celsus lib. 5. idem præcipit. Si cucurbitula inquiens nō est, quod tñ uix incidere pōt, tū quodlibet simile uas, quod idem possit. Si ne id quidem est, homo adhibendus est, qui uulnus exugat. Græce erat. ἐκμυζήσας, hoc ē exultione uti. ἐκμυζήσας. Galenus memoriæ prodit.] De uipera multis in locis meminuit, tum in commentario simplicium medicamentorum, tū ubi antidota, confectionemq; Theriacæ comprehendit.

Aut paliurū.] Codex græcus deprauatus particulam ἢ de- siderat Legi debet, ἢ παλιῦρον, quod etiam Oribasius lib. 8 habet, præterit Castigator Basilienfis.

Desudationes.] Græce erat ὑδρωτῆγία hoc ē, quæ sudores mouēt, ut laconicū, aliq; id genus modi, ut. Suenenū ab internis foras inuocent.

### IN III. CAPVT.

**H**ydrophobiam.] Celsus hoc morbi genus miserrimum, Aquæ timorem appellat. Largus aquæ hoc est, liquoris metum interpretatur ὑδροφοβία.

Codex castigatur.  
Castigator Basilienfis  
ὑδρωτῆγία.  
Aquæ timor.  
ὑδροφοβία.

Ff 4 Sudore



**ἀπορία.** Sudore & anxietate. ] Verti ἀπορίαν anxietatem. Est autē proprie ἀπορία consilii, aut propositi inopia, incertitudo, ex qua quis nescit, quid potissimum acturus sit. Ruellius uertit ἀπορίαν languorem.

**περισσεύειν.** Carnis præscisio ] Græce erat τὸ μὲν περισσεύειν. quasi dicas circa carnem sectio, uel circūscriptio. nam interim carnem amputare scalpello conuenit.

## IN IIII. CAPVT.

**Celsus.** **L**ata manu morsum ferito. ] Hac locutione Celsus etiam utitur. Si manus, inquit, uulneri imponitur, superq; id duobus digitis uerberatur.

**πεπυρωμένα δὲ γματα.** Ad feruidos autem iam morsus. ] Græca sonant πρὸς δὲ ἡδὴ πεπυρωμένα τῶν δηγμάτων, hoc est ad morsus quos inflammatio iam feruida inuasit.

## IN V. CAPVT.

**Lac ficulneum.** **E**t lac ficulneū. ] Hoc est, liquor ficulneus sic lac papaueris lac laseris aliorumq; cōsimiliū pro liquore, aut lachryma.

## IN VI. CAPVT.

**Dioscorides & Paulus uariant hic.** **S**ed leniter rubidus. ] Græce habet ἀλλὰ μετρίως μὲν ὑπέρυθρος, quod est, sed mediocriter quidem subrubens. Dioscorides impressus habet pro ὑπέρυθρος, ὑπέρυγρος, hoc est humidus, atq; ita uertit Ruellius. Marcellus autem ὑπέρυθρος, quāquā supra Paulus dixerat. ἐνεργουθῆς. uide utra placeat lectio.

Et uiridiū cupressi foliorū. ] Mutilus est codex græcus. Nā desiderat dictio φύλλων legēdumq; uenit χλωρῶν κυπαρίσσον φυλλων ἢ σφυρίων. Id Orosius nō aduertit nec Gemusæus,

## IN VII. CAPVT.

**Particula.** **P**articula intenditur. ] Hic intelligo particulā penem ipsum. Sic etiam apud græcos τὸ πορίον accipitur. Dioscorides δὲ ποτρίχιν huius loco habet, quod est pilorū erectionē.

## IN IX. CAPVT.

**Confer aures.** **A**t tolliturq;. ] Pauli Codex Græcus habet ἐπάρεται, hoc est attollitur, Dioscorides unde hæc transcripsit, περισσέπεται hoc est computrescit, legit. Item Paulus δυσινδῆ ponit pro δυσίατον, hoc est δυσφάρον.

## IN XII. CAPVT.

**νομή.** **A**lbū ulcus apparet. ] hoc est ulcus depascens, quod νομή græcis appellatur.

Frigidi madoris. ] hoc est corpus frigido sudore perfunditur, mador



# IN PAVLVM AEGIN.

815

tur, mador initium sudoris est. *νότις* græce dicitur.

*νότις.*

## IN XIII. CAPVT.

**D**e amphisbena.] Hoc animal biceps est, autore Galeno, & utraq; parte ingreditur, unde nomen illi est inditum.

## IN XV. CAPVT.

**D**ryinus.] uide Galenū de Theriaca dictus est à *δρῦς*, quod Dryinus. in quercuum radicibus uiuat.

Torſiones.] Græca dictio est *τροφοί* qui proprie tormina *τροφαί*. sunt circa umbilicum, omneq; id spaciū quod in anteriore parte ab ore stomachi ad umbilici partes descendit hominem torquens.

## IN XVI. CAPVT.

**Q**ui hæmorrhoi ictum.] Hæmorrhus & hæmorrhoids *Ηεμορ-  
thus,* suis ipsorum nominibus similem hominibus perniciem adferunt. quippe percussi ab eis, sanguine per os, nares, totoq; corpore effuso intereunt.

Redduntur corpora.] Græcus codex habet *ἀραιώματα*, hoc est raritatis. Dioscorides quē Paulus sequit̃, *σώματα* eoq; sic uertendum duxi, quod Oroscius & castigator Basiliensis præterierint.

Et si cicatrix toto corpore.] Sic quoq; legit Aetius, quāquā Marcellus Virgilius aliter legēdum Dioscoride sentiat.

Quem euomentes.] Pauli codex impressus *ἐξαυματῆντες* pro *ἐξεμετῆντες* habet. Dioscoridem secutus sum unde Paulus hæc transcripsit: licet sententia non multum uariet. Oroscius non dignatus est annotare.

Aduersus feram præsidia.] Græca sonant *πρὸς τὸ θηρίον*. *θηρίον.* Oroscius dum nimis exacte loqui studet, in aliis corrigendis, Oroscius. maxime fallitur. Paulò superius damnauit quendam quod *θηρίον* bestiam uertisset, semper eam dictionē pro uipera accipi affirmans. Cuius hic contrarium uides.

## IN XVII. CAPVT.

**N**atricis morsu uulnus factum.] Natrrix primum in terra *Natrix.* uiuit, & Cherſydios appellatur. deinde in aqua, unde *Hydros.* hydros dicitur. Similis est putillæ aspide, præterquam q̃ ceruicē latam non habeat ut alpidēs.

## IN XVIII. CAPVT.

**N**asturcium.] Dioscorides legit *καρχήμων* hoc est cardamomum nō *καρχήμων* quod est nasturcium, sequere utrā *Dioscorides & Paulus* malis lectionem. *uariat.*

IN



**R**eginam Cleopatram.] Vide Galeni commentarium de Theriaca, ubi historiam ampliter comprehendit, speciesq; aspidum enumerat. Oroscius putat in fine capitis aliqua ex Dioscoride apponenda, at ego breuitatis causa omissa existimo.

## IN XXIII. CAPVT.

**D**rachmis duabus.] In Aldino exemplari erat Cyatho uno. Basiliensis corrector fecit cyathis duobus. Aetius integram lectionem ita habet. Drachmis duabus ex cyatho uno aceti: Sequenti die drachmis quatuor ex cyathis duobus Tertia die drach. octo ex tribus cyathis. hoc præterit Oroscius. Lege igitur in græco <.β. μετ' ὅρους βυ. α. πη δ' ἐξ ἡς <.δ. μέτ' ὅρους βυ β. πη δ' ἐξ ἡς <.η. μετ' ὅρους βυ γ.

## IN XXVII. CAPVT.

**R**ex Mithridates.] Galenus ea commemorat lib. de Theriaca ad Pisonem, unde Paulus transcripsit.

## IN XXXII. CAPVT.

Historia  
Mithridatis.

**F**icus brida, item.] Transposita & peruersa uidetur lectio in Pauli codice impresso. Nam Dioscorides unde omnia hæc sumpsit, aliter habet. Fac itaque in hunc modum συκὰ ξηρὰ λαμβάνοντες, καὶ τὸ ἀφέψημα δὲ αὐτῶν σὺν οἴνῳ παρακημάζοντος δὲ τῷ κατ' ὀξύτητα κινδύνου ὠφελεῖνται θυβαϊκὰς βαλάνους ἐθίοντες ἢ λελεασμένους σὺν οἴνομέλιτι ἢ γάλακτι πινόντες, ἢ καὶ ἀπίων ἅπαν τὸ γένος ἐθίοντες καὶ γάλα γυναικῶν πινόντες, Ita quoq; nos reddimus. Pauli scriptura ad uerbū hēt ut sequet συκὰ ξηρὰ λαμβάνοντες, καὶ τὸ ἀφέψημα αὐτῶν σὺν οἴνῳ ἢ γάλακτι πινόντες, ἢ οἴνομέλιτι, καὶ ἀπίων μᾶν γένος ἐθίοντες, καὶ γάλα γυναικῶς λαμβάνοντες παρακημάζοντος δὲ τῷ κατ' ὀξύτητα κινδύνου ὠφελοῦνται. θυβαϊκὰς βαλάνους ἐθίοντες λελεασμένους σὺν οἴνῳ hoc est iuuantur, si ficus aridas sumant, earumq; decoctum cum uino aut lacte bibant, aut mulso, ac pirorum omne genus comedant, & lac muliebre assumant, ubi periculum lenius sit & declinat, confert, si glandes thebaicas detritas cum uino edant.

Nota.

## IN XXXIII. CAPVT.

**M**ens impeditur.] Græca habent. λαλιᾶς ἐμποδισμός, hoc est loquelæ impedimentū. At Dioscorides unde hæc sumpta sunt διανοίας ἐμποδισμός, id est mentio seu intellectus impedimentū habet. Ita quoq; Aetius lib. 3. scribit. Quibus authoribus



authoribus mutādam lectionem putauī, saluo aliorū iudicio.

Et resolutione urget. ] Hic quoq; uicium exemplaris gręci est habet enim καὶ ἐκλύσεως pro ἐκλύσεις, nec hoc annotauit Orosius.

## IN XXXV. CAPVT.

**P**iscibus uirosis. ] Corrige lectionem gręcam muta q; ex, *ὁμοία ἰχθυος, βρομώδης. In ὁμοία ἰχθυοῖ βρομώδεσι.* Paulo post, ὑδρῶσι δὲ δυσώδη αἵματι μεμιγμένα. Mutila est lectio, quę sic instaurari debet. ὑδρῶσι δὲ δυσώδε, καὶ ἐμετῶσι χολώδη ἐνίοτε δὲ αἵματι μεμιγμένα. ut nos uertimus. Orosius & castigat. Basiliensis. Nō multo post πονκεδάνη male habetur, pro κινδάνη.

Lectio gręca emendatur.

Orosius  
Castigat.  
Basiliensis.

## IN XLII. CAPVT.

**C**um oleo & passo. ] Variat lectio Dioscoridis à Paulo impresso habet σὺν ἐλαίῳ καὶ γλυκῇ, hoc est cū oleo & passo, ubi Paulus σὺν οἴνῳ καὶ γλυκῇ, quod est cum uino & passo. Aetius tantum ex uino dulci habet, sequere quęcunq; ualet.

Instauratur Pauli lectio ex Dioscorides.

## IN XLVI. CAPVT.

**R**efertim in exurgendo. ] Hoc est cū ē lectulo leuare se conantur, ut ait Largus. Gręca sonant, ἐν τῷ ἐξανίστασθαι.

Opobalsami drachma cum uino. ] Dioscorides habet cū melle aut lacte. In primo libro etiam opobalsamum ualere contra aconitum tradit, uide an malis cum Dioscoride legere. Ego exemplar sum secutus.

Nota.

## IN XLVIII. CAPVT.

**T**otum corpus prurire facit. ] Gręce est κινησμός καθ' ὅλον τὸ σῶμα. Dioscorides etiam in hunc modum habet. Largus autem cuius mentionem Galenus subinde facit, pro corpus, habet os in hunc modum. Ephemerum potum protinus quidem os prurire facit, uelut scilla tactum postea etiam adurit, quasi pipere manducato. Hęc te, lector, latere nolui.

Largus.

Nota.

## IN LIII. CAPVT.

**P**haricum dictum. ] Multi scriptores dubitant, simplex ne sit an compositum. Largus ex compluribus componi affirmat.

Nardum syluestrem. ] In codice Pauli Gręco deerat ἀγρία. Tu ex Dioscoride restituito Basiliensis castigat. omisit.

IN



## IN LIIII. CAPVT.

Castigatur  
sexius græ-  
cus.

**V**T uinum dulce cum rosaceo.] Deprauatus est Codex græcus impressus, habet enim γλυκὺν οἶον pro γλυκὺν οἶνον. Omisit Gemusæus.

## IN LV. CAPVT.

**A**Tramētum sutorium.] Hic quoq; uiciatus est codex græcus, habet enim χάλκιον ἄνθος hoc est, flos æris pro χάλκειον, ut sit atramentum sutorium. Ex Dioscoride castigatum: Basiliensis castigator hoc etiam non aduertit. Largus habet æris flos, sed male opinor.

## IN LVI. CAPVT.

Impressū  
exemplar  
græcū cor-  
rigitur.

**D**entes tincti.] Græcus codex impressus habet ὀδοντες βεβρυμένοι hoc est dentes erosi. Dioscorides ὡς ὀδοντες βεβρυμένοι quod est Dentes tincti. At Aetius legit gingiuarum corrolæ. Secutus sum Dioscoridem. Præterit Gemusæus.

## IN LVII. CAPVT.

Marcel-  
lus.

**L**Ac potum quod subito ac confarctum sit intus congelatum.] Sic interpretatus sum γάλα ἐμπιτυαδὲν ἀτρυγῶν. Nā si prius coagulatum est quàm fuerit assumptum, non opus habet, ut rursus congeletur: Longe dissentio à Marcello cui ἐμπιτυαδὲν uertendum censet, cui coagulum sit admixtum, cū Paulus coagulum superbibi cū aceto præcipiat. Sed ἐμπιτυαδὲν intelligo intus, hoc est in corpore congelatum. Ibi enim aliquando coit in grumos, & densatur, ut respirationem impediat. Vbi igitur lac assumptum repente, ac cumulatim, in corpore coierit, remedia adserenda sunt.

κονία πι-  
λοποικῆ.

Ἰδὼς πι-  
λοποικόν.

E cinete lixiua.] Turpiter hic Ruellius Marcellus, aliique interpretes lapsi sunt, qui κονίαν πιλοποικῆν uerterint, nunc lutum excolatū, nunc lixiui genus aliquod. Nihil enim aliud est quàm à cinere lixiuium, quo & pilotarii, & alii artifices utuntur. Sicut apud Galenum Ἰδὼς πιλοποικτικόν, quod Largus in eodem medicamēto dixerat, è cinere lixiuium, ut alias annotauimus.

## IN LXII. CAPVT.

Castigatur  
codex græ-  
cus.

**H**Ormini semine. Male habetur in codice Græco φερμίνου ἀγρίου pro δμίνε ἀγρίε. neglexit Gemusæus.


## FINIS LIBRI QVINTI

## COMMENTARIO RVM.



# COMMENTARIORVM IN PAVLVM AEGIN.

## LIBER SEXTVS.



V M humor oculis.] Liber hic sextus curationem tradit, quæ ferramentis & manu administratur. Certe difficilis existit, tum quod nemo hæc eo ordine tractarit, tum quod ij unde trāscripsit, non extant. Curabo tamen pro mea fide, ut nihil quod lectorem remorari possit, indiscussum relinquat.

Ferramentis nuclei modo rotūdis.]

Sextus liber omniū difficillimus.

καυτηρας πυρυναιδεις. Græce dicuntur πυρηνες, extrema speculorum siue acuta, siue caua, siue rotunda. Hoc autem loco, rotunda ut ustio commodius administretur, aliqui nuclearia uocant instrumenta. Celsus tenuibus, retusisq; ferramentis ait lib. 7. de oculorum humoribus reprimendis sermonē faciens.

πυρηνες.

At in elephantiafi.] Paulus hoc lib 4. iam docuerat, nempe multos qui ne in totū insanabiles fierent, ex capitis ustione seruatos.

Tenuia, retusaq; ferramenta. Vstio capitis.

## IN III. CAPVT.

HYdrocephalon.] Celsus lib. 4. Inuenitur genus quod longum potest esse, ubi humor cutem inflat eaq; intumescit, & prementi digito cedit υδροκέφαλον Græci appellant.

Hydrocephalon.

In ociosam inutilemq; mutato substantiā.] Oroscius omnia grammaticorū Lexica introspexit ut me in dictione Græca αργον, tanquam male eam interpretatum reprehenderet, ac tandem Budęum nostrum in commentariis in Græcā linguam consulens, αργον, inuenit significare, contrariū ei quod elabora-

Oroscius, αργος.



Crudum.

elaboratum, confectum, concoctumq; est, eoq; exponendum hic censuit ἀργὴν, crudam, non attendēs, quo modo in re medica crudum dicatur. Nam sanguis nunquam dicitur, post absolutam sanguificationis terminum crudus fieri, sed mordax, acris, crudum uero aut semicoctum succum, sanguinem mutari, aut sanguinem minus elaboratum, ac crudū adhuc in perfectum degenerari. Gal. enim lib. de sanitate tuenda quarto cōcoctionem ponit crudorum, uel etiam semicoctorum humorum eductionem acrium. At sanguis non consistit citra concoctionis terminum. Et si adhuc in uenis etiā illis capitis semicoctus ac crudus existeret, tamen non diceretur extra uasa elapsus, in crudam mutari substantiam, sed putridam potius ac peregrinam Qui enim extra instrumenta sua elapsus est, nō potest non corrumpi. Crudus autem fieri, non item. Quare Orosius hunc laborem castigandi, non alio quā calumniæ studio sumpsisse uidetur, ipse maxime corripiendus.

κεκυρτω - μένος.

Orosius.

Puluino sublimi.] εἰς ὑψὸν κεκυρτωμένος, hoc est, in sublimē eleuatus, quemadmodum puluini in superficie tument, gibbero extante.

Et quia paucis particulis subiectus ] Orosius coniungit hic sequentia cum prioribus Græca sic habent δι' ὀλίγε σάματος ὑποπεπτῶν κατὰ τὴν ἐπερείσιν τῶν δακτύλων. At clausula hæc posterior κατὰ τὴν ἐπερείσιν segreganda est à priori, connectendaq; sequentibus, in hunc modum, κατὰ τὴν ἐπερείσιν τῶν δακτύλων ῥαδίως ἐπείκων.

Lineis incidere.

Duabus utemur lineis.] Hoc est duas diuisiones molimur. Celsus ubiq; loquitur eodem modo, ut lib. 7. Reperti in Græcia sunt qui nouem lineis cutem capitis inciderent. Itē Reperti sunt qui à capite recte eas lineas ad tempora diducerent. Græce est δύο κεκρήμεθα διαίρεσες.

## I N V. CAPVT.

**A**Ut etiam acutus.] Fluxiones in oculos nunc longæ, nunc breues eueniunt, pro humorum in illos decumbentium, ratione particula & in Græco codice male pro & posita est, nec Orosio, nec Gemusæo aduertente.

Aut etiam ceruix deligata sit.] Ut scilicet magis conspiciatur. Nam Celsus lib. 7. de eadem re tractans, frequens curatio est, uenas in temporibus adurere: quæ fere quidem in eiusmodi malo



di malo tument, sed tamen ut inflentur, magisq; se ostendāt, ceruix ante modice deliganda est.

Membranam detrahemus. ] Codex Græcus uiciatus est, ut qui ὑφ' ἐν habeat pro ὑμένα omisit Orosius, aliiq; castigatores. In fine capitis ἀφελωτικῶς uertit crustam inducentibus, cum dicendum esset, cicatricem inducentibus.

## IN VI. CAPVT.

**H**Ypospatismo. ] Anonymus quidam Græcus inquit, hypospatismus itaq; tribus fit super frontē diuisionibus post latiore specillo quod spatoulam uocant, per corpora quæ interiacent, transmissio. Hypoσπα-  
τίσμος quæ  
ἢ spatæ  
transmis-  
sis.

Exilem spatam. ] Hoc est gladiola modo latam Græco uocat Paulus ὑποσπαδίαν. Paulo post σπάδιον, quasi dicas spatulam. Hac autem dictione usus sum non quidem latina, sed medicis cognita. ὑποσπά-  
διος.  
πτύγμα.

Panniculumq; implicitum ] Græci πτύγμα & πτυγμάτων appellant. Galenus in commentariis de Chirurgia.

## IN VII. CAPVT.

**P**eriscyphismus. ] Citatus supra Græcus author, memoriæ prodit periscyphismus est, cum transuersis lineis coronæ modo frons secatur.

Penicillis ] Sic reddidi σφηνίσκος, quæ linamenta dicuntur cunei modo intorta. Vnde quidam reddunt cuneolos ex linamentis. σφηνίσ-  
κος.

## IN VIII. CAPVT.

**D**E sutura ] Titulus capitis habet περί ἀναρῥαφῆς quæ dictio deriuata est à ῥάφῃ & ἀνα Sicut inferius caput facit de καταρῥαφῆς hoc est de sutura [inferioris palpebræ à κάτω & ῥάφῃ. ἀναρῥα-  
φή.  
καταρῥα-  
φή.

Græci appellant διτιχίασιν. Celsus eleganter lib 7 hanc dictionem interpretatur, Modo sub ordine naturali pilorum alius ordo subcrescit. Quo authore ego quoq; uerti, cum naturali pilorū ordini, alii præter naturam pili succrescūt, nihil tamen ex Pauli snia commutauī. Græce sonāt in huius modū καλουμένη διτιχίασις ἐπὶ μὲν ἐκφυσοῦ παρὰ φύσιν τρύχων, ἐπὶ τὸν κατὰ φύσιν ἀύχοντ' ἢ βλεφάρῳ προσγινομένη τρύχων.

Interim in phalangoſi. ] Phalangosis est cū pilorum subnaſcentium duplex, triplex uē acies uel in superiore, uel in inferiore palpebra prouenit. φαλάγγω-  
σις.

Cuspide



πυρῆν.  
σμήλης.

Cuspide specilli.] Græce est πυρῆνι σμήλης. At intelligendum uenit apud Græcos πυρῆνα nunc pro cuspide accipi, nūc pro extremo quidem capi, sed cauo, unde aliquid infundi pōt. Itē rotūdo, nucleoq; specilli. Hic igitur specilli cuspide palpebra in rugas, plicasq; aut sinum coacta quod κολπώσαντες significat, inuertitur. Dixi autem in rugas coacta, pro inuoluta circa cuspidem.

κροκινόν.  
διὰ γούδω.

Vt croceno diarthodon.] Sic appellat collyrion apud Paulum 7. lib. quod ex rosīs inscribit, adiecto croco in Græco codice κροκινόν habetur pro κροκινῶν. Neglexit Oroscius.

Et ueluti lacte infu.] Græce est ὡς γάλακτι ἐγχύτω. Oroscius uoluit instillato dici, quasi uero non etiam infundi dicatur in oculum medicamēta. Cels. Quicquid inspergitur, auerso specillo infundi debet.

#### IN IX. CAPVT.

Oroscius.  
Vrina im-  
puberis.

Vrina pueri impubis.] Oroscius diligens aliorū iudex. ἀφ' ὅσου uult à me exponi, uenerem non experti. At ego Plinium secutus dixi impubis. Ante pubertatem enim uenerem exercere nequeunt pueri. Hermolaus aliq; docti uiri eo quo ego modo sunt interpretari. Simili calumnia in sequente capite utitur, reprehendens ἱκανὸν uerti amplam notandā magnam, sufficientem, dicendum autem putans. idoneam contra Grammaticorum suorū quibus adheret pertinaciter, opinionem. Item in Aldino exemplari habebatur, ὅδ' αὖ γὰρ, ubi ipse ὅν relatiue legendū censeat, at ego ex Ruellii exemplari & sensu sine ὅ in hunc modum corrigendum codicem dico δ' αὖ γὰρ αὐτὴν τὴν ἑλάν, &c. In 11. cap. pro διτυχίαν, facito διτυχίαν.

Oroscius.  
castigatur.

#### IN XII. CAPVT.

DE ectropio.] Inferioris palpebre uicium est, quod parum sursum attollitur, sed pendet & hiat neq; potest cum superiore committi, ut ait Celsus.

Ectropiū.

Ectropion oboritur.] Vide librum septimum Aetii. Inuertuntur palpebre nonnunquam exulceratione precedente & carne ipsarum adaucta: nonnunquam ex duriore cicatrice.

Auersum specillum. Ita exposui autoribus Celfo & Scribonio, ut etiā antea annotauerim. At Cræci τῶν κυκλίσκων τῆς σμήλης uidentur sepe cōfundere. Nunc pro cauo, & ad fundendum apto specilli extremo, nunc pro acuto & in cuspidē abeunte accipitur, ut hoc in loco. Celsus etiam lib. 5. Quicquid,

Celsus.

inquit,



inquit, inspergitur, auerso specillo infundi debet. Item libro septimo, nam quod paruulum est, super inguem in aluum uel digito, uel auerso specillo repellendum est. Iterum uulnus digitis, uel aduerso specillo diducendū est, ut torquentibus exitus detur: ijsque effusis tū diutius pura urina descendat. Scribonius compositione 227. Ac quarto die auriscalpio auerso, quam partem *κναισισκόν* græci uocant sensim tentare, mouere ab alienatū oportet, quo celerius excidant hæmorrhoides.

## IN XIII. CAPVT.

**A** Nabrochisium græce dictū. ] Nulla est apud latinos dictio, quæ anabrochisium significat. Deriuaturque; à *βρόχη*, & *ἀνά*, quasi illa; ationem dicas. pili autem ansulis ex filo factis comprehensi euelluntur, ut non sit quod Oroscius dament, pilorum euulsionē à me dictā, quæ per filū administratur.

Auriscalpio. ] Græce est. *μήλωτις*, quod deductū est à *μήλη* *μήλωτις*. hoc est specillum, & *ἑστῶτις*, auris proprie enim auribus destitutum est. Dicitur etiam *μηλώτρως*.

Specillum quod utroque extremo in cuspidem. ] alein codice Græco habetur *διὰ πύρινον* pro *διπύρινον*. Quod instrumentum est duplici cuspidē præditum. Nam *πυρῆνα* extremum, ac summam cuspidem, seu nucleum, seu capitulum exponunt. Oroscius reliquit codicem deprauatum, sicut etiam Basilienfis Castigator.

## IN XIIII. CAPVT.

**P** Alpebræ cuti præter naturam. ] Codex deprauatus græcus τῷ *βλεφάρων* *δέξιματι* κατὰ φύσιν habet, pro *παρὰ φύσιν*. Notauit Oroscius.

Collectionem quandam. ] Ita exposui, *συναγωγὴν τινὰ τῆς ὑδατίδος*, hoc est congregantes aliquo modo hydatidem intra digitor.

## IN XVIII. CAPVT.

**P** Terigion. ] Celsus libro septimo ita scriptum reliquit. Vnguis uero quod *πτήρυγιον* græce uocant, est membrana neruosa oriens ab angulo, quæ nonnunquam ad pupilam quoque perueniet, eique officit &c. Hunc ego imitatus, dixit unguem oculorum.

Hamulo modice inflexo. ] Græce est, *ἀγκιστρῶ μικροκαμπῶ*. Celsus eleganter dixit hamulum paulum mucrone intus recuruato, alibi, hamulos intus recuruato.



**Staphyloma.** *κύρωσις.* *μετεωρίσμος.* **Staphyloma** est. ] Celsus nomen staphylomatis probe exponit libro septimo. In ipso autem, inquit, oculo, nonnumquam summa attollitur tunica, siue ruptis intus membranis aliquibus, siue luxatis, & similis figura acino sit, unde id staphyloma græci uocant. Itaque *κύρωσις* recte exponitur eleuatio. Nam alius quidam græcus dixit *μετεωρίσμος*.

## IN XX. CAPVT.

**Επόπυσι.** **De purulentis** Galeni uerba ] Græce purulēti *επόπυσι* dicuntur, cum scilicet totum oculi orbem, aut eius dimidiū pus occupat. Historiam apud Galenum habes in Methodi medicatorix libro quartodecimo.

**Oroscius.** Nisi quis admodum diligenter. ] In codice impresso græce habetur, *εἰ μὴ παύ τις ἀκρῶς*. Deprauata nimirum pro *εἰ μὴ παύ τις ἀκριβῶς*. Oroscius & Gemusæus ceu exiguum præterierunt.

## IN XXI. CAPVT.

**Επόχυμα.** **Ussio.** ] Latini interpretantur *επόχυμα*, suffusionem. Barbari Cataractam. Alibi Celsus enim *επόχυσιν* nominat.

**Oroscius.** Lanam oui luteo cum rosaceo. ] Hunc locum Græce ita habemus *ἐριον λουκῶ ὡς σὺν ῥοδίῳ δούθεν*, quem Oroscius male & imprudenter uertit, Imponemus oui luteum rosaceo exceptum, deligarumque.

## IN XXII. CAPVT.

**ΕΤ** si ad malas subluuias. ] Hoc est si ad genus humoris impetus deciderit. Paulus dixit, *καὶ εἰ πρὸς μῆλον ὑποπίπτει ἡ ὑποφορά*.

**Phacomeli.** *τηλόμελι.* *σιδωτόν.* Ab uisione lenticula melle adiecto. ] In Aldino exemplari habebatur omphacomeli, cuius descriptionem habes septimo. Pauli inter potiones dulces. At hic nihil proficit. Sed phacomeli, legendum, quod est lenticula melle addito, ut superius *τηλόμελι* fœnugræcum melle adiecto, item malicorio ex *σιδωτόν* reddidimus, à *σίδια* deriuatum.

## IN XXIII. CAPVT

**H**ic affectus à prima. ] Celsus septimo penè eadem habet. Solet inquit tamen tumere, uel à prima natali die primum, uel postea facta exulceratione, deinde per cicatricem aure repleta, ut foramen in ea nullum sit, eoque audiendi usu careat,



careat, &c. Græci uocant πόρος ἀγρήτους. In titulo male per ἀγρήτους  
tota ἀγρήτους impressum est.

Postea accidit. ] Hoc est, post natalem diem accidit hoc uitium, si præcesserit exulceratio.

## IN XXIII. CAPVT.

**A** Vriculario specillo. ] Sic exposui μηλωτίδα, quod aliquando etiā pro simplici specillo accipitur, ut in sequentibus interpretor.

Violenta capitis concussione, aure super circulum. ] Celsus libro sexto ex Hippocrate inquit, Tabula quoque collocatur media inhaerens capitibus utrinque pendentibus superq; ea homo deligatur in latus uersus, cuius auris eo modo laborat: Sic ut extra tabulā emineat. Tunc malleo caput tabulæ qđ à pedib⁹ est, feriūt, atq; ita cōcussa aure, id qđ inest, excidit.

Iam uero Calamo, græce ] est διακαλαμίδος. Sic enim aqua potest elici, exugendo: καλάμις:

## IN XXV. CAPVT.

**P** Olypus. ] De hoc lib. 3. comprehensum est, uocat autem hic molliores, dictione græce φαφαρωτέρες, quan dicas teneriores fragilioresq;.

Spatula. ] Celsus etiam hac dictione utitur lib. 7. de Poly-po. Ergo, inquit, hunc ferramento acuto in modum spatulae facti, resolvere ab osse oportet. Spatula.

Manubriolo ipsius. ] Græce est τῷ, καλθισκῷ αὐτῷ, quod superius exposui aueriam specilli partem. Celsus autem uidetur manubriolum capere pro aduersa specilli parte, ut libro 7. de Chalcio. Dein scapelli manubriolo diducenda ab integris partibus sunt, &c. quanquam etiam dicat eodem libro, Aduerso scalpello subsecare magna cum moderatione.

Duplici cuspide præditi ] Male rursus in codice græco διαπυρίων impressum est, pro δι' πυρίων, nec hoc emendauit Oroscius Gemusæus. Oroscius.

## IN XXXVII. CAPVT.

**A** Ntheron puluerem. ] Libro septimo Pauli compositio- nem Antheri habes compræhensam. Dicitur autem ἀν- Puluis Antheros.  
θηρόν. quod rosarum flores inter alia recipiat.

## IN XXX. CAPVT:

**T** Onfilla. ] Latinos in hoc uitio peculiariter significando uerborum inopia laborare testatur. Si quidem per tonsillas & parietē corporis, & morbi exponere cogimur. Græci autē Paristh-  
mia,  
ἀντιάδες.



distinctum partem παρίσθμια, affectū αντίσθας appellant,

Deuotioni spirationiq; negotium, ] Græce est δυσχε-  
ραίαν τε παρέχοντα πῆ τε καταπόσει, καὶ τῷ πνεύματι, quod  
est ad uerbū, difficile usum deuotioni, & spiritui exhibētes.

Quantum licet. ] Hoc est quoad possumus, ὅφ' ἔσων δυνά-  
μεθα. Auic lib. 3. Trahuntur ad exteriora quantū est possibile.

### IN XXXI. CAPVT.

**G**Vrgulio. ] Eadem fere Galenus libro sexto de compo-  
sitione medicamentorū sūm locos habet, Carnosa (inquiens)  
ut nos uertimus quædā particula in summa oris parte suspen-  
sa apparet, si quis toto ore plurimum aperto linguā deprimat  
hæc inquam caruncula duobus nominibus à ueteribus græcis  
nominatur Gargareon, & Cion hoc est Gorgulio & Colum-  
na. His posterius medici prope omnes non ita, sed cronida  
quod est columellam ipsam nominant. Nam eorum qui sta-  
phylen, hoc est uuam uocitant, satius est nō meminisse. Non  
enim particulam, sed unum aliquem ipsius affectum, Staphy-  
len hoc est uuam appellamus, &c.

Garga-  
reon.

Cion.

Gargulio.  
Columella

Vua,

Tenues aut oblongæ ] Celsus partē ipsam contra græcorū  
opinionē, uuam appellat lib. 7. uua inquiens, si cum inflāmati-  
one descēdit, &c. Paulo post quæsi uerba Pauli recenset in hunc  
modū. si uerò inflāmatio quidē nulla est, nihilominus autem  
ea ultra modum à pituita deducta est, & est tenuis, acuta alba,  
præcidi debet. Itēq; si ima, lucida, & crassa, summa tenuis est.

### IN XXXII. CAPVT.

**Q**uomodo aspera arteria ] Caput est περί λαρυγγοτο-  
μίας. Superius annotaui quid ὁ λάρυγξ apud græcos  
medicos sit, quid ὁ φάρυγξ & ἡ φάρυγξ. Hic dico τὸν λάρυγγα  
& φάρυγγα pro aspera arteria usurpari & inter se confundi, si-  
cut etiam βρόγχον. Gale. eodem modo utitur lib. 2. de placi-  
tis Hippocratis & Platonis magis autem ὁ λάρυγξ pro sum-  
ma parte arteriæ, ὁ φάρυγξ pro tota ipsa ponitur. Verba Gale-  
ni sunt. τὸ μὲν γὰρ τῆς τραχείας ἀσθησίας ἥνπερ δὴ καὶ φάρυγ-  
γα προσαγορεύομεν, &c. Paulo superius. πληττομένη γὰρ ὑπὸ  
τῶν κατὰ τῶν λαρυγγα χόνδρων, οἷον ὑπὸ πλήκτρων τινῶν ἢ ἐκ-  
φυσικοῖς ἀντιφωνῇ γίνεται, &c. Iam eodem in loco ἡ φάρυγξ,  
nisi uicium sit codicis, pro ἡ φάρυγξ usurpatur, in hanc senten-  
tiam. οἱ δ' ἄλλοι ἔχουσιν λέγειν, ἡ δ' ὅτι πλησίον ἐστὶν ἡ καρ-  
δία τῆς φάρυγγος διὰ τὸ τοῦ ἐκείνης ἀρχεῖσθαι τὴν φωνήν, &c.

Larynx.

Pharynx.

IN



## IN XXXIIII. CAPVT.

**A**No proximos.] Codices nostri deprauati erāt, δ'ἀκτυλον habentes, pro δ'ακτυλῖς ubi non parum debet Oroscius exemplari suo. Paulo post fac δ'ἀκτρησιν ex δ'ἀκτρησιν.

Implicitum aliquod in longitudinem.] Sic interpretatur λημισκόν. Celsus lib. 7. cap. 28. Intus inquires, & implicitum in longitudinem linamentū (λημισκόν græci uocant) in acetum tinctum demittere. In codice græco est διασυστόν distinctum, quasi duæ dictiones sint, impressum, quod legēdū est δ'ἀσυστόν, quod pertrahi possit & implicari.

Fomentum & medicamen.] In exemplari græco habetur τὴν αὐτὴν ἐμβροχὴν μοτοφυλάκιον φάρμακον, pro quo legēdū censeo τὴν αὐτὴν ἐμβροχὴν, καὶ μοτοφυλάκιον φάρμακον. Nā antea uino & oleo, aut aqua & oleo alpergi uolebat, inde medicamē in lintheolis illicitū accommodari. Capitur autem eodem fere sensu, quo ἔμμοτον. primum non annotauit Oroscius, nec Gemusæus.

Oroscius.  
μοτοφυ-  
λάκιον

## IN XXXV. CAPVT.

**I**N Ceruice.] superstitioni quidam doctores, pro in ceruice, censent dicendum, in collo, quod ἐν τραχήλῳ græce dicitur. At Celsus fere ubiq; ceruicem pro collo, ut libro quinto de strumis agens in hunc modum, nascuntur maxime ceruice, sed etiam in alis, & inguinibus, & in lateribus.

τραχήλος

Arteriæ quas Carotidas appellant.] Hæ arteriæ in dextra sinistraque circa guttur sursum procedentes ultra aures feruntur, quæ nomen inde sortitæ sunt, quod ntesæ, aut alterationem quandam expertæ Caron inducunt, quemadmodū musculi καρσιδῆς apud Hippocratem de articulis.

Cartides.

Nerui recurrētes.] Hi sunt nerui sextæ cōiugationis cerebri, qui iuxta carotidas arterias deorsum feruntur, communi utrinque uelamento, & in Anatome plenius condiscēs.

Musculi.  
καρσιδῆς  
Nerui re-  
currentes.

## IN XXXVII. CAPVT.

**A**Rteria aperte.] Galenus libello de tumoribus præter naturam hūc in modum habet. ἀρτηρίας δ' ἀνατομωθείσας, τὸ πάθος ἀνευρίσμα καλεῖται. γίγνεται δὲ καὶ τῷ τῆς αὐτῆς, ἐπειδὴν εἰς ἑλὴν μὲν ἀφίηται τὸ προσκείμενον αὐτῇ δέσκα δὲ μείνῃ τῆς ἀρτηρίας ἑλκος, μήτε συμφυεῖσις, μήτε τυνολωθείσης, μήτε σαρκεὶ φραχθείσης: διαγινώσκειται δὲ τὰ τοιαῦτα παθήματα τῷ σφίγγῳ τῶν ἐργασζομένων ἀσθησιῶν, ἀλλὰ καὶ θλιβο-

GG 3 μένων.



μένων ἀφανίζεται πᾶς ὄγκος παλινδρομήσης εἰς τὰς ἀρτηρίας  
τῆς ἐργαζομένης αὐτὸν ἐσίας. Ex quo sententia, addendum in  
Paulo superius est ἔλκος, legendumque μένει δὲ τῆς ἀρτηρίας  
ἔλκος, non μένει δὲ τὸ τῆς ἀρτηρίας, &c. Hæc non annotavit  
Orosius, uel Gemulus.

Tumor omnis euanescit. ] Codex græcus habet πῶς δ' ὄν-  
κος pro πᾶς ὄγκος. nec hoc aduerterunt Aristarchi nostri.

## IN XXXVIII. CAPVT.

βρογχοίλη  
λη

Gutturosi.

συστροφή.

**G**Randis in ceruice & rotundus. ] Celsus lib. 7. inquit, At  
in ceruice inter cutē, & asperā arteriam tumor increfcit,  
βρογχοίλην. græci uocāt, &c. Qui hoc uitio laborāt gutturo-  
si apud latinos nomināntur. IN XXXIX. CAPVT.

**G**Anglion. ] Verti ganglion est nerui in modum concretio  
quod græce est συστροφὴ νέρου. Nā induratur nerui, contor-  
quenturq; ac in nodosam affectionē coeūt. συστέφεται signat  
in spissari, coire, indurescere. IN XL. CAPVT.

**C**opia uero ipsius ] Vide Galeni commentarium de ple-  
nitudine: ubi copiam utramque fusissime exponit.

Ordo ue-  
narum in  
mittendo  
sanguine.

At in capitis morbis. ] Galenus libro de anatomicis tracta-  
tionibus quarto in eandem fere sententiā habet. In iis qui in  
fra iugulum afficiuntur, siquidē sanguinē detrahē oportet,  
principium locum præsidii ratione uena possidet: quæ cubiti  
flexū accedit sibi quæ ad cubitū ipsum defertur. Tertiū com-  
munis, quartum quæ ab humeraria ad flexū cubiti pergit, po-  
stremū humeraria ipsa. In illis autē quos supra iugulum mor-  
bus infestat, contra, humeraria primum, quæ inde ad cubiti fle-  
xum porrigitur secundum, tertium communis, quartum quæ  
ab interiori parte flexum adit, quintum, quæ cubitum ipsum.

## IN XLI. CAPVT.

Lenis cu-  
curbitula.

**L**enis itaq; Cucurbitula. ] Dicitur lenis cucurbitula, quæ  
sine scarificatu, & flamma imponitur. uide Galenum in li-  
bello de hirudinibus, reuulsione, cucurbitula, scarificatu.

Genera cu-  
curbitula-  
rum.

Alii cucurbitulis usi sunt uitreis. ] Celsus duo genera cu-  
curbitularū ponit æneum, & corneū quanquā ex aliis quoque  
materiæ generibus fieri doceat. ac si cætera defecerunt calcu-  
lus quoque pultarius oris cōpressioris ei rei cōmode aptatur.

## IN XLII. CAPVT.

**H**ippocrates. ] Libro de Articulis de ala mentionem fa-  
cit, non autem certe altius ferrum adigi præcipit, quod  
nerui,



nerui, uenæ, & arteriæ subsint, quæ calorem istum ex ferramento tolerare nequeunt. IN XLIII. CAPVT.

**C**onuenit igitur ] Græcus codex plane peregrinâ habet lectio nē, quid enim sibi uult aristolochiæ mentionē facere, uti ferramento crustę excitandæ sunt. Habet autē in hunc modum. *δει ἐν τῆς μακρᾶς ἀριστολοχίας τὴν ρίζαν ἀλαίῳ ὀδυσσάτας ἐντίθεναι αὐταῖς πεπυρακτωμένας τὰς ἐσχάρας.* hoc est conuenit igitur longe aristolochiæ radices oleo imbuta imponere ipsis crustas ignitas. Mihi autem legendū uiderur *δει ἐν αὐτοῖς καυτηρίοις πεπυρακτωμένοις τὰς ἐσχάρας ἐνχέειν*, ut nos uertim<sup>9</sup>. Neglexerūt locū Orosii & Basilien̄is castigator.

## IN XLV. CAPVT.

**G**alenus solam administrationem. ] Libro quartodecimo Methodi hæc ad uerbum inuenies.

## IN XLVII. CAPVT.

**V**omica laborat. Græce est *ἀφυσάμενον* quasi dicas, abscedens. Celsus de uisione iecoris agens, dicit si uerò iecur uomica laborat, eadem facienda sunt, quæ in cæteris interioribus suppurationib. quidā etiā contra id scalpello aperiunt, ipsam uomicā adurunt. IN L. CAPVT.

Vomica in  
pectore.  
Ascites.

**Q**uo ueluti in utrem aqua colligitur. ] Hoc est, si ascites hydrops est. Nam *ἄσχος* utrem signat. Auicenna administrationem ex Paulo sumpsit.

Ascites.

Imum abdomen adusq; tenuem. ] Sic redidi *ὑπογάστριον*, quod ad uerbū sonat imū uentrē. Sed abdomen imum ex Celso sumptū, nam exterior uētris pars est, abdomen. forte *ἐπιγάστριον* legendū est, ut in sequentibus, *χαλκῆν καλαμίσκον διέτε τῆς τῆς ἐπιγατρίου, καὶ τῆς τῆς περιτοαίου διαίρεσιν καθόλου*.

## IN LII. CAPVT.

**Q**uomodo peritonæi. ] Hoc caput ex sexto medendi Methodi libro sumptum est, uerum in codice græco, mirum quam mutilū & deprauatum. Orosius autē, & Basilien̄is castigator non aduerterunt, in erratis interpretū occupati.

Quare etiam remedium. ] Lege in codice græco *ὥστε καὶ ἡ ἰατρὶς ἐν τῷ θερμῇναι*.

Mox expressa calefacere. ] fac *ἐκθερμῆναι τέτω τὸ ἔντερον*.

Quæ græci Syringotoma. ] *μυτὰ καλέμεια ὀφθαλμοειγγοτόμα.* Figura autem laboranti. Adde in græco dictionem hoc pacto *ἐπιτήθει δὲ σχῆμα τῷ κάμνοντι*.

Gg 4 Cum



Cum in superioribus deorsum. ] Deest in græco, πρὸς δὲ τοῖς ἄνω, κατὰ ῥέθρον.

Quoad totum exacte persuat. ] Deest aliquid. Legendum enim ἀκριβὲς ἂν ὅλον ἀκριβῶς ῥαφῇ.

In per reliquum abdomen. ] Fac ex διαπείρειν τὸ ἕτερον ἐπιγάστριον hoc, διαπείρειν τὸ ἕτερον ἐπιγάστριον.

Deinde ab hoc rursus. ] Hic multa desiderantur plane necessaria quæ superioribus adiiciantur, ne quis cōpendii causa ab ipso Paulo prætermittenda censeat. Sic igitur ex Geleno instaurari debet. ἦτ' αὖτις ἀπὸ τούτου πάλιν ἀρχαμένους συρῶ-  
ξάπτειν αὐτῷ τῷ ἀντικειμένῳ περιτοναίῳ. καὶ πάλιν διεκβάλλειν διὰ τῆς πλησίον δέσμης. ἐκείθεν δ' αὖ πάλιν εἴσω διείρειν, συρῶσθαι αὐτὸ τῷ ἀντικειμένῳ περιτοναίῳ διεκβάλλον-  
τάς τε διὰ τῆς πλησίον δέσμης, ἦτα, &c.

Pari modo si proxime oras. ] Legendum est ἔτι δὲ καὶ τὸ μὲν ἐχρυσάτω.

Id autem fiet in eum modum. ] Fac ἔτσι δὲ τῆτο κατὰ τὸν δὲ τὸν τρόπον. Quid enim sibi uult ἔτσι δὲ τῆτο κατὰ τὸν δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον Vbi hic tua diligentia Orosie?

#### IN LIX. CAPVT.

καθέτην

SUmpro igitur Cathetiro. ] hoc instrumentum à demittendo dictum est. nam per id aliquis liquor in uescam demittitur à κατὰ & ἵμι. Est autem rectus syphos, ut ait Gal.

#### IN LX. CAPVT.

Ligaminibus sex processuū. ] Hoc est sex appendiculorum ἑξασκελῆς enim ad uerbum sonat, sex crurum. a geometris petita dictio est, qui figuras quasdam ἑξασκελῆς nominant.

ἐπικόπος

Super lapidem qui excidendis subiicitur. ] Græce est κα-  
πειτα διέλωμεν κάτω τὸν λίθον κατ' ἐπικόπου αὐτοῦ τῆς λίθου hoc est deinde diuidemus infra calculū super ipsum lapidē qui incidendis subiicitur. At uitiū exemplaris esse puto, ponendumq; pro τὸν λίθον, quod est calculū, τὸν καυλὸν hoc est colem. uerū Aetius & alii ueteres, sectionē in cole non infra ad futurā, uerū supra fieri præcipiūt sed κάτω. Sunt qui intelligāt super lapidē ipsum qui inciditur. IN LXI. CAPVT.

Nota.

ἑξασκε-  
λῆς

Dartos.  
Erythroi-  
dos.

TUnica erythroides. ] Duæ sunt testiculorum tunicae, dar-  
tos, & erythroides. Hic autem male habetur in Græco ἐλινθροειδῆς pro ἐρυθροειδῆς. Paulo post inuenies ἐρυθρὸν pro ἐρυθροειδῆ posuit. Gæmuseus locū iā citatū reliquit uitiatū.

IN



## IN LXII. CAPVT.

**H**vmoris ociosi in particulis scrotum impli.] In græco est  
 ἄργον ὑγρὸν συλλεγόμενον περὶ τὸ μέγας τῶν τῶν ὀσχεῶν  
 δια πλεόντων σωματίων, quod ad uerbum sonat. Oroscius hu-  
 mor collectus circa partem corporum scrotum implicantium,  
 Mihi uisa est superior translatio manifestius. hoc te meminif-  
 se ueluti. Cæterum commune ramicum nomen est, Hernia  
 ut ait Celsus unde Herniosi appellantur.

## IN LXIII. CAPVT.

Hernia.

**R**acosia.] Ita appellant græci ῥάκος quod uile detritumq;  
 λιπαρὸν, ut superius annotatum est. Cum itaq; laxior  
 cutis scroti & ueluti lacera pender, rhacosia uocant.

Rhacosia.

Quod incidendis subiicitur.] Græce est κατ' ἐπικόπου σα-  
 νίδος, quasi dicas super asserem, super quem aliquid inciditur  
 Superius de calculosis dixerat, κατ' ἐπικόπου τῆς λίθου. Nōnul-  
 li calculum ipsum qui inciditur, exponunt, uerum in sequenti-  
 bus dictio ἐπικόπος inotescet magis.

ἐπικόπου.

## IN LXXII. CAPVT.

**P**essarium aliquo cicatricem inducente unctum.] πρια-  
 πισκὸν reddidi pessarium, nam illud nihil aliud est quā pe-  
 nicillum, pudendi uirilis figuram repræsentans. Superius au-  
 tem habetur, spiculo quod græci δίοπτρα appellat, à perspi-  
 ciendo, Nam hoc instrumento triplici crure prædito, natura-  
 libus dilatatis, latentes in utero morbi cōspiciuntur modum  
 uero aptandi instrumenti uocant δισπρισμόν.

πριαπισ-  
κός.

δίοπτρα,

## IN LXXIII. CAPVT.

**S**peculi tridente.] Sic exposui τῆς τῆς δίοτρας λώτῃ. Cum  
 Senim speculum tria habeat crura, aut columnulas, aut den-  
 tes, inuicem iunctos, sed qui diduci possint, non plane abhor-  
 rere usum est à sensu, si tridentem speculi dicerem. Nā quid  
 sibi λώτῃ apud græcos aliud uelit, nescire me fateor. Bernar-  
 dus felicianus, qui mihi in Pauli sexto uertendo successit, græ-  
 cam dictionem reliquit, Loton inquit speculi.

λωτός

Lotos.

## IN LXXIII. CAPVT.

**C**ontraclum.] Male in græco codice est συνημένων pro  
 συνημένων Paulo post λελεπτυσμένον, pro λελεπτυσμένον,  
 rursus, postea indicem digitum unctum, λελεπισμένον habetur  
 pro λελεπισμένον quæ omnia Oroscius neglexit.

Hydrocephalon sit, hoc est aquam in capite.] Hoc est ferè  
 quod

Hydroce-  
phalon.



quod Celsus dicit, solet etiam euenire ut infans humore distendatur, ex eoq; profuat foed. odoris sanies.

## IN LXXV. CAPVT.

**M**Anu siquidem sinistra calida, nunctaq;.] Græce est, τὴν γὰρ χειρὰ τὴν ἀριστερὰν θερμὴν, καὶ λελεπισμένην, fac λελεπισμένην ἀλιπαίῳ. Et hoc reliquerunt aristarchi.

## IN LXXVII. CAPVT.

**S**I oblique, specillo duplici cuspide.] male in codice Græco habetur, διαπυρίνω pro διπυρίνω.

Caulis modo porrection.] Græce est ἀποκωνλίσσειν, hoc notat caulium modo transuersim fractum.

## IN LXXVIII. CAPVT.

Fistulæ.

**A**Ni fistulæ, latentes.] Fistulæ aniales tortuosæ, aliæ multiplices, aliæ transuersæ, aliæ simplices habentur.

Vel specillo per fistulam.] Rursus male in græco διαπυρίνω pro διπυρίνω habetur.

Διατορὴς

Δίοπτριον

Instrumento quod ad sedem.] Vocatur hoc διατορὴς δίοπτριον quasi dicas distendens speculum, uerum propriè dicitur δίοπτριον de utero Potest autem accommodari etiam sedi, cum latentes in ea morbi sint.

## IN LXXXIII. CAPVT.

**D**E extremarum partium præcisione.] Sic uocatur græcis ἀκροτηγασμός. Celsus lib. 7. de Gangræna inquit, Gāgræna inquit, inter ungues, alasq; aut inguina nasci, & si quando medicamenta uincuntur, membrum præcidi oportere, alio loco mihi dictum est.

ἀκροτηγασμόν.

Ex causa exterius adueniente.] Græce est ἐκ προκαταρκτικῆς αἰτίας, quasi dicas præincipiente aut primaria causa, ut προηγούμενος de intentiore causa dicitur.

## IN LXXXV. CAPVT.

**P**ollicibus.] In græco est τῆς πρὸς μεγάλῳ δάκτυλῳ, hoc est ad uerbum in manus digitis magnis. Quia uero pollex quasi maximus omnium est, uerti pollicibus, Celsū imitat.

## IN LXXXVI. CAPVT.

**V**T sanie excreta, secta hæc.] Codex græcus tantum habet, ἵνα ἐκκρίθῃτος, ubi addendum est ἰχώρος, legēdnmq; ἵνα ἐκκρίθῃτος ἰχώρος quod Orosius & Basiliensis corrector nō annotarunt.

At in rectū superne deorsum.] Hic quoq; mutila est lectio exemplaris



exemplaris græci. Habet enim εἰ δὲ κατ' ἐνθὺ ποιήσας τομὴν ἐκ τῶν ἀνωθεν εἰς τὸ καλὲ μενον ὑπεσάρκομα γίνεται τῆς, &c ubi legendum est, εἰ δὲ κατ' ἐνθὺ ποιήσας τομὴν ἐκ τῶν ἀνωθεν εἰς τὸ κάτω, τὸ καλὲ μενον ὑπεσάρκημα γίνεται, τῆς, &c. Istud quoque Aristarchi nostri neglexerunt.

## IN LXXXVIII. CAPVT.

**T**elis extrahendis.] Telum uocatur, quicquid manu iacimur in aliquem potest, unde quod græcos βέλος à βάλ βέλος λω quod est iaceo dictum est.

Hastilia.] Sic exposui ἀτράκτα Galenus in exegesi Hippocratis inquit ἀτράκτον ἢ μόνον τὸν εἰς ἱερουργὸν χρῆσιμον, ἀλλὰ καὶ τὸ ξύλον βέλους, hoc est attracto non modo ad sacrificium utilē, sed et sagittæ lignum significat. Alibi appellat τὸ ἐπίθεμα, nempe id quod imponitur Ego ut obtēperare Oroscio hostile di<sup>i</sup>, q̄ quā interpretatio mea satis erat manifesta.

Belulcum.] Celsus lib 7. hoc ferramentum ad Authorem Dioctem refert. Est autem lamina uel ferrea; uel ænea etiam ab altero capite, duos utrinq; deorsum conuersos uncus habet, ab altero duplicata lateribus, leuiterq; extrema in eā partem inclinata quæ perforata est.

Succus ex uentriculo.] Hoc est Chylus, quæ uox licet græca sit, medicis tamen non est incognita. Est autem proprie Chylus, succus ex alimento in uentriculo prima concoctione factus, nec proprie succus latine dicitur, quia uero aliam digestionem non habemus, ea utendum fuit.

Lamina quæ membranam custodiat.] uocatur græcis inde μνηγγόφυλαξ. Celsus ut alias annotaui lib. 8. exponit in hunc modum. Lamina cinea est, firma, paulum resima, ab exteriori parte leuis quæ demissa est, ut exterior pars eius cerebro prior sit, subinde ei subiicitur, quod scalpro discutientū est, &c. Sequenti capite rursus ait, subiicienda lumina est, q̄ custodē eius mēbranæ esse proposui, & super eā quicquid spinosum est, & intus eminet excidendū est, forte non male ἐπικόπος dici potest.

## IN XC. CAPVT.

**V**Sque ad laminam secundam.] Græce erat ἀχρι τῆς διπλῆς. Recentiores, ijq; barbari dicunt ad caluariæ tabulaturam, alii usq; ad duplicationem.

Mirum in modū Galeno cōmendatur.] Vide librum sextum Galeni Methodi medēdi, ubi de fracturis caluariæ agit.

Chœnicion.



χοινίκιον  
Modiolus.

Choenicion. ] Celsus interpretatur modiolū qđ ita describit lib. 8. cap. 3. Modiolus ferramentum cōcauū, teres, est imis oris ferratū per quod mediū clauus ipse quoq; interiore orbe cinctus demittitur. IN XCII. CAPVT.

Celsus.

TEnui & sorbili cibo. ] Celsus lib. 8 in quo Hippocratē magna ex parte sequitur, habet. Deinde die tertio humidū cibū, quod Paulus dixit λεπταῖς, καὶ ῥοφματώδες τροφαῖς.

Fracturarū  
differētiæ

Maxilla intra tres potissimū septimanas. ] Huic snīa Celsus astipulatur. ferē uero intra quartum decimū & unū & uigesimum diem sanescunt, maxilla, malæ, iugulum, pectus, latus, os scapulorū, costæ, spina coxarū, os tali, calx, manus planta.

Quod si fractura per transuersum. ] Fracturarum differentia quinque sunt, prima quæ fit schidacedon, altera cauledon. Tertia raphanidon, quarta sycydon, postremo alphitedon, prima assulatiū quasi per rectitudinem, secunda per trāsuersum, tertia in raphani modum per fissuras, quarta cucumeris modo, quinta in minutissimas partes ut farina efficitur.

#### IN XCII. CAPVT.

Lamina quæ à tuendis ] Græce erat μινυγγοφυλάκος ἢ ἐτέρας ἐκκοπέως. Adhibetur ēt lamina quā in cerebri membranis usurpamus, aliis quibusdam excidendis: ut corium, uel asser, uel massa plumbea æneaq;. Puto autem legendum ἐπικόπου pro ἐκκόπεως. Nam superius ἐκκόπων facta iam erat mentio Præterea subiungitur, dictioni μινυγγοφύλακος. In sequenti capite Græce habetur προτυπῆται pro προτυπῆται. quæ omnia Orosius & Corrector Basiliensis neglexerunt.

#### IN XCIX. CAPVT.

Manubrii ligonis. ] in Græco codice male habetur οἶον τυλίον, pro οἶον τελεός qđ Orosius & Gemusæus præterierunt. Exponit autem Galenus, rationem administrationis huius commētario secundo in librum Hippocratis de fracturis.

κῶλα  
Artus.  
Membra.

In medio membro. ] Græca sonant, ἐν μέσῳ τῶ κῶλῳ frequentius uertunt τὰ κῶλα artus. Celsus autem lib. 8. uidetur etiam in articulis enumerādis, dictione, membri, uti primum in hac sententia Si breuius adhuc membrum est, & ossa loco suo non sunt. Item donec id membrū cōfirmetur, de humeris, brachiis, cruribus, feminibus, digitisq; cōfractis uerba faciens.

#### IN CVII. CAPVT.

Adaptamus uero ossa uecte. ] Hoc est in locum suum com  
mode



mode restituiimus. Cæterum *μοχλίσκον* quod à *μοχλός* descēdit, uestem reddidimus uide Hippo. lib de fracturis, ubi habet, *μοχλίσκος*.  
*σιδήρια χρὴ ποίεσθαι ἐς τῶτον τὸν τροπὸν ὅνπερ ἔχουσιν οἱ μοχλοὶ οἷς οἱ λάτυποι τρέονται, τὸ μέντοι πλατύτερον, τὸ δ' ἐτίτερότερον, &c.*

Membris coniugalibus.] Dicuntur membra coniugalia, cum duo inuicem iungantur, ut in cubito duo ossa, in tibia itē duo. Rursus *αἰῦγα*, quæ sola sunt, nulli consimili iuncta, ut brachium, femur, aliaq; id genus. Apud Galenum in anatomicis *φλέψ αἰῦγος* de uena, quæ ex paribus thoracem intercurrentibus, sola absq; pari relinquitur, mentionem faciens.

Vt in litera χ.] Græce est *κατὰ τὸν χιεσμένον*, male pro *χιεσμόν*, ut in sequentibus etiam habetur. Est autem *χιεσμός*, imitatio literæ χ.

Linamento illicitum.] Idem *μοτοφύλαξ* & *ἐμμοτόν* apud græcos est, prius quā in lintheolo seruatum significat: alterū in lintheolo illicitum.

## IN CXI CAPVT.

Differētiās.] Celsus ita scriptum reliquit. Mouentur autem ea sedibus suis duobus modis. Nam modo quæ iūcta sunt inter se dehiscunt: ut cū latum scapularū os ab humero recedit, & in brachio radius à cubito & in crure, tibia à sura.

Interdū saltu, calcis os à talo. Modo articuli suis sedibus exci-  
dūt, &c. primū *παράρθεμα* dicere poteris: alteru *ἐξάρθεμα*.

Vsq; ad superficiem.] In græco legitur *μεχρὶ τῆς ὀσφυός* male nimirum pro *μεχρὶ τῆς ὀσφύος*. neglexerunt locū Oroscius, & Gemusæus.

## IN CXII. CAPVT.

DE maxilla,] apud Græcos *γένυς* cum uoce *κάτω* significat maxillam, cum uoce *ἄνω*, malas. quanquam barbari maxillam inferiorem & superiorem appellent. Græci etiam dictione *γνάθος* in eodem significatu utuntur.

*Σχᾶται.*] Galenum commentario secūdo in librum Hippocratis, de articulis exponit quid sibi uelit *σχᾶται*. in hunc modum ὥστε τὸ *σχᾶται* *μυῶν καὶ νῦντων ἐπὶ πάθος ἀνευ ἀρθρήματος*. ὁποῖον δὲ τι τὸ πάθος τῆς ἐπὶ, δηλον μὲν καὶ τὸ φάναι *παρὰλλαγὰ*. hoc est, quare *σχᾶται* musculorū & neruorum affectus est citra articulamentum. Qualis autem affectus hic sit, constat quidem ex eo quod dicit, *peruersiones*.

Maxillam



Maxillam cōmittūt ] Hippocrates legit συμβάλλουσι τὰς κάτω γνάθος. codex impressus Pauli dictionē κάτω nō habet. Tu lectionē corrigitō secundū Hippocratem, ex quo hæc ad uerbum sumpsit Omisit Orosius, & Castigator Basiliensis.

Interpre-  
ratio Hip-  
pocr.

Sin autem utraq; maxilla ] Græca sonant, ἢν δὲ ἀμφοτέ-  
ραι αἰ γνάθοι. Hoc est si maxilla utraq; parte luxata fuerit nō  
ut recentiores interpretantur, maxilla inferior, & superior,  
quæ malæ rectius dicendæ sunt. Galenus orationem Hip-  
ocratis, unde hæc sunt transcripta, in eum modum interpreta-  
tur, ἐν ταύτῃ τῇ ῥήσει δόξη γνάθους ὀνομάζειν οὐ τὴν γένιν ὅλως,  
ἀλλ' ἐκάτερον τῶν μερῶν, καθ' ἃ πλάτνιεται αὐτὴ δόξη δὲ καὶ  
τὰ κάτω πέρατα καθ' ἃ γυμνὸν καὶ ἄσαρκον τὸ ὅσ' ἔν' ὀνομάζειν  
γένιας, &c. Quæ ita exponere possis. In hac oratione uidetur  
γνάθους non absolute maxillam appellare, sed utrāq; partem,  
in quibus ipsa dilatescit, uidetur etiam ima extrema i quibus  
os nudum & ex carne est, maxillas nominare.

Secundum horum directam aciem. ] Pauli codex græcus  
habet κατὰ τάξιν, forte καθ' ἕξιν & ut Gal. dicit καθ' ἐυθυπο-  
ρίαν, ut scilicet dentes primores in maxilla, primoribus in ma-  
lis, Canini caninis, molares molaribus respondeant. Hippo-  
cratis uerba hæc sunt, τὸ δὲ ἀτραβὲς μάλιστ' ἂν γνῶις τοῖσι  
δρίοισι τῶν ὀδόντων τῶν τε ἄνω καὶ τῶν κάτω καθ' ἕξιν. Nō an-  
notauit Orosius, nec Gemusæus correxit.

Orosius,  
καθ' ἕξιν.  
καρσείδεις  
οἱ μῦες  
Quomodo  
caros.

Nam musculi hi dum alterantur, & præter naturam inten-  
duntur, carum inducunt ] Græca ita sonant. καρσείδεις οἱ μῦες  
οὗτοι καὶ ἐν τανύμενοι παρὰ φύσιν. Galenus locum exponens  
commentario supra citato inquit, utrunq; & alteratio. & mu-  
sculorum tensio carum potest efficere. Nam tensio hæc fit, fi-  
lamentis quæ prius erant laxa, nunc omnibus secundum re-  
ctam lineam extensis Alteratio, dum calefacti, aut refrigera-  
ti, aut humectati, præter modum fuerint, aut inflammationē,  
aut erysipelas fuerint experti.

Hic igitur decimo die potissimum moriuntur. ] Mutilus  
est codex Græcus Pauli. habet enim οὗτοι ἔν' καὶ θνήσκουσι καὶ  
μάλιστα. pro quo legendum est, οὗτοι ἔν' θνήσκουσι δεκαταῖσι  
μάλιστα, ut habet Hippo. lib de articulis. Gal. ibidem exponit  
dictionem μάλιστα. pro ἐπὶ τὸ πολὺ, quod est plurimum, ma-  
gna ex parte, & ut nos diximus. potissimum. Orosius & Ge-  
musæus locum præterierunt.

IN



**P**rocessus ancoræ similis.] Est hic processus interiore in parte exiguus, acutusq; anchoræ modo, qui etiam ab aliis ῥοπακκοειδής dicitur, quod extrema ipsius pars, ita corniculæ rostrum exterius inclinat.

Musculi bicipitis.] Vide Galenum de usu particularū, & de Anatomicis tractationibus. Est aut ex colli musculis anterioribus, qui in duplici capite ligamēta fortia obtinet, unū ex processu anchorali, alterū ex elata iupficie scapularū ceruicis.

Ipsūq; humeri fastigium.] Quidam anatomici scapularum cū iugulo cōpactionem Græce nomināt ἀκρωμίων quasi dicas summum humerum, alii tertium os esse prædicāt, quod in ipsis tantum hominibus deprehenditur, ubi igitur in Græco codice habetur ἀκρωμίων, ego reddidi summum humerū, aut humeri fastigium.

Lignum quod Græci hyperon.] Lignum est pistilli modo factum, unde etiam nomen habet, frequens apud Hippocratem de articulis. Hyperon.

Atq; hoc in scalæ gradu.] Celsus lib. 8. de humero luxato Paulo consentit, sic (inquiens) brachium deligatum super scalæ gallinariæ gradu traicitur, ita alte, ut consiltere homo ipse non possit. Hippocrates hanc restitutionem per scalæ gradum separat ab ea quæ fit per hyperium, estq; apud illum, quintus restituendi modus, quanquam in sexto modo, scalæ etiam faciat mentionem. Scala gal.  
linaria.

Ambe.] Ad uerbum transcripsit ex Hippocrate, & Celsus Hippocratem lib. 8. quasi expressit in hunc modum. At si uastius corpus, neruiue robustiores sunt, necessaria est spathula lignea, & quæ crassitudinem duorum digitorum habet, & longitudine ab ala ad digitos perueniat. In qua summa capitulū est rotundum & leniter cauum, ut recipere particulam aliquā ex capite humeri possit. Ambe.  
Celsus imi-  
tatur Hippo-  
cr.

Panniculo circumdatū.] Celsus idem aliis uerbis exponit. Eoq; spatha fascia inuoluta, quo neruis tactu lædat, ad alam à brachio dirigitur.

**S**ani cubiti inspectio.] Methodus hæc est quam Hippo. lib. de medicina exponit, quamq; Galenus similitudinis, & dissimilitudinis. Optime enim affecta pars cognoscit, si cū sana conferatur. Codex autem Græcus male habet παθους pro

Methodus  
similitudi-  
nis, & dis-  
similitudi-  
nis.

παθους.



πάθῃσις. Quid enim sibi uult, ἡ τῆς ὑγιαίνοντος ἀγκῶνος ἐλέγ-  
χει πάθῃσις, hoc est sani cubiti affectus arguit, quomodo id quod  
sanum est, simul affectum est? Melius igitur mea sententia  
πάθῃσις quod est disciplina. ego dixi inspectio. Aristarchi no-  
stri non aduerterunt.

## IN SEQVENS.

**A**ppellauī Brachiale eam uincturam, quā brachium cū ex-  
trema manu committitur. Celsus palmam nominare ui-  
detur in octauo. Græci dicunt καρπὸν.

## IN CVIII. CAPVT.

**V**ertebræ spinæ.] Hoc caput Paulus magna parte ex Hip-  
pocrate transcripsit, Auicēna autem quasi ad uerbum ex  
Paulo transtulit. In hoc discrepamus, ubi ego sculpturā uerti,  
ille foueam habet, ubi ego asserem, ille tabulam.


## IN CVIII. CAPVT.

**I**ntenso autem affecto Crure.] Mutilus est codex Græcus  
impressus uel Basileæ, uel Venetiis id quod etiam ex Aui-  
cenna manifeste constat. Habet autem codex in hunc modū:  
ἐντεταμένον τῆς πεπονθότος ὑπὸ τῶν τέτρων ὡς δύο δακτύλης.  
nimirum pro ἐντεταμένον δὲ τῆς πεπονθότος σκελὸς πλεον τῆς  
ἐτέρας ὡς δύο δάκτυλους. quod miror Orosium ex suo casti-  
gato exemplari non aduertisse.

Comprehendens qua crassissimum.] Hic etiam male in  
Græco legitur κατὰ τὸ βραχύτατον, pro τὰ τὴν πᾶσχυτατιον.  
Id etiam omiserunt Orosius & Gemusæus. Ex superioribus  
lectio poterat cortigi, nisi in aliorum erratis nimium fuissent  
oculati.

## FINIS LIBRI SEXTI

## COMMENTARIOVM.





COMMENTARIORVM  
IN PAVLVM AEGIN.  
LIBER SEPTIMVS.



**L**IBER hic septimus Pauli de simplici & composita medicina, partim ex Galeno, partim ex Dioscoride partim etiam ex Oribasio, transcriptus est, ordines Galenus præcipue, uires & descriptionem Dioscorides, cõpositionem medicamentorum Oribasius tradidit, quanquam hic quoq; à Galeno & aliis misturarũ rationẽ acceperit. In codice Græco habetur *ἐνεργοὶ* hoc est ad uerbũ emortuũ reddit, nos diximus sensũ aufert. Oroscius maledicit *Οροσκιος*. legendũ *ἡγεῖται* cũ potius quadraret *ἐκνεύει*, qđ est eneruat.

IN II. CAPVT.

**M**Oderatum sane medicamentũ. ] Galenus s̄m genera inquit, medicamentũ affectioni cui adhibetur, potentia respondere oportet. Cæterum hic ordines quatuor enumerat, quos Græci *τάξεις καὶ ἀποστάσεις* nominat. Galenus etiam *ἀριθμὸς* hoc est numeros appellat, nos ordines, interualla, abscessus, & gradus appellamus. *τάξεις. ἀποστάσεις.*

Vt iam sensu priuent. ] Græce est, *ὥς ἡδὴ τεκῶν*, quasi dicas, ut iam mortificent, hoc enim frigida uehemẽter, in membris efficiunt, ut emoriantur, sensuq; priuentur. In summa nihil aliud est *ἐκνεύειν* quàm uita & sensu priuare. *ἐκνεύειν.*

Poterat Oroscius ex hoc loco, superiorem lectionem satis castigatam deprehendere, uerum calumniandi animus eò illũ prouexit, ut bene dicta etiam deteriora faciat.

PAVLI AEGIN. Hh IN



Lignum  
aloes.

**A** Gallochum.] Acrius lignum hoc describens, à similitudine quadam coloris Aloes, Xilaleon nominauit. Hunc secuti recentiores quidam non dubitarunt Lignum aloes, appellare. In sumatra nuper à Lusitanis inuenta, magna copia esse fertur. Ad odorem gentes hæ utuntur. Nam si in manu lignum hoc retineatur optimum spirat odorem.

πλάθος

Flaccidum est superfl.] Gale. πλάθον interpretatur περίτην υγρότητα. Cum itaq; humiditate ea stomachus est irriguus, flaccescit, resoluiturque. Hæc dixi, ut intelligas, Lector, uersionis mea rationem.

Polytri-  
chum.  
Callitri-  
chum.  
Tricho-  
manes.

Anchusæ quatuor.] Ex Galeno transcripsit: quāquā & Dioscorides fere omnia habeat. Verum Galenus & Paulus in hoc à Dioscoride dissentiunt, quod onochelon uiperarum moribus conuenire dicant, forma cataplasmatidis adhibitam, ad alligatum, & comestam his uerbis, καταπλασσομένη τε περιπτομένη, και ἐδιομένη. Dioscorides de foliis εἰς διόμενα. και πινόμενα, και περιπτόμενα.

Adianthum.] Adianthū & Polytrichon idē sunt, Callitrichum, & Trichomanes etiam idem. Duæ igitur species tantū sunt nō quatuor, ut officinæ putant. Vna herba est adianthos in duas partes separata, una proprie adianthū dicitur, de qua Dioscorides priuatim in uno capite tractat, foliis magis albis coriandro similibus & longioribus. Altera pars sequenti capite explicatur, diciturq; Trichomanes, foliis filicis tenuibus, nigrioribus primo, & breuioribus hæc proprie uocatur Callitrichon. Pharmacopolæ in duobus communi uocabulo capilli ueneris utuntur.

Capilli Ve-  
neris,

Athera.] Ex Dioscoride sumptum, uerū clausula hæc apud illum non adest, ἀπὸ σίτου quod est ē frumento. nec apud Galenum, nec Oribasium inuenitur.

Quid loco  
acacie ue-  
re summi  
possit.

Aegilops.] Aue ne secundū genus. Primū βρόμος dicitur. Acacia.] Veterum acatiam non habemus. utimur autem quadam ex fractu pruni syluestris facta. uerum recte aliquis uteretur loco acaciæ ueteris, rhu obsoniorum, quod sumach uocant officinæ, ut quidam eruditus annotauit.

Brancha  
ursina,

Acanthus.] Si Dioscoridis acanthū, & nostrā Branchā ursi nā cōferas, idē plane esse intelliges. Verg dixit, mollis acantib.

Acinos.] Ex Dioscoride tantū hoc transcriptū est, ubi φύγεθ  
λον



λον interpretatus sum panum, & ἐρυσυπέλατα sacros ignes. Acorus ueterum, Galanga nostra est: noster autem acorus species glandioli.

Acorus ueterum.

Amaracus. ] Paulus & Galenus duo capita de amaraco & sampsucho faciunt: easdemq; uires utriq; attribuunt. ac si autores conferas idē plane sunt. Amaracus aut magis apud cyprum celebratus, sampsuchus in tota Græcia præterea amarus paulo erit odorator, quam hodie apud Gallos maioranā gentile dicunt quēq; magis humi serpit. Sampsuchus erectior minusq; odoratus. Dioscorides etiā diuersa fecit capita de unguento amaracino & sampsuchino, qđ alterū ex nobiliori maiorana in Cipro & cyzicenis, alterum per totā graciā fieret. Galeni aut Amaracus est, quā hodie Matricariā nominamus.

Amaracus  
Sampsuchus.

Amaranthus. ] Nota herba est apud Gallos, uocāt eā passuelutum, quod coloris gratia sericum coccineum uincat. annotauit Ruellius.

Matricaria.

Amaranthus.

Ambrosia.

Ambrosia. ] Frequēs reperit in gallia inter exiles & madidas segetes qua mēssores se coronāt Vinosa herba rusticis dī, alijs uinosa ruta, qđ folio rutā, & odore uinū imiteat. Quā officinā ambrosiā noīant, polemoniū antiquorū ē, nō ambrosia.

Polemonium.

Ampeloprasum. ] Exulcerat. Græcus codex habet κακῶι. ut ego legendū ex Gal. censeo ἐλκῶι. quod castigatōr Basilien- sis dissimulat me annotasse priorem Orosius neglexit.

Anemonæ omnes. ] Hoc est oēs satiuæ species. Duo n. genera tm̄ habentur. Satiuū, & syluestre. Satiuū nos papauer rubrū appellamus, eoq; utimur in triticis nascente. ueteres aut nunquā papaueris noīe uocarūt. Germani clapperrosen, gal- li passle fleur. Ipsa nomenclatura à uēto sumpta est, qđ eo flāte, flos ipsius aperiat. Erratica nūcupat gallis coquerelles, primo uere crescit flore purpureo, mulierculæ hac noua tingūt.

Orosius.  
Duo ge-  
nera,  
Anemone.

Lac in mammas suggerūt. ] Ex Gal hæc omnia sunt transcripta. Verum in illo ἀνασπῶσι quasi dicas, sursum in mammas adducunt. In Paulo autem & Dioscoride κατασπῶσι.

ἀνασπῶσι

Aparine. ] Addendum in codice græco particula, τι. nam sententia imperfecta est, si tantū legas ἔχει δὲ καὶ λεπτομερές. fac igitur ἔχει δὲ καὶ τι λεπτομερές. Hoc Orosius & Castigatōr Basilien- sis annotasse debuerunt, uel exemplari adiecisse.

Aristolochia ] Duab. tm̄ specieb. in officinis utimur, Lōga & Rotūda. Sarmētacea negligit, unguētis alioquin utilissima.

H h 2

Arction



Lappa.  
Maior.  
Minor.

Arction prosopitis.] Herba est, quam officinæ uocant Lappam maiorem. Alterum arction uirbasco simile, Lappam minorem appellant.

Arnabo.

Armeniacum.] Hoc est lapis armenius apud Diosc. lib. 5.  
Arnabo.] Idem est, quod Serapio uocat Zurumbet, Cassiæ fistulæ, & cubebis uiribus respondens.

Arthemisia.

Arthemisia.] Duplex, monoclones, & polyclones, matricaria species illius est, per unum & plures ramos distinctæ. Nam & hæc plures habet ramos.

Baccara.

Asarum.] Vulgus Baccharam appellat. Germani Haselwurtz Galii, Racabarant.

Oroscius.

Fuligo.] In græco est κατάγματα. Sic etiā habet Dioscorides Nescio cur Oroscius τραύματα legendū censeat, cū ipsæ quoque fracturæ ossium ad cicatricē uenire dicantur. siquidē raro sine ulcere carnis, fractura accidat, nec κατάγματα solū de capitis fracturis dicitur, ut putat Oroscius, sed omnium membrorum quod intellexisset Oroscius si Hippocratis librum de fracturis legisset.

Mumia.

Aspalthus.] Vero aspalcho in officinis caremus. Possumus autem ipsa Munia loco ipsius uti. Nā in Syria pauperes mortui bitumine implentur, uendunturque; postea Diuites autem myrrha, aloë, croco, balsamo, aliisque id genus conduntur.

Asphodelus.] Pharmacopola, aphrodilorum uocant.

Ungula ta-  
ballina.  
Borago.  
Buglossum.

Atriplex.] In græco codice uidetur addendum ταχέως. Nam διὸ καὶ κατὰ γαστέρα διεξέρχεται, quod est, quare etiam per uentrem transit, imperfecta est sententia, & communis cū aliis omnibus. Nam per uentrem uniuersa quidē transeunt, alia uero cito quæ ταχύπορα, alia tarde, quæ ἑρπυδιόπορα dicuntur. Legendum igitur cum Galeno διὸ καὶ κατὰ γαστέρα διεξέρχεται ταχέως. non aduerterunt nostri Aristarchi.

Bechion.] Officinæ uocant ungulam caballinam.

Buglossum.] Dioscorides & antiquorum Buglossum est, quam hodie boraginem uocamus. Ei uero quam buglossam appellant officinæ, respondet ueterum Cirsion dictū. Itaque buglossum duplex erit, alterū minus, diceturque; nostra uulgaris borago, alterū maius, quod Cirsion apud ueteres dici monuimus.

Sabina.] Duplex est, altera Cupressio similis, altera tarmarici Germani feuerbaum, Galli sauinier appellant.

Corallina.

Muscus marinus: Officinæ Corallinam uocant. In græcia ad uermes



ad uermes puerorū quasi præsentanæo remedio utuntur. Imo etiā purgare dicūt, etiā uim astringentē ueteres ei ascripserūt.

Lemnium miniū ] Celsus miniū uertit *μίλτον*. Manardus corrigit Barbarū, quod minium dixerit, non rubricam, ipse cul pandus. Cæterū officinæ uocant Terram Sigillatam, quā mul ris annis fictitiam, imo etiam hodie uendunt, rubricā quandā ex terra sigillata & bolo armeno mixtam exhibentes. ueram nunc Veneris ex Lemno allatam habes: quæ ibi in collæ quo dam saluo colore nascitur. olim Dianæ sigillo eam imprime bant, unde etiam sphragis dicitur. nunc Turcico insignita est.

Minium.

Terra armenia. ] Hactenus globulos quosdā in medio im pressos ex Germania ailatos pro bolo armeno officinæ uendi derūt, uerus aut bolus armenus est, terra illa sigillata turcicis literis, si supremā & inferiorē partē auferas. nam cū in Turcia imprimunt, adiiciunt sabulū albū, ut melius signū recipiat.

Senecta anguis. ] Hoc est exuiū, qđ uerno tēpore deponūt. Nuclei acinorū uue. ] Græcus codex deprauatus est, qui habet *ψυχρά* hoc est frigidi. pro *αρυφρά* quod est acerbi. Dioscorides dixit *αυπτικά* hoc est astringētes. Orosius omisit. Cemusæus inuitus cōcedit ita legendū, dissimulās me id antea annotasse.

Gingidū. ] Paulus siccare dicit ordine tertio: Galenus, *κίτὰ τὴν δούτέραν ἀπότασιν*, hoc est secundo ordine uel abscessū.

Nota.

Pollen farinaceus. ] Triticici intelligendū est.

Tedē ] Teda proprie dicta, à græcis *δάς* & *δάδιον* uocatur sui generis arbor in Illirico est, redundantior humore quā reliquæ parcior liquidiorq; quā picea, flammis & lumini sa crorum quoq; grata. Improprie tedus appellamus, tum piceæ satiuæ partes imas tum alia quoq; ligna, quæ flamma olei uel picis illitu concepta faculæ modo lucent.

Teda.

Daucos. ] Vero dauco caremus, qui in Creta nascitur, No ster daucus in officinis est species pastinacæ syluestris. Cum autem easdem uires haheant, nil refert hoc loco dauci uti.

Dictamnus. ] Hanc non habemus. In Creta tantum na scitur, unde facile haberi potest, quam officinæ pro Dictam no uendunt, non est, nec etiam pseudo dictamnus.

Dictamnus.

Dracunculus. ] Duplex est, maior, & minor. maior Serpen taria in officinis appellatur.

Quercus. Quod sub glandis corio. Dioscorides etiam ha bet. Tunica glandis putamini subiecta.

Hh 3 Ehenus.]



**Oroscius.** Ehenus.] Paulus habet græce ἐπισκοτῆντα nullo sensu pro  
ἐπισκοτῆντα. Sic etiam Dioscorides Oroscius non aduertit,  
nec Basilienfis castigat.

**Veratrū.]** Olim ueratrū album in usu frequentissimum  
erat, nunc nigrū, idque solum forte quod illud molestius eua-  
cuet. At ueratrū album si recte correctum exhibeatur, citra  
molestiā purgat, maxime atra bile laborātes, & lue hispanica.

**Hermoda-  
ctylus.** Hermodactylus.] Alius hic est ab eo quē officinæ hermo-  
dactylū appellant. Hermodactylus serapiones duo cōprehen-  
dit, ephemerū, & colchicū. Illud nō lethale, hoc perniciosum.  
Sed in Italia colchicū min⁹ noxiū est, officinarūq; hermodacty-  
lus, colchicū existit. Soluit ad sanguinē usq; Ephemerocarem.

**Eupatorium.]** Eupatoriū antiquorū est nostra agrimonia,  
quid autem nostrum Eupatoriū sit adhuc me nescire fateor.

**Spelta.** Zea.] In Germania inferiori, & Italia speltam appellant.  
Zithus.] Potus est ea ordeo aqua resoluto. uocant ubiq;  
cereuisiant quanquā ea ex aliis etiā frugibus fieri soleat.

**Isatis.]** Glastrum latini uocant. Galli Guadam.

**Caucamum.]** Serapionis lacca est, non autem ea quam offi-  
cinæ uendunt. Tria enim nomine laccae ueneunt, unum ue-  
rum caucamum, alterum grana quædam arte facta. Tertium  
unde color carmesinus confit.

**Oroscius,** Cadmia.] Manifestus error in græco. Legendum enim  
βοτρυίτις λεπτομερετέρα πλακίτις δὲ παχυμερετέρα. Oro-  
scius omisit Genusæus dissimulat me annotasse.

**Calamin-  
thæ.** Calamintha.] Nepita Romanis uocatur. Tres sunt spē. Pri-  
ma foliis ocymi, altera odorē pulegii habet. Tertia foliis men-  
tastri. Officinæ secundā uocant herbā cattorum. Tertiā cala-  
menthū, quæ cæteris est ignauior. Quidā secundā spēm, pprie  
Nepitā à Romanis noīari dicūt. Gal. aut libello de paratu faci-  
libus inqt, Calaminthā absolute Nepitā Romanas appellari.

**Caros.]** Officinæ Carui appellant.

**Carpesium.]** Myropolæ Cubebas nominant.

**Cubebæ.** Nux.] In græco deesse aliquid ex dictione καὶ intelligo.  
Nam Galenus ita habet, καρύα τὸ δένδρον ἔχει μέντι καὶ τοῖς  
βλαττοῖς τυπτικόν, καὶ τοῖς φύλλοις. Tu igitur hinc restitue. Ca-  
stigatores neglexerunt.

**Cassia.]** De Cassia odorata hic intellige Cassia fistula an-  
tiquis eadem erat quæ odorata. Officinarum Cinnamomū,  
seu



seu canellæ uilioris frustra, Cassia illa antiquorū uidetur. Nūc autem uulgus cassiā fistulā accipit pro siliqua illa humore nigro intus plena, ueterib. incognita. qua purgamus hodie bilē.

Cerasia. ] Acida inquit conueniunt phlegmaticis & excrementosis stomchis. Male in codice græco legitur φλεγματώδεσι καὶ φλεγματικῶις. Mutanda autem ex Galeno φλεγματώδεσι καὶ περιττωματικῶις. Quod Cēsores nři nō annotarūt.

Ceratonix. ] Pauli codex græcus habet, ξηραντικῆς ἐστὶ καὶ ψυκτικῆς hoc est siccantis facultatis est & refrigerantis. Galenus pro ψυκτικῆς, legit τυπτικῆς. hunc nos sumus imitati non admonuerunt castigatores, Nota,

Galla. ] Duo gallarū genera tantū in usu mediocrem sunt: unū solidū, alterū perforatū, aliorū compluriū nullus est usus.

Cinnamomum. ] Hoc caremus. Nam quod nos Cinnamomum, aut canellam uocamus cassia potius fistula antiquorum existit Nam cinamomum fistula aut canella non est, sed arbutum uide Galenum de Antidotis.

Hedera. ] Quod officinæ gummi hederæ, appellant, non est lachrima hederæ, sed alterius cuiusdam arboris quam igno- Gummi  
Hederæ.

Cichoreum. ] Paulus uocat cichoreum, syluaticam serem, seu, intybum. Græci tamē alii cichorei uocabulo tam domesticam, quā agrestem appellant Domestica duplex est, una latioribus foliis, lactucæ similibus quam uulgus corrupto uocabulo Endiuia quasi intybum nuncupant. Altera strictioribus folijs. Officinæ has duas scariolā quoq; nominant. Iam syluatica etiā duplex habetur, ac proprio nomine cichoreum seu picris ab amaritudine dicitur. Quanquam græci alij cichorei nomine, tam domesticā quā agrestem serim accipiāt. At quā hodie uulgus herbariorū Endiuia ostendit in aruis sponte nascentē, folio lactucæ pusillo, aculeato, caule spinulis horrido, cādicāte, cui succus inest lacteus, syluellris lactuca existit. Intybi species.

Clematis. ] Bis habetur in codice græco κληματίτις pro κλημάτις. non emendarunt censores. Orosius.

Cnicus. ] Officinæ Cartamum appellant.

Gummi. ] Arabicum intellige, absolute dictum.

Lixiuū. ] Protoſtaſton multi etiā celebres uiri trāstulerūt cinerē qui primus destillauerit, uerū ideo non est dictum lixiuū protoſtaſtū, sed quod primariū sit lixiuū, & principale. Lixiuum  
protoſtaſton.

H h 4 Costus ]



Costus. ] Vero costo caremus. Potest autem ex Arabia, aut Syria haberi.

Hordeum. ] Polenta græcis ἀλφίτα dicitur. Est autem proprie ordeum torrefactum. Pisana uero ordeum decorticatū.

Sigillum  
Mariæ.

Cyclaminus ] Duplex, prima species panis porcinus officinis, aut Rapum terræ latinis à rotunditate dicitur. Altera Sigillum Mariæ, officinis appellatur.

Lichen. ] Hæc est herba, quam officinæ hepaticam nominant, iocinorum fibris similis.

Leucoion. ] Per se signat uiolam albam quam gariophylla tam albam uulgo nominat. Refertur tamen nomen hoc leucoion, etiam ad omnes alias uiolas, præsertim ad eas quæ primo uere nascuntur, siue albæ, siue purpureæ, siue luteæ fuerint. Apud Columellam, habetur. Leucoia candida.

πεύκης  
πύτις  
κῶνος

Fuligo. ] Fuliginē pinī, conī, & piceæ acriorem esse prodit. Mirum in modū uariant interpretes in his uocibus reddendis misereq; se torquent. Gaza πεύκην transfert pinum, πέτιν, piceam. Κῶνον, Conum. Hunc fere secutus est Marcellus, nisi quod πεύκην exponat tedam. Conū autem nucē pineam interpretatur, ut accipit Dioscorides, aliq; ueteres græci. Galenus autem Canon arborē appellat, fructum eius, hoc est nucē. κόκκαλον, & τρόβιλον. Atq; hoc pacto apud Paulum accipi debet.

Lapides. ] In græco est μέρορος, lege μόρορος. Dioscorides uocat μόροχθον. alij etiam μόλοχθον.

Lycium. ] Officinæ uerum Lycium non habent.

Atramentum Indicum ] Dioscorides uocat lapidem Indicum, præterea astringentis esse naturæ tradit. unde codex Pauli græcus emendari debet legendūq; τῶν στιφόιτων pro τῶν ψυχόντων, quod Orosius non annotauit. Gemusæus dissimulat me id ostendisse, textumq; relinquit deprauatum.

Melantheria. ] Verti, creta sutoria, ex Scribonio qui ea caligulas calceamentorum tingi scribit.

Melanthium. ] Nigella est. Quam officinæ ostendunt, uera non est. Nam semē est subflauum, cū nigrū esse debeat, acutū, boni odoris. Galli melle noyre. Germani ratten appellār.

Myxa. ] Officinæ Sebestem nominant.

Oenanthe. ] Duplex, una solui foliis herba, quæ uitis nō est, sed ob fructū racemosum uitis appellat. Altera labrusca quæ à uite domestica nihil differat, nisi quæ syluestriē habitum referat,



referat, nec colitur, uocant Oenanthe, labruscæ flores, quam & herba sit eiuldem nominis.

Opos. ] Codex Pauli Græcus ὀπιον habet, Galenus ὀπος. ὀπος. Superius de lachryma papaueris quæ opium dicitur, actum est. Hic de laserpitii liquore: qui partim belzuinum partim assa fetida dicitur officinis.

Eruum. ] Dubitatur, an officinarum eruum uerum sit nam intus flauescit, cum album esse debeat.

Orminum. ] Vulgus in Gallia uocant: Toute bonne, aut Balsamitie.

Oryza. ] Vulgus Rizam appellat, prima adempta littera. Rizum.

Petroselinū. ] Verū petroselinū nō habemus, forte nostrū est apiū hortense, qđ Dioscorides cōdimētis accōmodatū dicit.

Peuce. ] Vbiq; interpretes græcorum πεύκη pinum, interim pinastrum reddunt.

Pistacea. ] Officinæ, phistica nominant, aut physticorum grana. codex græcus male habet λεπτων, pro λεπων. Nō emē darunt censores nostri. Phytica. Oroscius.

Pityides. ] Dioscorides pini, piceæq; fructus nominat. Galenus piceæ tātū, illosq; abuti dictione ait qui utriusq; arboris fructū ita appellāt. Sunt aut interni nucum pinearum nuclei.

Poligonatū. ] Officinæ Sigillum Mariæ, nel Salomonis dicunt, item genicularem & fraxinellam. Sigillum. Mariæ.

Pompholyx. ] Officinæ Tutiam nominant. codex Græcus σαρκώδεις hoc est carnosus ulceribus, pro καρκινώδεις habet. Tutia.

Propolis. ] Vnguentarii Ceram uirgineam nuncupant.

Resinæ. ] Dici non potest, quā interpretes Græcorū tum antiqui, tum recentiores in arborum quæ resinas fundunt, nomenclaturis euariant. E pinu dixi, quā Græci πεύκη uocāt, hanc Marcellus Thedam exponit, quā ratione, ignoro Gaza, Hermolaus pinū aut pinastrum. Strobilena. Hermolaus uerit Resina ē Strobilo, ut hæc etiam sit arbor. Nam Plinius de pinu & pinastro agens, Easdem arbores alio nomine esse per oram Italiæ, quas strobilas uocant, pleriq; arbitrantur, &c. Nota.

Eadem igitur arbor est strobilus, quæ Conos superius dicta est, pineas nuces ferēs. Ruellius interpretatus est. Resinā Strobilinam quæ ex nucibus pineis fiat, secutus Pliniū, qui 16. lib. inquit, pinus ferit minimū Resinæ, interdum ex nucibus ipsis.

Itaq;



Itaq; cōfundunt hæc nomina πεύκη, κώνον, τρόβιλον addit ἐκ πίτιν, pro pinu, aut pinastro, aut picea, cū inter se ēt uiribus respōdeāt, eoq; minus periculi est in expositionū diuersitate.

Rhus.] Officinæ sumach appellant.

Sagapenum.] Seplasiarij Serapinum uocant.

Sandaracha uera.

Sandaracha.] Officinæ ueram sandaracham non habent, aut saltē ignorāt, uernicē team uocantes. uera autē est, quæ in argēti fodinis cū auro & argēto inueniē, flāmeo colore ruffescit, ita ut cinnabarim quasi referat, odore sulphuris uirus. Id qđ in auripigmēto rubrū est, uera est sandaracha, licetq; auripigmēto loco sandarachæ uti, cū idē quasi sint, simulq; alterum alteri iunctū ex fodinis colligātur. Hoc solū differunt, qđ auripigmentum nondū à natura perfectū sit: sandaracha autem per concoctionem naturæ, debitum colorem acceperit.

Seseli.] Tria sunt genera seselios, Massiliēse, Aethiopicū, & peloponnesiacū. Massiliensis descriptio cōuenit cū nostro, siliari mōtano, ut uocant uulgares, at quod officinæ ostendunt, Aethiopici semen uidetur, facillimum est, uerum comparare.

Asa odorata.  
Asa foetida.

Sylphium.] Laserpitium herba est, Liqueor Laser uocatur. Affertur partim ex aphrica, armenia, & india, suauissimo odore, præsertim cyrenaicū, unde etiam liqueor Cyrenaicus apud autores uocatur, atq; hic officinis dicitur, asa odorata, seu belzuinū partim ex Media & Syria uiroso odore, qđ liqueorū Medicū, & Syriacū nuncupant, officinæ uero, assam foetidam.

Ceterat,

Sisymbrium.] In Gallia officinæ mentam aquaticam appellant. In Italia Menta florentina uel menta gētilis aut nobilis Nā magis odoratū est. Nisi colat, in nepetā degenerat.

Scammonium.] Officinæ raro uerum habent.

Scolopendrium.] Seplasiarum Ceter ac existit.

Orosius.  
Mirrha.

Scordion.] In fine sententiæ legitur in græco codice ἐπιπλαττόμενον, pro ἐπιπαττόμενον croco enim illini, sed inspergi sicca debent. Castigatores præterierunt.

Orosius.

Myrrha.] Quam officinæ uendunt myrrham, est deterri-  
ma species myrrhæ Optima subuiritidis esse debet: cōfracta, cā dida unguiu modo. Legit in codice Græco male ἐπιπλατομένη, pro ἐπιπαττομένη. Nec hoc annotarunt censores nostri.

Aluminis species.

Solanum.] Vulgus Solatrum nominat.

Alumen.] alumen scissile officinæ uocant alumē plumę, nimirum quod si frangitur, capillamenta ipsius, ueluti pluma esse



esse uideantur. Alumen rotundum raro in officinis inuenitur nonnunquam tamen inter singulorū lapides conspicitur, quibus uitis plumboq; mistis, uitrū paternū & laucium parant. Alumen liquidum, uocat seplapsia, rochæ alumen, cū foditur, liquidum est, postea durefcit: & si igni admoueaturs rursus liquefcit. Quod placitū & latercularium à Galeno & Paulo nūcupatur, forte est officinarum alumē scaiolæ, ex Gipsi fodinis, pellucens tanquā subtilissima ipsius portio. Sunt adhuc alia aluminis Genera in officinis, sed fictitia, Zuccarinum, quod ex alumine liquido aqua rosacea, & albumine oui conficitur. Mulieres huc fucum parant. Item alumen carinum ex herba quadam cali uulgo dicta, quæ autem sit adhuc ignoro.

Stryrax. ] Officinæ storax dicunt. Sed quam illæ uocant, sty racem liquidam uocant, myrrha est stacte. Calamitis autem storax, uerus styraç est de qua ueteres tractant. Stryrax,  
Stactæ.

Simphitum, ] Variant sententiæ recentiorū in huius herbæ cognitione. Adiectum est in codice Græco γλισχρόν τὶ καὶ κηρομώδες. Galenus habet γλισχρόν τὶ καὶ δακνῶδες, quod est uiscosum quippiam & mordax. Nota,

Scheni anthos. ] Officinæ squinanthos corrupto uocabulo appellant, uerti ego odorati ad differentiam palustris, & rotundi, ad differentiam quadrati seu angulosi. Sæpe autem alterum tantum adijcio, uel odorati, uel rotundi.

Calx. ] Perperam in codice græco erat, συντείνει pro θερμαίνει hoc est calefacit. Oroscius nō aduertit, Gemusæus dissimulat ne id ante eum annotasse. Oroscius,

Tragus frumentaceus. ] Ita dicitur, ut ab herba distinguatur. Nam herba quædam etiam Tragos dicitur.

Altercū. ] Deerat in codice græco τῶν ψυχράτων. Instaurauit ex Galeno. Oroscius libenter, omisit, & si necessario addatur, Gemusæus fingit se in exemplari antiquo inuenisse, sed textum tamen impressum, mutilum edidit.

Aes. ] In siccioribus corporibus conuenire dicit ad cicatricem ducendam, Sin autem eluatur, in teneris ultima clausula, deerat in codice Græco, necessario addenda, pp̄ superiore finiam, nempe in siccioribus, hoc est duris. Legēdum itaq; uenit, εἰ δὲ πλεονέχῃ τῆ ἀπλότητος ἐπὶ τῶν ἀπαλασσεμένων χρησιμώτερον. Ad uerbū fere ex Galeno. Nō obseruarūt cēsores nostri.

Chamædrys ] Quasi dicas humilis quærcus, unde etiam uulgas,



Iua mu-  
scata.

vulgus, querculam minorem appellat.

Chamæpitys ] Hoc est humilis pinus aut picea, officinæ Iuam muscatam uocant hanc antiquorum chamæpityn.

Chrysocolla. ] Officinæ uocant Borax.

Ocymum. ] Vulgo Basilicum dicitur.

#### IN IIII. CAPVT.

**A**D affectum induratum. ] Recte dixit *μοχλεῖσθαι* quasi uete quadam agitare. Male autem in codice græco *ἐσκιρῶ* *μεινν* pro *ἐσκληρω μένν*. neglexerunt castigatores.

Sed etiam à neruis & neruosis partibus ] Oroscius diligēs ut ipse sibi uideatur, castigator, legit in codice græco *ἀπὸ πλδ-  
γῶν*, quod est à costis aut latere ut idē uertit, pro *ἀπὸ νδρῶν*. Aetius & Oribasius nobiscum sentiunt.

Elaterium. ] Paulus aliter quàm Dioscorides Elaterium commendat porraceum. Nam candidum colore optimū uideretur Dioscoridi, nisi porraceum aliter intelligi debeat, quod Græci *περσίζον* nominant.

Lathyrides ] Species Tithymali est. Capit hic Paulus Lathyrides pro ipsis granis fruticis, cum alioquin lathyris ipse frutex uocetur. Dioscorides & Aetius *σπερμάτια* hoc est grana Lathyridis septem aut octo propinant.

Polypodium. ] In Græco codice est *ἐπιπλαθαῖα* pro *ἐπιπαθαῖα*. Nnn emendarunt Aristarchi nostri.

#### IN V. CAPVT.

**C**Olocynthis medullæ ] Hæc sunt Catapotia, quæ officinæ uocant Cochias. Deprauata autem est scriptura in codice Græco, habet enim *ἀλόης με. α.* hoc est, aloes pars una. Gale, unde Paulus transcripsit, lib. i. de compositione medicamentorum secundum locos, *ἀλόης* habet *με. ω.* hoc est partes duæ Castigatores omiserunt.

Purgatio ex malis cotoneis ] Nimis magnū uidetur pondus piperis, nempe uncie sex forte drachmæ sex.

Oliuæ purgantes. ] Habetur in compositione oliuariū colymbadum, icissarum, hoc est, ut melius perfundi liquore possint Aetius libro tertio, inquit, oliuas sigillatim tribus scissuris infectas in eodem liquore aliquot diebus cōficito & utere.

Catapota ex lapide armenico ] Scammonie pondus erat nimis grande, uncie sex, mendumq; in codice Græco esse puto, nam legitur s. hoc est uncie sex pro *το S* quid est semuncia facilis



cilis lapsus, cum quasi eadem literę utriusq; facies sit.

Vbi uenter inanitus.] In Gręco lege post κένωσιν, γατέ-  
ρος. Nō fuit uersa in γατέρος, ὀβόλους dictio, ut putat Castiga-  
tor Basiliēsis Orosci<sup>9</sup> hūc & superiorē locū prę studio omisit.

Puls.] In titulo est Gręce ὠδιδικαῖς tu fac οἰδῆδεκαῖς, quasi  
œdematosis.

## IN VII. CAPVT.

**F**RICTione & medicaminum potu.] non purgantiū, sed ob-  
tundentium uim medicaminis pręsumpti, intelligito.

## IN VIII. CAPVT.

**M**ELLIS quod sufficit.] Post τὸ ἀρκῆν. In codice Gręco, ad-  
de, ἄλλως. Hoc est aliter, omiserunt censores nostri.

Hiera Archigenis.] In Gręco cod. pro πολίς quidam φύλ-  
ας legunt.

## IN X. CAPVT.

**P**RECIPUÈ induratis.] Melius in codice Gręco legitur τῶν  
ἐσκληρωμένων pro τῶν ἀσκιζόμενων, quod est scyrrho ob-  
ductis. Nam scyrrhus nūquam potest emolliri aut discuti, aut  
medicamentis intro sumptis amoueri.

Apī radice.] Apios herba est, cuius radice alia pars sur-  
sum, alia infra purgat, ne putes hic apium, quod gręci σέλινον  
dicunt, intelligi.

Purgatio paulatim respondeat.] In Gręco est κατὰ λόγον,  
fac tu κατ' ὀλίγον. neglexerunt castigatores.

## IN XI. CAPVT.

**H**EDYCHROI.] Paulus ad uerbum quasi ex commētario Ga-  
leni ad Pamphilianum transcripsit: sed exemplaria mirū  
in modum uariant:

Carpobalsami.] Huc usq; conueniūt scripturę: Galenus  
in citato libello Carpobalsamum non habet: uerum primo  
de Antidotis, opobalsamum addit: non Carpobalsamum. Prę-  
terea in ponderibus dissentiunt, & in nonnullis aliis simplici-  
bus medicamentis. Galeni itaq; ad Pamphilianum codex ita  
pergit, lunci odorati floris drachmę duodecim, secūdū alios,  
uiginti quatuor. Cinamomi drachmę duodecim, amomi: Ca-  
się, rhapōtici singulorū drachmę quindecim, nardi indicę, fo-  
lij singul. drachmę sede cim, myrrhę, croci, singul. drachmę  
duodecim, uino falerno excipito in opobalsamū manus intin-  
gēs. Alia habet in cōmentario de Antidotis, sed uariat magis.

Pastilli



Pastilli scillini.] Carnis ipsius partes duæ, hoc est, ut Galenus ait drachmæ centum uiginti, erui farinæ drach. sexaginta.

Pastillorum Hedychroi.] Deest in Græco ἀγρίσκων. Antea uerteram magnatis hedychoi, secundum Galenū de Antidotis, quod Orosius reprehendit sine causa.

Nota.

Rosarum siccarum drachmæ duodecim.] Textus Græcus habet. <.ι. hoc est drachmæ quindecim. Orosius castigās locum, ait legendum <.ιι. quod est drachmæ undecim. Ego <.ιβ. hoc est drachmæ duodecim, scribendum esse iudico Galeni exemplaribus tum de Antidotis, tum ad Pamphilianum, tum uersibus Andromachi consentientibus.

Napi seminit.] Galenus adicit γογγύλιδος ἀγρίας, quod Orosius, est Rapi syluestris, præterijt Orosius.

Dictamni.] Post dictamni habetur in Græco αἰθους, quod expungi debet. Orosius ex Galeno.

Mastichæ Chiæ.] Pauli codex Chiæ non habet. Ex Galeno addendum.

Castiæ nigræ.] Galenus Castiæ fistulæ nigræ.

Nardi Indicæ.] Paulus ναρδοσάχυνος hoc est spicæ nardi, Sed Galenus ubiq; nardi indicæ habet, quanquam Aetios spicæ nardi etiam legat. Post nardi Indicæ, deest pondus in Græco < S hoc est drachmæ sex.

Carpobalsami.] In Codice Græco tantum erat βαλσάμου. Ex Galeno initaurandam καρποβαλσάμου.

Phu pōtici.] male legebat in Græco φε, ἀπὸ κ, ἢ πρὸς ποιντικῆ.

Centaurii.] Omnes Theriacæ descriptiones apud Galenū habent κενταυρίον quod est centaurii tenuis.

Liquore hypocisthidos.] Perperam in Græco ἔπυον ὑποκιστίδος pro ὀπον ὑποκιστίδος.

In nephriticis cū mulso.] Male Græcus codex habet ἐπὶ νεφρικῶν μετ' ὄζυ μέλιτος pro ἐπὶ νεφριτικῶν μετ' οἶνο μέλιτος, ex Galeno castigatum. Basilienfis castigator omisit.

Sumuntur uiperæ.] Ex libello Galeni de Theriaca ad Pāphilianū ad uerbū sunt trāscripta nisi quod deest in illo, apiī.

Rutæ satuæ seminis libra.] Paulus habet. β. hoc est sextarii duo, male nimirū pro λιτρά, ut habet Gale. omisit. Orosius.

Malabathri foliorū.] Codex Pauli habet singulorū uncia. Galenus uncis quatuor. Ita ēt Aetius. Neglexit Orosius.

Thymi summitatū.] Hic quoq; castigandus codex. Legendum ὅς



dumq; Γο.β. pro Γο.β. secundum Galenum & Aetium.

Piperis nigri, fœniculi singulorum libris.] Male in codice Græco Pauli λι.η. habet pro λι.β. sed facilis error erat, ponere ω. pro η primum signat β secundum, literam η τ α, quam Latini in e uertunt, ualet autem in numero, octo.

Tordyli montani.] Deest in codice Pauli, ex Galeno plane restituendum. Neglexerunt Orosius, & Gemusæus, tanquam non addenda compendio.

Philonis antidotum.] In Græco est εοσκυάμυ η. ubi legendum εοσκυάμου < η. quod præterierunt Aristarchi nostri.

Efdra.] in fine compositionis quidam legunt σέριως hoc est iutybi pro σεσέλεως.

Medicamentum Cyphoides.] Textus Græcus & mutilus, & deprauatus est. Legendum enim καλαμου < .β. S. βδελλίε < .β. S. κασσίας < .α. κιννάου τρίωβολον, νάρδου στάχυος < .γ. σχοίνε άνθους < .β. S. Orosius & castigator Basiliensis reliquerunt textum deprauatum.

Compositio atactos, Piperis albi & nigri.] Deest in codice Græco πίπεριως. Orosius omisit.

## IN XII. CAPVT.

TERRA samia cū cremore ptisanæ.] In Græco est διαχυλῆ πτίσανης, forte μετὰ χυλῆ. Notauit etiam Orosius, Gemusæus autem omisit.

Herbæ pulicaris succo.] In fine capitis puto Græcū codicē esse deprauatū, quā proximē aūt licuit, ad ueritatē cōuerti.

## IN XVI. CAPVT.

SI quidem uino, aut succo.] Codex Græcus hic rursus deprauatus est. Habet enim εἰμὴ οἶνω ἢ χύλω τινὶ λειπύντε καὶ τρίβειν, &c. pro εἰ μὲν οἶνω καὶ τρίβειν δεῖ αὐτὰ. Neglexit castigator Basiliensis.

Lesio Græca deprauata.

## IN XVII. CAPVT.

OESYPO.] In principio Capitis Græcus codex habet, εσωπῶ ᾧ οἶσι πῶ hoc est Oesypos. Aristarchi nři præterierūt.

Lixiui e ficu cui calx.] Græci hoc lixiuium uocant κοῖαν προτότακτον Orosius, aliq, multi uertunt, lixiuium quod primum distillauerit, Paulus autem lib. 7. ipse interpretatur, lixiuium cui calx sit admista.

Orosius,

Emplastrum ex dictamno.] Textus Græcus deprauatus corrigi debet ex Galeno de compos. medicamentorū secundum

dum



dum genera in hunc modū λεπιδος < S χαλκῆ κεκαύμενου  
< κ αλοῆς. < κ. χαλβάνης. < ιβ. ut nos uertimus.

Aristolochiæ rotundæ & longæ drachmæ quatuor. ] In em-  
plastro dia cinnabareos codex Græcus habet post pōdus præ-  
scriptum Γο. S quod est semuncia. Sed quatuor drachmæ ua-  
lent semuncia, puto superfluum Neglexerunt Castigatores.

Olei ueteris. ] In fine Emplastri ex lapidis alij flore. Græ-  
cus codex superflue habet ὄξους δρυμιτάτου. Nam superius  
mētione aceti fecerat Paulus. Orosius & Gemus. omiserunt.

## IN XVIII. CAPVT.

Sertulæ cāpanæ. ] In malagmate polyarchio, Deest μελιλέ-  
τῃ. Instauratum ex Galeno. Neglexerūt hoc correctores.


Pentamyron. In medicamento quædam sunt superflua, &  
nomen ipsum Græcum indicat, quinq; tantum significans, &  
Oribasius consentit. Ita autem sonant ea quæ adijciuntur, fo-  
lia tum, phylli uncia tres, ammoniaci uncia: Cassiæ uncia sex,  
Ladani, &c. aut in fine addendum, ladant uncia sex.

Seui Taurini ] In medicamento diaspermaton deest co-  
dici græco λ. ι. Vt sit seui Taurini libra. Sic etiam habet Ale-  
xander medicus, omisit Orosius & castigator Basiliensis.

Copton. ] Sic dicitur medicamentum, quod nō coquitur,  
uerum tunditur, & succis aut liquidus affulsis, ad figuram ma-  
lagmatis redigitur.

## FINIS LIBRI VLTIMI

## COMMENTARIORVM.



## REGISTRVM.

\* \* \* \* \* abcdefghiklmnopqrstuxyz,  
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z,  
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh.

Omnes sunt quaterniones,

